LINNEAN
QK91
.C113
1788
t.1
pt.4

CAROLI A LINNÉ SYSTEMA NATURAE.

TOM. I. PARS IV.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.

CLASSIS V.

INSECTA.

In his tam parvis, atque tam nullis
Quae ratio? quanta vis!
Quam inextricabilis perfectio!

Plin. XI. 2.

ANIMALCULA polypoda, *ſpiraculis* lateralibus reſpirantia, *cute* cataphracta aut pilis hirta; *antennis* mobilibus ſentientibus inſtruuntur.

CORPUS horum dividitur in *caput*, *truncum*, *abdomen*, *artus*.

CAPUT plerisque diſtinguendum *inſtruitur* cerebro minuto, oculis, antennis, ſaepius ore; *deſtituitur* naribus, auribus, etſi, nonnullis certe, evidenter competat olfactus et auditus.

Oculi plerisque bini. absque palpebris, ſimplices parvi, aut compoſiti magni hemiſphaerici vel polyedri, rarius mobiles aut ſtipitati; his vident colores.

Antennae binae, articulatae, ſenſu tactus, ut videtur, inſtructae, ſunt *ſetaceae*, *filiformes*, *moniliformes*, *clavatae*, *capitatae*, *fiſſiles*, *pectinatae*, *barbatae*, corpore *breviores*, *longiores*, *mediocres*.

Palpi articulati, ori affixi, plerisque quatuor ſ. ſex: articulis 2, 4, 3.

Os paucioribus nullum, plurimis ſub capite, quibusdam in pectore; *roſtro*, *labio*, *maxillis* transverſis ad latera mobilibus, *dentibus*, *lingua*, *palato*.

Stemmata verticis puncta tria elevata nitida.

TRUNCUS, inter caput et abdomen, pedatus, *thorace* ſupra *dorſo*, poſterius *ſcutello*, ſubtus *pectore ſternoque*.

ABDOMEN ventriculo, inteſtinis, viſceribusque foetum, inciſuris 5, annulatum, *ſpiraculis* poroſis lateribus pertuſum, ſupra *tergo*, ſubtus *ventre*, poſterius *ano* terminatum.

ARTUS ſunt *cauda*, *pedes*, plurimisque *alae*.

Cauda abdomen terminans, eſt vel *ſolitaria*, vel *bicornis*; ſimplex vel armata *forcipe*, *furca*, *ſeta* vel *aculeo* ſimplici vel compoſito, laevi vel ſerrato.

Pedes trunci *femoribus*, *tibiis*, plantae *tarſis*, digitorum *unguibus*; manus (*chela*) nonnullis, ſimplex pollice mobili; poſteriores pro uſu *ſaltatorii*, *curſorii*, *natatorii*.

Alae duae vel quatuor ſunt vel *planae*, *plicatiles*, *erectae*, *patentes*, *incumbentes*, *deflexae* vel *reverſae*, *dentatae*, *caudatae*, *reticulatae*, *maculis*, *faſciis*, *ſtrigis*, *lineis*, *punctis* pictae, vel *ſtigmatibus* notatae, *ocellis* ornatae, idque vel in *primoribus* vel in *ſecundariis*, tam in *pagina ſuperiore*, quam *inferiore*.

Elytra (alae ſuperiores) cruſtacea bina, ſaepius mobilia, *truncata*, *ſpinoſa*, *ſerrata*, *ſcabra*, *ſtriata*, *porcata*, *ſulcata*, *punctata*, tegentia alas inferiores. *Hemelytra* media quaſi alas inter et elytra.

Halteres ſub alis dipterorum ex petiolo capitati.

SEXUS *Mas* et *Femina* generant perfecta.

Neutra nonnullis (formicae, veſpae, api) ſocietate foederatis.

METAMORPHOSIS plurimis triplex, mutanda ſtructura, exutis ovi tunicis, una poſt alteram.

Ovum ſub minima mole veſicaria excluditur.

Larva (Eruca) ſuccoſa, mollior, major, aptera, ſterilis, tardior, interdum apus, ſaepeque polypus, vorax alimento proprio.

Pupa (Nympha, Chryſalis) ſiccior, coarctata, durior, *nuda* vel *folliculata*, ſaepe ſine ore, vel *pedata* 1. 2. 3. vel *apus* 4. 5.

1. *completa*, omnibus partibus agilis (aranea, acarus, oniſcus.)
2. *ſemicompleta* ſolis alarum rudimentis (gryllus, cicada, cimex, libellula, ephemera.)
3. *incompleta*, alis pedibusque immobilis (apis, formica, tipula.)
4. *obtecta*, thorace abdomineque diſtincto corticata (lepidoptera, eaque vel nuda, vel folliculata).
5. *coarctata* intra globum (muſca, oeſtrus).

Imago revelata, declarata, perfecta generans, agilis, antennis inſtructa.

triplex itaque ſtructura et cognitio ejusdem animalis.

HAEC

Verboſitas, praeſente ſeculo calamitas artis inſectorum, ut pauciloquium vermium.

HAEC *muta*, niſi alio proprio inſtrumento, tympano thoracico, alisve ſonora; *ſurda*, (pleraque,) ſtridorem aetheris licet percipiant; *plura* ubique plantarum ſpeciebus, ſed ob regionem ſibi magis patentem in orbe pauciora, *tropica*, *arctica* et *antarctica*; ſingula demum *minima*, annua, exceptis aquaticis aliisque paucioribus, ſed univerſa maximae molis animantia, effectuque pariter maxima, et magis occulto magisque diſperſo, ideoque minus coercendo; totidem enim ſunt naturae annui miniſtri, propriis negotiis peragendis praefixi, quot muniis ſufficiant, proportionem inter plantas ſervando, erronea, ſuperflua, mortua, putrida, conſumendo, aliis demum, inprimis avibus in alimentum cedendo.

HABITANT inſecta in iis tantum plantis, e quibus (non in quibus,) victitant, unde ſaepius nomina *trivialia* optima, ut ars cum *politia naturae* combinatur; aliis alia muneribus praefixa praeparant, purgant, deſtruunt neceſſaria.

ENTOMOLOGI praeſtantiores delineando figuras, deſignando attributa et characteres, diſponendo ordines inclaruere.

Veteres *Mouffet*, *Aldrovandi*, *Jonſton*, *Rai*.

Metamorphoſii *Goedart*, *Meriana*, *Albin*, *Friſch*, *Roeſel*, *Wilkes*, *Kleemann*, *Ammiral*, *Harris*.

Philoſophi *Swammerdam*, *Leſſer*, *Reaumur*, *de Geer*, *Bonnet*, *Lyonnet*, *Goeze*, *Koch*.

Iconographi *Clerck*, *) *Sepp*, *Roeſel*, *Hoeffnagel*, *Bradley*, *Robert*, *Petiver*, *Schaeffer*, *Voet*, *Fueſſli*, *Hollar*, *Amiral*, *Drury*, *Cramer*, *Eſper*, *Knoch*, *Jablonsky*, *Bergſtraeſſer*, *Herbſt*, *Capieux*.

Deſcriptores *Rai*, Fauna ſuecica (*edit.* 2. *Holm.* 1761. 8.) Muſeum Reginae *Holm.* 1764. *Koelreuter*, *Pallas*, *Thunberg*, *Schranck*, *a Laicharting*, *Schreber*, *J. R. Forſter*, *Pollich*, *Lang*, *Harrer*, *Bjercander*, *Knoch*, *Schaller*, *Scriba*, *Schroeter*, *Mayer*.

Monographi *Liſter*, *Schaeffer*, *Clerck*, *v. Gleichen*, *O. Fr. Müller*, *Herbſt*, *Kob*, *Loſchge*, *Panzer*.

Syſtematici *Syſtema naturae*, *Poda*, *Sulzer*, *Geoffroi*, *Scopoli*, *Gronovius*, T. *Bergmann*, *de Geer*, *Schluga*, *Brünnich*, *Schiefermüller*, *Fabricius*.

*) Clerckii icones inſectorum *pulcherrimum opus*, *quod Academia Regia ſcientiarum Holmienſis ab interitu vindicavit.*

ORDINES inſectorum ab alis deſumti.

Alae 4	Superiores	cruſtaceae ſutura recta	*Coleoptera*	1.
		ſemicruſtaceae incumbentes	*Hemiptera*	2.
	Omnes	imbricatae ſquamis	*Lepidoptera*	3.
		membranaceae ano inermi	*Neuroptera*	4.
		membranaceae ano aculeato	*Hymenoptera*	5.
Alae 2, halteres loco poſteriorum			*Diptera*	6.
Alae 0 ſ, absque alis et elytris			*Aptera*	7.

CHA-

Quaeſo ne haec legentes,
quoniam in his ſpernunt multa,
etiam relata faſtidio damnent,
cum in contemplatione naturae
nil poſſit videri ſupervacaneum.

PLIN.

CHARACTERES INSECTORUM.

I. COLEOPTERA.

* *Antennis clavatis extrorſum incraſſatis.*

a) *clava* lamellata.

189.	SCARABAEUS.	*Tibiae* anteriores dentatae.
190.	LUCANUS.	*Penicilli* duo ſub labio palſpigeri.

b) *clava perfoliata.*

191.	DERMESTES.	*Caput* inflexum ſub thorace vix marginato.
	MELYRIS.	*Labium* clavatum, emarginatum.
195.	BYRRHUS.	*Labium* porrectum, bifidum.
196.	SILPHA.	*Thorax* et *elytra* marginata.
	TRITOMA.	*Palpi* anteriores ſecuriformes.
	HYDROPHILUS.	*Maxilla* bifida.

c) clava *ſolida.*

193.	HISTER.	*Caput* retractile intra thoracem.
	PAUSUS.	*Antennae* biarticulatae: clava uncinata.
	BOSTRICHUS.	*Caput* inflexum ſub thorace vix marginato.
	ANTHRENUS.	*Maxilla* bifida.
	NITIDULA.	*Thorax* et *elytra* marginata.
198.	COCCINELLA.	*Palpi* anteriores ſecuriformes, poſteriores filiformes.
202.	CURCULIO.	*Roſtrum* elongatum corneum.

** *Antennis moniliformibus.*

	BRENTUS.	*Roſtrum* elongatum, corneum, rectum.
203.	ATTELABUS.	*Roſtrum* elongatum, incurvum.
	ERODIUS.	*Labium* corneum, emarginatum.
217.	STAPHYLINUS.	*Elytra* dimidiata, alas tegentia. *Veſiculae* 2 *ſupra caudam exſerendae.*
	SCAURUS.	*Labium* truncatum, integrum.
	ZYGIA.	*Labium* elongatum, membranaceum.
215.	MELOE.	*Thorax* ſubrotundus. *Caput* gibbum, inflexum.
214.	TENEBRIO.	*Thorax* marginatus. *Caput* exſertum. *Corpus* oblongum.
197.	CASSIDA.	*Corpus* ovatum. *Elytra* marginata. *Caput* tectum clypeo.
	OPATRUM.	*Thorax* et *elytra* marginata.

216.	MORDELLA.	*Laminae* ad baſin abdominis. *Caput* inflexum.
199.	CHRYSOMELA.	*Corpus* ovatum, immarginatum.
	HORIA.	*Palpi* inaequales. *Maxilla* bifida. *Labium* rotundatum.

*** *Antennis filiformibus.*

	APALUS.	*Thorax* ſubrotundus. *Caput* gibbum, inflexum.
	MANTICORA.	*Maxillae* exſertae, dentatae. *Oculi* prominuli.
	PIMELIA.	*Thorax* marginatus. *Caput* exſertum. *Corpus* oblongum.
194.	GYRINUS.	*Antennae* rigidulae. *Oculi* 4.
	CUCUJUS.	*Labium* breve, bifidum: laciniis diſtantibus.
	CRYPTOCEPHALUS.	*Corpus* ovatum, immarginatum.
201.	BRUCHUS.	*Antennae* extrorſum craſſiores.
192.	PTINUS.	*Thorax* caput recipiens. *Antennae* articulis ultimis longioribus.
200.	HISPA.	*Antennae* porrectae, approximatae, fuſiformes.
211.	BUPRESTIS.	*Caput* dimidium intra thoracem retractum.
206.	NECYDALIS.	*Elytra* dimidiata: alis nudis.
207.	LAMPYRIS.	*Elytra* flexilia. *Thoracis* clypeus caput obumbrans recipiensque.
208.	CANTHARIS.	*Elytra* flexilia. *Abdomen* lateribus plicato-papilloſum.
	NOTOXUS.	*Labium* bifidum: laciniis conniventibus obtuſis.
209.	ELATER.	*Pectoris* mucro e poro abdominis reſiliens.
	CALOPUS.	*Thorax* ad latera mucronato-calloſus.
	ALURNUS.	*Maxilla* fornicata.
213.	CARABUS.	*Thorax* obcordatus, poſterius truncatus.
	LYTTA.	*Thorax* ſubrotundus. *Caput* gibbum, inflexum.

**** *Antennis ſetaceis.*

	SERROPALPUS.	*Palpi* anteriores profunde ſerrati.
204.	CERAMBYX.	*Thorax* ad latera mucronato-calloſus.
205.	LEPTURA.	*Elytra* apice attenuata. *Thorax* teretiuſculus.
	RHINOMACER.	*Antennae* roſtro inſidentes.
	ZONITIS.	*Labium* emarginatum.
210.	CICINDELA.	*Maxillae* exſertae dentatae. *Oculi* prominuli.

Genera *naturalia auctorum*, metamorphoſi demonſtranda, vitam ſcientiae largiuntur.

Genera *falſa tironum*, ex ludicro principio deducta totidem foetidiſſimis ulceribus artem pulcherrimam commacularunt.

212. DYTICUS. *Pedes* poſteriores ciliati, natatorii.
218. FORFICULA. *Elytra* dimidiata: alis tectis. *Cauda* forcipata.

II. HEMIPTERA.

219. BLATTA. *Os* maxilloſum. *Alae* coriaceae, planae. *Pedes* curſorii.
PNEUMORA. *Os* maxilloſum. *Alae* membranaceae, deflexae. *Pedes* curſorii. *Corpus* cavum, inflatum, diaphanum.
220. MANTIS. *Os* maxilloſum. *Pedes* anteriores ſerrati: ungue unico.
221. GRYLLUS. *Os* maxilloſum. *Pedes* poſteriores ſaltatorii.
222. FULGORA. *Roſtrum* inflexum. *Frons* producta, inermis. *Antennae* capitatae.
223. CICADA. *Roſtrum* inflexum. *Pedes* poſteriores ſaltatorii.
224. NOTONECTA. *Roſtrum* inflexum. *Pedes* poſteriores natatorii (ciliati.)
225. NEPA. *Roſtrum* inflexum. *Pedes* anteriores cheliferi.
226. CIMEX. *Roſtrum* inflexum. *Pedes* curſorii. *Antennae* thorace longiores.
MACROCEPHALUS. *Roſtrum* inflexum. *Antennae* breviſſimae.
227. APHIS. *Roſtrum* inflexum. *Abdomen* bicorne.
228. CHERMES. *Roſtrum* pectorale. *Pedes* poſteriores ſaltatorii.
229. COCCUS. *Roſtrum* pectorale. *Abdomen* (maribus) poſterius ſetoſum.
230. THRIPS. *Roſtrum* obſoletum. *Alae* incumbentes abdomini reflexili.

III. LEPIDOPTERA.

231. PAPILIO. *Antennae* extrorſum craſſiores. *Alae* erectae.
232. SPHINX. *Antennae* medio craſſiores.
233. PHALAENA. *Antennae* introrſum craſſiores.

IV. NEUROPTERA.

234. LIBELLULA. *Cauda* forcipata. *Os* multi-maxilloſum. *Alae* extenſae.
235. EPHEMERA. *Cauda* ſetis 2-3. *Os* edentulum. *Alae* erectae.
238. MYRMELEON. *Cauda* forcipata. *Os* bidentatum. *Alae* deflexae.
236. PHRYGANEA. *Cauda* ſimplex. *Os* edentulum. *Alae* deflexae.
237. HEMEROBIUS. *Cauda* ſimplex. *Os* bidentatum. *Alae* deflexae.
239. PANORPA. *Cauda* chelata. *Os* roſtratum. *Alae* incumbentes.
240. RAPHIDIA. *Cauda* filo 1. *Os* bidentatum. *Alae* deflexae.

V. HYMENOPTERA.

241.	CYNIPS.	*Aculeus* ſpiralis!
242.	TENTREDO.	*Aculeus* ſerratus! bivalvis.
243.	SIREX.	*Aculeus* ſerratus ſub abdominis ſpina terminali.
244.	ICHNEUMON.	*Aculeus* exſertus! triplex.
245.	SPHEX.	*Aculeus* punctorius. *Alae* planae. Lingua *inflexa trifida.*
	SCOLIA.	*Lingua* inflexa, trifida. *Labium* apice membranaceum.
	THYNNUS.	*Lingua* breviſſima, involuta. *Labium* trifidum.
	LEUCOSPIS.	*Labium* maxilla longius emarginatum. *Antennae* clavatae.
	TIPHIA.	*Labium* breve, corneum, tridentatum.
	CHALCIS.	*Antennae* breves, cylindricae, fuſiformes.
246.	CHRYSIS.	*Aculeus* punctorius. *Abdomen* ſubtus fornicatum.
247.	VESPA.	*Aculeus* punctorius. *Alae* ſuperiores plicatae!
248.	APIS.	*Aculeus* punctorius. *Lingua* inflexa!
249.	FORMICA.	*Aculeus* obſoletus. *Alae* neutris nullae!
250.	MUTILLA.	*Aculeus* punctorius. *Alae* neutris nullae.

VI. DIPTERA.

* *proboſcide et hauſtello.*

	DIOPSIS.	*Caput* bicorne: oculis terminalibus.
252.	TIPULA.	*Hauſtellum* ſine vagina. *Palpi* 2 porrecti, filiformes.
253.	MUSCA.	*Hauſtellum* ſine vagina, ſetis inſtructum.
254.	TABANUS.	*Hauſtellum* vagina univalvi ſetisque inſtructum.
256.	EMPIS.	*Proboſcis* inflexa.
257.	CONOPS.	*Proboſcis* porrecta, geniculata.

** *hauſtello ſine proboſcide.*

251.	OESTRUS.	*Hauſtellum* retractum intra labia connata, poro pertuſa.
258.	ASILUS.	*Hauſtellum* rectum, bivalve, baſi gibbum.
	STOMOXYS.	*Hauſtellum* vagina univalvi convoluta, baſi geniculata.
255.	CULEX.	*Vagina* exſerta, univalvis, flexilis: ſetis 5.
259.	BOMBYLIUS.	*Hauſtellum* longiſſimum, rectum, ſetaceum, bivalve.
260.	HIPPOBOSCA.	*Hauſtellum* breve, cylindricum, rectum, bivalve.

VII. APTERA.

* *Pedibus ſex, capite a thorace diſcreto.*

261.	LEPISMA.	*Cauda* ſetis exſertis.
262.	PODURA.	*Cauda* bifurca, inflexa, ſaltatrix.
263.	TERMES.	*Os* maxillis duabus. *Labium* corneum, quadrifidum.
264.	PEDICULUS.	*Os* aculeo exſerendo.
265.	PULEX.	*Os* roſtro inflexo cum aculeo. *Pedes* ſaltatorii.

** *Pedibus 8-14, capite thoraceque unitis.*

266.	ACARUS.	*Oculi* 2. *Pedes* 8. *Palpi* compreſſi.
	HYDRACHNA.	*Oculi* 2-8. *Pedes* 8 in anteriore corporis parte. *Papillae* textoriae.
268.	ARANEA.	*Oculi* 8. *Pedes* 8. *Papillae* textoriae. *Palpi* clavati.
267.	PHALANGIUM.	*Oculi* 4. *Pedes* 8. *Palpi* chelati.
269.	SCORPIO.	*Oculi* 8. *Pedes* 8. *Palpi* chelati.
270.	CANCER.	*Oculi* 2. *Pedes* 10: primo chelato.
271.	MONOCULUS.	*Oculi* 2. *Pedes* 12: decem chelatis.
272.	ONISCUS.	*Oculi* 2. *Pedes* 14.

*** *Pedibus pluribus, capite a thorace diſcreto.*

273.	SCOLOPENDRA.	*Corpus* lineare.
274.	JULUS.	*Corpus* ſubcylindricum.

In nova fert animus mutatas dicere formas corpora.

I. COLEOPTERA.

Elytra alas tegentia.

189. SCARABAEUS. *Antennae* clavatae: clava lamellata.
Palpi 4.
Mandibula cornea *ſubedentula.*
Tibiae anteriores ſaepius dentatae.

* *palpis filiformibus.*
† *mandibula arcuata.*
a) *plane edentula*, Scarabaei Fabricii.
ℵ) *thorace cornuto.*
α) *ſcutellati.*

Hercules. 1. Sc. thoracis cornu incurvo maximo: ſubtus barbato unidentato, capitis recurvato: ſupra multidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 3. *Gronov. zooph.* 412. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 1. *f.* 1. 2. *Voet coleopt. t.* 12. *f.* 98. *Drury inſ.* 1. *t.* 30. *f.* 1. 2. *Aubent. miſc. t.* 41. *f.* 2. *Fabric. ſpec. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 1.
Marcgr. braſ. 247. *f.* 3. Taurus volans ſ. Eruma.
Jonſt. inſ. t. 16. *f.* 1.
Olear. muſ. t. 16. *f.* 1.
Petiv. gazoph. t. 70. *f.* 1. Rhinoceros americanus cinereus, roſtro nigro nitente.
Edw. glean. t. 334.
Grew muſ. 162.
Roeſ. inſ. II. *Kaef.* 1. *t.* A. *f.* 1. *inſ.* IV. *p.* 45. *t.* 5. *f.* 3.
Degeer inſ. 4. *p.* 304. *n.* 2. *t.* 18. *f.* 9. Scarabaeus ſcutellatus niger &c.
Habitat in America, *varians elytris piceis et glaucis nigropunctatis.*
Femina mutica.

Alcides. 91. Sc. thoracis cornu incurvo ſubtus barbato unidentato, capitis recurvato mutico. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 2.
Habitat in India, *Hercule duplo minor, an ejus varietas?*

Gideon. 2. Sc. thoracis cornu incurvo maximo ſubtus laevi apice bifido, capitis recurvato ſupra unidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 3. *Gron. zooph.* 413. *Voet coleoptr. t.* 12. *f.* 100. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 1. *f.* 3.
Edw. av. t. 40.
Roeſ. inſ. 2. *Kaeſ.* 1. *t.* A. *f.* 5.
Swammerdam bibl. nat. t. 30. *f.* 2.
Aubent. miſc. t. 40. *f.* 3.
Habitat in America *auſtrali et* India, *an vere a* praecedentibus *diverſus?*

Centaurus. 92. Sc. thoracis cornu incurvo baſi bidentato apice bifido, capitis recurvato unidentato. *Fabric. ſp. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 4. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 2. *f.* 1.
Drury inſ. 1. *t.* 36. *f.* 1. Scarabaeus Gideon.
Habitat in India *et* Africa.

Oromedon. 93. Sc. thoracis cornu brevi emarginato, capitis recurvato bifido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 5. *Drury inſ.* 1. *t.* 36. *f.* 5. *Aubent. miſc.* 1. *t.* 40. *f.* 4. *Voet coleopt. t.* 13. *f.* 102. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in America *auſtrali et* India.

Aegeon. 94. Sc. rufus, thoracis cornu brevi incurvo ſubtus barbato, capitis recurvo ſubulato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 6. *Drury inſ.* 2. *t.* 30. *f.* 5. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 1. *f.* 4.
Habitat in America *auſtrali et* India.

diſpar. 95. Sc. cornu (in mare) thoracis ſubulato protenſo, capitis ſubulato ſubrecurvo, ſcutello cordato. *Fabric. ſp. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 7. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 2. *f.* 3. 4.
Pall. it. 1. *p.* 461. Scarabaeus polyceros.
Pall. it. 3. *p.* 707. *ic. inſ. Ruſſ. indig.* 1. *t.* A. *f.* 8. A. B.
Habitat in regionibus Ruſſici *imperii magis auſtralibus, ater, ſtercorarii magnitudine.*
Feminae nec thorax, nec caput cornutum, ſed utrumque antrorſum bidentatum.

Chorinaeus. 96. Sc. thoracis cornu incurvo baſi craſſiſſimo apice bifido, capitis longiori recurvo bifido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 8. *mant.* 1. *p.* 4. *n.* 8. *Voet coleopt. t.* 13. *f.* 104. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat in Braſilia, *pani affinis.*

89. Sc.

dichotomus. 89. Sc. thoracis cornu bidentato, capitis dichotomo, elytris rufis. *Mant.* 1. 529. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 9. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 2. *f.* 6.
Aubent. miſc. t. 40. *f.* 5.
Voet coleopt. t. 14. *f.* 107.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 1.
Habitat in America *auſtrali et* India.

claviger. 90. Sc. rufus, thoracis cornu elevato, capitis ſubulato recurvo. *Mant.* 1. 529. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 10.
Aubent. miſc. 1. *t.* 40. *f.* 1.
Drury inſ. 3. *t.* 48. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 14. *f.* 108.
Habitat in America *auſtrali et* India.

haſtatus. 97. Sc. thoracis cornu brevi fornicato haſtato ſubtus hirto, capitis recurvo. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 11.
Habitat in America *meridionali.*

Enema. 98. Sc. thoracis cornu incurvo ſimplici baſi craſſiſſimo, capitis recurvo bifido. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 12.
Habitat in India, *pani affinis.*

Pan. 99. Sc. thoracis cornu incurvo baſi craſſiſſimo apice bifido, capitis recurvo unidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 12. *mant.* 1. *p.* 4. *n.* 13.
Habitat in America *auſtrali et* India.

Jaſon. 100. Sc. thoracis cornu craſſiſſimo apice emarginato, capitis unidentato trifido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 15. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 3. *f.* 3.
Swammerd. bibl. nat. t. 30. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 13. *f.* 103.
Aubent. miſc. t. 15. *f.* 4.
Habitat in Sina, *Chorinaeo affinis.*

validus. 101. Sc. thorace anterius retuſo: cornu conico breviſſimo, capite bituberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 16.
Habitat in Braſilia, *rhinocerotis magnitudine.*

truncatus. 102. Sc. thorace retuſo, cornu brevi truncato, capite mutico. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 17.
Habitat in nova Seelandia, *naſicornis magnitudine.*

103. Sc.

Eurytus. 103. Sc. thorace anterius retuſo: cornu brevi incumbente emarginato, capite mutico. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 18.
Habitat in America, *niger.*

Actaeon. 3. Sc. glaber, thorace bicorni, capitis cornu unidentato apice bifido, elytris laevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 4.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 18. *mant. inſ. p.* 5. *n.* 19. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 3. *f.* 4.
Marcgr. braſil. 246. Enema.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* A. *f.* 2.
Swammerd. bibl. nat. t. A. *f.* 2.
Petiv. gazoph. t. 15. *f.* 12.
Seb. muſ. 4. *t.* 90. *f.* 3. 4.
91. *f.* 3.
Aubent. miſc. t. 5. *f. inf.*
Voet coleoptr. t. 16. *f.* 111. 112.
Merian. ſur. t. 72.
Huffn. pict. 1. *t.* 1.
Habitat in America, *omnium hactenus cognitorum inſectorum, cancris monoculisque exceptis, maximum.*
Thoracis *cornua antrorſum verſa, conica.*

Simſon. 4. Sc. thorace bicorni, capitis cornu apice bifido, clypeo denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 5.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 20.
Habitat in America *auſtrali et* India, *actaeoni affinis, at quadruplo minor, ſupra laevis, piceus.*
Caput *anterius bidentatum;* thoracis *cornua lanceolata, porrecta, non capite, ſed cornu capitis longiora.*

Elephas. 104. Sc. villoſus, thorace gibbo bicorni, capitis cornu unidentato apiceque bifido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 20. *mant. inſ. p.* 5. *n.* 21.
Olear. muſ. t. 16. *f.* 2.
Habitat in Guinea, *actaeoni affinis, at villoſus.*

Boas. 105. Sc. thorace retuſo excavato bidentato, capitis cornu recurvo ſimplici. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 22.
Habitat ad Sierra Leona.

Coryphaeus. 106. Sc. thorace bicorni, corpore ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 23.
Habitat ad caput bonae ſpei, *vernalis magnitudine et ſtatura.*

bicornis. 107. Sc. thorace bicorni, capitis cornu recurvo unidentato, elytris rufis. *Lesk. Anf. der Naturg.* 1. *t.* 9. *f.* 1. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 4. *f.* 1. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 24.
Aubent. miſc. t. 15. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, naſicornis magnitudine.*

Tityus. 5. Sc. thoracis cornu intermedio maximo ſimpliciſſimo, capitis cornu recurvato ſimpliciſſimo. *Amoen. ac.* 6. *p.* 39. *n.* 1.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 8. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 26. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 4. *f.* 2. Scarabaeus ſcutellatus glaucus, thorace tricorni: lateralibus breviſſimis ſubulatis, medio ſubtus barbato, capitis cornu recurvato ſimpliciſſimo.
Gron. zooph. t. 14. *f.* 8. Scarabaeus thorace tricorni laevi: intermedio maximo incurvo ſubtus barbato, capitis cornu maximo recurvo.
Aubent. miſc. 1. *t.* 14. *f.* 8.
Voet Kaeſ. t. 12. *f.* 99.
Degeer inſ. 4. *t.* 18. *f.* 10.
Habitat in America, *herculi ſimilis, at parvus.*
Elytra *nunc nigra glauco-maculata, nunc glauca, nigro-maculata.*

Atlas. 6. Sc. thorace tricorni: anteriore breviſſimo, capitis cornu adcendente. *Muſ. Lud. Ulr.* 6.*
Fabr. ſpec. inſ. 1. *p.* 9. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 27. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 4. *f.* 5.
Marcgr. braſ. 247. *f.* 1.
Edw. av. t. 105. *f.* 1.
Olear. muſ. t. 16. *f.* 3.
Merian. ſurin. in tit. F. G.
Swammerd. bibl. t. 30. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 15. *f.* 109. 110.
Sulz. inſ. t. 1. *f.* 1.
Habitat in America *magis auſtrali.*

Geryon. 108. Sc. thorace excavato tricorni, lateralibus compreſſis unidentatis, capitis recurvo ſimplici. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 28. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 4. *f.* 5.
Drury inſ. 2. *t.* 30. *f.* 6.
Habitat in America *auſtrali et* India.

7. Sc.

Scarabaeorum *larvae hexapodes annulatae, piloſae, abdominis apice veſiculoſo, capite corneo inſtructae, vivunt tranquillae ſub terra, plurimae fimo delectantur et paſcuntur, cetoniarum ligno putreſcente, melolontharum radicibus plantarum; pupae intra glebam quieſcentes.*

Aloëus. 7. Sc. thorace tricorni: intermedio longiori ſimplici, capite ſubmutico, elytris uniſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 7.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 29. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 4. *f.* 3.

Degeer inſ. 4. *p.* 302. *n.* 1. Scarabaeus ſcutellatus niger, thorace tricorni: intermedio longiori truncato.

Roeſ. inſ. 2. *Scarab.* 1. *t.* A. *f.* 6.

Petiv. gazoph. t. 24. *f.* 10.

Aubent. miſc. t. 5. *f.* 1.

Voet Kaef. t. 18. *f.* 122. (mas) *et t.* 19. *f.* 122. (femina.)

Habitat in America, *naſicorni ſimillimus, at triplo major, tibiis anterioribus quinquedentatis.*

Antaeus. 109. Sc. thorace tricorni: intermedio longiori ſimplici, capite mutico, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 30. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 4. *f.* 4.

Drury inſ. 1. *t.* 34. *f.* 3.

Habitat in inſulis Americae *oppoſitis.*

Femina *mutica.*

Syphax. 110. Sc. thorace tricorni: intermedio longiori ſimplici, capite mutico, elytris punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 31.

Habitat in America, *antaeo perquam affinis.*

Maimon. 111. Sc. thorace tricorni: cornubus aequalibus breviſſimis, elytris laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 32.

Habitat in America.

Typhoeus. 9. Sc. thorace tricorni: intermedio minore; lateralibus porrectis longitudine capitis mutici. *Muſ. Lud. Ulr.* 8.* *Gronov. zooph.* 123.

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 10. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 33. *Bergſtr. Nomencl.* 1. *p.* 26. *n.* 6. *t.* 4. *f.* 6. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 6. *f.* 1. 2.

Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 72. *t.* 1. *f.* 3.

Raj. inſ. 103. Scarabaeus ovinus 2.

Friſch inſ. 4. *t.* 8. Scarabaeus thorace cornuto.

Mouff. inſ. 152. *f.* 2. Taurocerus.

Petiv. gaz. t. 23. *f.* 3.

Schaeff. icon. t. 5. *f.* 1. ♀. *t.* 26. *f.* 4. ♂.

Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 5.

Voet coleoptr. t. 19. *f.* 124. 125.

Habitat in Europa, *ſub ſtercore bovino ſub terra cuniculos profundos fodiens, nidulans, ſtercorarii magnitudine, ater.*

Caput *depreſſum, ad latera villoſum, anguſtum*; antennarum *capitulum ſubgriſeum*; thorax *glaber, cornubus nunc capiti aequalibus, nunc duplo longioribus, in femina exſoletis*; elytra *ſtriata*; tibiae *admodum piloſae.*

Titanus. 112. Sc. thorace tricorni: intermedio longiori apice bifido; lateralibus ſubarcuatis acutis, capite mutico. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 34.

Sloane jam. 2. *p.* 205. *t.* 237. *f.* 4. 5. Scarabaeus major niger tricornis.

Drury inſ. 1. *t.* 36. *f.* 3. 4. Scarabaeus Simſon.

Habitat in inſulis Americae *meridionali oppoſitis.*

Oenobarbus. 113. Sc. thorace tricorni: medio longiori emarginato; lateralibus obtuſis, capite bituberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 35.

Habitat in America, *titani ſtatura, ſed minor.*

quadriſpinoſus. 114. Sc. thorace retuſo: prominentia quadridentata, capitis cornu recurvo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 38.

Habitat in Cayenna, *magnus.*

quadridens. 115. Sc. thorace quadridentato, capitis clypeo bidentato, corpore ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 39.

Habitat in India, *parvus, gibbus.*

mobilicornis. 116. Sc. thorace quadridentato, capitis cornu recurvo mobili. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 40. *Laichart. inſ. t.* 1. *f.* 11. *Jablonſk. Kaef.* 1. *t.* 8. *f.* 6. 7.

Habitat in Anglia *et* Germania, *niger.*

Femina *plane mutica*; elytra *ſtriata.*

cylindricus. 11. Sc. thorace anterius truncato quinquedentato, capite anterius cornu erecto, corpore cylindrico. *Fn. ſuec.* 380.

Laichart. inſ. tyr. p. 4. *n.* 4. Lucanus cylindricus.

Scopol. introd. hiſt. nat. 5. 75. Lucanus tenebrioides.

Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 2.

Voet coleoptr. t. 20. *f.* 131.

Habitat in Europae *magis borealis pruno ceraſo.*

409. Sc.

Candidae. 409. Sc. thorace excavato antrorſum cornuto tibiis anterioribus tridentatis. *Petagn. ſpec. inſ. Calabr. p.* 3. *n.* 9. *f.* VI. *a.* 6.
Habitat in Calabriae *ulterioris* promontorio Lacinio.

β) exſcutellati.

violaceus. 117. Sc. totus violaceus, maxillis prominentibus, fronte declivi, thorace ſexſpinoſa. *Lepech. it.* 2. *p.* 208. *t.* 10. *f.* 13.
Habitat in Sibiria, *ſub lapidibus, parvus.*
Elytra *punctis excavatis inſignita.*

nemeſtrinus. 118. Sc. thoracis cornubus duobus porrectis acutis, capitis erecto ſubulato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 96. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 106.
Degeer inſ. 7. *p.* 637. *t.* 47. *f.* 16. Scarabaeus tricornutus.
Habitat ad caput bonae ſpei, *jaccho affinis, ſubtus hirtus.*

Oedipus. 119. Sc. thoracis cornu plano ſubtus dentato, capitis truncato tridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 98. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 108.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ſplendidulus. 120. Sc. thoracis aenei cornubus duobus compreſſis nigris, capitis erecto apice compreſſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 100. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 110.
Habitat in America *auſtrali, carnificis magnitudine.*

feſtivus. 52. Sc. thorace gibbo bicorni, capitis cornu erecto, elytris rubro-aeneis. *Linn. ſp. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 101. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 111.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 552. *n.* 52. *Gron. zooph.* 452. Scarabaeus exſcutellatus muticus, thorace nigro-maculato, elytris rubro-aeneis, ſterno porrecto.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 8. (mas).
Voet coleoptr. t. 23. *f.* 5. 7.
Degeer inſ. 4. *t.* 8. *f.* 15.
Drury inſ. 3. *t.* 48. *f.* 5. (fem.)
Habitat in America, *melolonthae magnitudine, at brevior, niger.*

Pactolus. 121. Sc. thorace bidente, capitis cornu elongato recurvo medio bidentato. *Fabr. mant.* 1. *p.* 12. *n.* 112.
Habitat in Braſilia, *mediae magnitudinis, viridi-aeneus.*

Pithecius. 122. Sc. thorace bicorni: cornubus breviſſimis, capitis cornu erecto ſubulato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 102. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 113.
Habitat in America *auſtrali et* India.

ſeniculus. 123. Sc. thorace anterius, clypeo poſterius bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 103. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 114.
β) Scarabaeus brevipes. *Herbſt apud Fueſſl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 10. *n.* 35. *t.* 19. *f.* 16.
Habitat in Coromandel, *bonaſi ſtatura.*

Catla. 124. Sc. thorace anterius bidentato, capitis clypeo lineis duabus elevatis transverſis carinatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 115.
Habitat in Coromandel, *nuchicornis magnitudine et ſtatura, an femina alius ſpeciei?*

Moloſſus. 8. Sc. thorace retuſo bidentato utrinque impreſſo, clypeo unicorni lunato integro, elytris laevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 11.* *Amoen. ac.* 6. *p.* 391.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 118. *mant. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 134.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 2.
Schroet. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 3.
Degeer inſ. 4. *t.* 18. *f.* 11.
Habitat in Sina, *ibi officinalis, cornu dentibusque nunc longioribus nunc brevioribus, feminae nullis.*
Femora *ovata.*

Roſalius. 125. Sc. thorace anterius bicorni, poſterius elevato tricorni, capitis cornu compreſſo ſerrato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 104. *mant inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 116.
Habitat in America *meridionali.*

Ammon. 126. Sc. thorace tridentato, capitis cornu recurvo, elytris ſtriatis. *Linn. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 105. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 117.
Fabr. ſyſt. entom. p. 21. *n.* 83. Scarabaeus Silenus.
Habitat in America.

Midas. 127. Sc. thorace tricorni, clypeo ſinuato bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 106. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 118.
Habitat in America.

Hamadryas. 128. Sc. thorace tricorni: intermedio plano acuto tridentato, clypeo reflexo bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 107. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 119.
Voet coleoptr. t. 27. *f.* 38?
Habitat ad caput bonae ſpei, *niger.*

lunaris. 10. Sc. thorace bicorni: intermedio obtuſo bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato. *Fn. ſuec.* 379.* *Scop. ent. carn.* 22. *Gron. zooph.* 453.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 108. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 120.

Fn. ſuec. 1. *p.* 341. Scarabaeus thorace ſubmutico, capite lunato, clypeo emarginato.

Raj. inſ. 103. Scarabaeus ovinus tertius.

Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 88. *n.* 1. Copris capitis clypeo lunulato &c.

Friſch inſ. 4. *p.* 25. *t.* 7.

Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* B. *f.* 2.

Pet. gaz. t. 138. *f.* 4.

Schaeff. ic. t. 63. *f.* 2. 3. ♂. ♀.

Bergſtr. nomencl. t. 1. *f.* 9. *et t.* 4. *f.* 7.

Poda muſ. t. 1. *f.* 1.

Voet coleoptr. t. 25. *f.* 24. 25. *et t.* 26. *f.* 26.

Habitat in Europae *ſtercoratis, aliquando minor, cornubus minoribus, feminae in thorace conſtanter nullis.*

Rhadamiſtus. 129. Sc. thorace late foveolato; anterius cornu recurvo, capite inermi, elytris rufis: ſutura punctisque duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 109. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 121.

Habitat Tranquebariae.

Lar. 130. Sc. thorace tridentato, capitis cornu erecto, clypeo fiſſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 124.

Habitat in India *parvus niger.*

Faunus. 131. Sc. thorace quadricorni; intermediis breviſſimis, capitis cornu recurvo ſerrato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 112. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 125.

Voet coleoptr. t. 24. *f.* 15.

Drury inſ. 3. *t.* 48. *f.* 6.

Habitat in Cayenna.

Feminae *cornua minora: lateralia acuta.*

capucinus. 132. Sc. thorace quadridentato, capitis cornu recumbente utrinque unidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 113. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 126.

Habitat in India, *carolini magnitudine et ſtatura.*

Lemur. 133. Sc. thorace quadridentato cupreo, clypeo poſterius tranſverſo carinato, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 495. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 127.

Schaller act. ſoc. Hal. nat. cur. I. *p.* 237. Scarabaeus 10 punctatus.

Habitat in Germaniae *inferioris ſtercore animali, niger, ſtatura nuchicornis.*

Camelus. 134. Sc. thorace quadridentato, clypeo poſterius ſubbicorni, corpore atro. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 13. *n.* 128.

Habitat in Germania.

Femina *non mutica.*

Daldorfii. 135. Sc. thorace ſexdentato, clypeo rhombeo: centro prominulo, elytris laevibus. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 14. *n.* 129.

Habitat in India, *vernalis magnitudine.*

Biſon. 27. Sc. thorace anterius mucronato, capite cornubus duobus lunaribus. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 26. *n.* 115, *mant. inſ.* I. *p.* 14. *n.* 131.

Habitat in Hiſpania, *et auſtrali* Gallia, *ater, ſtercorario minor.*

Femina *thoracis margine anteriore carinato elevato, mucroneque capitis parvo diſtincta.*

ſagittarius. 136. Sc. thorace anterius mucronato, capitis cornu ſolitario erecto. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 26. *n.* 116. *mant. inſ.* I. *p.* 14. *n.* 132.

Habitat ad caput bonae ſpei.

bucephalus. 137. Sc. thorace retuſo quadridentato, capitis clypeo angulato unicorni. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 26. *n.* 117. *mant. inſ.* I. *p.* 14. *n.* 133.

Habitat in America *auſtrali et* India.

lancifer. 13. Sc. violaceus, thorace dentato, capitis cornu angulato, elytris ſulcatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 26. *n.* 119. *mant. inſ.* I. *p.* 14. *n.* 135.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 544. *n.* 13. Scarabaeus exſcutellatus violaceus, capite cornu angulato, thorace inaequali, elytris ſulcatis.

Voet coleoptr. t. 23. *f.* 1. 2. Scarabaeus violaceus.

Marcgr. braſ. 247. Taurus.

Schroet. Abh. I. *t.* 3. *f.* 4.

Habitat in America *auſtrali, et* India, *mima minor.*

Vitulus. 138. Sc. thorace quadridentato, occipite cornubus duobus erectis brevibus, corpore atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 127. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 145.
Habitat in Auſtria.
Femina *mutica.*

Gazella. 407. Sc. thorace ſubinermi aeneo, occipite cornubus duobus arcuatis, elytris teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 377.
Habitat - - - - ſtatura et magnitudine Sc. Tauri.

b) *thorace inermi, capite cornuto.*

α) *ſcutellati.*

bilobus. 12. Sc. thorace prominente bilobo, capitis cornu ſimplici, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 14. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 3. *f.* 2.
Edw. av. t. 105. *f.* 2.
Gron. zooph. p. 414. *t.* 14. *f.* 1. 2.
Aubent. miſc. t. 15. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 63. *f.* 2. 3.
Voet coleoptr. t. 14. *f.* 106.
Habitat in Europa *auſtrali, naſicorni ſimilis, piceus.*

Rhinoceros. 14. Sc. thorace retuſo ſubbituberculato, capitis cornu ſimplici, clypeo bifido, elytris punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 42.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 544. *n.* 14. *Muſ. Lud. Ulr.* 10.* Scarabaeus ſcutellatus thorace inermi, capite cornu ſimplici, clypeo bifido, elytris punctatis.
Petiv. gaz. t. 44. *f.* 9. *et t.* 100. *f.* 3. Rhinoceros Laconenſis &c.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* A. *f.* 7.
Barrel. ic. t. 163.
Voet coleoptr. t. 18. *f.* 117. 118.
Habitat in Aſia, *piceus, ſubtus hirſutus, naſicorni ſimilis, ſed duplo major.*
Feminae *thorax excavatus.*

naſicornis. 15. Sc. thorace prominentia triplici, capitis cornu recurvo, elytris laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 36. *Jablonsk. Kaeſ.* 1. *t.* 6. *f.* 4. 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 544. *n.* 15. *Fn. ſuec.* 378. *Scop. ent. carn.* 14. Scarabaeus ſcutellatus, thorace prominentia triplici, capitis cornu incurvato, antennis heptaphyllis.
Mouff. inſ. 53.

Imperat. nat. 924. *f.* 1. 2. *et* 925. *f.* 3. 4.
Hoeffn. pict. t. 13. *f. antepenult.*
Olear. muſ. 27. *t.* 16. *f.* 4.
Jacob. muſ. 1. *S.* 5.
Jonſt. inſ. t. 15. *f.* 2.
Swammerd. bibl. nat. t. 27. *f.* 1. 2.
Friſch inſ. 3. *t.* 3. *f.* 4.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* 7. *f.* 8. 10.
Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 68. *n.* 1.
Drury inſ. 1. *t.* 34. *f.* 7. 8.
Voet coleoptr. t. 18. *f.* 120. 121.
Habitat in Europae *fimetis et vaporariis.*
Larva *griſea, capite, pedibus ſpiraculisque rufis, a* Swammerdamio *pro coſſo veterum habita.* Feminae *thorax retundatus vix retuſus.*

Sylvanus. 139. Sc. thorace retuſo: prominentia triplici, intermedia obſoleta, capitis cornu recurvo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 37.
Habitat in Braſilia.

Lazarus. 140. Sc. thorace bituberculato, capitis cornu brevi emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 25.
Habitat in Noveboraco.

Barbaroſſa. 141. Sc. thorace anterius ſcabro, capitis cornu recurvo brevi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 43.
Habitat in nova Hollandia.

Satyrus. 142. Sc. thorace anterius truncato, capitis cornu recurvo, capite longiore. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 44.
Habitat in America *ſeptentrionali.*
Feminae *clypeus tuberculatus, thorax planus.*

jamaicenſis. 143. Sc. thorace anterius retuſo, capitis cornu recurvo, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 45.
Drury inſ. 1. *t.* 34. *f.* 1. 2.
Habitat in America *meridionali.*
Femina *mutica.*

Silenus. 144. Sc. thorace anterius excavato, capitis cornu recurvo, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 46.

Forſter cent. inſ. 1. 1. 1. Scarabaeus excavatus.
Voet coleopt. t. 18. *f.* 119.
Barrel. plant. Hiſp. t. 163.
Scopol. delic. inſubr. 1. *p.* 50. *t.* 21. *f.* c.
Habitat in Galloprovincia.

Syrichtus. 145. Sc. thorace rotundato, capitis cornu recurvo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 47.
Habitat in America.

Apelles. 146. Sc. capitis cornu breviſſimo, elytris cinereis: punctis elevatis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 48.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parvus, pedibus flavis nigro-maculatis.*

Aries. 147. Sc. thorace rotundato, capitis cornu breviſſimo ſubulato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 495. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 49.
Habitat ad caput bonae ſpei.

coronatus. 148. Sc. capitis clypeo elevato poſterius emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 50.
Habitat in Java, *piceus.*

Hylax. 149. Sc. capitis cornu emarginato, tibiis poſterioribus breviſſimis apice ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 51.
Habitat in Africa.

didymus. 19. Sc. thorace foſſula exarato, capite tricuſpidi, elytris ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 14. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 52.
Gron. zooph. 420.
Petiv. gaz. t. 27. *f.* 7.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 19. *f.* 126.
Habitat in America.
Feminae *thorax antrorſum mucrone parvo elevato armatus.*

Polyphemus. 150. Sc. capite tricorni: anteriore porrecto bifido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 53.
Habitat in Africa, *goliatho affinis, ſed minor, elytris viridibus macularum albarum ſerie triplici ornatis.*

Goliathus. 151. Sc. clypeo bifurco. *Mant. p.* 530. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 54.
Sulz. inſ. t. 1. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 22. *f.* 51.
Drury inſ. 1. *t.* 31. *et* 3. *t.* 40. *f.* 1.
Habitat in Africa, *praeſertim* Guinea.

Hircus. 152. Sc. thorace ſcabro, capite linea transverſa carinata: clypeo bidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 55.
Habitat Tranquebariae.

farctus. 153. Sc. brunneus, capite ſubbicorni, elytris punctato-ſtriatis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 56.
Habitat in Penſilvania.

retuſus. 154. Sc. thorace retuſo, capitis cornu brevi plano, femoribus poſterioribus incraſſatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 57.
Habitat ad caput bonae ſpei, *naſicorni minor, niger, ſubtus ferrugineus hirtus, pedibus rufis.*

piceus. 155. Sc. piceus, thorace glabro, capite bicorni, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 58. *Herbſt apud Fueſſl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 4. *n.* 6. *t.* 19. *f.* 1.
Habitat in America *auſtrali et* India, *foſſoris magnitudine.*

maurus. 30. Sc. capite mucronibus tribus, corpore violaceo, abdomine teſtaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 62. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 68.
Habitat in Mauritania, *oblongus, thorace convexo.*

β) *exſcutellati.*

Jacchus. 156. Sc. thorace prominente bilobo, capitis cornu recurvo ſimplici. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 97. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 107.
Habitat ad caput bonae ſpei.
Feminae *cornu capitis breviſſimum truncatum.*

Sabaeus. 157. Sc. thorace prominentia duplici, capitis cornu erecto ſimplici. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 99. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 109.
Habitat in Coromandel, *Jacchi ſtatura et magnitudine.*
Feminae *cornu capitis, et thoracis tubercula minora.*

Belzebul. 158. Sc. thorace prominentia triplici, capite tricorni: intermedio majore. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 110. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 122.
Habitat in America.

bifaſciatus. 159. Sc. thorace prominentia triplici, capitis cornu erecto, elytris nigris: faſciis duabus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 111. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 123.
Habitat in Coromandel, *niger, nuchicornis magnitudine.*

Bonaſus. 160. Sc. thorace prominentia duplici, capite tricorni: lateralibus majoribus arcuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 114. *mant. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 130.
Pallas ic. inſ. Ruſſ. p. 5. *t.* A. *f.* 5.
Schroeter Abh. 1. *t.* 3. *f.* 5. Scarabaeus Vacca.
Habitat in India.

valgus. 20. Sc. femoribus ſecundi paris remotis. *Muſ. Lud. Ulr.* 15.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 27. *n.* 120. *mant. inſ. p.* 14. *n.* 136.
Scarabaeus (Paniſcus) thorace retuſo elevato, capitis cornu recurvo, clypeo fiſſo.
Petiv. gaz. t. 27. *f.* 8.
Roeſ. inſ. 2. *Scarab.* 1. *t.* B. *f.* 2.
Habitat in America.
Elytra *brevia*; digiti *magis hirſuti, quam congeneribus.*

carolinus. 16. Sc. thorace retuſo, capite ovali integro unicorni, elytris ſtriatis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 27. *n.* 121. *mant. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 137.
Scarabaeus capitis cornu erecto breviſſimo, clypeo integro, elytris ſulcatis.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 24. *f.* 14.
Habitat in America *boreali, ater, obtuſus, gibbus, pollicem craſſus, ſtatura moloſſi.*

Sphinx. 161. Sc. thorace punctis quatuor impreſſis, capite ſubcornuto, tarſis anterioribus nullis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 27. *n.* 122. *mant. inſ. p.* 24. *n.* 138.
Pall. it. 1. *p.* 462. *n.* 25. Scarabaeus humeroſus.
Pall. ic. inſ. Ruſſ. 1. *p.* 4. *t.* A. *f.* 4. Scarabaeus Menalcas.
Herbſt Beſch. der berl. Naturf. Fr. 4. *t.* 7. *f.* 10. *et apud Fueſſl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 11. *n.* 37. *t.* 19. *f.* 17.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 8. Scarabaeus ſpinipes.
β) Scarabaeus fronte ruga, elytris ſtriis laeviſſimis. *Muſ. Lesk. p.* 1. *n.* 12.

Habitat

Habitat in America *meridionali, et deſerto acidiſſimo* mari caſpio *boream verſus finitimo, ſericeus ex viridi caeruleus.*

Nicanor. 162. Sc. thorace punctis quatuor impreſſis, capitis cornu recurvo bidentato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 27. *n.* 123. *mant. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 139.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 1. Scarabaeus ſulcatus.
Habitat in America.

Fricator. 163. Sc. thorace anterius elevato acuto, capitis cornu truncato ſubemarginato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 140.
Habitat in India, *totus ater, nitidus, nicanoris magnitudine.*

Mimas. 17. Sc. thorace retuſo angulato, capite obſolete bicorni, elytris inauratis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 9.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 124. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 141.
Sulz. inſ. t. 1. *f.* 4. *Voet coleoptr. t.* 23. *f.* 4. Copris viridis ſplendens.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, clypeo integro.*

hiſpanus. 21. Sc. clypeo cornuto emarginato, elytris ſtriatis, femoribus ſecundis remotiſſimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 12. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 130. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 148.
Pet. gazoph. t. 8. *f.* 4.
Voet coleoptr. t. 24. *f.* 13.
Habitat in Barbaria *et auſtraliore* Europa, *lunari ſimilis, ſed major, clypei inciſura a moloſſo diſtinctus.*

tridens. 164. Sc. thorace cupreo, capite baſi tridentato, elytris nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 129. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 147.
Habitat in Africa *aequinoctiali, niger, carnificis magnitudine.*

carnifex. 22. Sc. thorace plano angulato ſcabro, capitis cornu inflexo, corpore aeneo. *Gron. zooph.* 450.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 129. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 146. Scarabaeus exſcutellatus, thorace inermi angulato, capitis cornu reflexo, corpore aeneo.
Catesb. Car. 3. *t.* 11. *f.* ult.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 3-5.
Voet coleopt. t. 26. *f.* 31. 32.
Habitat in America, *ſtercorario brevior, latus, depreſſus; formatam e ſtercore pilulam conjunctis gregatim viribus*

per

per totam aeſtatem volvens volutansque, etiam non ſuam, usque in foveam determinatam, uti pilularis.
Cornu *retrorſum poſitum nigrum, laeve, feminae obſoletum.*

ſpinifex. 165. Sc. thorace rotundato, occipite ſpina recurva. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 131. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 145.
Habitat in Coromandel, *niger viridi-nitens, nuchicornis ſtatura et magnitudine.*

nuchicornis. 24. Sc. thorace rotundato, occipite ſpina erecta armato. *Fn. ſuec.* 381.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 132. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 150.
It. gotl. 41. Scarabaeus capite thoraceque atro opaco, elytris cinereis nigro-nebuloſis.
Raj. inſ. p. 103. *n.* 2. Scarabaeus ovinus tertius.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 89. *n.* 3. (*mas*) *et* (*fem.*) 4.
Voet colept. t. 25. *f.* 18.
Gronov. zooph. 454.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* A. *f.* 4.
β) Scarabaeus coenobita. *Herbſt apud Fueſſl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 11. *n.* 40. *Voet coleopt. t.* 25. *f.* 18.
Habitat in Europae *ſtercore.*
Femina *mutica.*

Capra. 166. Sc. occipite ſpina erecta gemina, corpore nigro obſcuro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 144.
Habitat Halae Saxonum, *vaccae ſtatura et magnitudine.*

Vacca. 25. Sc. thorace acuminato, occipite ſpina erecta gemina. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 126. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 143.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 90. *n.* 5.
Schaeff. inſ. t. 73. *f.* 4. 5. ♂. ♀.
Schroet. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat in Europa *temperata, nuchicorni thorace aeneo, elytrisque fuſcis, caprae ſpina occipitis gemina ſimilis.*

Taurus. 26. Sc. occipite cornubus binis reclinatis arcuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 126. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 142. *Schreber inſ. t.* 1. *f.* 6. 7.
Scop. ent. carn. 25. Scarabaeus illyricus.
Raj. inſ. p. 103. *n.* 2. Scarabaeus ovinus alter.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 92. Copris niger, capite pone bicorni &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 5.

Schaeff.

Schaeff. inſ. t. 73. *f.* 2. 3. ♂. ♀.
Voet coleopt. t. 24. *f.* 16.
Habitat in Germania *et* Europa *magis auſtrali, nuchicorni ſimilis, at cornubus diſtantibus arcuatis diverſus.*

nutans. 167. Sc. thorace anterius impreſſo, occipite ſpina erecta apice nutante, corpore nigro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 151.
Habitat Halae Saxonum, *nuchicornis ſtatura et magnitudine.*

ſcabroſus. 168. Sc. thorace rugoſo, capitis cornu erecto breviſſimo, elytris teſtaceis nigro-ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 133. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 152.
Voet coleopt. t. 25. *f.* 23.
Habitat in America *meridionali, nuchicorni paulo major.*

furcatus. 169. Sc. thorace rotundato, capite cornubus tribus erectis approximatis: intermedio breviori. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 134. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 153.
Laichart. inſ. tyr. p. 26. *n.* 20. *t.* 1. *f.* 20. Scarabaeus Vitulus.
Habitat in Gallia *meridionali.*
Feminae *cornuum loco linea transverſa elevata.*

vertici-cornis. 170. Sc. thorace griſeo nigro-punctato, capitis cornu erecto breviſſimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 135. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 154.
Habitat in Anglia, *nuchicorni valde affinis, an varietas?*

truncati-cornis. 171. Sc. aeneo-niger, thorace rotundato, occipite ſpina apice truncata. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 238.
Habitat in - - - - ſtatura nuchicornis, at minor.
Femina *mutica.*

ſpiniger. 415. Sc. occipite ſpina erecta brevi, elytris lividis: maculis confluentibus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 47.
Habitat in Europa.

novem maculatus. 416. Sc. teſtaceo fuſcus, clypeo rugis duabus, elytris fuſcis: maculis novem rufo teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 48.
Habitat extra Europam, *antennis, thoracis margine exteriori pedibusque lividis.*

recticornis. 427. Sc. ater, thorace ſubinermi, capite cornubus duobus erectis, clypeo rotundato. *Lesk. it. p.* 45. *t.* A. *f.* 8. 9.
Habitat in Luſatiae *valle, a fluvio* Puloniz *irrigata,* 5 *lineas longus.*

c) *tho-*

c) *thorace et capite inermi:* Mutici:

α) *ſcutellati.*

Aygulus. 172. Sc. thorace quadripunctato, capite tuberculato, elytris teſtaceis, tarſis anterioribus nullis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 60.
Habitat in India, *Jnuo affinis, at duplo major, et tibiis anterius quoque dentatis diſtinctus.*

fimetarius. 32. Sc. ater, capite tuberculato, elytris rubris. *Fn. ſuec.* 385. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 64. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 70. *Scop. ent. carn. p.* 20. 21. *Geoffr. inſ. pariſ.* 1. *p.* 81. *n.* 18.
Fn. ſuec. 1. *p.* 355. Scarabaeus capite thoraceque nigro, antennis elytriſque rubris.
Raj. inſ. p. 106. *n.* 9. Scarabaeus pilularius nonus.
Friſch inſ. 4. *t.* 19. *f.* 3.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* A. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 144. *f.* 6.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 8.
β) Scarabaeus capite thoraceque nigro glabro, elytris griſeis, pedibus pallidis. *It. oel.* 41.
Uddm. diſſ. nr. 2.
γ) Scarabaeus (rufus) rufus totus, ſolis oculis nigris, capite tuberculis tribus, elytris ſtriatis. *v. Moll apud Fueſſl. naturh. Mag.* I. 372.
Habitat frequens in Europae *ſtercore.*
Capitis *tubercula utplurimum tria.*

haemorrhoidalis. 33. Sc. capite tuberculato, elytris apice rubris. *Fn. ſuec.* 386.
Fn. ſuec. 1. *p.* 358. Scarabaeus ater, elytris poſtice ferrugineis, pedibus rufis.
Habitat in Europae *fungis et putridis; an mera granarii varietas?*

conſpurcatus. 34. Sc. thoracis marginibus lateralibus albidis, capite tuberculato, elytris lividis nigro-maculatis. *Fn. ſuec:* 387.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 67. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 73.
Raj. inſ. p. 108. Scarabaeus pilularius decimus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 82. *n.* 19.
Schaeff. ic. t. 26. *f.* 8.
Pontopp. Atl. dan. t. 1. *f.* 82.
Voet coleoptr. t. 21. *f.* 144.
β) Scarabaeus teſſulatus. *v. Moll naturh. Br.* I. *p.* 162. *n.* 9.
Habitat in Europae *ſtercore, vere praeſertim frequens, ſordido affinis, ſed minor;* β) *dimidio minor.*

173. Sc.

ſordidus. 173. Sc. capite tuberculato, thorace nigro: margine pallido; puncto nigro, elytris griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 75. *Herbſt apud Fueſſl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 6. *n.* 13. *t.* 19. *f.* 3.
Habitat in Angliae *ſtercore.*

luridus. 174. Sc. ater, capite tuberculato, elytris griſeis nigro-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 76.
Müll. prodr. zool. dan. Scarabaeus teſſullatus.

marianus. 35. Sc. capite tuberculato, elytris laevibus glaucis fuſco-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 78.
Habitat in America, *magnitudine aloëi; an forſan femina mutica Herculis?*

ſordens. 413. Sc. niger, capite tuberculato: intermedio prominulo, elytris ſordide teſtaceis: ſutura marginibusque ſordide brunneis. *Muſ. Lesk. p.* 2. *n.* 21.
Habitat in Europa.

nebuloſus. 414. Sc. fuſcus, thorace laevi: marginibus externis lividis, capite obſolete tuberculato, elytris ſtriatis, fuſco nebuloſis, pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 2. *n.* 22.
Habitat in Europa.

Inuus. 175. Sc. thorace quadripunctato, capite quadrituberculato, tarſis anterioribus nullis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 59.
Fabr. ſyſt. entom. p. 14. *n.* 45. Scarabaeus Sphinx.
Habitat in Sierra Leon Africae, *ſupra ex viridi aeneus obſcurus.*

ſubterraneus. 28. Sc. thorare glabro, capite tuberculis tribus, elytris ſtriis crenatis. *Fn. ſuec.* 382.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 58. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 61.
Gadol ſatag. 76. Scarabaeus niger, capitis clypeo lunato tribus tuberculis notato.
Sulz. inſ. t. 1. *f.* 2.
Habitat in Europae *ſtercore, foſſori affinis, at multo minor.*

Foſſor. 31. Sc. thorace retuſo, capite tuberculis tribus: medio ſubcornuto. *Fn. ſuec.* 384.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 59. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 62.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 82. *n.* 20.

Gunner.

Gunner. act. Nidr. 4. *p.* 266. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 1.
Fn. ſuec. 352. Scarabaeus ovatus ater glaber.
Schaeff. ic. t. 144. *f.* 78.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 7.
Voet coleopt. t. 21. *f.* 141.
Habitat in Europae *ſabuloſi ſtercoratis.*

foetens. 176. Sc. capite tuberculis tribus: medio acuto, elytrorum limbo ferrugineo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 63.
Habitat Halae Saxonum *ater, ano rufo, thoracis macula marginali ferruginea.*

analis. 177. Sc. niger, capite tuberculis tribus aequalibus, elytris apice ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 64.
Habitat in India, *foſſoris ſtatura et magnitudine.*

ſcybalarius. 178. Sc. capite tuberculis tribus: intermedio acuto, elytris ſtriatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 65.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 7. *n.* 17. *t.* 19. *f.* 6. Scarabaeus foetidus.
Habitat in Germania, *foſſore minor.*

terreſtris. 179. Sc. capite tuberculis tribus aequalibus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 66.
Habitat in Anglia, *foſſore triplo minor.*

conflagratus. 180. Sc. capite tuberculis tribus, clypeo ſcutelloque nitide nigris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 5. *n.* 11.
Habitat in Germaniae *ſtercore vaccino, erratico affinis.*
Elytra *punctis excavatis ſulcata.*

inquinatus. 181. Sc. capite tuberculis tribus, elytris luteis nigro ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 6. *t.* 19. *f.* 5. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 74.
Habitat in Germania, *fimetario tertia parte, ad conſpurcatum accedens.*
Scutellum *nitide nigrum.*

unifaſciatus. 182. Sc. thorace piceo: prominentia triplici; intermedia trituberculata, elytris teſtaceis: faſcia ſinuata fuſca. *Schaller Abh. der hall. Naturf.* 1. *p.* 240.
Habitat in Malabar.

ſanguinolentus. 183. Sc. niger, capite tuberculis tribus obſoletis, elytris punctatim ſtriatis apice rubris. *Herbſt apud Fueſſli Arch.* 4. *p.* 6. *n.* 15. *t.* 19. *f.* 4.

Habitat in Germania, *fimetarium ſimulans, at tertia parte minor.*

bimaculatus. 184. Sc. capite ſubtrituberculato, elytris ſtriatis: macula baſeos rubra. *Fabr. mant. inſ.* 1. 8. *n.* 67.
Habitat in Germania, *ater, terreſtris ſtatura et magnitudine.*

teſtaceus. 185. Sc. teſtaceus, capite bituberculato, elytris punctato-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 63. *mant. inſ* 1. *p.* 9. *n.* 69.
Habitat in Angliae *ſtercoratis.*

pygmaeus. 186. Sc. clypeo marginato, thorace viridi: prominentia bifida, elytris teſtaceis nigro-maculatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf.* 1. *p.* 239.
Habitat in Malabar, *ovati magnitudine, nuchicornis ſtatura.*

erraticus. 29. Sc. thorace laevi, capite tuberculo unico, elytris fuſcis. *Fn. ſuec.* 385. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 66. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 72. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 5. *n.* 10. *t.* 19. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 26. *f.* 9.
Voet coleoptr. f. 146?
Habitat in Europae *ſtercore, viis.*

bicolor. 187. Sc. thorace ſubinermi, capite tuberculo unico, elytris nigris, abdomine rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 65. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 71.
Habitat in Germania.

granarius. 23. Sc. niger, clypeo tuberculo ſolitario, elytris poſterius teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 70. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 77. *Lesk. it. p.* 45. *t.* A. *f.* 10.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 547. *n.* 23. Scarabaeus ſcutellatus niger, thorace inermi: clypeo tuberculato, elytris ſubſtriatis margine poſtico teſtaceis.
Habitat in Europae *locis ſuffocatis, ſeminis tritici magnitudine.*
Elytra *interdum ultra dimidium teſtacea.*

ſuturalis. 188. Sc. niger nitidus, capitis tuberculo ſolitario minuto, elytris ſordide flavis ſtriatis minuto punctatis, ſcutello margine exteriore ad baſin ſuturaque nigris. *v. Moll naturh. Br.* I. *p.* 162. *n.* 10.
Habitat in vallis Salzburgenſis Zillerthal *ſtercore equino, ſordido affinis.*

408. Sc.

Veter. 408. Sc. rufus, capite thoraceque linea carinata elevata. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 377.
Habitat in India, *cephi magnitudine.*

Gigas. 36. Sc. thorace retuſo, capite ſupra margineque angulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 16.*
Habitat in Aegypto, *ater, primae magnitudinis.*

ſcaber. 37. Sc. thorace elytriſque anterius ſcabris. *Muſ. Lud. Ulr.* 17.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 72. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 79. Scarabaeus ſcutellatus, clypei centro prominulo, elytris antice ſcabris.
Habitat in America, *naſicorni duplo major, Herculis feminae affinis.*

longimanus. 39. Sc. pedibus anterioribus arcuatis longiſſimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 18.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 73. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 80.
Aubent. miſc. t. 41. *f.* 1.
Voet coleopt. t. 11. *f.* 97.
Habitat in India.
Femora *anteriora dente valido armata.*

ſtercorarius. 42. Sc. ater glaber, elytris ſulcatis, capite rhombeo: vertice prominulo. *Fn. ſuec.* 388.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 75. *n.* 9. *Scop. ent. carn.* 26! *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 74. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 81.
Mouff. inſ. 151.
Raj. inſ. p. 74. *n.* 1.
Baub. halluc. 212. *f.* ult.
Liſt. mut. 17. *f.* 4.
ſcar. angl. p. 380. *n.* 4.
Friſch inſ. 4. *p.* 13. *t.* 6.
Schaeff. ic. t. 23. *f.* 9.
Degeer inſ. 4. *t.* 9. *f.* 10. 11.
Voet coleopt. t. 20. *f.* 134.
Habitat in Europa *ſub ſtercore, acaris et ichneumone infeſtatus, veſpere ingenti cum ſuſurro circumvolitando ſerenum diem praenuncians, ab Aegyptiis ſoli conſecratus, colore interdum in caeruleum aut vireſcentem vergente, aut ſubtus aeneo, elytriſque obſcure rufis varians.*

vernalis. 43. Sc. elytris glabris laeviſſimis, clypeo rhombeo: vertice prominulo. *Fn. ſuec.* 389. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 77. *n.* 10. *Scop. ent. carn. p.* 27. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 75. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 82.

Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 6.
Voet coleopt. t. 20. *f.* 135.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 4.
Habitat ſub Europae *ſtercore*, *ſtercorario ſimillimus*, *at minor*, *glaber*, *nitidus*, *antennis rubris*, *colore caeruleſcente*, *vireſcente et obſcuro varius*.

juvencus. 189. Sc. thorace anterius impreſſo mucronato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 76. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 83.
Habitat in America.

ſplendidus. 190. Sc. viridi-nitens, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 77. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 84.
Habitat in inſulis Americae *auſtrali oppoſitis*.

Cephus. 191. Sc. rufus, elytrorum ſutura apicibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 78. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 85.
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks.

laborator. 192. Sc. ater, thorace punctato, elytris ſtriatis, clypeo emarginato. *Fabr. ſp, inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 79. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 86.
Habitat in Braſiliae *ſtercore*.

globator. 193. Sc. thorace elytrisque obſcure nigris punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 80. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 87.
Habitat ad caput bonae ſpei, *foſſoris magnitudine*, *ſubtus hirtus piceus*.

ſeptemmaculatus. 194. Sc. elytris ſtriatis pallidis nigro-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 81. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 88.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *piceus*, *conſpurcati ſtatura*, *at paulo major*.

bipunctatus. 195. Sc. thorace nigro rubro-marginato, elytris rubris puncto nigro. *Lepech. it.* 2. *p.* 324. *t.* 10. *f.* 7. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 89.
Laxmann nov. comm. Petr. 14. *p.* 593. *t.* 24. *f.* 1. Scarabaeus bimaculatus.
Pallas ic. inſ. Ruſſ. 1. *p.* 12. *t.* A. *f.* 12. Scarabaeus coccinelloides.
Habitat ſub fimo equino Ruſſiae *auſtralis et ad* Volgam.
Thoracis *margo rufus*, *puncto nigro*.

arator. 196. Sc. niger, thorace laevi, elytris punctato-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 102. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 90.
Habitat ad caput bonae ſpei.

barbatus. 197. Sc. muticus laevis niger, ano barbato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 83. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 91.
Habitat in India.

quisquilius. 83. Sc. ater glaber, elytris livido-teſtaceis. *Fn. ſuec.* 297.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 91. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 100.
Scop. ent. carn. 29.
Herbſt apud Fueſſl. Arch. Inſ. 4. *p.* 7. *n.* 23. *t.* 19. *f.* 8.
β) Scarabaeus merdarius. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 90. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 7. *n.* 22.
γ) Scarabaeus cotericus. *v. Moll. naturh. Br.* I. *p.* 168. *n.* 13.
Scarabaeus Copris. *Schranck enum. inſ. Auſtr. p.* 5. *n.* 6.
Habitat in Europae *ſtercore et quisquiliis, ſeminis milii magnitudine,* β) *dimidio major.*

arcuatus. 198. Sc. niger nitidus, capitis clypeo anterius rufo, elytris ſtriato-punctatis, ſutura, puncto marginali baſeos vittaque abbreviata ſuturam verſus inflexa rubeſcentibus, pectore obſcuro, abdomine flaveſcente, palpis, antennis pedibusque ferrugineis. *v. Moll. naturh. Br.* I. *p.* 160. *n.* 7.
Habitat in alpibus Salzburgicis.

Scrofa. 199. Sc. oblongus niger, elytris fuſcis ſubſtriatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 11. *n.* 99.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura teſtudinarii, at minor.*

teſtudinarius. 200. Sc. niger, elytris ſulcatis piceis ferrugineo-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 89. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 98.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 7. *n.* 21. *t.* 19. *f.* 7. a. b.
Habitat in Anglia *et* Germania, *vere in agris ſtercoratis frequens.*

marginellus. 201. Sc. niger, thoracis elytrorumque margine teſtaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 88. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 97.
β) Melolontha nigro-marginata. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 155. *n.* 20. *t.* 43. *f.* 7.
Habitat in Coromandel, *parvus, pedibus piceis.*

quadrimaculatus. 84. Sc. niger oblongus, elytris maculis duabus nigris. *Fn. ſuec.* 398.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 86. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 94.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 10. *n.* 31. *t.* 19. *f.* 15.
Scarabaeus quadriguttatus.
Habitat in Europae *ſtercore.*

Sus. 202. Sc. oblongus obſcure rufus, elytris teſtaceis nigro-maculatis: *Fabr. mant.* 1. *p.* 11. *n.* 95. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 9. *n.* 29. *t.* 19. *f.* 10.
Habitat in Germaniae *ſtercore humano, fimetario dimidio minor, ſtatura quadrimaculati.*

plagiatus. 85. Sc. niger, elytris plaga ruſeſcente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 87. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 96.
Habitat in Europa, *an varietas ſubterranei?*

Blackburni. 203. Sc. thorace nigro aeneo, elytris ſtriatis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 85. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 93.
Habitat in America *boreali, rufipede paulo major.*

rufipes. 86. Sc. antennis pallidis, elytris laevibus. *Fn. ſuec.* 403.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 20. *n.* 84. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 92.
Scarabaeus thorace glabro nitido, elytris ſtriatis.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 6.
β) Scarabaeus arator. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 9. *n.* 30.
Scarabaeus gagates. *v. Moll naturh. Br.* 1. *p.* 172. *n.* 17.
Habitat in Europae, *potiſſimum borealis ſtercoratis, β) fimetarium magnitudine vix ſuperans.*

Ceratoniae. 87. Sc. thorace ſcabro lateribus tridentato, elytris griſeis. *Muſ. Lud. Ulr.* 31.*
Haſſelq. it. 409. *n.* 99. Scarabaeus ceratoniae.
Habitat in Cairi *ceratonia.*

porcatus. 204. Sc. fuſcus, elytris punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 92. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 101. *Herbſt. apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 8. *n.* 24. *t.* 19. *f.* 9. a. b. c.
β) Scarabaeus foveolatus. *v. Moll. naturh. Br.* 1. *p.* 173. *n.* 19.
Habitat in Germaniae *ſtercore.*

ſtercorator. 205. Sc. ater laevis, elytris ſtriato-crenatis, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 93. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 102.
Habitat in Braſilia.

aſper. 206. Sc. capite thoraceque transverſim ſulcatis, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 94. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 103. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 8. *n.* 25. *t.* 19. *f.* 10. a. b.
Habitat in Europae *plantis putridis.*

unipunctatus. 207. Sc. ater, coleoptris flaveſcentibus: puncto communi nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 95. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 104.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 579. *n.* 6. *Fn. ſuec.* 470.* Coccinella coleoptris flaveſcentibus: puncto communi nigro.

interpunctatus. 208. Sc. niger, elytris ſordide flavis ſulcis nigris: area intermedia maculis oblongis alternis nigris varia. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 8. *n.* 26. *t.* 19. *f.* 11.
Habitat in ſtercore vaccino Berolini.

varius. 209. Sc. niger, elytris dimiato flavis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 9. A. 27. *t.* 19. *f.* 12.
v. Moll naturh. Br. 1. *p.* 172. *n.* 18. Scarabaeus variegatus?
Habitat in ſtercore vaccino pratorum Berolinenſium, *ad interpunctatum proxime accedens, an varietas?*

contaminatus. 210. Sc. niger, clypei ſurtellique margine luteo, elytris punctato-ſtriatis hirtis pedibusque ſordide flavis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 9. *n.* 28. *t.* 19. *f.* 13.
Habitat in Pomerania, *interpunctato ſimilis, ſed minor.*

minutus. 211. Sc. niger, elytris ſtriatis pedibusque ſpadiceis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 32.
Habitat Berolini, *quisquilio aequalis, at magis oblongus.*

oblongus. 212. Sc. clypeo foveolato, elytris ſulcatis, corpore oblongo. *v. Moll naturh. Br.* 1. *p.* 171. *n.* 16. *et apud Fueſſli n. Mag. Entom.* 1. *p.* 371.
Habitat in Germaniae *ſtercore, foſſori affinis.*

arenarius. 213. Sc. ater, elytris ſtriatis, tibiis piceis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 11. *n.* 105.
Habitat in Sueciae *arena mobili, parvus.*

laevis. 417. Sc. ater, thorace laevi, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 2. *n.* 34.
Habitat in Europa.

dichrous. 418. Sc. ater glaber, thoracis margine externo elytris pedibusque ſordide teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 2. *n.* 35.
Habitat in Europa.

β) *exſcutellati.*

decempunctatus. 214. Sc. thorace anterius tuberculis tribus, elytris teſtaceis faſcia transverſa oblongo-punctatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf.* 1. *p.* 237.

v. *Moll naturh. Br.* 1. *p.* 175. *n.* 21. Scarabaeus quadrituberculatus.

Habitat in Germaniae *ſtercore humano et vaccino.*

reflexus. 215. Sc. niger, capite trituberculato, clypeo reflexo emarginato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 157.

Habitat in Sina, *oblongus, foſſoris magnitudine.*

quadripuſtulatus. 216. Sc. ater, capite bituberculato, elytris maculis duabus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 137. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 156.

Habitat in nova Hollandia.

ſulcator. 217. Sc. ater, capitis tuberculo unico, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 136. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 155.

Habitat in Cayenna.

criſtatus. 218. Sc. niger, thorace criſtato, clypeo tuberculato quadridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 138. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 158.

Habitat in Aegypto.

ſacer. 18. Sc. clypeo ſexdentato, thorace crenulato, tibiis poſterioribus ciliatis, vertice ſubbidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 13.* *Amoen. acad.* 6. *t.* 3. *f.* 170. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 139. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 159.

Degeer inſ. 7. *p.* 638. *n.* 36. *t.* 47. *f.* 18. Scarabaeus cornutus.

Osb. it. 51. Scarabaeus laevis thorace inermi, capite antice ſexdentato.

Loefl. it. 20. Scarabaeus pilularius niger, clypeo antice ſerrato, elytris nebuloſe maculatis ſubmollibus planiuſculis.

Petiv. gazoph. t. 42. *f.* 2.

Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 3.

Voet coleopt. t. 27. *f.* 39. 40.

Habitat in partibus Orbis *antiqui auſtralioribus, in* Roſſiae *auſtralis aridis frequens cylindrum e ſtercore bovino volvens in columnis antiquis* Romae *exſculptus ab* Aegyptiis.

laticollis. 38. Sc. niger, clypeo ſexdentato, elytris ſulcatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 140. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 160.

Geoffr. inſ. 1. *p.* 89. *n.* 2. Copris niger, capite clypeato: margine ſerrato, thorace lato laevi, elytris ſtriatis.

Raj. inſ. p. 105. *n.* 4.

Voet coleoptr. t. 27. *f.* 41.

Habitat in Sina, *et auſtrali* Europa, *ſacro valde affinis.*

219. Sc.

variolo-ſus. 219. Sc. clypeo ſexdentato, thorace elytrisque nigris: punctis impreſſis varioloſis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 16. *n.* 161.
Habitat in Iſtria, *laticollis ſtatura, ſed paulo minor.*

miliaris. 220. Sc. clypeo ſexdentato, thorace elytrisque nigris: maculis elongatis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 141. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 162.
Habitat in India.

Bacchus. 221. Sc. clypeo quadridentato, thorace gibbo elytrisque glabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 142. *mant.* 1. *p.* 17. *n.* 163.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus, gibbus.*

gibboſus. 222. Sc. clypeo quadridentato, elytris baſi gibbo notatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 143. *mant. p.* 17. *n.* 164.
Habitat in America.

Hollan-diae. 223. Sc. clypeo quadridentato, elytris ſulcatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 144. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 165.
Habitat in nova Hollandia.

Koenigii. 224. Sc. clypeo bidentato, thorace ſcabro, elytris varioloſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 145. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 166.
Pall. icon. inſ. Roſſ. 1. *p.* 7. *t.* A. *f.* 7. Scarabaeus ſcriptus.
Habitat Tranquebariae.

cupreus. 225. Sc. ex nigro cupreus, clypeo emarginato, thorace gibbo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 146. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 167.
Habitat in Africa.

flagella-tus. 226. Sc. niger opacus, clypeo emarginato, elytris ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 147. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 168.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et in auſtrali* Europa.

pilularius. 40. Sc. niger opacus laevis ſubtus aeneus, thorace poſterius rotundato. *Muſ. Lud. Ulr.* 19.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 151. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 170.
Geoffr. inſ. 1. *p.* 91. *n.* 7. Copris niger nitidus &c.
Ariſt. Anim. l. 5. *c.* 18.
Plin hiſt. mund. II. 34. Pilularius.
Raj. inſ. p. 105. *n.* 1.
Catesb. Car. 3. *t.* 11. fig. ſiniſtr.
Schaeff. ic. t. 73. *f.* 6.
Voet coleopt. t. 28. *f.* 49.
β) Scarabaeus Mopſus. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *t.* A. *f.* 3.
Scarabaeus Geoffroae. *Sulz. ic. inſ. t.* 1. *f.* 7.
Habitat in Europa *magis auſtrali, ſtercorarii magnitudine et ſtatura; bini quotidie ſiſyphi inſtar volvunt globum e ſter-*

ſtercore inprimis humano confectum ſe ſaepe ſepties majorem Loeſl. it. 20.

Schaefferi. 41. Sc. thorace rotundato, clypeo emarginato, elytris triangulis, femoribus poſterioribus elongatis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 148. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 169.
Scop. ent. carn. p. 84. Scarabaeus longipes.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 92. *n.* 9. Copris niger, pedibus longis &c.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 8.
Voet coleoptr. t. 25. *f.* 17.
Habitat in Calabriae, Germaniae *et* Sibiriae *collibus apricis, globulos e ſtercore bovino factos volvens et ſepeliens, niger, horticolae magnitudine.*

braſilianus. 227. Sc. ater, clypeo emarginato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 150. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 171.
Habitat in Braſiliae *ſtercore bovino.*

calcaratus. 44. Sc. capite clypeato emarginato, femoribus poſterioribus dentatis.
Habitat in Aegypto.

Schreberi. 45. Sc. ater glaber, elytrorum maculis duabus femoribusque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 151. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 172.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 91. *n.* 7. Copris niger nitidus &c.
Schaeff. ic. t. 73. *f.* 6.
Voet coleoptr. t. 28. *f.* 49.
Habitat in Europa *temperata, nuchicornis fere ſtatura.*

bipuſtulatus. 228. Sc. ater, elytris baſi macula rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 152. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 173.
Habitat in nova Hollandia.

pallipes. 229. Sc. capite thoraceque pallido viridique variegatis, pedibus antennisque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 153. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 174.
Habitat in Coromandel, *parvus.*

triangularis. 230. Sc. niger, thoracis margine femoribusque pallidis, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 154. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 175.
Drury inſ. 1. *t.* 36. *f.* 7.
Habitat in America *auſtrali, nuchicornis ſtatura.*

ciuctus. 231. Sc. niger, elytrorum margine pallido, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 155. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 176.
Habitat in Sina.

flavipes. 232. Sc. nigricans, thoracis marginibus, elytris pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 495. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 177.
Laichart. inſ. tir. 1. *p.* 24. *n.* 17. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 12. *n.* 46. *t.* 19. *f.* 19. Scarabaeus thoracocircularis.
Schaeff. ic. t. 74. *f.* 6.
Habitat in Germania, *cincti ſtatura.*

aeneus. 233. Sc. viridi-aeneus, thorace bituberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 156. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 178.
Habitat in Coromandel, *parvus, ſubtus niger.*

ſmaragdulus. 234. Sc. aeneus nitidus, clypeo bidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 157. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 179.
Habitat in America *auſtrali, parvus, glaberrimus.*

ovatus. 46. Sc. niger, clypeo emarginato, thorace ſubaeneo, elytris abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 158. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 180.
Habitat in Calabriae, Germaniae, Angliae *ſtercore bovino, nuchicorni ſimilis, at quadruplo minor.*

amazonus. 47. Sc. teſtaceus thorace lituris duabus nigris, elytrisque margine exteriore callo fuſco.
Habitat Surinami, *laevis, ſtercorario dimidio minor.*

crucifer. 319. Sc. thorace ſubvilloſo virideſcente, elytris luteis corpore brevioribus: cruce nigra, trabe duplici. *Lepech. it.* 1. *p.* 240. *t.* 16. *f.* 14.
Habitat in Sibiriae *quercetis, pulpa foliorum victitans, ſubtus niger villoſus, an hujus generis?*

caeruleus. 320. Sc. totus cyaneus oblongus. *Lepech. it.* 1. *p.* 313. *t.* 19. *f.* 2.
Habitat in Sibiriae *deſerto* uralenſi, 5 *lineas longus, ſubtus in atrum colorem vergens.*

uralenſis. 321. Sc. viridis, elytris flavis corpore brevioribus, apice acuminatis. *Lepech. it.* 1. *p.* 313.
Habitat in deſerti Sibiriae uralenſis *arenoſis, ſubtus villo albo tectus.*
Elytra *lineis villo albicante ſignatis a medio ad apicem diſtincta.*

419. Sc.

ſtictopterus. 419. Sc. niger elytris ſtrictis punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 32.
Habitat in Europa.

guttatus. 420. Sc. niger, thorace rotundato: guttis eminentibus glabris, capitis clypeo impreſſo apice bifido, elytris profunde ſtriatis crenatis: maculis oblongis e pilis luteis. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 53.

b) *mandibula arcuata ſubdentata, abdomine apice nudo, oblique truncato.* Melolonthae.

Fullo. 57. Sc. teſtaceus albo-maculatus, ſcutello macula duplici antennis heptaphyllis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 553. *n.* 57. *Fn. ſuec. p.* 394.* *Scop. ent. carn. p.* 123. Scarabaeus ſcutellatus muticus, antennis heptaphyllis, corpore nigro, pilis albis, ſcutello macula duplici alba.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 69. *n.* 2. Scarabaeus antennarum lamellis maximis.
Raj. inſ. p. 93. *n.* 9. Scarabaeus Fullo.
Friſch inſ. 11. *t.* 1. *f.* 1.
Mouff. inſ. 160. *f.* 4.
Hoeffn. inſ. 2. *t.* 7.
Eph. Nat. Cur. Dec. 2. *ann.* 6. *obſ.* 239.
Aubent. miſc. t. 16. *f. med.*
Schaeff. ic. t. 23. *f.* 2.
Petiv. gaz. t. 138. *f.* 1.
Sulz. hiſt. inſ. 1. 1.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 48. 49.
β) Scarabaeus albus. *Pall. it.* 2. *p.* 718. *n.* 4.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 19. *t.* B. *f.* 21. Scarabaeus hololeucos.
Habitat in Europae *et* Barbariae *arenoſis, quercu, elymo et arundine arenariis victitans, ſubtus hirſutus, unguiculis baſi ramo uncinato.*

ruricola. 235. Sc. ater ſericeus, elytris rufis: margine nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 45. *mant inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 58.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 80. *n.* 15. Scarabaeus niger elytris croceis &c.
Habitat in Angliae *graminoſis.*

fruticola. 236. Sc. capite thoraceque caeruleo-piloſis, elytris lividis, clypeo apice reflexo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 56.
Scop. ent. carn. 6. Scarabaeus cyathiger.

Poda

Poda inſ. 21. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 44. Scarabaeus agricola.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 15. *n.* 6. *t.* 19. *f.* 24.
Schaeff. ic. t. 65. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 67.
β) Scarabaeus campeſtris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 15. *n. c. t.* 19. *f.* 25.
Habitat in Germaniae *ſpicis ſecalinis, in* Calabria *etiam inquilinus, horticolae ſtatura, ſed minor.*

praticola. 237. Sc. thorace nigro flavoque vario ſubpiloſo, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 55.
Habitat in Sibiria, *agricolae affinis, at clypeo non reflexo.*

arvicola. 238. Sc. capitis clypeo reflexo, corpore nigro immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 54.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali, horticolae affinis.*

agricola. 58. Sc. thorace villoſo, elytris lividis: limbo faſciaque nigris, clypeo apice reflexo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 23. *n.* 57.
Habitat in Germaniae *graminibus.*

floricola. 239. Sc. cyaneo-nigra glabra, elytris rufis: ſutura nigra, abdomine punctis faſciculatis albis, clypeo reflexo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 22. *n.* 53.
Habitat in Africa; *horticolae proxime affinis.*

abdominalis. 240. Sc. capite thoraceque caeruleo-piloſis, elytris teſtaceis, abdomine albo villoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 52.
Habitat in Italia, *horticolae nimium affinis.*

horticola. 59. Sc. capite thoraceque caeruleo-piloſis, elytris teſtaceis, pedibus nigris. *Fn. ſuec.* 391.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 50.
Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 75. *n.* 8.
It. ſcan. 116. 321. Scarabaeus friſius.
Liſt. ſcar. 380. *n.* 3. Scarabaeus ex nigro vireſcens, pennarum thecis rufis.
Degeer inſ. 4. *p.* 278. *n.* 24. *t.* 10. *f.* 18. Scarabaeus viridicollis.
Raj. inſ. p. 380. *n.* 3.
Friſch inſ. 4. *t.* 14.
Pet. gaz. t. 22. *f.* 9.
Schaeff. ic. t. 23. *f.* 4.

Habitat

Habitat in Europae *hortis; larva radices braſſicae lotrydis, et capitatae deſtruit, intacta viridi et ſabauda; imago pomonam devaſtat, intacta pyro communi.*

regius. 241. Sc. cupreo-nitidus, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 49.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſplendentis ſtatura.*

ſplendens. 242. Sc. ater, elytris vitta abbreviata aurea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 48.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ferrugineus. 243. Sc. rufus thorace elytrisque vage punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 38.
Habitat in Coromandel, *rauco affinis, at duplo minor.*

raucus. 244. Sc. clypeo reflexo, thorace elytrisque punctatis nigro-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 46.
Habitat in Coromandel, *ſubtus niger.*

rupicola. 245. Sc. villoſus vireſcens, capite nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 44.
Habitat ad caput bonae ſpei.

innubus. 246. Sc. glaber niger, thoracis margine, abdomine femoribusque teſtaceis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 22. *n.* 45.
Habitat in - - - parvus, nitidus, thorace punctato, elytris ſubſtriatis.

errans. 247. Sc. teſtaceus, thorace maculis duabus nigris, pedibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 43.
Habitat in - - -

Cardui. 248. Sc. glaber viridi-aeneus, abdomine rufo-cinereo villoſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 42.
Habitat in Africae *carduo pycnocephalo, Sc. Friſchii ſtatura, at paulo minor.*

Vitis. 249. Sc. viridis, thoracis lateribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 41.
Scop. ent. carn. Scarabaeus dubius.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 56. 57.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 11.
Habitat in Europae *et* Americae *vite, Sc. Friſchii valde affinis, varians elytris teſtaceis.*

250. Sc.

Friſchii. 250. Sc. nigro-aeneus, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 40.
Friſch inſ. 4. *p.* 29. *t.* 14.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 55. *et t.* 7. *f.* 58.
Habitat in Germaniae *vite et roſa, in* Braſilia, *rarius elytris thoraci concoloribus.*

janthinus. 421. Sc. obſolete violaceus, thoracis margine externo, elytris, abdomine pedibusque teſtaceis, ano fuſco violaceo femoribus anterius violaceis. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 62.
Habitat in Europa, *ſtatura et magnitudine Sc. Friſchii.*

coriarius. 422. Sc. fuſco-violaceus, thorace fuſco-luteo piloſo, capitis clypeo apice reflexo, elytris teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 4. *n.* 72.
Habitat in Europa.

holoſericeus. 251. Sc. ſupra viridis holoſericeus ſubtus cupreus, elytris lineis elevatis quatuor. *Fabr. mant.* 1. *p.* 21. *n.* 39.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali, Sc. Friſchii ſtatura et magnitudine.*

auſtriacus. 252. Sc. glaber, elytris fuſcis: marginis exterioris plica elevata, ſcutelli macula quadrata. *Schranck enum. inſ. Auſtr. p.* 11. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 16. *n.* 12. *t.* 19. *f.* 26.
Habitat in Auſtria, *an varietas agricolae?*

laetus. 253. Sc. ſupra glaber aureus, thoracis linea dorſali ſcutelloque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 38.
Habitat in nova Seelandia.

feſtus. 254. Sc. ſupra glaber viridis, thorace linea dorſali, elytris ſutura nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 37.
Habitat in nova Seelandia.

rufeſcens. 255. Sc. glaber rufeſcens, elytris teſtaceis, clypeo quinquedentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 36.
Voet coleoptr. t. 19. *f.* 76.
Habitat ad caput bonae ſpei.

obſcurus. 256. Sc. obſcure piceus, immaculatus, pilis breviſſimis erectis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 35.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *rufeſcentis magnitudine.*

erythrocephalus. 257. Sc. glaber pallidus, capite rubro baſi nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 34.
Petagn. ſp. inſ. Calabr. p. 5. *n.* 18. *f.* XXXV.
Habitat in Calabria *et* Coromandel, *melanocephalo affinis, at duplo minor.*

melanocephalus. 258. Sc. glaber rufeſcens, capite nigro, elytris pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 33.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 80.
Habitat in Braſilia.

ſerratus. 259. Sc. obſcure teſtaceus, clypeo emarginato, thoracis margine ſerrato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 2.
β) Melolontha ſibirica. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 35.
Habitat in Coromandel, *melolonthae magnitudine*, β) *triplo minor in* Sibiria.

Melolontha. 60. Sc. ſcutellatus muticus teſtaceus, thorace villoſo, cauda inflexa, inciſuris abdominis albis. *Fn. ſuec.* 392.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 70. *n.* 1. *Scop. ent. carn.* 16.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 35. *n.* 3. *mant. inſ. p.* 19. *n.* 3. Melolontha (vulgaris) teſtacea, thorace villoſo, inciſuris abdominis albis.
Mouff. inſ. 160. *f.* 2.
Liſter ſcar. Angl. 379.
Aldrov. inſ. 454. *t. ſup. f.* 2.
Hoefn. inſ. t. 1. *f.* 11.
Goed. inſ. 1. *t.* 78.
Merian. europ. 1. *p.* 2. *f.* 4.
Friſch inſ. 4. *t.* 14.
Raj. inſ. p. 104. *n.* 1.
Pet. gaz. t. 9. *f.* 2.
Alb. inſ. 60.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* 1.
Leeuwenh. epiſt. 1. *p.* 18.
Sulz. inſ. t. 1. *f.* 3.
Schaeff. elem. t. 8. *f.* 3. *et. t.* 109. *f.* 5.
icon. t. 93. *f.* 1. 2.
Voet coleopt. t. 6. *f.* 45. 46.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 14.

Habitat

Habitat in Europae *parte magis boreali vulgatiſſimus, in* Calabria *quoque frequens, unguibus prope baſin bidentatis, dente inferiori breviore, veſpere circumvolitans, arborum foliis, tilia tamen intacta, victitans, auctumno copioſior morbos praenuncians, oleum infuſum cimicifugum reddens, meleagridum gallinarum, veſpertilionum gratus cibus, varians annuatim thorace ruſo et nigro.*

Mas *cauda acuta inflexa diſtinctus;* larva *griſea, capite pedibusque teſtaceis, plantarum, ſegetis praeſertim radices exedit, ſexto demum anno exeunte ſcarabaeo.*

ſolſtitialis. 61. Sc. ſcutellatus muticus teſtaceus thorace villoſo, elytris luteo-pallidis: lineis tribus albis parallelis. *Fn. ſuec.* 393.*
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 74. *n.* 7. *Scop. ent. carn.* 3.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 57. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 9. Melolontha teſtacea, thorace villoſo, elytris luteo-pallidis: lineis tribus pallidioribus.
Mouff. inſ. 160. *f.* 3.
Liſter ſcar. angl. 301. *n.* 2.
Raj. inſ. p. 105. *n.* 2.
Petiv. gaz. p. 36. *t.* 22. *f.* 9.
Friſch inſ. 9. *t.* 15. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 93. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 51. 52.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 15.
Habitat in Europae *arboretis, unguibus, ad baſin unidentatis, melolontha ſerior, ſolſtitio aeſtivo frequentiſſimus, an germinibus frumentaceorum, quorum radices larva rodit, inhaerendo, morbi epidemici* Kriebelkrankheit *cauſſa?*

Tau nigrum. 411. Sc. nigricans ſubtus lunatus caneſcens, elytris pilis albis breviſſimis, ſcutello villoſo albido T nigro inſcripto. *Schranck Schr. eintr. Fr. z. Wien* II. 2. *p.* 6.
Habitat in Hungaria, *unguibus medio unidentatis.*

lanugithorax. 412. Sc. unguibus bifidis, poſterioribus minoribus poſteriorum unico. *Schranck Schr. eintr. Fr. z. Wien* II. 2. *p.* 7. *n.* 9.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 31.
Habitat in Bavariae *montibus, ab hirtello diſtinctus.*

reflexus. 260. Sc. glaber teſtaceus, clypeo reflexo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 7.
Habitat in Africa *aequinoctiali, fervido affinis, at paulo minor.*

Alopex. 261. Sc. fulvo-hirtus, clypeo reflexo emarginato, elytris glabris nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 8.
Habitat ad caput bonae ſpei, *reflexi ſtatura.*

fervidus. 262. Sc. teſtaceus glaber, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 6.
Habitat in America *ſeptentrionali, quaſi rore caeruleſcente tectus.*

villoſus. 263. Sc. teſtaceus, clypeo marginato reflexo, corpore ſubtus lanato, ſcutello albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 4.
Habitat in Italia, *melolonthae ſtatura et magnitudine.*

atomarius. 264. Sc. albo-farinoſus, thorace canaliculato atro, elytris fuſcis, abdomine albo: punctis lateralibus atris. *Fabric. ſp. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 59.
Habitat ad caput bonae ſpei, *farinoſi ſtatura et magnitudine.*

farinoſus. 64. Sc. ſcutellatus muticus niger, polline vireſcente, elytris abbreviatis. *Fn. ſuec.* 399.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 43. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 60. Melolontha ſupra caeruleo-ſubtus argenteo-ſquamoſa nitens, clypeo integro.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 79. *n.* 13. Scarabaeus violaceus.
Degeer inſ. 4. *p.* 302. *n.* 30. *t.* 10. *f.* 23. Scarabaeus ſcutellatus niger, ſquamulis griſeo-viridibus &c.
Drury inſ. 2. *t.* 32. *f.* 4. Scarabaeus caeruleus.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 71.
Habitat in Europa *magis auſtrali, unguibus poſterioribus breviſſimis.*

argenteus. 265. Sc. niger, ſubtus argenteo-nitens, clypeo marginato, elytris teſtaceis. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 61.
Scop. ent. carn. 9. *Poda inſ.* 20. Scarabaeus argenteus.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 68.
Habitat in Auſtria *interiori*, Calabria *et frequens in* Angliae *floribus.*

266. Sc.

Melolonthae *arborum foliis*, cetoniae *etiam floribus victitant*; trichii *delectantur floribus praeſertim umbellatarum*; melolontharum *larva radicibus*, cetoniarum *ligno putreſcente ſubcidulo victitat.*

proboſci-deus. 266. Sc. niger hirtus, clypeo porrecto ſubreflexo, elytris teſtaceis: margine nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 62.
Habitat in India, *et* Africae *floribus.*

ſpinipes. 267. Sc. niger immaculatus, pedibus poſterioribus elongatis: femoribus baſi uniſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 63.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura craſſipedis.*

dentipes. 268. Sc. niger, elytris teſtaceis, clypeo quadridentato, femoribus tibiisque poſterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 64.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſpinipedi affinis.*

podagricus. 269. Sc. niger, clypeo tridentato, femoribus tibiisque poſterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 65.
Habitat in Coromandel, *dentipedis ſtatura.*

arthriticus. 270. Sc. niger, elytris griſeis, clypeo tridentato, femoribus tibiisque poſterioribus incraſſatis ſubinermibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. 23. *n.* 66.
Habitat ad caput bonae ſpei, *podagrico minor.*

gonagricus. 271. Sc. griſeus, pedibus rufis, femoribus poſterioribus incraſſatis muticis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 67.
Habitat ad caput bonae ſpei, *arthritico minor.*

craſſipes. 272. Sc. ater albo-maculatus, pedibus poſterioribus elongatis craſſiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 68.
Habitat ad caput bonae ſpei.

pulverulentus. 273. Sc. corpore polline vireſcenti argenteo, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 69.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 8.
Habitat in Alſatia *et* Ruſſia, *argenteo duplo minor.*

ſylvicola. 274. Sc. clypeo inflexo integro, corpore nigro glabro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 70.
Habitat in nova Hollandia, *elytris fuſcis varians.*

subſpinoſus. 275. Sc. flaveſcens, pedibus rufis, thorace ſubſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 58. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 71.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

Bankſii. 276. Sc. capite thoraceque atris, elytris villoſis pedibusque teſtaceis, abdomine brevi retuſo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 24. *n.* 72.
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks, *pulverulenti ſtatura.*

aulicus. 65. Sc. ſcutellatus muticus piloſus luteus, capite nigro, pedibus poſterioribus elongatis uniunguiculatis.
Fabr. mant. 1. *p.* 22. *n.* 51. Melolontha (regia) villoſa ſupra lutea, capite nigro, ſubtus cinerea.
Habitat in Africa, *horticolae magnitudine et ſtatura.*

abbreviatus. 277. Sc. villoſus niger, clypeo tridentato, elytris abbreviatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 59. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 73.
Habitat ad caput bonae ſpei, *pilis aliquot albis hirtus.*

mutabilis. 278. Sc. ater, tomento cinereo villoſus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 74.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 75.
Habitat Tranquebariae.

chryſomelinus. 279. Sc. ater, elytris auro nitentibus, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 75. *Schranck inſ. auſtr.* 16. *n.* 25.
Habitat in Americae *borealis*, Germaniae *ligno putreſcente.*

verſicolor. 280. Sc. obſcure aeneus, elytris tomento cinereo nitidulis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 62. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 76.
Habitat in Sierra Leon Africae.

capicola. 281. Sc. niger hirtus, ſcutello abdomineque albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 63. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 77.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 75.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parvus.*

picatus. 282. Sc. glaber ferrugineus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 64. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 78.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura capicolae.*

lineatus. 283. Sc. obſcure vireſcens, elytris lineis duabus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 65. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 79.
Habitat in Sierra Leon Africae, *parvus*, *gibbus.*

gibbus. 284. Sc. gibbus teſtaceus, tomento cineraſcente nitidulus. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 46. *n.* 66. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 80.
Habitat ad caput bonae ſpei, *lineato magis gibbus.*

montico-la. 285. Sc. teſtaceus glaber, capite atro, clypeo integro reflexo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 46. *n.* 67. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 81.
Habitat in nova Hollandia.

humeralis. 286. Sc. ater, elytris baſi punctoque medio pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 46. *n.* 68. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 82.
Habitat in Europae *graminoſis.*

Urſus. 287. Sc. ater hirſutiſſimus, pedibus quatuor anterioribus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 47. *n.* 69. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 83.
Habitat ad caput bonae ſpei, *pedibus aliquando omnibus nigris.*

Lynx. 288. Sc. niger hirtus, elytrorum margine aureo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 47. *n.* 70. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 84.
Habitat ad caput bonae ſpei.

longipes. 66. Sc. ſcutellatus muticus atro-cyaneus, pedibus nigris, poſterioribus elongatis uniunguiculatis.
Fabr. ſp. inſ. I. *p.* 47. *n.* 71. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 85.
Melolontha (crinita) hirta, ſupra viridis, ſubtus nigra.
Pall. ic. inſ. Roſſ. t. A. *f.* 17. Scarabaeus bombyliformis.
Habitat ad caput bonae ſpei.

hirtus. 289. Sc. hirtus, capite thoraceque viridibus, elytris fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 47. *n.* 72. *mant. inſ.* I. *p.* 25. *n.* 86.
Pall. ic. inſ. Roſſ. t. A. *f.* 15. Scarabaeus Alopecias.
Habitat in Sibiria.

Vulpes. 290. Sc. aureus fulvo hirtus, abdomine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 47. *n.* 73. *mant. inſ.* I. *p.* 25. *n.* 87.
Habitat in Sibiria.

bombylius. 291. Sc. niger cinereo hirtus, elytris teſtaceis: lineis tribus apicis albidis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 25. *n.* 88.
Habitat in Africae *plantis, vulpis magnitudine et ſtatura.*

vittatus. 292. Sc. cyaneus piloſus, elytris teſtaceis: lineis tribus albicantibus. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 47. *n.* 74. *mant. inſ.* I. *p.* 25. *n.* 89.
Lepechin it. I. *p.* 508. *t.* 16. *f.* 9. Scarabaeus acuminatus.

 Pall.

Pall. it. 1. *p.* 462. *n.* 26. *icon. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 14. *t.* A. *f.* 14.
Scarabaeus oxypterus.
Petiv. gazoph. t. 11. *f.* 12.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 35.
Habitat in America *auſtrali et* India.

bimaculatus. 293. Sc. oblongus glaber teſtaceus, thorace utrinque macula abdomineque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 10.
Habitat in Sina, *ſolſtitiali maxime affinis.*

atriplicis. 294. Sc. oblongus villoſus pallidus, elytris ſutura apiceque nigris, clypeo reflexo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 19. *n.* 11.
Habitat in Barbariae *atriplice halimifolia, ruficornis ſtatura et magnitudine.*

ruficornis. 295. Sc. villoſus teſtaceus, abdomine albicante. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 8. *mant. pl.* 1. *p.* 20. *n.* 12.
Habitat in Germania, *an varietas ſolſtitialis?*

teres. 296. Sc. oblongus glaber niger, elytris obſolete ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 13.
Scop. ent. carn. 19. Scarabaeus oblongus.
Habitat in Germania *ſuperiore, an ab oblongo diverſus?*

lanigerus. 67. Sc. ſcutellatus muticus, ſubtus lanatus, capite thoraceque lanatis, elytris luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 20.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 37. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 14.
Melolontha (lanigera) ſubtus lanata, capite thoraceque aureis, elytris luteis.

brunnus. 72. Sc. ſcutellatus muticus teſtaceus, elytris ſtriatis, thorace utrinque puncto notato.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 39. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 32.
Melolontha (brunnea) glabra teſtacea, elytris ſtriatis, thorace utrinque puncto notato.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 83. *n.* 22. *Degeer inſ.* 4. *p.* 277. *n.* 23. *t.* 10. *f.* 17. Scarabaeus fulvus.
Voet coleoptr. t. 7. *f.* 53. 54.
Habitat in Europae *arboretis.*

ſignatus. 297. Sc. glaber pallidus thorace lineis duabus, elytris maculis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 31.
Habitat in Jamaica, *ruficollis magnitudine.*

ruficollis. 298. Sc. glaber punctatus ferrugineus, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 30.
Habitat in Coromandel, *brunneo major.*

pallens. 299. Sc. glaber teſtaceus capite elytrorumque ſutura nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 29.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 13. *n.* 4. *t.* 19. *f.* 21. a. b. Melolontha ſpinipes.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* India, *ſolſtitiali ſimilis.*

hirticollis. 300. Sc. hirtus niger, elytris punctatis glabris rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 28.
Habitat in Africa, *fuſci magnitudine.*

fuſcus. 301. Sc. glaber teſtaceus, capite obſcuriore, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 27.
Habitat in terra del fuego.

triſtis. 302. Sc. thorace villoſo obſcuro, elytris laevibus teſtaceis, ſcutello albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 26.
Habitat in America *boreali, fuſco affinis.*

ſtriatus. 303. Sc. glaber aeneus, elytris ſtriatis: ſutura lineisque quatuor cupreis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 26.
Habitat in terra del fuego.

luridus. 304. Sc. thorace nigro: margine pallido, elytris griſeis nigropunctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 24.
Habitat - - -

glacialis. 305. Sc. glaber piceus, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 23.
Habitat in terra del fuego.

dorſalis. 306. Sc. glaber teſtaceus, capite, thoracis elytrorumque dorſo nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 20 *n.* 22.
Habitat Tranquebariae.

bicoloratus. 307. Sc. glaber viridis, ſubtus teſtaceus, pedibus apice aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 21.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 66.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ſuturatus. 308. Sc. viridis, elytrorum ſutura flaveſcente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 20.
Habitat in nova Seelandia.

aeratus. 309. Sc. glaber aeneus, abdominis lateribus albis, elytris acuminatis. *Fabr. ſp. inſ* 1. *p.* 38. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 19.
Habitat in nova Hollandia.

viridis. 310. Sc. glaber, ſupra viridis, ſubtus aureus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 18.
Habitat ad caput bonae ſpei.

glabratus. 311. Sc. teſtaceus nitidus, ſterno anterius porrecto obtuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 17.
Habitat in America *auſtrali et* India.

punctatus. 76. Sc. ſcutellatus muticus teſtaceus, elytris punctis tribus ſubfuſcis obſoletis diſtantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 23.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 38. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 16.
Melolontha teſtacea, elytris punctis tribus fuſcis diſtantibus. *Gron. zooph.* 438.
Drury inſ. 1. *t.* 34. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 65.
Habitat in America, *laevis, aurati magnitudine, unguibus arcuatis acutiſſimis.*

longicornis. 312. Sc. ſupra glaber niger, elytris ferrugineis, antennarum clava elongata. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei, *lanigeri ſtatura et magnitudine.*

unicolor. 313. Sc. totus ſpadiceus laevis, elytris punctis impreſſis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 154. *n.* 18. *t.* 43. *f.* 5.
Habitat in India, *brunno ſimilis, at quadruplo major.*

ciliatus. 314. Sc. niger ſubtus piloſus, elytris villoſis et thorace poſterius pilis longis albis ciliato punctatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 155. *n.* 19. *t.* 43. *f.* 6.
Habitat in India, *antennis ad fullonem accedens, his pedibusque fuſcis.*

pellucidus. 315. Sc. holoſericeus obſcurus albo-obumbratus, elytris coſtatis. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 1. *f.* 9.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 7. *p.* 155. *n.* 21. Melolontha Berolinenſis.
Voet coleoptr. t. 21. *f.* 150.

Habitat

Habitat in Germania *et* Helvetia, *brunno ſimilis, at brevior, magisque rotundatus et convexus.*

cerealis. 316. Sc. ſcutellatus, ſubtus hirſutus, abdominis latere utroque albo-maculato. *Scop. delic. inſubr.* 1. *p.* 49. *t.* 21. *f.* B. a. b. c.

Habitat in Inſubria, *ſub initium aeſtatis veſpere frequens in celti auſtrali aliisque arboribus, melolonthae valde affinis.*

ſinuatus. 317. Sc. exſcutellatus niger, tibiis toto margine exteriore denticulatis. *Scop. delic. inſubr.* 1. *p.* 52. *t.* 21. *f.* E.

Habitat in agro Ticinenſi, *glaber, totus niger, ſupra punctulatus.*

fuſceſcens. 318. Sc. ſcutellatus fuſceſcens, ſcutello lineola transverſa duplicata, tibiis poſterioribus quadridentatis. *Scop. delic. inſubr.* 1. *p.* 53. *t.* 21. *f.* F.

Habitat in Inſubria, *frequens inter ſegetes, aeſtate in arboribus, ſtatura ſolſtitialis, ſupra badius, ſubtus villis longioribus et rufeſcentibus hirſutus.*

deſerti. 322. Sc. ſupra nigricans, ſubtus lanugine alba obſitus, elytris corpore brevioribus, ſcutello triangulari villoſo albo. *Lepech. it.* 1. *p.* 313. *t.* 19. *f.* 7.

Habitat in deſerto Sibiriae uralenſi, 9 *lineas longus, an hujus tribus?*

ſepicola. 55. Sc. ſcutellatus muticus ferrugineus, thorace elytrisque piloſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 24.*

Habitat in India, *habitu horticolae, at triplo major.*

ſyriacus. 56. Sc. ſcutellatus muticus, capite thoraceque piloſo viridibus, elytris piloſis ciliatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 25.*

Habitat in India, *horticolae ſtatura.*

Leei. 427. Sc. ſcutellatus muticus caeruleus nitidiſſimus, capitis diſco, thoracis faſcia interrupta, elytrorumque vittis quatuor aureis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 4.

Habitat in India, *facie ſc. vitis, at duplo fere major.*

bivittatus. 428. Sc. flavus nitidiſſimus, capite thoraceque vittis duabus communibus, elytris ſtriis plurimis abbreviatis viridibus. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 5.

Habitat in Braſilia, *fervidae facie, at paulo minor.*

†† *mandibula recta.*

a) *acuta*, Cetoniae.

Chryſis. 49. Sc. ſcutellatus muticus, ſterno porrecto, ſcutello elytris dimidio breviore. *Muſ. Lud. Ulr.* 21.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 52. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 15. Cetonia ſcutello elytris dimidio breviore, ſterno porrecto, corpore viridi.
Degeer inſ. 4. *p.* 319. *n.* 12. *t.* 19. *f.* 4. Scarabaeus, ſcutello longiſſimo &c.
Gron. zooph. p. 428. *t.* 15. *f.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 10.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 63.
Habitat in America *magis auſtrali, aurati colore et magnitudine.*

ſurinamus. 50. Sc. ſcutellatus muticus niger, thoracis inciſurarumque marginibus flavis, ſterno porrecto. *Amoen. ac.* 6. *p.* 391.*
Habitat Surinami.
Caput *linea flava*, abdominis *ſegmentum ultimum maculis* 3-4 *flavis pictum.*

nitidus. 51. Sc. ſcutellatus muticus thorace poſtice lobato, capite ſpina recumbente, ſterno porrecto. *Muſ. Lud. Ulr.* 26.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 52. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 13. Cetonia thorace poſtice lobato, capite ſpina recumbente, ſterno cornuto.
Degeer inſ. 4. *p.* 321. *n.* 16. *t.* 19. *f.* 8. 9. Scarabaeus ſcutello minimo &c.
Gron. zooph. 455.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 5. 6.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 4.
Voet coleoptr. t. 3. *f.* 23.
Habitat in America, *praeſertim* Carolina.

Carmelita. 323. Sc. nigro-viridis, thorace elytrisque teſtaceis, ano albo bipunctato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 14.
Habitat in Africa, *ſtatura nitidi, capite nigro.*

quadripunctatus. 324. Sc. niger, ano bipunctato, pedibus rufis: tibiis poſterioribus ſpinis annulatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 27. *n.* 12.
Habitat in India, *antennis pedibusque ferrugineis.*

areatus. 325. Sc. niger pubeſcens, elytris diſco rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 59.
Habitat in Virginia.

326. Sc.

cruentatus. 326. Sc. niger, elytris viridibus nitidis, thoracis margine anoque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 59. *n.* 48. *mant. inſ.* I. *p.* 31. *n.* 58.
Habitat ad caput bonae ſpei.

acuminatus. 327. Sc. obſcure aeneus pallido-maculatus, elytris acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 58. *n.* 47. *mant. inſ.* I. *p.* 31. *n.* 57.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 37.
Habitat ad caput bonae ſpei.

maculatus. 328. Sc. aeneus nitidus, thorace utrinque macula, elytris plurimum albis, ſterno obtuſo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 58. *n.* 46. *mant. inſ.* I. *p.* 31. *n.* 36.
Voet coleoptr. t. I. *f.* 8. Antheus.
Habitat in Coromandel, *acuminati ſtatura.*

ſtolatus. 329. Sc. viridi-fuſcus, thorace margine punctisque, elytris faſcia media maculisque niveis poſterius acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 58. *n.* 45. *mant. inſ.* I. *p.* 31. *n.* 55.
Habitat in nova Hollandia.

philippenſis. 330. Sc. aeneus nitidus, thorace margine punctisque duobus albis, elytris maculatis acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 58. *n.* 44. *mant. inſ.* I. *p.* 30. *n.* 54.
Habitat in inſulis Philippinis.

aurichalceus. 331. Sc. aeneus opacus, elytris acuminatis albo-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 58. *n.* 43. *mant. inſ.* I. *p.* 30. *n.* 53.
Habitat prope Surate Indiae.

ſordens. 332. Sc. nigro-aeneus, elytris lineis duabus elevatis alboque maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 58. *n.* 42. *mant. inſ.* I *p.* 30. *n.* 52.
Habitat in Braſilia.

tetradactylus. 333. Sc. ſcutellatus muticus niger, pedibus triunguiculatis, pollice fixo. *Mont. pl. p.* 530.
Fabr. ſp. inſ. I. *p.* 58. *n.* 41. *mant. inſ.* I. *p.* 30. *n.* 51. Cetonia atra, ſcutello elytris dimidio breviore, pedibus triunguiculatis: pollice fixo.
Drury inſ. I. *t.* 33. *f.* 7.
Sloan. jam. 2. 237. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, inſulisque oppoſitis.*

orichalcus. 88. Sc. ſcutellatus muticus aeneus glaber, ſubtus ferrugineo varius. *Syſt. nat.* T. III. *app. p.* 224.
Habitat in India.

gagates. 334. Sc. ater nitidus, clypeo truncato reflexo, ſterno obtuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 50.
Forſter cent. inſ. 6. 6.
Habitat in Sierra Leona Africae.

Iris. 335. Sc. viridis nitidiſſimus fuſco-micans immaculatus. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 49.
Habitat Surinami, *fulgidi magnitudine, ſterno porrecto.*

fulgidus. 336. Sc. aeneus nitidiſſimus, abdominis ultimo ſegmento prominente quadripunctato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 48.
Voet coleoptr. t. 3. *f.* 24?
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks.

tricolor. 337. Sc. viridi-aeneus hirtus, elytris teſtaceis: vitta media nigra ſuturaque aenea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 47.
Voet coleoptr. t. 7. *f.* 60.
Habitat in America.

quadricolor. 338. Sc. thorace nigro: margine rufo, elytris aeneo-nitidis: ſutura nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 46.
Habitat in Africa.

africanus. 339. Sc. aeneus nitens, capitis ſpina incumbente, ſterno porrecto, elytris punctis nigris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 45.
Drury inſ. 2. *t.* 30. *f.* 4.
Habitat in Sierra Leon Africae.

venereus. 340. Sc. cupreus nitidus, thorace ſcutello elytriſque viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 44.
Herbſt Arch. Inſ. 7. *p.* 156. *n.* 10. Cetonia aeruginea.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 26.
Habitat in Jamaica.

aethiopicus. 341. Sc. viridis fulvo micans, elytris maculis duabus nigris, ſterno obtuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 43.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

elegans. 342. Sc. viridis nitidiſſimus, elytrorum ſutura punctoque apicis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 42.
Habitat in Coromandel, *aurati magnitudine.*

ſpecioſiſſimus. 343. Sc. ſcutellatus aurato-viridis, punctulatus laevis, tibiis interno latere rufo-ciliatis: poſterioribus edentatis biſpinoſis. *Scop. delic. inſubr. p.* 48. *t.* 21. *f.* A. a. b.
Habitat - - - Eremita major, aurato affinis, at corpore utrinque ſplendidiſſimo, thoracis foveis nullis, abdomine poſterius non punctato, ejusque ſegmento primo absque lateribus unidentatis diſtinctus.

coruſcans. 344. Sc. cyaneus, thoracis margine elytrisque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 41.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 62.
Habitat in India.

limbatus. 345. Sc. niger, thoracis margine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 40.
Habitat in Aegypto.

fuliginoſus. 346. Sc. ſcutellatus niger, ſupra opacus, ſubtus nitens, ſegmento femorali in dentem exeunte. *Scop. delic. inſubr.* 1. *p.* 51. *t.* 21. *f.* D. b.
Habitat Paviae *in hortis, campis, frequens in floribus onopordi acanthii, ſtatura nobilem ſimulans.*

quinquelineatus. 347. Sc. niger, thorace quinquelineato, elytris albo maculatis, clypeo reflexo ſpinaque incumbente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 39.
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks.

ſemipunctatus. 348. Sc. viridis nitidus, thorace quadrilineato, elytris baſi lineatis, apice punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 38.
Habitat - - - mediae magnitudinis, ſubtus albo villoſus.

trilineatus. 349. Sc. niger, thorace lineis tribus, elytris faſcia flexuoſa ſcutelloque albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 37.
Habitat ad caput bonae ſpei.

pictus. 350. Sc. niger, thorace quinquelineato, elytris acuminatis albo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 36.
Habitat in Oriente.

olivaceus. 351. Sc. teſtaceus, thorace lineis punctisque duobus, elytris maculis quatuor transverſis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 35.
Habitat in Sierra Leona Africae.

thoracicus. 352. Sc. niger, thorace ferrugineo, elytris nigris ſubpurpuraſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 34.
Habitat Alexandriae *in* Aegypto.

alexandrinus. 353. Sc. niger, thoracis margine elytrisque teſtaceis, elytris ſutura faſciaque dentata nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 33.
Habitat Alexandriae *in* Aegypto.

ſinuoſus. 354. Sc. fuſco-viridis, thorace elytrisque margine punctisque duobus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 32.
Degeer inſ. 7. *p.* 639. *n.* 38. *t.* 47. *f.* 20. Scarabaeus punctato-marginatus.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Ephippium. 355. Sc. niger, thoracis margine lineaque dorſali, elytris macula difformi ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 31.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 81.
Habitat in India, *lineolae ſtatura et magnitudine.*

lineola. 53. Sc. muticus niger, lineola flava a capite ad ſcutellum ducta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 30.
Degeer inſ. 4. *p.* 320. *n.* 13. *t.* 13. *f.* 5. Scarabaeus ſcutellatus niger nitidus flavo-maculatus &c.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 7.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 81.
Habitat in America, *ſtercorario minor.*

ſticticus. 54. Sc. ſcutellatus muticus niger glaber, punctis albis ſparſis, abdomine ſubtus punctis quatuor albis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 18. *n.* 5. *t.* 19. *f.* 27.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 59. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 61. Cetonia clypeo emarginato nigra albo-maculata, abdomine ſubtus punctis quatuor albis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 79. *n.* 14. Scarabaeus nigro-caeruleſcens &c.
Raj. inſ. p. 104. *n.* 8.
Habitat in Galliae *et* Calabriae *carduis.*

356. Sc.

ſuneſtus. 356. Sc. glaber niger, thorace elytriſque albo-punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 62. *Scop. ent. carn.* 7.
Habitat in Carniola *et* Italia, *mediae magnitudinis.*

thebanus. 357. Sc. niger, thorace rufo nigro maculato, elytris nigris albo punctatis, dorſo rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 64. *Herbſt Beſchr. der berl. Naturf. Fr.* 4. *t.* 1. *f.* 8. *et apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 18. *n.* 6. *t.* 19. *f.* 28.
Habitat in Aegypto.

floralis. 358. Sc. glaber niger, thoracis, elytrorum abdominisque margine albo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 63.
Habitat in Africae *floribus compoſitis, ſatis magnus.*

lugubris. 359. Sc. glaber ater, elytris macula laterali anoque albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 65.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Hiſtrio. 360. Sc. teſtaceus, capite, thoracis lineis duabus, elytrorum ſutura maculisque tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 66.
Habitat in Aegypto.

albellus. 361. Sc. ater, thorace, margine elytriſque maculis ſparſis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 67. *Pall. it.* 1. *p.* 462. *n.* 17. *ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 17. *t.* A. *f.* 18.
Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ. 4. *p.* 18. *n.* 7. *t.* 19. *f.* 29.
Habitat Tranquebariae.

hottentottus. 362. Sc. ater glaber, elytris poſterius punctis duobus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 68.
Habitat ad caput bonae ſpei.

cruentus. 363. Sc. ater glaber, thorace poſterius maculis duabus elytriſque vitta ſanguineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 69.
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks, *ſtatura hottentotti.*

ſqualidus. 68. Sc. ſcutellatus muticus niger hirtus, thorace ſubcarinato. *Scop. ent. carn.* 13.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 33.
Habitat in Germania, *hirtello ſimillimus, an varietas?*

hirtellus. 69. Sc. ſcutellatus muticus hirtus teſtaceo-nigricans, elytris pallido-maculatis.

Fabr.

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 59. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 60. Cetonia (hirta) nigricans hirta elytris pallido maculatis, thorace carinato.
Scop. ent. carn. 8. *Poda inſ.* 21. Scarabaeus hirtus.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 34.
Habitat in Europa *magis auſtrali, vere etiam frequens in omnibus deſertis* Volgae *finitimis ad* Terek *usque, vitis ibi gemmas foliiferas et floriferas exedens, faſciato dimidio minor.*

afer. 364. Sc. viridis, thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 29.
Habitat in Sierra Leon Africae.

marginatus. 365. Sc. glaber ater, thoracis elytrorumque marginibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 28.
Drury inſ. 2. *t.* 32. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 1. *f.* 4.

inſignitus. 366. Sc. thorace nigro: margine albo, elytris teſtaceis: ſutura margineque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 54. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 27.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 13.
Habitat ad caput bonae ſpei.

capenſis. 73. Sc. ſcutellatus muticus rufus hirtus, adſperſus punctis albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 30.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 54. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 26. Cetonia hirta rufa albo-punctata.
Degeer inſ. 7. *p.* 640. *n.* 40. *t.* 48. *f.* 2. Scarabaeus albopunctatus.
Petiv. gaz. t. 8. *f.* 6.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* B. *f.* 6.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 11.
Habitat in Africa.

cafer. 367. Sc. viridis nitidus, thoracis margine elytrorumque maculis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 54. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 25.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus, punctis inter oculos* 2 *albis.*

Eremita. 74. Sc. ſcutellatus aeneo-ater, thorace inaequali, thorace ſulco longitudinali. *Scop. ent. carn.* 15. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 23.

Degeer

Degeer inſ. 4. *p.* 300. *n.* 28. *t.* 10. *f.* 22. Scarabaeus coriarius &c.
Voet coleoptr. t. 3. *f.* 21. Scarabaeus lugubris.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* 3. *f.* 8.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 26. *f.* 1.
Habitat in pyri, ſalicis *truncis putridis, recens corium ruſſicum olens.*

faſcicularis. 75. Sc. ſcutellatus, thorace lineolis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis inciſuris barbatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 26.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 53. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 24.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 3. *f.* 17.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſubtus lana helvola in faſciculos digeſta veſtitus.*

ſmaragdinus. 368. Sc. ferrugineo-flaveſcens, elytris vireſcentibus, ſterno cornuto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 22.
Habitat in America.

moeſtus. 369. Sc. piceus, abdominis ſegmentis margine albis, clypeo emarginato, ſterno cornuto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 21.
Habitat in America *boreali.*

aterrimus. 370. Sc. niger obſcurus, elytris obſolete ruſo-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 19.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura lanii.*

corniger. 371. Sc. niger obſcure immaculatus, thoracis margine anteriori ſubcornuto. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 20.
Habitht ad caput bonae ſpei, *ſtatura aurati.*

ruber. 372. Sc. ſcutellatus ruber, elytris nigro-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 18.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 16.
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks.

Lanius. 77. Sc. exſcutellatus muticus ruber, adſperſus punctis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 17.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 7. 8.

Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 8.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 44.
Habitat in America *meridionali.*

S. Franciſci. 373. Sc. piceus, thoracis margine flaveſcente, ſterno porrecto. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 16.
Habitat in India, *ſtatura chryſis.*

micans. 374. Sc. viridis nitens, clypeo porrecto recurvo bifido, tibiis anterioribus ſerratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 1.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 3.
Habitat in Sierra Leona Africae.

ſinenſis. 375. Sc. aeneus, clypeo emarginato ſubſpinoſo, thorace poſterius lobato, elytris acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 2.
Forſter cent. inſ. 2. 2.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 40.
Habitat in Sina.

nigrita. 376. Sc. glaber ater, clypeo emarginato ſubſpinoſo, thorace poſterius lobato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 3.
Hermann muſ. p. 17. *n.* 257.
Petiv. gazoph. t. 28. *f.* 3.
Habitat in Zeylon.

auratus. 28. Sc. ſcutellatus auratus, ſegmento abdominis primo lateribus unidentato, clypeo planiuſculo. *Fn. ſuec.* 400. *Scop. ent. carn.* 17.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 50. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 4. Cetonia aurata, ſegmento abdominis primo lateribus unidentato, elytris albo maculatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 73. *n.* 5.
Hoeffn. pict. t. 6. *f.* prior.
Friſch inſ. 12. 25. *t.* 3. *f.* 1.
Raj. inſ. p. 76. *n.* 7.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* 2. *f.* 8. 9.
Degeer inſ. 4. *p.* 279. *n.* 25. *t.* 11. *f.* 1. Scarabaeus Smaragdus.
Bergſtr. nomencl. 1. 14. *n.* 5. 6. 7. *t.* 2. *f.* 5. 6. 7.
Schaeff. icon. t. 26. *f.* 2. 3. 7. *et t.* 50. *f.* 8. 9.
Voet coleoptr. t. 1. *f.* 1. 2. 3.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 1.

Pet.

Pet. gaz. t. 23. *f.* 12.
Worm muſ. 342.
Ammir. inſ. t. 12.
Habitat, magnitudine et colore varius, in Europa, *larva in lignis putreſcentibus, et formicarum acervis, imago in floribus, praeſertim paeoniae, ſorbi aucupariae, tacta per anum ejicit liquorem foetidiſſimum.*
Sternum *porrectum;* pectoris *latera poſterius in dentem terminata.*

Morio. 377. Sc. niger obſcurus, corpore ſubtus nitidiore. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 27. *n.* 6.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 14.
Habitat in Europa *auſtrali, aurato proxime affinis.*

opacus. 378. Sc. obſcure viridis opacus, capitis clypeo reflexo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 27. *n.* 5.
Habitat in Africae *floribus compoſitis, aurati magnitudine et ſtatura.*

erythropus. 379. Sc. niger, capitis clypeo porrecto baſi utrinque ſinuato, thoracis limbo elytrorumque margine cinereis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 27. *n.* 7.
Habitat ad caput bonae ſpei, *morionis ſtatura et magnitudine.*

variabilis. 79. Sc. ſcutellatus laevis opacus ater, elytris albo-punctatis. *Fn. ſuec.* 402.*
Fabr. mant. 1. *p.* 27. *n.* 11. Cetonia (octopunctata) nigra, thorace punctis quatuor albis.
Degeer inſ. 4. *p.* 301. *n.* 29. *t.* 10. *f.* 22. Scarabaeus albopunctatus.
Schaeff. ic. t. 198. *f.* 8.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 42.
Habitat in Germaniae *et* Sibiriae *quercubus, colore rubro et aureo varians; mas quintuplo minor.*

aeruginoſus. 80. Sc. ſcutellatus auratus ſupra viridis. *Gron. muſ.* 424. *t.* 15. *f.* 7.
Habitat in regno Tunetano *et* Calabriae *lentiſco, ſtatura aurati.*

cordatus. 380. Sc. niger, thorace utrinque puncto baſeos elytrisque duobus flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 27. *n.* 10.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 51. *n.* 7. Cetonia octopunctata.
Habitat - - -

Lundii. 381. Sc. ater nitidus, capitis clypeo cordato. *Fabr. mant.* 1. *p.* 27. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei.

nobilis. 81. Sc. ſcutellatus laevis auratus, abdomine poſterius albo-punctato. *Fn. ſuec.* 401.* *Scop. ent. carn.* 18.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 51. *n.* 6. Cetonia aurata, abdomine poſtice albo-punctato, elytris rugoſis.
Fabr. mant. 1. *p.* 27. *n.* 8. Cetonia cuſpidata.
Udm. diſſ. 1. Scarabaeus viridi aeneus, thorace ſulcato, elytris rugoſis.
Degeer inſ. 4. *p.* 297. *n.* 26. Scarabaeus viridulus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 73. *n.* 6.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* 3. *f.* 1-5.
Schaeff. icon. t. 66. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 28.
Habitat in Europa, *larva* (*griſea, capite ſanguineo, pedibus flaveſcentibus,*) *in ligno putreſcente, imago in floribus praeſertim umbellatarum.*

aeneus. 82. Sc. ſcutellatus oblongus cyaneus glaber, abdomine teſtaceo, capitis apice tridentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 29.*
Habitat - - - brunni magnitudine, ſubtus pubeſcens.

caeruleus. 382. Sc. glaberrimus glaucus, elytris chalybeis punctato-ſtriatis, maculis quinque albis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 19. *n.* 8. *t.* 19. *f.* 30.
Habitat in India.

metallicus. 383. Sc. viridis auratus, ſubtus violaceus, annulis abdominis quatuor macula alba notatis. *Herbſt apud Fueſſli n. ent. Mag.* 1. *p.* 314.
Habitat in Europa.

bimucronatus. 384. Sc. teſtaceus, tibiis anterioribus majoribus barbatis, clypeo utrinque mucronato, villis fimbriato. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 13. *n.* 13. *t.* A. *f.* 13.
Habitat in Amboina, *habitu longimani, eremita duplo major.*

aureolus. 385. Sc. depreſſo-ſubangulatus, polline aureolus, thorace elytrisque nigro-punctatis. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 18. *t.* A. *f.* 20.
Habitat in Dauria, *Junio in rheo compacto florente frequens, farinoſo affinis, an hujus tribus?*

glaucus. 386. Sc. cylindraceus, totus teſtaceus glaber, commiſſura thoracis pallido-villoſa, abdomine glauco. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 19. *t.* B. *f.* A. 22.
Habitat in ſabuletis Anketeri *inter* Cumam *et* Caucaſum, *vere frequens fullonis magnitudine.*

ſanguinolentus. 387. Sc. depreſſo-angulatus niger, thorace ſupra elytrisque diſco rubris, punctis elytrorum abdominisque crebris albis. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 21. *t.* B. *f.* A. 24.
Habitat in America *boreali, ſtictici forma et magnitudine.*

pulcher. 429. Sc. thorace elytrisque pulchre variegatis laevibus, capite nigro: ſpina incumbente. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 6.
Habitat in inſula Tobago, *marginati facie et magnitudine, ſubtus totus, antennis pedibusque ater.*

trivittatus. 430. Sc. thorace vittis tribus albidis, elytris flavo-teſtaceis: ſutura limboque nigro, hoc albo maculato. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 7.
Habitat in Sierra Leon Africae, *aurato paulo minor, et magis depreſſus.*

ſubfaſciatus. 431. Sc. ſcutellatus muticus niger opacus, elytris faſciis quatuor lateralibus abbreviatis fulvis: poſteriori maxima. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 8.
Habitat ad caput bonae ſpei, *aurato paulo minor et magis depreſſus.*

ſcabriuſculus. 432. Sc. aureo-niger, elytris anterius glabris poſterius ſcabriuſculis: linea elevata glabra abdomine utrinque albo-maculato. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 9.
Habitat - - - aurati facie, at paulo major.

b) *mandibula obtuſa*, Trichii.

faſciatus. 70. Sc. ſcutellatus niger tomentoſo-flavus, elytris faſciis duabus luteis coadunatis. *Fn. ſuec.* 395.* *Scop. ent. carn.* 5.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 48. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 1. Trichius niger tomentoſo flavus, elytris faſciis tribus nigris abbreviatis.
Mouff. inſ. 161. *f.* 6.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 80. *n.* 16.
Gunner act. Nidroſ. 4. *t.* 16. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 4.

Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 19.
Drury inſ. 1. *t.* 36. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 43.
Habitat in Europae *borealis, etiam* Calabriae *ulterioris floribus ſyringae, filipendulae, umbellatarum.*

ſuccinctus. 388. Sc. niger tomentoſo cinereus; elytris nigris: faſciis duabus flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 25. *n.* 2. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *t.* A. *f.* 19.
Habitat in Germania, *ſtatura faſciati, at duplo minor.*

indus. 71. Sc. ſcutellatus thorace hirſuto, elytris lividis fuſco-punctatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 27.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 3.
Habitat in India, *ſtatura faſciati, cetoniis affinis.*

punctulatus. 389. Sc. capite thoraceque viridi-aeneis glabris, elytris teſtaceis, abdominis ultimo ſegmento prominente bipunctato. *Fabr. mant.* 1. *p.* 25. *n.* 4.
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks.

bibens. 390. Sc. capite et thorace viridi-aeneis piloſis, elytris teſtaceis viridi nitentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 5.
Habitat in America.

hemipterus. 63. Sc. ſcutellatus thorace tomentoſo rugis duabus longitudinalibus marginato, elytris abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 6.
Scop. ent. carn. 28. Scarabaeus variegatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 78. *n.* 17.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 7.
Voet coleoptr. t. 10. *f.* 88-90.
Habitat in Europa, *larva in ligno, imago in floribus, femina aculeo ani rigido brevi munita.*

lunulatus. 391. Sc. glaber cyaneus, elytris lunulis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 7.
Habitat in Carolina.

virens. 392. Sc. viridis pubeſcens, ano albo bimaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 8.
Habitat in India.

piger. 393. Sc. capite thoraceque aeneis villoſis, elytris teſtaceis albo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 9.
Habitat in America *boreali.*

Delta. 394. Sc. thorace nigro: triangulo albo, elytris teſtaceis: puncto fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 10.
Forſter cent. inſ. 1. *p.* 7. *n.* 7. Scarabaeus ſcutellatus muticus flavus thorace atro: triangulo flavo, elytris teſtaceo-flavis nigro-maculatis.
Drury inſ. 2. *t.* 30. *f.* 1. 2.
Habitat in Americae *floribus.*

fulvus. 395. Sc. pubeſcens, thorace fulvo nigro-lineato, elytris teſtaceis: ſutura fulva. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae ſpei.

nigripes. 396. Sc. hirtus fuſcus, elytris ſubteſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 12.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura fulvi.*

naevius. 397. Sc. ſupra glaber cinereo-maculatus, capite thoraceque nigris, elytris piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 13.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura nigripedis.*

carbonarius. 423. Sc. hirſutus totus niger, clypeo anguſto apice bifido. *Muſ. Lesk. p.* 4. *n.* 75.
Habitat extra Europam.

unguiculatus. 424. Sc. griſeus tomentoſus, thorace fuſco, clypeo apice anguſto ſulcato bifido, elytris rufis margine nigris piloſis, pedibus poſterioribus elongatis unguiculatis. *Muſ. Lesk. p.* 4. *n.* 76.
Habitat extra Europam.

** *palpis capitatis*, Trox.

ſabuloſus. 48. Sc. ſcutellatus niger opacus, tuberculis rugoſis, antennis baſi piloſis. *Fn. ſuec.* 390.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 34. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 1. Trox thorace elytriſque rugoſis, thorace integerrimo.

 Scop.

Scop. ent. carn. 23. Scarabaeus rugoſus.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 12.
Habitat in Europae *collibus ſabuloſis apricis.*

arenoſus. 398. Sc. thorace ſubcanaliculato, elytris ſtriatis, corpore obſcuro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 2.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura ſabuloſi, at duplo minor, fuſcus.*

ſuberoſus. 399. Sc. griſeus, thorace marginato: margine poſteriori dentato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 3.
Habitat in Braſilia.

horridus. 400. Sc. ater, thorace elytrisque ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 4.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 10. *t.* A. *f.* 10. Scarabaeus pectinatus.
Habitat in India.

ſilphoides. 401. Sc. niger, thorace marginato inaequali, elytris ſtriatis ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 5.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura horridi.*

ſpinicornis. 402. Sc. nigricans, thorace poſterius utrinque emarginato, antennis ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 6.
Habitat - - -

tenebrioides. 403. Sc. ovatus piceus glaber, punctato-ſcaber, clypeo margine cilioſo. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 9. A. 8. *t.* A. *f.* 9.
Habitat in Dauuriae *campis glareoſis aridis, inter* Ononem *et* Argunum *poſitis, Majo primo veris calore obvius, interdiu humi immobilis.*

morticinii. 404. Sc. ſilphoides, clypeo inaequali ciliato, elytris ſtriatis convexe punctatis hiſpidulis. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 11. *t.* A. *f.* 11.
Habitat in Tatariae *deſertis aridiſſimis, ad fluvios* Ural *et* Irtin, *ſub cadaveribus aeſtivo calore exſiccatis frequens, ani ad elytra attritu ſtridens, ut ſabuloſus, niger, opacus, foſſoris magnitudine.*

quadriguttatus. 410. Sc. teſtaceus, capite thoraceque aeneo nitidulis, abdominis ultimo ſegmento prominulo bipunctato. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 377.
Habitat in Sina, *ſtatura melolonthae.*

miliarius. 425. Sc. elevato punctatus niger, thoracis dorſo ſulcato, elytris abdomen ſuperantibus decuſſato ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 54.
Habitat extra Europam, *elytris ſtriarum punctatarum ordinibus novem capitis punctis elevatis ſex.*

coracinus. 426. Sc. niger, frontis tuberculis duobus, thorace tuberculato, elytris abdomen ſuperantibus punctorum elevatorum ordinibus novem. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 55.
Habitat extra Europam.

longipes. 433. Sc. ſcutellatus muticus, capite thoraceque nigro, elytris pallide teſtaceis: lunula communi nigra, pedibus poſterioribus longiſſimis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 10.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine horticolae, at ſupra magis depreſſus.*

*** *palpis cylindricis, antennarum clava tunicata,* Lathrus.

cephalotes. 405. Sc. clypeo emarginato-bilobo. *Pall. it.* 1. *app. p.* 461. *n.* 23.
Laxmann nov. comm. Petrop. 14. *p.* 59. *n.* 4. *t.* 24. *f.* 1.
Pall. *ic. inſ. Roſſ.* 1. *t.* A. *f.* 1. Lucanus apterus.
Acharius nov. act. Stockh. 1781. *p.* 246. *t.* 5. *f.* 3-12. Bulbocerus cephalotes.
Scop. introd. in hiſt. nat. p. 439. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 2. Lathrus.
Habitat in Tatariae, Roſſiae, Hungariae *deſertis aridis ſub terra, monogamus, laevis, niger, ſubopacus, ſubrotundus thorace convexo marginato, elytris coalitis, vix thoracis longitudinem ſuperantibus, pedibus foſſoriis, mandibula adunco-falcata intus denticula, medius inter ſcarabaeos et lucanos.*

hemiſphaericus. 406. Sc. hemiſphaericus, clypeo anterius obtuſe bidentato. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 20. A. 23. *t.* B. *f.* A. 23.
Habitat - - - ſacro major, cephalotae perquam affinis, an ſpecie diſtinctus?

190. LUCANUS. *Antennae* clavatae: clava compreſſa, latere latiore, pectinatofiſſili.

Maxillae porrectae, exſertae, dentatae.

Penicilli duo ſub labio palpigeri.

Alces. 8. L. mandibulis exſertis apice quadridentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 1.
Petiv. gazoph. t. 47. *f.* 15.
Habitat in Aſia.

Cervus. 1. L. ſcutellatus: maxillis exſertis apice bifurcatis latere unidentatis. *Fn. ſuec.* 405. *Scop. ent. carn.* 1.
Fn. ſuec. 1. *n.* 377. Scarabaeus cornibus duobus mobilibus aequalibus apice bifurcatis: introrſum ramis denticulisque inſtructis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 1. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 2. Lucanus mandibulis exſertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo: ruga transverſali elevata.
Geoffr. inſ. 1. *p.* 61. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. Platycerus fuſcus &c.
Mouff. inſ. 148. Cervus volans.
Raj. inſ. p. 74. *n.* 2. Scarabaeus maximus platyceros &c.
Olear. muſ. t. 16. *f.* 5. Taurus volans.
Aldrov. inſ. 151. *f.* 1.
Hoeffn. pict. t. 6.
Worm. muſ. 242.
Jonſt. inſ. t. 14. *f.* 1. 2.
Merian. eur. t. 168.
Imperat. nat. 924. *f.* 3.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* 4. 5.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 18. *n.* 1-3. *t.* 3. *f.* 1-3. *et t.* 4. *f.* 1.
Sulz. inſ. t. 1. *f.* 4.
Degeer inſ. 4. *t.* 12. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 133. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 1. 3.
Schluga t. 1. *f.* 1.
b) Scarabaeus maxillis lunatis prominentibus dentatis, thorace inermi. *Fn. ſuec.* 338. (femina).
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 60. *n.* 2. Platycerus fuſcus, elytris laevibus, capite laevi.
O. F. Müller prodr. zool. dan. p. 444. Lucanus Dorcas.

Imper.

Imper. nat. 925. *f.* 1. 2.
Gron. zooph. 446.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* 5. *f.* 8.
Schaeff. elem. t. 9. *f.* 1.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 25. *n.* 2. 3. *t.* 4. *f.* 2.* 3.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 2. 4.
Habitat in Europae *et* Sibiriae *ligno quercino putreſcente, femina minor, larva obeſa albida, capite pedibusque ferrugineis, a* Roeſelio *pro craſſo veterum habita.*

Elaphus. 9. L. mandibulis exſertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo conico. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 3.
Voet coleoptr. t. 30. *f.* 5.
Habitat in Virginia, *femina minor, mandibulis haud exſertis.*

Capreolus. 2. L. ſcutellatus, maxillis exſertis, apice tantum furcatis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 391. *n.* 4.* *Muſ. Lud. Ulr.* 30.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 2. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 4. Lucanus mandibulis exſertis apice tantum bifurcatis, labio ruga transverſa elevata interrupta.
Degeer inſ. 4. *t.* 19. *f.* 11. 12.
Merian. Europ. 168.
β) Lucanus platyceros. *Scriba Schr. der berl. Naturf.* 7. *p.* 728.
Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 63. *n.* 5.
Habitat in America *boreali*, Alſatia, Calabria, *cervo dimidio minor.*

Dania. 10. L. mandibulis exſertis intus bidentatis longitudine capitis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 5.
Muſ. Lud. Ulr. 30. Lucanus Capreolus *β*.
Habitat in Virginia.

Gazella. 11. L. mandibulis intus bidentatis, ater, elytrorum margine exteriori teſtaceo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 1. *n.* 6.
Habitat in Siam, *damae magnitudine.*

tridentatus. 3. L. maxilloſus depreſſus niger, thorace utrinque tridentato. *Fn. ſuec.* 406. *It. oel.* 152.* *Bonsdorf nov. act. Stockh.* 1785. 3. *n.* 10. *p.* 216.
Habitat in Oelandia, *thorace trilobato; an cervi potius mera varietas minor?*

4. L.

interruptus. 4. L. exſcutellatus, antennis arcuatis, corpore oblongo depreſſo, vertice ſpina recumbente, thorace abdomineque remotis. *Muſ. Lud. Ulr.* 33.* *Muſ. Ad. Fr.* 82. *Gron. zooph.* 447. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 8.
Brown jam. 429. *t.* 44. *f.* 7. Dermeſtes.
Merian. ſurin. t. 50.
Petiv. gaz. t. 27. *f.* 7.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 2.
Degeer inſ. 4. *t.* 19. *f.* 13.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 1.
Habitat in America, *ſub ſaccharo putreſcente, ſcarabaeo vulgo proxime affinis; mas major ſpina capitis incumbente mandibulis truncato-tridentatis, elytrorumque ſulcis lateralibus punctatis, femina ſpina capitis elevata, arcuata, mandibulis acuto-tridentatis, elytrorumque ſulcis omnibus laevibus diſtincta.*

carinatus. 5. L. depreſſus, thorace mutico capite breviore: angulis poſterioribus excavatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 34.*
Habitat in India, *abdomine breviſſimo, pectore poſterius in angulum acutum terminato.*

parallelepipedus. 6. L. ſcutellatus depreſſus niger, maxillis dente laterali elevato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 7. *Pontopp. atl. dan.* 1. *p.* 666. *t.* 29. *f.* 1.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 62. *n.* 3. Platyceros niger &c.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 7.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Degeer inſ. 4. *t.* 12. *f.* 9.
Schaeff. elem. t. 101. *f.* 1.
-*icon. t.* 63. *f.* 7.
Habitat in Calabriae, Galliae, Angliae, Germaniae, Daniae, Succiae, Sibiriae *ſilvis, cervo feminae ſimilis, at* 8*ies minor, niger, magis depreſſus; femina mare minor, mandibulis minoribus, punctoque capitis duplici prominente diſtincta.*

cancroides. 12. L. mandibulis incurvis: intus dente incraſſato difformi, elytris punctato-ſubpubeſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 9.
Habitat in terra van Diemen, *vireſcente paulo major.*

vireſcens. 13. L. mandibulis tridentatis, corpore viridi-aeneo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 10.
Habitat in America.

14. L.

tenebroides. 14. L. mandibulis lunatis unidentatis ater, thorace marginato, elytris ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 11.

Habitat in Novogorod *inferiori* Roſſiae, *ſtatura caraboidis, at paulo major, ater.*

caraboides. 7. L. ſcutellatus caeruleſcens, mandibulis lunatis, thorace marginato. *Fn. ſuec.* 407.* *Scop. ent. carn.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 12.*

Udm. diſſ. n. 40. Carabaeus caeruleſcens.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 63. *n.* 4. Platyceros violaceo-caeruleus &c.

Schaeff. ic. t. 6. *f.* 8. *et t.* 75. *f.* 7. Platycerus.

Degeer inſ. 4. *t.* 12. *f.* 11.

Voet coleoptr. t. 29. *f.* 8.

Habitat in Europae *locis ſuffocatis, varians colore viridi et caeruleo.*

piceus. 15. L. ater glaber ſtriatus, antennis, abdomine et pedibus piceis. *Bonsdorf nov. act. Stockh.* 1785. 3. *n.* 10. *p.* 217. *t.* 8. *f.* a.

Habitat in Oſtrogothiae *et* Weſtrogothiae *lapidoſis, Junio frequens.*

capenſis. 16. L. exſcutellatus niger, elytrorum ſulcis punctatis. *Thunberg nov. inſ. ſpec.* 1. *p.* 5. *f.* 1.

Habitat ad caput bonae ſpei, *cylindricus, glaber, tenebrione foſſore paulo major.*

Pilmus. 17. L. exſcutellatus ater, corpore depreſſo, thorace ſtriato. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 184.

Habitat in provincia Chilenſi Makle, *arvis legumine conſitis infeſtus,* 8 *lineas longus; an hujus generis?*

Tarandus. 18. L. ſcutellatus ater glaberrimus, mandibulis exſertis apice tridentatis a latere interiori bidentatis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 1. *t.* 8. *f.* 2.

Habitat in Sierra Leon Africae, *L. Cervo major.*

Antilope. 19. L. mandibulis exſertis a latere interiori bimarginatis: margine ſuperiori bidentato, inferiori quinquedentato. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 2. *t.* 8. *f.* 3.

Habitat in Sierra Leon Africae, *brunneus, ſubglaber, magnitudine capreoli.*

Bubalus. 20. L. niger, mandibulis bifidis: altera parte porrecta, ſublunata interius tridentata; altera majore deflexa arcuata integra. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 3. *t.* 8. *f.* 4.
Habitat in Georgia Americae, *caraboide duplo major.*

191. DERMESTES.

Antennae clavatae: clava perfoliata: articulis tribus craſſioribus.
Thorax convexus, vix marginatus.
Caput ſub thorace inflexum condens.

* *maxilla bifida.*

lardarius. 1. D. niger, elytris anterius cinereis. *Fn. ſuec.* 408. *Geoffr. inſ. pariſ.* 1. *p.* 100. *n.* 5. *Scop. ent. carn.* 34. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 1.
Goed. inſ. 2. *t.* 41.
Blank. inſ. t. 11. *f.* K. L. M.
Raj. inſ. p. 107. *n.* 4.
Mer. inſ. 2. *t.* 33.
Friſch inſ. 6. *t.* 9.
Degeer inſ. 4. *p.* 192. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 15.
Schaeff. elem. t. 7. *f.* 1. 2.
icon. t. 42. *f.* 3.
Habitat in Europa, *larva ovata cinerea hirſuta in animalibus diu aſſervatis, lardo, carnibus, repoſitoriis culinariis et muſeis libris potiſſimum corio ſuillo aut aſinino a pilis non ſatis repurgato tectis infeſta, imago, olea et pinguedines aliis inſectis lethalia appetens, ſcybala inter vorandum ex ano protrudit concatenata pendula; rarior elytris anterius ferrugineis conſpicua.*

elongatus. 2. D. niger, elytris baſi faſciaque poſteriore lividis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 409.*
Habitat in Europa, *fere filiformis.*

undatus. 3. D. oblongus niger, elytris faſcia alba lineari duplici. *Fn. ſuec.* 410.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 6.

Degeer inſ. 4. *p.* 199. *n.* 5. Dermeſtes oblongus niger &c.
Schaeff. ic. t. 157. *f.* 7. a. b.
Habitat in Europae *putridis*, *ſuffocatis*.

pellio. 4. D. niger, coleopteris punctis albis binis. *Fn. ſuec.* 411.*
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 100. *n.* 4. *Scop. ent. carn.* 37.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 63. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 5. Dermeſtes niger, elytris puncto albo.
Degeer inſ. 4. *p.* 197. *n.* 3. Dermeſtes bipunctatus.
Raj. inſ. p. 85. *n.* 35.
Friſch inſ. 5. *p.* 22. *t.* 8.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 4.
β) Dermeſtes minor non punctatus. *Muſ. Lesk. p.* 5. *n.* 101.
Habitat in Europae *pellibus*, *lardo*, *aliis cibariis*, *libris vetuſtis*.
Larva *oblonga*, *piloſa*, *cauda ſetoſa*.

macellarius. 5. D. niger glaber, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 4.
Habitat in Germania, *lardario affinis*.

cadaverinus. 7. D. niger, ore ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 3.
Habitat in inſula S. Helenae.

carnivorus. 8. D. niger, elytris anterius teſtaceis, abdomine albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 2.
Habitat in nova Hollandia *et* Seelandia.

trifaſciatus. 9. D. ovatus niger, elytris faſciis tribus undatis cinereis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 34. *n.* 7.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 112. *n.* 5. Byrrhus fuſcus &c.
Habitat in Europa *magis auſtrali*, *undati magnitudine et ſtatura*.

20guttatus. 10. D. oblongus ater, punctis viginti albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 7. *mant.* 1. *p.* 34. *n.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 3.

bicolor. 11. D. oblongus niger ſubtus teſtaceus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 9.
Habitat in Germania, *ſtatura murini*.

12. D.

Dermeſtis *larvae exedunt et deſtruunt animalium cadavera*, *res culinares*, *pelles*, *libros*; apodes *lignum putreſcens*.

domeſticus. 12. D. niger, elytris griſeis margine nigris, thorace villoſo. *Fn. ſuec.* 424.*
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 111. *t.* 1. *f.* 6. Byrrhus.
Habitat in Europa, *thorace fere hemiſphaerico.*

violaceus. 13. D. nigro-caeruleſcens, thorace villoſo. *Fn. ſuec.* 422.* *Scop. carn.* 51. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 15.
Fn. ſuec. 373. Dermeſtes nigro-caeruleus.
Degeer inſ. 5. *p.* 163. *n.* 4. *t.* 5. *f.* 13. Clerus caeruleus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 304. *n.* 2. Clerus nigro-caeruleus.
Raj. inſ. 100. Scarabaeus antennis clavatis 12.
Habitat in Europae *cadaveribus frequens, etiam in floribus.*

rufipes. 16. D. nigro-caeruleſcens, thorace villoſo, pedibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 16.
Thunb. nov. inſ. ſpec. 1. *p.* 10. Anobium rufipes.
Habitat in Africa *aequinoctiali, an varietas violacei?*

ruficollis. 17. D. violaceus, thorace elytrorumque baſi rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 17.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 8. *f.* 7.
Habitat in Africa *et* India, *violacei magnitudine, totus hirtus.*

caeruleus. 24. D. caeruleus hirtus linearis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 10. Anobium caeruleum.
Habitat ad caput bonae ſpei, *violaceo ſimilis, at linearis.*

hirtus. 14. D. ater hirtus.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 82. *n.* 6. Hiſpa (hirta) antennis ſerratis atra hirta.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 94. *n.* 18. Lagria atra.
Habitat in Europa, *undati magnitudine, pilis nigris hirtus.*

feneſtralis. 15. D. caſtaneus, capite nigricante, thorace fuſco. *Fn. ſuec.* 423.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 29.
Degeer inſ. 5. *p.* 197. *n.* 7. Ips ſpinoſus &c.
Müll. prodr. zool. dan. p. 57. *n.* 505. Byrrhus feneſtralis &c.
Habitat in Europa *boreali, frequens in feneſtris.*

vulpinus. 25. D. oblongus laevis niger, thoracis lateribus cinereo-villoſis ſubtus albidus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 10.
Habitat ad caput bonae ſpei, *carnivoro affinis et aequalis.*

28. D.

felinus. 28. D. oblongus villoſus cinereus immaculatus. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 34. *n.* 11.
Habitat in terra van Diemen, *an ſatis a vulpino diſtinctus?*

murinus. 18. D. oblongus tomentoſus nigro alboque nebuloſus, abdomine niveo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 64. *n.* 10. *mant. inſ.* I. *p.* 35. *n.* 12.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 563. *n.* 18. *Fn. ſuec.* 426.* *Scop. ent. carn.* 35. *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 102. *n.* 7. Dermeſtes tomentoſus oblongus fuſco cinereoque nebuloſus, ſcutello luteo.
Degeer inſ. 4. *p.* 197. *n.* 2. Dermeſtes nebuloſus &c.
Friſch inſ. 4. *p.* 34. *t.* 18.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 1. 2.
Voet coleoptr. t. 31. *f.* 11.
Habitat in Europae *cadaveribus frequens.*
Larva *oblonga brunnea, ore atro.*

teſſellatus. 31. D. oblongus tomentoſus fuſco cinereoque nebuloſus, abdomine fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 65. *n.* 11. *mant. inſ.* I. *p.* 35. *n.* 13.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 100. *n.* 8. Dermeſtes flaveſcens piloſus.

navalis. 32. D. elongatus ferrugineo-fuſcus, oculis atris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 65. *n.* 12. *mant. inſ.* I. *p.* 35. *n.* 14.
Habitat in nova Seelandia, *murino quadruplo minor.*

ſcaber. 33. D. griſeus, thorace elytrisque ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 66. *n.* 20. *mant. inſ.* I. *p.* 35. *n.* 25.
Habitat in nova Seelandia.

teſtaceus. 34. D. oblongus teſtaceus, oculis abdominisque baſi nigris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 66. *n.* 19. *mant. inſ.* I. *p.* 35. *n.* 24.
Habitat in Belgio.

fumatus. 22. D. oblongus teſtaceus, oculis nigris. *Fn. ſuec.* 432.* *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 104. *n.* 12. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 66. *n.* 16. *mant. inſ.* I. *p.* 35. *n.* 19.
Scop. ent. carn. 59. Dermeſtes roſae.
Degeer inſ. 4. *p.* 195. *n.* 3. Ips teſtaceo-flavus &c.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 20. *n.* 7. *t.* 20. *f.* 1?
Habitat in Europae *floribus, in viis, fimo equino.*

picipes. 35. D. oblongus nigricans, pedibus piceis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 35. *n.* 23.
Habitat Halae Saxonum, *tomentoſi ſtatura et magnitudine.*

chinenſis. 36. D. oblongus ferrugineus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 66. n. 21. mant. inſ. 1. p. 36. n. 27.*
Habitat in ſeminibus e Sina *allatis.*

paniceus. 19. D. oblongus ferrugineus, oculis rufis. *Fn. ſuec. 431. Fabr. ſp. inſ. 1. p. 66. n. 18. mant. inſ. 1. p. 35. n. 22.*
Friſch inſ. 2. p. 36. t. 8.
Habitat in Europae *pane diutius aſſervato, glutine bibliopegorum, et libris aliisque, quibus hoc adhaeret, ſeminis milii magnitudine.*
Larva *ovata alba nitida.*

ferrugineus. 21. D. oblongus ferrugineus ſemicylindricus, elytris abbreviatis. *Fn. ſuec.* 433.*
Fabr. ſp. inſ. 1. p. 91. n. 6. mant. inſ. 1. p. 51. n. 6. Nitidula ferruginea?
Schranck apud Fueſſli n. entom. Mag. 1. p. 140. Dermeſtes teſtaceus.
Laicharting inſ. tyr. 1. p. 104. n. 2. Oſtoma ferruginea?
Lesk. it. p. 46. t. A. f. 11?
Habitat in Europa.

Euſtatius. 20. D. ater glaber obtuſiſſimus, pedibus ferrugineis.
Habitat in inſulae Euſtatii *fungis, pediculi magnitudine.*

pedicularius. 23. D. oblongus teſtaceus, elytris abbreviatis. *Fn. ſuec.* 434.*
Schranck inſ. auſtr. n. 56. Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. p. 22. n. 13. t. 20. f. 6.
Fn. ſuec. 1. n. 441. Chryſomela dilute teſtacea hemiptera.
Habitat in Europae *floribus frequens.*

fuſcus. 37. D. oblongus villoſus fuſcus immaculatus. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 35. n. 21.*
Habitat Halae Saxonum *et* Kilonii, *tomentoſi ſtatura et magnitudine.*

tomentoſus. 38. D. oblongus villoſus griſeus, capite punctis duobus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 66. n. 17. mant. inſ. 1. p. 35. n. 20.*
Degeer inſ. 4. p. 199. n. 4. t. 7. f. 18.
Habitat in Angliae, Sueciae *floribus.*

ſanguinicollis. 39. D. elongatus hirtus violaceus, thorace abdomineque rufis. *Fabr. mant. 1. p. 35. n. 18.*
Habitat Halae Saxonum, *chryſomelae ſtatura, antennis dermeſtis.*

40. D.

limbatus. 40. D. fuſcus, elytris punctatis: limbo cinereo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 28.
Habitat in nova Seelandia, *parvus.*

ſcanicus. 26. D. ater thorace punctoque elytrorum teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *n.* 27.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 564. *n.* 26. *Fn. ſuec.* 437.* Dermeſtes fuſcus, thorace teſtaceo.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 21. *n.* 8. *t.* 20. *f.* 2.
Habitat in Suecia *et* Germania.

Colon. 27. D. thorace lateribus flavis, elytris griſeis: puncto nigro. *Fn. ſuec.* 430.*
Habitat in Europa.

ſurinamenſis. 29. D. teſtaceus, elytris ſtriatis, thorace ſtriis tribus elevatis marginibusque denticulato.
Habitat in Surinamo *et* Sibiria, *oblongus, pediculi magnitudine.* Rolander.

hemipterus. 30. D. elytris abbreviatis baſi exteriore apiceque teſtaceis.
Habitat Surinami, *pediculi magnitudine.* Rolander.
Antennae *capitatae*; pedes *ferruginei*; elytra *abdomine dimidio breviora*; *ſingulis macula cuneiformis in apice, et punctum glaucum ad baſin exteriorem elytri.*

bifaſciatus. 41. D. niger, elytris faſciis binis undulatis luteis, thorace cinereo-teſſellato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 6. *f.* 2.
Habitat ad caput bonae ſpei, *undati magnitudine, at latior.*

interruptus. 42. D. niger, faſcia baſeos elytrorum rubra interrupta. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 6. *f.* 3.
Habitat - - - undati magnitudine.

bipuſtulatus. 43. D. ater glaber, capite, thorace punctoque baſeos elytrorum rubris. *Thunb. nov. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *f.* 4.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 45. *n.* 7. Ips humeralis.
Habitat - - - magnitudine pulicis.

marginatus. 44. D. niger, thoracis lateribus, pectore inciſurisque abdominis albis. *Thunb. nov. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *f.* 6.
Habitat in India *et ad* caput bonae ſpei, *magnitudine et facie lardarii, ſed paulo major, et totus hirtus.*

piceus. 45. D. totus ferrugineus, elytris ſtriatis. *Thunb. nov. ſp. inſ.* 1. *p.* 8.
Habitat in India *et ad* caput bonae ſpei, *marginati magnitudine et ſtatura.*

capenſis. 46. D. ater hirtus, elytris flexilibus violaceis: faſciis duabus albis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 9. *f.* 8. Anobium capenſe.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine majoris pediculi.*

cafer. 47. D. niger glaber, elytris faſciis duabus luteis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *t.* 9. *f.* 9. Anobium bifaſciatum.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſublineari oblongus.*

viridis. 48. D. viridis hirtus, pedibus rubris.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 9. Anobium viride.
Habitat in Africa *et* India.

fimetarius. 49. D. flaveſcente fuſcus, thorace marginato, antennis pedibusque ſpadiceis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 21. *n.* 10. *t.* 20. *f.* 3.
Habitat Berolini *in fimo et floribus, convexus,* $1\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

cellaris. 50. D. fuſceſcens, antennis longis, elytris ſtriatis. *Scop. ent. carn. n.* 42.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 22. *n.* 12. *t.* 20. *f.* 5.
Habitat in Germaniae *parietibus, vere frequens,* $\frac{2}{3}$ *lineae longus.*

longicornis. 51. D. fuſcus, antennis longis, thorace medio excavato, elytris punctatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 23. *n.* 15. *t.* 20. *f.* 8.
Habitat Berolini, *lineam longus, cellari affinis.*

flaveſcens. 52. D. ferrugineus ſubtus flaveſcens, capite obſcuriore, oculis nigris, thorace tereti. *Schranck apud Fueſſli n. ent. Mag.* 1. *p.* 140.
Habitat in Bavaria, *ferrugineo affinis.*

fulvipes. 53. D. niger oblongus, elytris punctatis, pedibus fulvis.
Schranck apud Fueſſli n. ent. Mag. 1. *p.* 141. Dermeſtes leucophilus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 108. *n.* 21.
Habitat - - -

61. D.

Plura hujus nominis inſecta habent Scopoli et Geoffroi, Schranck, Laicharting, Moll,

ſulcatus. 61. D. fuſco ruber, oculis nigris, elytris ſulcatis punctatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 2. *n.* 1.
Habitat in Suecia, *pediculo duplo major.*

feneſtratus. 62. D. fuſcus, elytris maculis ſedecim pallidis, tibiis omnibus ſpinoſis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 3. *n.* 2.
Habitat Upſaliae, *ptini mollis magnitudine.*

ruber. 63. D. ruber, thorace glaberrime ferrugineo-nigro, lateribus rufis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 3. *n.* 3.
Habitat Upſaliae, *pediculo vix major, ſilphae melanocephalae affinis.*

linearis. 64. D. corpore elytrisque linearibus ferrugineis, capite thoraceque fuſcis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 4. *n.* 4.
Habitat in Suecia, *feneſtrali ſimilis, at multoties major.*

ater. 658. D. ater nitidus, elytris tenuiſſime punctatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 4. *n.* 5.
Habitat Upſaliae, *magnitudine coccinellae bipunctatae.*

bipuſtulatus. 66. D. niger, capite thoraceque rubris, elytris nigris: baſi macula rubra. *Thunb. nov. act. Upſ.* 1. *p.* 4. *n.* 6.
Habitat Upſaliae, *pediculo vix major.*

faſciatus. 67. D. niger, elytris faſciis duabus undulatis luteſcentibus. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 5. *n.* 7.
Habitat Upſaliae, *pediculi magnitudine.*

** *maxilla unidentata:* Apate.

muricatus, 6. D. elytris reticulatis poſterius retuſis dentatis, thorace muricato gibbo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 1.
Pall. ſpic. zool. 9. *p.* 7. *t.* 1. *f.* 3. Ligniperda terebrans.
Habitat in Americae *meridionalis lignis.*

hamatus. 54. D. elytris ante apicem uniſpinoſis thoracis margine anteriori bihamato denticulato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 2.
Habitat in Saxoniae *lignis, ſtatura muricati, at minor.*

Monachus. 55. D. elytris obtuſis, thorace gibbo truncato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 3.
Pall. ſpic. zool. 9. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 4. Ligniperda cornuta.
Habitat in Americae *meridionalis lignis.*

Jeſuita. 56. D. elytris integris varioloſis, thorace anterius truncato. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 62. *n.* 3. *mant. inſ.* I. *p.* 33. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

indicus. 57. D. elytris integris nigris, thorace anterius ſcabro, *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 62. *n.* 4. *mant. inſ.* I. *p.* 33. *n.* 5.
Habitat in Coromandel, *minuto affinis, at paulo major.*

minutus. 58. D. niger, elytris integris piceis, thorace anterius ſcabro. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 62. *n.* 5. *mant. inſ.* I. *p.* 33. *n.* 6.
Habitat in nova Seelandia.

exilis. 59. D. ater, elytris integris pallidis: margine omni nigro. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 33. *n.* 7.
Habitat Kilonii *ſub fagi cortice, parvus.*

villoſus. 60. D. thorace villoſo, elytris integris fuſcis: margine punctisque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 33. *n.* 8.
Habitat Halae Saxonum.

pallipes. 68. D. oblongus planus ater nitidus, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Sueciae *floribus, minutus.*

lunatus. 69. D. oblongus niger, elytris lunula dorſali cinerea. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Suecia, *ſub arborum corticibus, parvus.*

ruficornis. 70. D. fuſcus capite retracto, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 5. *n.* 108. b.
Habitat in Europa, *minimus.*

BOSTRICHUS. *Antennae* clavatae: clava ſolida. *Thorax* convexus vix marginatus. *Caput* ſub thorace inflexo conditum.

Capucinus. 1. B. niger, elytris abdomineque rubris, thorace retuſo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 67. *n.* I. *mant. inſ.* I. *p.* 36. *n.* I.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 562. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 416. Dermeſtes capucinus.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 302. *n.* I. *t.* 5. *f.* I. Boſtrichus niger &c.
Schaeff. elem. t. 28.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 5. 6. c.
β) Dermeſtes capucinus abdomine nigro. *Lepechin it.* 2. *t.* II. *f.* 3.
Habitat in Europae, β) Sibiriae *truncis, praeſertim emortuis, parietibus.*

flavicornis. 2. B. piceus, elytris apice ſpinoſo-dentatis, antennis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 2.
Habitat in America *boreali.*

elongatus. 3. B. elongatus ater, pedibus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 3.
Habitat in Upſaliae *ligno antiquo.*

typographus. 4. B. teſtaceus piloſus, elytris ſtriatis retuſis praemorſo-dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 562. *n.* 7. *Fn. ſuec.* 418. *It. oel.* 26. 195. *Lepech. it.* 2. *p.* 202. *t.* 81. *f.* 21. Dermeſtes typographus.
Degeer inſ. 5. *p.* 193. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 1. 2. Ips piloſus fuſcus &c.
Raj. inſ. p. 100. *n.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 4.
Habitat intra Europae, Americae, Sibiriae *cortices arborum, praeſertim piceae infeſtiſſimus, fertiliſſimus, voraciſſimus, intra corticem canalem effodiens, ex quo ad latus plures utrinque minores ſubparalleli exeunt, pro aetate magnitudine, magis adhuc colore flaveſcente, fuſceſcente, fuſco, ſubatro varians, vitae tenaciſſimus.*

chalcographus. 5. B. ater, elytris praemorſo-dentatis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 562. *n.* 8. *Fn. ſuec.* 417. Dermeſtes chalcographus.
Habitat intra arborum Europae *cortices, colore nigro et teſtaceo varians.*

polygraphus. 6. B. nigricans, elytris glaucis obtuſiuſculis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 6.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 562. *n.* 10. *Fn. ſuec.* 420. Dermeſtes polygraphus.
Degeer inſ. 5. *p.* 196. *n.* 5. Ips rufo-fuſcus &c.
Habitat in Europa *boreali ſub arborum corticibus, labyrinthos formans, inter nocentiores ſui generis.*

micrographus. 7. B. ferrugineus, elytris integris teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 7.

 Syſt.

Boſtrichi *fertiliſſimi larva et imago cortices arborum et ligna exedit, ſilvarum aliquando peſtis perniicioſiſſima. J. F. Gmelin Abh. von der Wurmtroknis. Lipſ.* 1787.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 562. *n.* 9. *Fn. ſuec.* 419. Dermeſtes (micrographus) teſtaceus glaber, thorace nigro, elytris apice retuſo-dentatis.

Habitat in Europae *ligno, etiam intra cortices arborum, parvus, niger, elytris, antennis pedibusque teſtaceis.*

bidentatus. 8. B. niger, coleopteris teſtaceis apice retuſis bihamatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 8.

Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 24. *n.* 6. *t.* 20. *f.* 10. Boſtrichus bidentatus.

Lepech. it. 2. *p.* 202. *t.* 11. *f.* 22. Scarabaeus thorace mutico, elytris apice excavatis mucronibus 4 inſtructis?

Habitat in Saxonia *et* Sibiria, *polygraphi magnitudine.*

Scolytus. 9. B. glaber nigricans, elytris truncatis integris, abdomine retuſo, fronte villoſa cineraſcente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 9.

Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 310. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 5. Scolytus.

Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 13.

Schaeff. ic. t. 112.

Habitat ſub Angliae *ulmorum cortice, quas miſere devaſtat.*

crenatus. 10. B. glaber ater, elytris integris piceis crenato-ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 10.

Habitat in Germania, *ſcolyti ſtatura et magnitudine.*

pygmaeus. 11. B. ater nitidus, elytris integris rufis, abdomine retuſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 11.

Habitat Halae Saxonum, *ſcolyto proxime affinis, at triplo minor.*

ligniperda. 12. B. villoſus teſtaceus, corpore nigricante, tibiis quatuor poſterioribus ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 12.

Habitat in Germaniae *ligno, piniperda paulo major.*

piniperda. 13. B. niger ſubvilloſus, elytris piceis integris, plantis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 13. *Lesk. it. p.* 11. *t.* A. *f.* 2.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 563. *n.* 11. *Fn. ſuec.* 421. Dermeſtes piniperda.

Degeer inſ. 5. *p.* 194. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 8. 9. Ips ſubvilloſus niger nitidus &c.

Habitat in Europae *pini ramulis inferioribus, quos perforat, exſiccat, deſtruit, hortulanus naturae, curculionis fere ſtatura, colore elytrorum varians.*

teſtaceus. 14. B. glaber teſtaceus, elytris laevibus, longitudine abdominis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 14.
Habitat in pini truncis, *piniperdae ſtatura oblonga.*

varius. 15. B. ſubvilloſus, corpore nigro cinereoque vario. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 15.
Habitat in Hafniae *arboretis antennarum clava acuminata.*

vittatus. 16. B. ſubvilloſus fuſcus, elytris vitta abbreviata cinerea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 16.
Habitat in Europae *truncis arborum, ſtatura varii, at duplo minor.*

minutus. 17. B. glaber ater immaculatus, elytris integris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 17.
Habitat Kilonii *in boleto verſicolore.*

maculatus. 18. B. niger, elytris faſcia undatâ punctisque rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 7. *f.* 5.
Habitat in Suecia, *ſtatura dermeſtis undati, antennis moniliformibus, an hujus generis?*

bifaſciatus. 19. B. ater, elytris flavis: faſciis duabus nigro-caeruleſcentibus denticulatis.
Lepech. it. 2. *p.* 206. *t.* 10. *f.* 3. Dermeſtes bifaſciatus.
Habitat in Sibiria.

limbatus. 20. B. niger, elytris flaveſcentibus marginatis fuſco-limbatis.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 1. *p.* 24. *n.* 7. *t.* 20. *f.* 11.
Habitat in Pomerania, $1\frac{1}{2}$ *lineas longus thorace capucino ſimilis.*

fuſcus. 21. B. fuſcus, elytris ſtriatis: ſtriis apice cohaerentibus, tibiis extus dentatis, plantis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 6. *n.* 112.
Habitat in Europa.

piloſus. 22. B. teſtaceus piloſus, elytris punctato-ſtriatis, apice retuſis dentatis. *Muſ. Lesk. p.* 6. *n.* 113.
Habitat in Europa.

fraxini ~~[illegible]~~ 23. B. fulvus pilosus, elytris [illegible] fusco-maculatis.
Habitat sub cortice fraxini excelsioris tanta multitudine ut typographus sub cortice pini. [illegible] lineas longus, [illegible]. Larva alba, [illegible].

MELYRIS. *Labium* clavatum emarginatum.
Antennae totae perfoliatae.
Maxilla unidentata acuta.

viridis. 1. M. viridis, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei.

nigra. 2. M. nigra, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 2.
Habitat - - - *ſtatura viridis, at triplo minor.*

192. PTINUS. *Antennae* filiformes: articulis ultimis majoribus.
Thorax ſubrotundus, non marginatus, caput excipiens.

* *palpis clavatis:* Anobia.

rugoſus. 1. Pt. fuſcus thorace inaequali, elytris ſtriatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 39. *n.* 1.
Habitat Kilonii, *pertinace duplo major, immaculatus.*

pertinax. 2. Pt. fuſcus unicolor. *Fn. ſuec.* 414.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 71. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 2. Anobium fuſcum immaculatum.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 112. *n.* 4. Byrrhus totus nigro-fuſcus.
Degeer inſ. 4. *p.* 227. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 24. 25. Byrrhus nigrofuſcus &c.
Habitat in Europa *captus mortui inſtar ſe contrahens immobilis, e ligno, potiſſimum querno confecta deſtruens, libris etiam infeſtus, ab attelabo formicario eradicatur.*

mollis. 3. Pt. teſtaceus oculis fuſcis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 71. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 3. Anobium teſtaceum, oculis nigris.
Fn. ſuec. 415. *Bergius nov. act. Stockh.* 1786. 4. *p.* 268. Dermeſtes mollis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 112. *n.* 2. Byrrhus teſtaceus glaber.
Degeer inſ. 4. *p.* 230. *n.* 4. *t.* 8. *f.* 29. Byrrhus rufo-fuſcus, oculis nigris &c.

Habitat

Habitat in Europae *quisquiliis, herbariis etiam inviſus, calore furni pellendus.*
Larva *alba frigoris patientiſſima.*

frumentarius. 7. Pt. teſtaceus, thorace ciliato: dorſo plano carinato. *Fabr. ſp. inſ* 1. *p.* 71. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 5.
Habitat in pane diutius aſſervato, capitur in navi prope Braſiliam.

planus. 8. Pt. fuſcus, thorace plano, elytris crenato-ſtriatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 39. *n.* 4.
Habitat Kilonii.

flavipes. 9. Pt. villoſus niger, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 4.
Habitat Hamburgi.

lineatus. 10. Pt. piloſus niger, elytris lineis ſeſquitertiis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 6.
Habitat in Braſilia, *ſtatura cantharidis nigrae; an hujus generis?*

cyaneus. 11. Pt. ſubvilloſus cyaneus, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 7.
Habitat in America *magis auſtrali, cantharidis nigrae ſtatura et magnitudine.*

minutus. 12. Pt. ſubvilloſus niger thorace elytrisque cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 8.
Habitat in nova Seelandia, *ſtatura cyanei, at duplo minor, elytris interdum vireſcentibus.*

pulſator. 13. Pt. cylindricus opacus rugoſus maculis griſeis adſperſus. *Schaller Abh. hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 249.
Habitat Halae Saxonum *in truncis vetuſtis ſalicis et domibus, noctu praeſertim termitis inſtar pulſans, ſtatura pertinacis, magnitudine dermeſtis lardarii.*

fagi. 14. Pt. niger, antennis ſpadiceis, elytris punctato-ſulcatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 26. *n.* 2. *t.* 20. *f.* 12.
Habitat Berolini, 3. *lineas longus.*

ferrugineus. 15. Pt. ferrugineus, oculis nigris, elytris obſolete ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 37. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 13.
Habitat in Marchia.

16. Pt.

teſtaceus. 16. Pt. ferrugineus, oculis nigris, elytris glaberrimis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 7. p. 158. n. 4.*
Habitat Berolini, *an ſatis a ferrugineo diſtinctus?*

capenſis. 26. Pt. ferrugineus, elytris ſtriatis pallidioribus. *Fabr. mant. inſ. 2. app. p. 378.*
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura pertinacis, at duplo minor.*

fuſcus. 27. Pt. fuſcus, corpore griſeo irrorato, ſcutello griſeo, antennis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p. 6. n. 121.*
Habitat in Europa.

rufus. 28. Pt. rufus luteo nitens, thorace utrinque poſterius macula lutea, elytris punctato ſtriatis. *Muſ. Lesk. p. 6. n. 122.*
Habitat in Europa.

ferrugineus. 29. Pt. ferrugineus, thorace inaequali, elytris punctato ſtriatis, antennis rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p. 6. n. 123.*
Habitat in Europa, *antennarum articulis* 3 *ultimis majoribus, compreſſis obconicis.*

ſtriatulus. 30. Pt. teſtaceus, elytris leviſſime ſtriatis, antennorum articulis tribus ultimis majoribus. *Muſ. Lesk. p. 6. n. 127.*
Habitat in Europa.

brunneus. 31. Pt. brunneus, elytris leviſſime ſtriatis pubeſcentibus. *Muſ. Lesk. p. 6. n. 128.*
Habitat in Europa.

** *palpis filiformibus:* Ptini.

Gigas. 17. Pt. griſeus, elytris poſterius cinereis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 72. n. 1. mant. inſ. 1. p. 40. n. 1.*

imperialis. 4. Pt. fuſcus, thorace ſubcarinato, coleoptris macula lobata alba. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 73. n. 5. mant. inſ. 1. p. 40. n. 5. Müll. zool. dan. prodr. p. 57. n. 507.* Bruchus imperialis. *Sulz. hiſt. inſ. t. 2. f. 7.*
Habitat in Europae *borealis et* Calabriae *arboribus, ſeminis tritici magnitudine.*
Antennae *longitudine corporis* pedesque *ferruginei;* ſcutellum *niveum;* elytra *nigra, macula alba aquilam inſignium quodammodo referente notata.*

Fur. 5. Pt. teſtaceus ſubapterus, thorace quadridentato, elytris faſciis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 4.
Fn. ſuec. 651. Cerambyx Fur.
Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 164. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 6. Bruchus teſtaceus.
Degeer inſ. 4. *p.* 231. *n.* 5. *t.* 9. *f.* 5. 6. Byrrhus rapax.
Scop. ent. carn. 210. Bupreſtis Fur.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 8.
Schaeff. elem. t. 30.
Friſch inſ. 13. *t.* 15.
Habitat in Europae *ſeminibus, in muſeis peſſimus, deſtruens herbaria, inſecta, aves, pelles, utenſilia, libros, culinaria, imo pulverem tabaci, ambroſiacis non pellendus, frigoris et humiditatis amans, calore et ſiccitate arcendus, arſenico et alumine, certius mercurio corroſivo ſublimato albo occidendus, habitu, facie, moribus, metamorphoſi ad dermeſtes, dentibus thoracis lateralibus ad cerambyces accedens;* femina *aptera;* larva *hexapus obeſa, mollis, piloſa, ſegmentis dorſalibus prominulis;* puppa *intra globum glutinoſum.*

longicornis. 18. Pt. ater nitidus, pedibus flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 3.
Habitat in Germania, *furis magnitudine.*

germanus. 6. Pt. fuſcus, thorace transverſim rugoſo, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 2. *mant. inſ. p.* 40. *n.* 2. Ptinus fuſcus, thorace quadridentato, elytris villoſis cinereo-variis.
Habitat in Europae *quercu, furi affinis, ſed major.*
Antennae *ferrugineae, longitudine corporis.*

Latro. 19. Pt. teſtaceus immaculatus, thorace bidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 6.
Habitat Argentorati. Hermann.

ſpinicornis. 20. Pt. oblongus, antennarum articulis duobus prioribus longioribus ſpinoſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 7.
Habitat in Sandwichii *inſulis.*

ſulcatus. 21. Pt. albidus, thorace quadriſulcato villoſo, elytris connatis fuſco-teſtaceis nitidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 6.
Habitat in plantis ſiccis ex inſulis Canariis *miſſis, fure minor.*

Scotias. 22. Pt. thorace laevi piceo, elytris connatis fuſco teſtaceis nitidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 8.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 27. *n.* 5. *t.* 20. *f.* 14.
Czenpinsk. diſſ. 51. 155. *Jacquin miſcell. auſtr. t.* 23. *f.* 1. Scotias pſylloides.
Schranck inſ. auſtr. Scotias Seminulum.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 164. *n.* 2. Bruchus totus teſtaceus &c.
Scop. introd. hiſt. nat. 505. Gibbium?
Habitat in Europae *magis auſtralis betula.*

ſtriatus. 23. Pt. thorace gibbo bituberculato, coleoptris globoſis ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 10.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura ſcotiae.*

upſalienſis. 24. Pt. teſtaceus, oculis nigris, elytris ſtriatis, thorace convexo-plano. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 6. *n.* 9.
Habitat Upſaliae, *pediculi magnitudine, molli duplo minor; an hujus tribus.*

Faber. 25. Pt. teſtaceo-obſcurus, elytris laevibus cinereo-undulatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 6. *n.* 10.
Habitat in Hollandia, *pertinace major.*

apterus. 32. Pt. capite fuſco: fronte canaliculata, elytris annatis pedibus antennisque rufis, femoribus clavatis, tibiis ciliatis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 130.
Habitat - - -

193. HISTER.

Antennae clavatae: clava ſolida, infimo articulo compreſſo, decurvato.
Caput intra corpus retractile.
Os forcipatum.
Elytra corpore breviora.
Tibiae anteriores dentatae.

maximus. 1. H. maximus.
Muſ. Lud. Ulr. 36.* Hiſter unicolor.
Habitat in India, *unicolori ſimilis, ſed decuplo major, thoracis angulis rotundatis, pectoris apice non ad os usque extenſo.*

2. H.

major. 2. H. ater, elytris ſubſtriatis, thoracis marginibus ciliatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 1.
Voet coleopt. t. 31. *f.* 6.
Habitat in Africa, *unicolori ſimillimus, at duplo major.*

niger. 7. H. niger, punctis elevatis ſcaber. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 4.
Habitat in Hiſpania, *unicoloris magnitudine.*

unicolor. 3. H. ater, elytris oblique ſtriatis. *Fn. ſuec.* 440.* *Scop. ent. carn.* 30. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 2.
Degeer inſ. 4. *p.* 342. *n.* 1. *t.* 12. *f.* 12. Hiſter niger nitidus, elytris ſtriatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 94. *t.* 1. *f.* 4. Attelabus totus niger &c.
Raj. inſ. p. 91. *n.* 7. Scarabaeus antennis globuloſis &c.
Gunner act. nidroſ. 4. *t.* 16. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 10. *et t.* 208. *f.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 8. 9.
β) Hiſter elytris ſtriis quinque punctatis dimidiatis. *Muſ. Lesk. p.* 5. *n.* 89.
γ) Hiſter elytris ſtriis tribus integris duabusque parvulis. *Muſ. Lesk. p.* 5. *n.* 90.
Habitat in Europae *et* Americae *arena, terra, ſtercore,* β) *triplo,* γ) *quadruplo minor.*

cyaneus. 8. H. thorace aeneo, elytris caeruleſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

planus. 9. H. planus ater opacus, elytris laeviſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 9.
Habitat in Helvetia.

brunneus. 10. H. ferrugineus, elytris ſubſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 6.
Habitat in Sueciae *ſtercore.*

pygmaeus. 4. H. ater, elytris laeviſſimis. *Fn. ſuec.* 441. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 7.
Degeer inſ. 4. *p.* 344. *n.* 4. Hiſter nigro-fuſcus &c.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 10.
Habitat in Europa *boreali, unicolori ſimillimus, at quadruplo minor.*

depreſſus. 11. H. depreſſus ater nitidiſſimus, elytris ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ. p. 32. n. 8.*
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. p. 20. n. 7. Hiſter compreſſus.
Habitat ſub betulae *cortice.*

abbreviatus. 12. H. ater, elytris crenato-ſtriatis: ſtriis interioribus abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 61. n. 6. mant. inſ. 1. p. 32. n. 9.*
Habitat in America *boreali, ſtatura pygmaei.*

bimaculatus. 5. H. ater, elytris poſterius rubris. *Fn. ſuec. 442.* Fabr. ſp. inſ. 1. p. 6. n. 7. mant. inſ. 1. p. 33. n. 10.*
Scop. ent. carn. 51. Hiſter fimetarius.
Degeer inſ. 4. *p.* 343. *n.* 2. Hiſter niger nitidus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 95. *n.* 2. Attelabus niger &c.
Udm. diſſ. 80. Coccinella atra glabra, elytris abdomine brevioribus, maculis duabus rubris.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 9.
elem. t. 24. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 31. *f.* 1.
Habitat in Europae *ſtercore bovino.*

quadrimaculatus. 6. H. ater, elytris bimaculatis. *Fn. ſuec. 443.* Fabr. ſp. inſ. 1. p. 61. mant. inſ. 1. p. 33. n. 11.*
Degeer inſ. 4. *p.* 344. *n.* 3. Hiſter niger nitidus &c.
Gadd. ſatag. 76. Scarabaeus ovatus niger glaber, maculis duabus rubris in ſingulo elytro.
Schaeff. elem. t. 24. *f.* 2.
icon. t. 3. *f.* 9. *et t.* 14.
Voet coleoptr. t. 31. *f.* 3.
Habitat in Europa *boreali, maculis elytrorum interdum cohaerentibus.*

aeneus. 13. H. aeneus, elytris baſi ſtriatis apice punctatis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 62. n. 9. mant. inſ. 1. p. 33. n. 12.*
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 95. *n.* 3. Attelabus nigro cupreus.
Habitat in Anglia, Gallia.

detritus. 14. H. ater nitens, elytris piceis apice obſcuris. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 62. n. 10. mant. inſ. 1. p. 33. n. 13.*
Habitat in nova Hollandia.

ſtriatus. 15. H. ater, thorace elytriſque ſtriatis. *Forſter nov. ſp. inſ. cent. 1. p. 11. n. 11.*
Habitat in Anglia.

pulicarius. 16. H. niger, elytris ſtriatis apice pallidis. *Thunb. nov. act. Upſ. 4. p. 7. n. 11.*
Habitat in Suecia, *pygmaei magnitudine.*

apterus. 17. H. fulvus, alis nullis. *Scop. ent. carn. n. 32.*
Habitat in Carniola.

194. GYRINUS. *Antennae* cylindricae. *Maxilla* cornea, acutiſſima. *Oculi* 4: duo ſupra, duo infra.

Natator. 1. G. ſubſtriatus. *Geoffr. inſ. par. 1. p. 194. t. 3. f. 3. Fabr. ſp. inſ. 1. p. 297. n. 1. mant. inſ. 1. p. 194. n. 1.*
Fn. ſuec. 779. Scop. ent. carn. 299. Dytiſcus ovatus glaber, antennis capite brevioribus obtuſis.
Merret pin. 203. Pulex aquaticus.
Pet. gaz. 21. *t.* 13. *f.* 9. Scarabaeus niger noſtras, ſupra aquam velociter circumnatans.
Raj. inſ. p. 89. *n.* 9. Scarabaeus aquae ſubrotundus e caeruleo viridi ſplendente undique tinctus.
Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond. I. 3. *p.* 158. Gyrinus pygolampis.
Roeſ. inſ. 3. *p.* 195. *t.* 31.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 43.
Poda inſ. 44. *n.* 4.
Schaeff. elem. t. 67.
Habitat in Europae *lacubus, frequens, nitidiſſimus, foetens, velociſſime ſupra aquam per orbes curſitans, dum vero urinatur, bullam aëream hydrargyri coloris ſecum trahens.*

bicolor. 3. G. niger ſubtus ferrugineus, pedibus poſterioribus compreſſis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 194. *n.* 2.
Habitat in Sueciae *aquis, natatore major.*

auſtralis. 4. G. ſubſtriatus vireſcens elytris abbreviatis unidentatis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 298. n. 2. mant. inſ. 1. p. 194. n. 3.*
Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond. I. 3. *p.* 159. *n.* 5.
Habitat in novae Hollandiae *aquis.*

americanus. 2. G. laevis ater opacus. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 298. n. 3. mant. inſ. 1. p. 194. n. 4. Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond.* I. 3. *p.* 157. *n.* 2.
Habitat in Americae *meridionalis aquis, natatori ſimilis, ſed duplo major.*

ſpinoſus. 5. G. niger nitidus, thoracis elytrorumque margine flavo, elytris ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 298. *n.* 4. *mant. inſ.* I. *p.* 194. *n.* 5.
Habitat in Coromandel, *congeneribus ſimilis, at ſpinis elytrorum duabus elongatis acutiſſimis diſtinctus.*

groſſus. 6. G. ſubtus ater, ſupra niger, laevis, glaberrimus, elytris apicibus rotundatis. *Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond.* I. 3. *p.* 156. *n.* 1.
Habitat in aquis claris ad caput bonae ſpei.

formoſus. 7. G. ſubtus ater, pectore, ſterno pedibusque ferrugineis, ſupra obſcure aeneo-vireſcens, linea labii transverſa, maculis binis frontis, thoracis linea transverſa interrupta, ſtriisque elytrorum rubro-ſubauratis. *Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond.* I. 3. *p.* 157. *n.* 3.
β) Gyrinus minor non auratus. *Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond.* I. 3. *p.* 157.
Habitat in aquis claris ad caput bonae ſpei, *β) duplo minor.*

orientalis. 8. G. ſubtus pallide ferrugineus, ſupra aeneo-niger, elytris utrinque compreſſis ſtriatis ſubauratis, poſterius quadridentatis. *Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond.* I. 3. *p.* 160. *n.* 6.
Habitat - - - teretiuſculus, elytris abdominis longitudine.

Viola aquatica. 9. G. ſubtus pallide ferrugineus, ſupra ater glaberrimus, ſubtomentoſo murinus. *Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond.* I. 3. *p.* 160. *n.* 7.
Aldr. inſ. l. 7. *c.* 1. *Jonſt. inſ. l.* 4. *c.* 1. Viola aquatica.
Habitat in aquis ſalſis.

195. BYRRHUS. *Antennae* clavatae: clava perfoliata.
Palpi aequales, ſubclavati.
Maxilla bifida.
Labium bifidum.

Gigas. 1. B. niger, elytris punctatis ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 38. *n.* 1.
Habitat in Auſtria, *pilula major.*
Feminae *anus aculeo armatus.*

4. B.

Pilula. 4. B. fuſcus, elytris ſtriis atris interruptis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 2.
Fn. ſuec. 427. Dermeſtes tomentoſus ovatus fuſco-nebuloſus.
Deeger inſ. 4. *p.* 213. *n.* 9. *t.* 7. *f.* 23. Dermeſtes ovatus &c.
Geoffr. inſ. par. 4. *p.* 116. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 8. Ciſtela ſubvilloſa viridefcens &c.
β) Byrrhus maculatus. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 25. *n.* 2.
Habitat in Europae *ſabuloſis, colore nigro interdum conſpicuus.*

ater. 2. B. niger immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 117. *n.* 3. Ciſtela nigra nitens glabra.
Habitat in Germania, *pilulae ſtatura et magnitudine.*

dorſalis. 3. B. nigricans, coleoptris macula transverſa ferruginea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 4.
Habitat Kilonii, *atro proxime affinis, at paulo minor.*

varius. 5. B. niger, thorace aeneo, elytris fuſcis; ſtriis tribus abbreviatis viridibus nigro-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 5.
Habitat in Anglia.

aeneus. 6. B. totus aeneus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 6.
Habitat Upſaliae, *ſcutello albido.*

nitidus. 7. B. totus nitidus, ſupra aeneo-viridis, ſubtus niger. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 252.
Habitat Halae Saxonum *in ſaxoſis, vere infra ſaxa frequens.*

faſciatus. 8. B. nigricans, elytris faſcia lata fuſca. *Herbſt. apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 26. *n.* 4.
Voët coleoptr. t. 32. *f.* 2?
Habitat Berolini.

vireſcens. 9. B. vireſcens, ſcutello luteo. *Muſ. Lesk. p.* 6. *n.* 116.
Habitat in Europa.

ANTHRENUS. *Antennae* clavatae: clava ſolida.
Palpi inaequales, filiformes.
Maxilla membranacea, linearis, bifida.
Labium integrum.

Pimpinellae. 4. A. niger, elytris faſcia alba apice ferrugineus, litura alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 1.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 114. *n.* 1. Anthrenus ſquamoſus niger &c.
Habitat in pimpinellae floribus Galliae.

Scrophulariae. 1. A. niger, elytris albo-maculatis: ſutura ſanguinea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 569. Byrrhus Scrophulariae.
Fn. ſuec. 429. Dermeſtes tomentoſus maculatus, ſutura elytrorum rubra.
Degeer inſ. 4. *p.* 200. *n.* 6. *t.* 7. *f.* 20. Dermeſtes ovatus niger &c.
Raj. inſ. p. 85. *n.* 35.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 11. h.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 9. 10.
Schaeff. elem. t. 17.
icon. t. 176. *f.* 4.
Habitat in Europae *ſcrophulariis.*

muſeorum. 2. A. nebuloſus, elytris ſubnebuloſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 568. *n.* 2. Byrrhus muſeorum.
Fn. ſuec. 430. Dermeſtes tomentoſus maculatus, elytris puncto albo.
Degeer inſ. par. 4. *p.* 203. *n.* 7. *t.* 8. *f.* 11. 12. Dermeſtes ovatus fuſcus &c.
Habitat in muſeis, *animalia aſſervata deſtruens, libris quoque infeſtus, praecedenti ſimilis, at minor.*

Verbaſci. 3. A. niger, elytris faſciis tribus undatis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 4.

Syſt.

An ad hoc genus ſpectat dubius Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ. 1. *p.* 41. *n.* 10. *t.* 21. *f.* k. K.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 568. *n.* 3. Byrrhus fuſcus, elytris faſciis tribus undulatis pallidis.
Geoffroi inſ. par. 1. *p.* 115. *n.* 2. Anthrenus ſquamoſus niger, elytris fuſcis &c.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 11. 12.

vagus. 5. A. cinereus, elytris faſciis nigris tribus obſoletis.
Habitat in Europa, *Suecia; an hujus generis?*

glaber. 6. A. glaber niger, elytris, pedibus antennisque fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 26. *n.* 4.
Habitat Berolini, *magnitudine derm. pellionis.*

fuſcus. 7. A. fuſcus pilis luteis leviſſime tomentoſus apice pallida. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 119. b.
Habitat in Europa.

196. SILPHA. *Antennae* clavatae: clava perfoliata. *Elytra* marginata. *Caput* prominens. *Thorax* planiuſculus, marginatus.

germanica. 1. S. oblonga atra, clypeo obrotundo inaequali marginato, elytris obtuſiſſimis margine laterali ferrugineis.
Degeer inſ. 4. *p.* 173. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 4. Silpha tota atra, elytris truncatis abdomine brevioribus.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 83. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 569. *n.* 1. Nicrophorus ater, thorace obrotundo inaequali.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 99. *n.* 2. Dermeſtes thorace marginato, elytris abſciſſis, totus niger.
Raj. inſ. p. 107. *n.* 1.
Liſt. ſcar. angl. p. 381.
Voet coleoptr. t. 30. *f.* 4. 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 10.
β) Silpha ſpecioſa, elytris maculis duabus aurantiacis. *Schulze Naturf.* 6. *p.* 95. *t.* 4.
γ) Silpha humator. *Bergſtr. nomencl.* 1. *t.* 10. *f.* 9.
Habitat multiplici varietate in Germania, *cadavera ovo impraegnata ſepeliens.*

Silpharum *larva et imago animalium, inprimis cadaveribus paſcitur.*

Veſpillo. 2. S. oblonga atra, clypeo orbiculato inaequali, elytris faſcia duplici ferruginea. *Fn. ſuec.* 444.* *Muſ. Lud. Ulr.* 37.*

Degeer inſ. par. 4. *p.* 168. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 1. Silpha nigra, elytris truncatis &c.

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 84. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 2. Nicrophorus ater, elytris faſcia duplici ferruginea.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 98. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 5. Dermeſtes thorace marginato &c.

Scop. ent. carn. 33. Dermeſtes veſpillo.

Raj. inſ. 106.

Liſter ſcar. p. 381. *n.* 2.

Mouff inſ. 149. *f.* 1.

Imp. alt. 692. *t.* 2. *f.* 2.

Blanck. inſ. 160. *t.* 14. *f.* 1.

Gleditſch act. Berol. 1752. *p.* 53.

Petiv. gazoph. t. 13. *f.* 6.

Poda inſ. t. 1. *f.* 2.

Voet coleoptr. t. 30. *f.* 1-3.

Roeſ. inſ. 4. *t.* 1. *f.* 1. 2.

Friſch inſ. 12. *p.* 28. *t.* 3. *f.* 2.

Bergſtr. nomencl. 1. 10. 14. *t.* 1. *f.* 14.

Schaeff. ic. t. 9. *f.* 4.

β) Silpha veſpilloides. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 32. *n.* 3.

Habitat multiplici varietate, in Europa, America, *cadavera ovo impraegnata ſepeliens, moſchum non raro ſpirans, elytris erectis approximatis ocyſſime volitans, acaris infeſtata; in* America *interdum decuplo major.*

bimaculata. 3. S. ovata nigra, antennarum capitulis globoſis, pedibus ferrugineis.

Habitat in Barbaria, *oryzae magnitudine, thoracis margine ſubferrugineo, elytris in medio macula rubra notatis.*

quadripuſtulata. 5. S. oblonga nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. *Fn. ſuec.* 446.*

Degeer inſ. 4. *p.* 187. *n.* 12. *t.* 6. *f.* 20. 21. Silpha nigra oblonga depreſſa &c.

Fabr. ſyſt. ent. p. 69. *n.* 3. Tritoma quadripuſtulata.

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 80. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 5. Ips quadripuſtulata.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 106. *n.* 16?

Friſch inſ. 9. 36. *t.* 19.

β) Silpha americana quadruplo major.

Habitat

Habitat in Europae *et* Americae *ligno putreſcente, glaberrimus, ſtatura ſcarabaei,* larva *oblonga hirſuta griſea.*

dorſalis. 4. S. oblonga ſupra pallida coleoptris macula media nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 4.
Habitat in Europa *auſtrali, quadripuſtulata, paulo major.*

notata. 17. S. atra elytris macula baſeos rufa. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 3.
Habitat Halae Saxonum, *dorſalis ſtatura.*

bipuncta-ta. 53. S. ater, elytris rufis: macula magna atra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 2.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

faſciata. 24. S. atra, elytris faſciis duabus rufis: anteriori nigro-maculata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 1.
Habitat in America *boreali.*

rufipes. 25. S. atra, capite, thorace pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 6.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 80. *n.* 2. Tritoma rufipes.
Habitat in Norwegiae *fungis arboreis, in* Germania *duplo major.*

quadri-maculata. 27. S. rufa, thorace elytrisque nigris: his maculis duabus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 8.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 256. Silpha quadrimaculata oblonga ferruginea, ſuperne nigra, elytris ſtriatis: maculis duabus ferrugineis.
Habitat Halae Saxonum, *ad ruſſicam accedens.*

punctula-ta. 32. S. oblonga nigra, elytris punctis faſciaque poſteriore fulvis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 9.
Habitat Halae Saxonum, *parva.*

glabra. 34. S. oblonga nigra, thorace rufo, elytris nigris: maculis duabus obſolete rufis, pedibus rufis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 255.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 46. *n.* 10. Ips ſanguinicollis.
Habitat Halae Saxonum, *mediae magnitudinis, ad ruſſicam accedens.*

picea. 36. S. picea, elytris nigris, baſi faſciaque poſteriore ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 3. *mant inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 11.
Habitat in Germania, *quadripuſtulata minor.*

quadri-guttata. 37. S. oblonga nitida atra, elytris maculis duabus albis, anteriore ſinuata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 14. *Herbſt. apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 158. *n.* 4. *t.* 43. *f.* 17.
Habitat Kilonii.

nigricornis. 38. S. flava, antennis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 12.
Habitat Halae Saxonum, *aenea paulo major; an hujus generis?*

aenea. 39. S. oblonga rufa, elytris caeruleo-viridibus, antennis nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 254.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 46. *n.* 13. Ips aenea.
Habitat in ſilvis Magdeburgicis, *mediae magnitudinis.*

crenata. 40. S. oblonga nigra, thorace rugoſo, elytris ſtriato-crenatis: maculis duabus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 15. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 31. *n.* 2. *t.* 20. *f.* 2.
Fabr. Syſt. ent. p. 69. *n.* 4. Tritoma crenata.
Habitat in Suecia, *quadripuſtulata quadruplo minor.*

rufifrons. 41. S. oblonga glabra atra, fronte pedibus maculisque duabus elytrorum ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 16.
Fabr. ſyſt. ent. p. 69. *n.* 5. Tritoma rufifrons.
Habitat in Anglia.

bifaſciata. 42. S. nigra, elytris faſciis duabus punctoque apicis ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 17.
Habitat Halae Saxonum, *minuta.*

nigra. 43. S. oblonga nigra immaculata. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 18.
Habitat in Uplandiae *boletis, parva.*

haemorrhoidalis. 79. S. rufa, elytris nigris apice rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Suecia, *rufipedi proxime affinis.*

binotata. 80. S. teſtacea, elytris ſtriatis: maculis duabus nigris. *Petagn. inſ. Calabr. p.* 7. *n.* 31. *f.* XXXIII.
Habitat in ſepibus circa Bellimontum Calabriae, *ſtatura ruſſicae.*

ſpadicea. 81. S. oblonga glabra, oculis apiceque elytrorum nigris. *Leſk. it. p.* 14. *t.* A. *f.* 3.
Habitat in Luſatiae *monte* Keulenberg, 2½ *lineas longa.*

ſexdentata. 44. S. nigra, thorace ſexdentato, elytris anguſtis punctato-ſulcatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 31. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 21.
Habitat in oryza, 1½ *lineas longa.*

collaris. 45. S. ovata nigra, thorace, pedibus antennisque luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 256.
Habitat in ligno ducatus Magdeburgici, *ruſſica dimidio minor.*

carnaria. 46. S. fuſca, elytris obtuſis pubeſcentibus: maculis duabus teſtaceis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 257.
Habitat in cadaveribus, *nitidulae rufipedi ſimilis, at minor.*

indica. 6. S. nigra, elytris faſciis duabus ferrugineis, thorace anterius bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 38.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 4.
Habitat in India.

americana. 7. S. ovata fuſca, clypeo flavo, centro nigro intra annulum fulvum.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 85. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 5. Silpha depreſſa nigra, thorace flavo: centro nigro.
Cateſb. Car. 3. *t.* 10. *f.* 5. Blatta americana.
Habitat in America, *veſpillonis magnitudine.*

Seminulum. 8. S. ovata atra nitida immaculata, abdomine rubro. *Fn. ſuec.* 447.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 79. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 13. Sphaeridium atrum, abdomine pedibusque rufis.
Habitat in Europae *hortis et floribus, parva; teſtam daſypodis inſtar componens, terrefacta ſimilis ſemini caput et pectus abdomini applicans, ut exacte granum glabrum lucidum referat, quiete jaciendo facile ſeducens inventorem.*

agaricina. 9. S. ovata atra glaberrima hemiptera. *Fn. ſuec.* 448.
Scop. ent. carn. 43. Dermeſtes agaricinus.
Habitat in agaricis.

ruſſica. 10. S. oblonga rufa, antennis, elytris, pectoreque nigris. *Fn. ſuec.* 449.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 6.

Uddm. diſſ. 7. Dermeſtes elytris nigris, capite, clypeo et abdomine rubro.
Degeer inſ. 5. *p.* 283. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 12. Anthribus ruber &c.
Herbſt. apud Fueſſli Arch. Inſ. 7. *p.* 159. *n.* 14. *t.* 43. *f.* 9.
Habitat in Europa *boreali, et* Calabria.

livida. 47. S. fuſca thorace elytris pedibusque lividis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 48. *n.* 3. *Herbſt. apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 34. *n.* 10.
Habitat in Germania, *littoralis ſtatura, ſed duplo minor.*

littoralis. 11. S. atra, elytris laevibus: lineis elevatis tribus, thorace orbiculato nitido. *Fn. ſuec.* 450.* *Scop. ent. carn.* 55. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 2.
Fn. ſuec. 380. Caſſida atra, elytris lineis tribus elevatis, antennis antice teſtaceis.
Degeer inſ. 4. *p.* 176. *n.* 4. Silpha rufo-clavata &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 120. *n.* 3. Peltis nigra &c.
Schaeff. ic. t. 218. *f.* 1.
Friſch inſ. 6. *p.* 12. *t.* 5.
Bergſtr. nomencl. 1. 24. 6. *t.* 3. *f.* 6.
β) Silpha clavipes? *Sulz. hiſt. inſ. t.* 2. *f.* 14?
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat in Europae *cadaveribus.*
Larva *ovata, depreſſa, fuſca, voraciſſima.*

ſurinamenſis. 48. S. atra, elytris faſcia poſteriore flava, femoribus poſterioribus dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 1.
Habitat in America *meridionali.*

inaequalis. 49. S. atra, elytris laevibus: lineis elevatis tribus, thorace inaequali emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 13.
Habitat in America *ſeptentrionali, atratae affinis.*

granulata. 50. S. atra, elytris lineis elevatis tribus punctisque granulatis, thorace emarginato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 12.
Habitat in Africa, *atrata paulo major.*

atrata. 12. S. atra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus laevibus, thorace integro. *Fn. ſuec.* 451.* *Scop. ent. carn.* 56. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 11.
Laichart. inſ. tyr. 1. *p.* 98. *n.* 10. Silpha tyrolenſis.
Degeer inſ. 4. *p.* 177. *n.* 5. *t.* 6. *f.* 15. Silpha punctata &c.

Geoffr.

Geoffr. inſ. par. I. *p.* 118. *n.* I. Peltis nigra &c.
Schaeff. elem. t. 96. *f.* I.
- *icon. t.* 93. *f.* 5.
Habitat in Europae *agris et viis frequens.*

thoracica. 13. S. nigra, elytris obſcuris: linea elevata unica, thorace teſtaceo. *Fn. ſuec.* 452.* *Scop. ent. carn.* 54. *Stroem act. nidr.* 3. *p.* 384. *t.* 6. *f.* I. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 86. *n.* 6. *mant. inſ.* I. *p.* 48. *n.* 7.
Degeer inſ. 4. *p.* 174. *n.* 3. *t.* 6. *f.* 7. Silpha nigra &c.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 121. *n.* 6. Peltis nigra &c.
Gadol diſſ. 25. Caſſida nigra, clypeo latiſſimo pallide, rufo, macula lata nigra nitida.
Raj. inſ. p. 90. *n.* 10. Scarabaeus primo ſimilis parum canaliculatus, ſcapulis croceis.
Bergſt. nomencl. I. 23. 5. *t.* 3. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 75. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 12.
Habitat in Europae *cadaveribus.*

laevicollis. 51. S. gibba nigra, elytris rugoſis: lineis elevatis tribus, thorace laevi emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 86. *n.* 7. *mant. inſ.* I. *p.* 48. *n.* 8.
Habitat in nova Hollandia.

marginalis. 52. S. atra, thoracis margine pallido, elytris fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 86. *n.* 8. *mant. inſ.* I. *p.* 48. *n.* 9.
Forſter cent. inſ. I. *p.* 17. *n.* 17. Silpha noveboracenſis.
Habitat in America *boreali, atratae magnitudine.*

quadripunctata. 14. S. nigra, elytris pallidis: puncto baſeos medioque nigro, thorace emarginato. *Fn. ſuec.* 453.* *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 88. *n.* 17. *mant. inſ.* I. *p.* 49. *n.* 20.
Pet. gaz. t. 12. *f.* 2.
Schreb. inſ. 2. *f.* 5. Silpha quadripunctata nigra, elytris exalbidis: maculis 4 nigris.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 122. *n.* 7. Peltis nigra, thorace elytrisque teſtaceis, thoracis macula coleoptrorumque 5 nigris.
Degeer inſ. 4. *p.* 181. *n.* 6. *t.* 4. Silpha corpore nigro &c.
Lepechin it. I. *p.* 202. *t.* 16. *f.* 4. Silpha flavicans.
Habitat in Europae, *frequens in* Angliae *quercu.*

pedemontana. 54. S. teſtacea, antennis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 88. *n.* 18. *mant. inſ.* I. *p.* 49. *n.* 21.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 123. *n.* 9.
Habitat in agris Pedemontanis.

hirta. 55. S. nigricans villis flavis ſplendidis hirta, elytris lineis duabus et dimidia elevatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 34. *n.* 11.

Habitat Berolini, *ſinuatae affinis.*

ſinuata. 56. S. thorace emarginato ſcabro, elytris lineis elevatis tribus apice ſinuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 19.

Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 15. Silpha appendiculata.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 119. *n.* 2. Peltis nigra &c.

Habitat in Anglia *et* Germania.

carinata. 57. S. ſpadicea, clypeo glaberrimo, latiſſimo, marginato, anterius exciſo, elytris margine carinatis glabris: lineis tribus elevatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 34. *n.* 12.

Habitat in Pomerania, *opacae affinis.*

opaca. 15. S. fuſca, elytris concoloribus: lineis elevatis ſubternis, thorace anterius truncato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 18.

Müller prodr. zool. dan. p. 63. *n.* 585. Peltis opaca &c.

Schaeff. ic. t. 93. *f.* 6.

rugoſa. 16. S. nigricans, elytris rugoſis: lineis elevatis tribus, thorace rugoſo poſterius ſinuato. *Fn. ſuec.* 445.* *Scop. ent. carn.* 53. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 10.

Fn. ſuec. 1. *n.* 379. Caſſida atra, elytris ſtriis quinque punctisque elevatis.

Degeer inſ. 4. *p.* 182. *n.* 7. *et inſ.* 5. *p.* 43. *n.* 5. *t.* 2. *f.* 21. Silpha nigra opaca &c. *et* Tenebrio rugoſus &c.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 120. *n.* 4. Peltis nigra &c.

Raj. inſ. 90. *p.* 9. Scarabaeus inter cadavera frequens &c.

Bergſtr. nomencl. 1. 23. 4. *t.* 3. *f.* 4.

β) Silpha pellae ocephalos. *Bergſtr. nomencl. t.* 9. *f.* 8.

Habitat frequentiſſima in Europa *et* Sibiria, *cadavera, piſces, carnes conſumens, capta humorem foetidiſſimum evomens.*

cancellata. 58. S. nigra, thorace laevi, elytris rugoſis: lineis elevatis tribus. *Fabr. mant.* 1. *p.* 49. *n.* 17.

Habitat Halae Saxonum, *obſcurae proxime affinis.*

18. S.

obſcura. 18. S. nigra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus, thorace anterius truncato. *Fn. ſuec.* 457. *Scop. ent. carn.* 57. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 88. *n.* 14. *mant. inſ.* I. *p.* 49. *n.* 16.
Udm. diſſ. 8. Caſſida ovata nigra, lineis elevatis tribus: media longiſſima.
β) Silpha punctata. *Bergſtr. nomencl. t.* 9. *f.* 9?
Habitat in Europa *boreali, rarior.*

ferruginea. 19. S. ferruginea, elytris lineis elevatiſſimis, thorace emarginato capite latiore. *Fn. ſuec.* 458. *Scop. ent. carn.* 60. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 89. *n.* 19. *mant. inſ.* I. *p.* 49. *n.* 22.
Degeer inſ. 4. *p.* 183. *n.* 9. Silpha cimicoides &c.
Laicbart. inſ. tyr. I. *p.* 102. *n.* I. Oſtoma rubicunda.
Raj. inſ. p. 84. *n.* 33.
Schaeff. ic. t. 40. *f.* 7.
Habitat in Europa *boreali, etiam* Calabria.

reticulata. 20. S. ferruginea, elytris lineis elevatis ſenis, thorace emarginato ſerrato.
Habitat in Europa, *ferruginea duplo anguſtior.*
Clypeus *lunatus, latitudine thoracis, et ultra thoracem exſertus; hic elytris anguſtior, marginibus lateralibus crenulatis; elytra profunde ſulcata; inter ſingulos ſulcos ordine punctorum excavato.*

groſſa. 21. S. atra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus laevibus, thorace transverſo emarginato. *Fn. ſuec.* 459. *Udm. diſſ.* 9.
Fabr. ſp. inſ. I. *p.* 87. *n.* 12. *mant. inſ.* I. *p.* 49. *n.* 14. Silpha truncata.
Habitat in Europa, *ovata, punctis elytrorum confertis.*

laevigata. 59. S. atra, elytris laevibus ſubpunctatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 87. *n.* 13. *mant. inſ.* I. *p.* 49. *n.* 15.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 122. *n.* 8. Peltis nigra tota &c.
Sulz hiſt. inſ. t. 2. *f.* 16.
Habitat in Europae *ſilvis.*

oblonga. 22. S. nigra, elytris ſtriato-punctatis, lineis elevatis ſenis, thorace emarginato. *Fn. ſuec.* 460. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 89. *n.* 20. *mant. inſ.* I. *p.* 50. *n.* 23. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *t.* 20. *f.* 22.
Degeer inſ. 4. *p.* 185. *n.* 71. Silpha oblonga &c.
Fn. ſuec. 381. Caſſida atra, elytris ſtriis 10 elevatis, punctis excavatis ſtriatis.
β) Silpha flavifrons. *Schaeff. elem. t.* 18?

ſcabra. 23. S. oblonga nigra, thorace anterius elytrisque ante apicem bidentatis.
Fabr. mant. inſ. I. *p.* 50. *n.* 24. Silpha dentata?
Habitat in Europa, *ſtatura et magnitudine oblongae.*

limbata. 60. S. nigra, thoracis elytrorumque margine ſubferrugineo, elytris lineis elevatis plurimis obſoletis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 89. *n.* 21. *mant. inſ.* I. *p.* 50. *n.* 25.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura ferrugineae, at paulo minor.*

undata. 61. S. nigra nitida, elytris faſciis duabus undatis, punctoque apicis albis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 50. *n.* 26.
Habitat in Saxonia, *ſub arborum cortice, dermeſtis undati ſtatura et magnitudine.*

ſuccincta. 26. S. ferruginea nitida, elytris medio nigris.
Habitat in Suecia, *pediculo major.*

fuſca. 28. S. fuſca elongata, ſubtus picea.
Habitat in Suecia, *pediculo major, ſtatura cicindelae.*

depreſſa. 29. S. ferruginea, elytris laevibus, thorace emarginato. *Fn. ſuec.* 463.*
Habitat in Europa.

uralenſis. 62. S. ſupra atra, ſubtus ferruginea, thoracis atque elytrorum marginibus rubicundis. *Lepech. it.* I. *p.* 312. *t.* 16. *f.* 3.
Habitat in deſerto Uralenſi, *aliorum inſectorum cadavera ſepeliens; an hujus generis?*

griſea. 30. S. griſea, elytris laevibus, thorace emarginato. *Fn. ſuec.* 464.*
Habitat in Europa.

teſtacea. 31. S. teſtacea, thorace integro.
Habitat in Germania, *nitidula aeſtiva triplo major, an hujus generis?*

pulicaria. 33. S. nigra oblonga, elytris abbreviatis, abdomine acuto.
Fabr. ſp. inſ. I. *p.* 79. *n.* 12. *mant. inſ.* I. *p.* 44. *n.* 15. Sphaeridium pulicarium.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 564. *n.* 24. *Fn. ſuec.* 370. Dermeſtes pulicarius.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 308. *n.* 4. Anthribus niger.
Raj. inſ. 108. *n.* 29.
Habitat frequens in Europa, *in floribus curſitans.*

63. S.

minuta. 63. S. atra, elytris ſtriatis, pedibus concoloribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 14.
Habitat in Anglia.

fimetaria. 64. S. atra, immaculata, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 12. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 30. *n.* 4. *t.* 20. *f.* 17.
Habitat in Angliae *ſtercore.*

cruentata. 65. S. atra nitida, thoracis margine elytrorumque macula ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 11.
Habitat in nova Hollandia.

rufa. 66. S. atra nitida, thorace pedibusque anterioribus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 10.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura parva et gibba haemorrhoidalis.*

haemorrhoidalis. 67. S. atra, elytris apice rufis, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 9.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 308. *n.* 5. Anthribus niger ovatus &c.
Habitat in Europae *ſtercore bovino.*

melanocephala. 68. S. atra glabra, elytris griſeis: macula communi baſeos nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 8.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 563. *n.* 16. *Fn. ſuec.* 425. Dermeſtes melanocephalus &c.
Habitat in Europae *ſtercore frequens.*

atomaria. 35. S. nigra ſubovata, elytris immarginatis, pedibus pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 7. Sphaeridium laeve atrum, elytris crenato-ſtriatis, pedibus pallidis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 117. *n.* 19. Dermeſtes niger ſubrotundus &c.
Habitat in Europae *ſtercore.*

ſtriata. 69. S. ferruginea, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 6.
Habitat Kilonii, *ſtatura marginatae.*

marginata. 70. S. laevis atra, elytrorum margine pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 5.
Habitat Halae Saxonum, *glabratae ſtatura et magnitudine.*

glabrata. 71. S. atra, antennis pedibusque rufis, elytris laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 4.
Habitat in inſula Madera, *ſtatura dyticoidis, at minor.*

dyticoides. 72. S. ferruginea, elytris atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 3.
Habitat in inſula S. Helenae.

ſtercorea. 73. S. atra nitida, elytrorum macula apicis rubra, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 2.
Habitat Kilonii *in ſtercore.*

ſcarabaeoides. 74. S. ovata atra, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 563. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 428.* *Scop. ent. carn.* 36. Dermeſtes ſcarabaeoides.
Gadd ſatag. 76. Scarabaeus ovatus niger glaber, maculis 2 rubris in ſingulo elytro.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 106. *n.* 17. Dermeſtes niger &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 345. *t.* 12. *f.* 17. Hiſter teſtudinarius &c.

inſignita. 75. S. nigra, elytris obſolete ſtriatis: maculis duabus magnis coccineis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 30. *n.* 5. *t.* 20. *f.* 18.
Habitat rarior Berolini *in ſtercore vaccino.*

nigricans. 76. S. nigricans, elytris laeviſſimis: maculis quatuor flavis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 30. *n.* 6. *t.* 20. *f.* 19.
Habitat rarior Berolini *in ſtercore vaccino, ſtatura et magnitudine melanocephalae.*

hiſteroides. 77. S. nigra, antennis pedibusque rubris, elytris abbreviatis: macula rubra. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 8. *n.* 12.
Habitat Upſaliae, *oblonga, anguſta, pediculo vix major.*

biguttata. 78. S. tota ferruginea, elytris linea punctoque pallido. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 9. *n.* 13.
Habitat Upſaliae, *depreſſae magnitudine et facie.*

lutea. 81. S. lutea, elytris pubeſcentibus laevibus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Suecia.

ruficornis. 82. S. atra glabra, antennis abdomine pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 142.
Habitat in Europa.

exilis. 83. S. atra glabra minima, capite thoraceque incurvis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 144. c.
Habitat in Europa.

ſpadicea. 84. S. ferrugineo fuſca glabra, capite thoraceque incurvis. *Muſ. Lesk. p.* 8. *n.* 144. A.
Habitat in Europa.

trilineata. 85. S. elytris punctatis: lineis elevatis tribus; intermedia longiſſima. *Muſ. Lesk. p.* 8. *n.* 154. b.
Habitat in Europa.

melanophthalma. 86. S. teſtacea, oculis nigris, elytris guttis quinque nigris; una communi ad ſcutellum. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 160.
Habitat in Europa.

multicolor. 87. S. nigra, antennis pedibusque rufis, thoracis teſtacei dorſo fuſco: punctis duobus impreſſis, elytris teſtaceis: punctis duobus, taenia media, faſcia inaequali verſus apicem apiceque ipſo nigris. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 171.
Habitat in Europa, *antennarum apice fuſco.*

bicolor. 88. S. fuſca, pedibus rufis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 172. 174.
Habitat in Europa.

nebuloſa. 89. S. teſtacea, capite, thorace elytrisque fuſco nebuloſis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 173.
Habitat in Europa.

rubiginoſa. 90. S. thorace anguſto: dorſo ſulcato, corpore fuſco, elytris rugoſis, capite, thorace, abdomine pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 174. b.
Habitat - - -

pallipes. 91. S. nigra, capite, thorace, elytris pedibusque pallidis, oculis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 174. d.
Habitat in Europa.

ſqualida. 92. S. fuſco teſtacea, capite, thorace antennarumque teſtacearum apice teſtaceis, elytris ſordide teſtaceis, pedibus lividis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 174. e.
Habitat - - -

ſtriatula. 93. S. ferruginea, elytris leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 174. f.
Habitat in Europa.

tricolor. 94. S. nigra, antennis pedibusque rufis, elytris fuſco-bruneis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 174. g.
Habitat in Europa.

NITIDULA. *Antennae* clavatae: clava ſolida.
Elytra marginata.
Caput prominens.
Thorax planiuſculus, marginatus.

* *labio quadrato:* Elophori.

aquatica. 1. N. fuſca, thorace rugoſo elytrisque fuſco-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 1. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 573. *n.* 25. *Fn. ſuec.* 461.* Silpha cinerea, elytris ſubſtriatis, thorace emarginato longitudinaliter rugoſo vireſcente.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 105. *n.* 15. Dermeſtes viridi-aeneus, thorace faſciis quatuor elevatis, elytris punctato-ſtriatis.
Degeer inſ. 4. *p.* 379. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 5. 6. Hydrophilus aeneus &c.
Habitat in Europae *aquis ſtagnantibus, parva, frequens inter confervas.*

elongata. 2. N. fuſca, thorace rugoſo, elytris ſulcatis crenatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 257.
Habitat Halae Saxonum *in aquis ſtagnantibus ſub lemna, magnitudine media ptini pertinacis, anguſta et elongata, pedibus piceis.*

nubila. 3. N. griſea, thorace elytrisque ſulcato-rugoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 2.
Habitat Hamburgi.

minuta. 4. N. fuſca, thorace rugoſo aeneo, elytris pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 3.
Habitat in Angliae *aquis ſtagnantibus, aquaticae affinis, at triplo minor.*

coccinelloides. 28. N. nigra, capite, thorace elytrisque fumatis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 137. b.
Habitat in Europa, *ſtatura coccinellae.*

fuſca. 29. N. fuſco teſtacea, elytris punctato ſtriatis, antennis pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 137. c.
Habitat in Europa.

nebuloſa. 30. N. teſtaceo griſea, capite fuſco: tuberculis inter oculos quatuor, thorace aſpero, elytris lineis elevatis ſex: interſtitiis punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 138. b.
Habitat - - - an forte eadem cum nubila?

** *labio cylindrico.*

bipuſtulata. 5. N. ovata nigra, elytris puncto rubro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 570. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 445. Silpha oblonga nigra, elytris ſingulis puncto unico rubro.
Laichart. inſ. tyr. 1. *p.* 106. *n.* 3. Oſtoma bipuſtulata.
Degeer inſ. 4. *p.* 186. *n.* 13. *t.* 6. *f.* 22. 23. Silpha nigra &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 100. *n.* 3. Dermeſtes niger &c.
Habitat in Europae *cadaveribus, carnibus, lardo.*

obſcura. 6. N. ovata nigra obſcura, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 2. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 36. *n.* 2. *t.* 20. *f.* 23.
Habitat in Germania.

abbreviata. 7. N. ovata nigra obſcura, elytris laevibus obtuſis abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 3.
Habitat in nova Seelandia, *obſcurae ſtatura et magnitudine, pedibus nunc flavis, nunc nigris.*

marginata. 8. N. ovata, elytris ſulcatis: margine punctisque diſci ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 4.
Habitat in Italia, *ſtatura bipuſtulatae.*

aeſtiva. 9. N. teſtacea ſubtomentoſa, thorace emarginato, oculis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 5. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 36. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 24.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 574. *n.* 32. *Fn. ſuec.* 465. Silpha aeſtiva.
Habitat in Europae *floribus.*

ſtrigata. 10. N. ovata fuſca, thoracis margine, elytris margine, lineola baſeos ſtrigaque apicis fulvis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 7.
Habitat Halae Saxonum, *mediae magnitudinis, ſubtus fuſca.*

varia. 11. N. ovata, thorace elytrisque nigro ferrugineoque variis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 8. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 76. *n.* 4. *t.* 20. *f.* 25.
Habitat Kilonii *in hortis, ſtatura dermeſtis ferruginei.*

bicolor. 12. N. ferruginea, elytris nigris, faſcia baſeos punctoque apicis ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 92. *n.* 8. *mant. inſ.* I. *p.* 52. *n.* 9.
Habitat in arvis Kilonienſibus.

Colon. 13. N. nigra, elytris ferrugineo-variis, thorace emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 92. *n.* 9. *mant. inſ.* I. *p.* 52. *n.* 10.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 573. *n.* 27. *Fn. ſuec.* 462. *Degeer inſ.* 4. *p.* 117. *n.* 14. *t.* 6. *f.* 24. Silpha Colon.
Habitat in Europae *borealis graminoſis.*

limbata. 14. N. nigra, thoracis margine, elytrorumque limbo ferrugineis. *Fabr. mant.* I. *p.* 52. *n.* 11.
Habitat Halae Saxonum *parva.*

haemorrhoidalis. 15. N. nigra, elytris apice ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 92. *n.* 10. *mant. inſ.* I. *p.* 52. *n.* 12.
Habitat Hamburgi.

diſcoidea. 16. N. nigra, thorace marginato, elytrorum diſco ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 92. *n.* 11. *mant. inſ.* I. *p.* 52. *n.* 13.
Habitat in Anglia.

pedicularia. 17. N. nigra, elytris laevibus, thorace marginato. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 92. *n.* 12. *mant. inſ.* I. *p.* 52. *n.* 14.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 574. *n.* 34. *Fn. ſuec.* 466. Silpha pedicularia.
β) Dermeſtes (pſyllius) ovatus niger, abdomine obtuſo, thorace elytrisque marginatis.
Habitat in Europae *borealis hortis, floribus, pediculi magnitudine, ovato-oblonga.*

litura. 18. N. teſtacea, elytris litura arcuata nigra. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 52. *n.* 15.
Habitat Halae Saxonum, *parva.*

bipunctata. 19. N. teſtacea, coleoptris maculis quinque nigris. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 52. *n.* 16.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 58. *n.* 32. *t.* 23. *f.* 20. c. Chryſomela ſcutellata.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura liturae.*

aenea. 20. N. viridi-aenea, thorace marginato, antennis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 93. *n.* 13. *mant. inſ.* I. *p.* 52. *n.* 17.
Habitat in Anglia.

viridesſcens. 21. N. viridi-aenea, thorace marginato, pedibus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 18.
Habitat Kilonii, *ſtatura aeneae.*

pubeſcens. 22. N. thorace elytrisque griſeis pubeſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 19.
Habitat in Germania.

hirta. 23. N. atra, thorace elytrisque pubeſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 20.
Habitat in Germania, *pubeſcenti affinis.*

rufipes. 24. N. nigra nitida, pedibus pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 21.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 573. *n.* 24. Silpha nigra laevis, thorace ſubemarginato, pedibus pallidis.
Habitat in Europae *hortis.*

ſetacea. 25. N. ochracea immaculata, oculis nigris, elytris laeviſſimis. *Herbſt. apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 36. *n.* 6.
Habitat - - - *ſtatura et magnitudine coli, dermeſti ferrugineo affinis.*

pectoralis. 26. N. fuſca, capite pedibusque ferruginea, antennarum clava flava. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 41. *n.* 12. *t.* 21. *f.* M. m.

piloſa. 27. N. nigra, elytris villoſis, antennis pedibusque ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 39. *n.* 7. *t.* 21. *f.* G. g.
Habitat in Marchia, *lineam longa.*

OPATRUM.

Antennae moniliformes, extrorſum craſſiores.
Elytra marginata.
Caput prominens.
Thorax planiuſculus, marginatus.

griſeum. 1. O. cinereum, thorace plano marginato, elytris ſtriis tribus elevatis poſterius dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 1.
Habitat in Italia, *ſabuloſo major.*

ſabuloſum. 2. O. fuſcum, elytris lineis elevatis tribus dentatis, thorace emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 572. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 456. Silpha ſabuloſa.
Udm. diſſ. 5. Dermeſtes niger, inter elytrorum lineas quatuor elevatas ſcrobiculis exaratus.
Fn. ſuec. 382. Caſſida nigra, elytris ſtriis quinque utrinque dentatis, clypeo emarginato.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 350. *n.* 7. Tenebrio atra &c.
Habitat in Europae *et borealis* Americae *campis apricis ſabuloſis.*

gibbum. 3. O. nigrum, elytris lineis elevatis plurimis obſoletis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 3.
Habitat in Succiae *collibus arenoſis.*

laevigatum. 4. O. nigrum, clypeo anterius piceo, elytris ſubſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 4.
Habitat in nova Seelandia, *ſtatura gibbi.*

arenarium. 5. O. griſeum, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 5.
Habitat ad caput bonae ſpei.

orientale. 6. O. cinereum, thorace elytrisque rugoſis, tibiis anterioribus dilatatis triangularibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 511. *n.* 6.
Forſk. Fn. ar. p. 77. *n.* 1. Silpha multiſtriata.
Habitat in Orientis *arenoſis.*

tibiale. 7. O. nigrum, elytris punctato ſubrugoſis, tibiis anterioribus compreſſo-triangularibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 7.
Habitat ſub Scaniae *lapidibus, parva.*

Agricola. 8. O. nigrum, thorace laevi, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 8: *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 35. *n.* 2.
Habitat Berolini *et* Halae Saxonum, *parva.*

minutum. 9. O. cinereum, thorace rugoſo, elytris lineis elevatis quatuor laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 9.
Habitat in Succiae *arenoſis, primis ſpeciebus quadruplo minor.*

quiſquiliarum. 10. O. nigrum, thorace granulato medio glabro, elytris glaberrimis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 35. *n.* 3.

cinereum. 11. O. nigrum cinereo obumbratum, elytris punctato-ſulcatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 159. *n.* 4. *t.* 43. *f.* 10.
Habitat in India.

Lithophilus. 12. O. nigrum, thorace et ſubtus coccineum, thorace emarginato poſterius utrinque acuminato, elytris glaberrimis, tarſis triarticulatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 37. *n.* 1. *t.* 21. *f.* A. a.
Habitat in Marchia *ſub ſaxis*, 2 *lineas longum*, *dubii generis.*

melinum. 13. O. ochraceum glabrum, thorace elytrisque tenerrime punctatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 37. *n.* 2. *t.* 21. *f.* B. b.
Habitat rarior in Marchiae *floribus*, 1½ *lineas longum*, *dubii generis.*

cineterium. 14. O. badium elongatum, elytris planis glaberrimis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 38. *n.* 3. *t.* 21. *f.* C. c.
Habitat in Pomerania.

bipuſtulatum. 15. O. ferrugineum, elytris tenerrime ſulcatis thoraceque poſterius ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 38. *n.* 4. *t.* 21. *f.* D. d.
Habitat in Pomerania, 2 *lineas longum*, *anguſtum*, *elongatum.*

moniliforne. 16. O. fuſcum, thorace elytrisque villoſis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 39. *n.* 5. *t.* 21. *f.* E. e.
Habitat in Germania, 4 *lineas longum.*

ſiphoides. 17. O. nigrum glabrum, thorace retrorſum dilatato, elytris punctato ſtriatis: maculis duabus fulvis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 41. *n.* 11. *t.* 21. *f.* L. l.
Habitat in fungis quernis, *generis dubii.*

unipunctatum. 18. O. fuſcum hirtum, thorace ſubcylindrico immarginato media fovea excavato, antennarum articulis duobus ultimis diſtantibus majoribus.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 40. *n.* 8. *t.* 21. *f.* H. h.
Dermeſtoides unipunctatus.
Habitat - - - ultra duas lineas longum, utrum hujus, an cum ſequente proprii generis?

bipunctatum, 19. O. fuſcum, thorace ſubcylindrico immarginato: foveis binis, antennarum articulis duobus ultimis diſtantibus majoribus.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. p. 40. n. 9. t. 21. f. 1. i.
Habitat - - - unipunctato affine, at minus et magis depreſſum.

clathratum. 20. O. nigrum, elytris ſtriatis: ſtriis punctatis. *Fabr. mant. inſ. 2. app. p. 379.*
Habitat in Cayenna.

teſtaceum. 21. O. teſtaceus, oculis, thorace, elytris antennisque fuſcis, his baſi apiceque rufis, elytrorum baſi lunula magna teſtacea, thorace punctis duobus impreſſis. *Muſ. Lesk. p. 9. n. 178.*
Habitat in Europa, *ſtatura quadripuſtulati, elytris punctato ſtriatis.*

brunneum. 22. O. brunneum luteo ſericeum, elytris leviſſime punctato ſtriatis: maculis ſex luteis, antennis pedibusque luteſcentibus. *Muſ. Lesk. p. 10. n. 179.*
Habitat - - - -

TRITOMA. *Antennae* clavatae: clava perfoliata. *Palpi* anteriores ſecuriformes.

bipuſtulatum. 1. Tr. atrum elytris macula laterali coccinea. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 80. n. 1. mant. inſ. 1. p. 44. n. 1.*
Geoffr. inſ. par. 1. p. 335. n. 1. t. 6. f. 2. Tritoma?
Habitat in Angliae *boletis arboreis.*

glabrum. 2. Tr. glabrum atrum, antennis pedibusque piceis. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 45. n. 2.*
Habitat ſub Sueciae *arborum corticibus, ſtatura bipuſtulati.*

dubium. 3. Tr. nigrum, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 80. n. 3. mant. inſ. 1. p. 44. n. 3.*
Habitat Kilonii.

vittatum. 4. Tr. rufum, elytris nigris: vitta rufa. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 44. n. 4.*
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

Morio. 5. Tr. atrum holoſericeum, antennis pedibusque concoloribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 5.
Habitat Kilonii, *ſtatura dubii, at duplo major.*

ſericeum. 6. Tr. nigricans holoſericeum, pedibus teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 6.
Habitat in Germania, *ſtatura dubii, ſed major.*

collare. 7. Tr. nigrum, thoracis lateribus abdomineque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 7.
Habitat in nova Hollandia.

197. CASSIDA. *Antennae* moniliformes.
Elytra marginata.
Caput ſub thoracis clypeo plano reconditum.

viridis. 1. C. viridis. *Fn. ſuec.* 467. *It. oel.* 153. *Scop. ent. carn.* 117. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 313. *n.* 1. *Fabr. ſp. inſ. p.* 107. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 1.
Degeer inſ. 5. *p.* 174. *n.* 2. Caſſida cardui &c.
Goed. inſ. 1. *p.* 94. *t.* 43.
Blank. inſ. 89. *t.* 11. *f.* F.
Merian. europ. t. 115.
Volk. heſper. 1. *p.* 166. *f.* 4.
Raj. inſ. 107. *n.* 5.
Reaum. inſ. 3. *t.* 18.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 3. *p.* 13. *t.* 6.
Schaeff. el. t. 35.
icon. t. 27. *f.* 5.
Habitat in Europae *carduis et verticillatis frequens.*
Larva *hexapus depreſſa, ſpinis lateralibus acutis et cauda biſeta armata proprio ſtercore obvoluta obambulat.*

Murraea. 2. C. nigra, clypeo rubro, elytris ſanguineis: punctis nigris ſparſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 6. *mant.* 1. *p.* 62. *n.* 8.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 50. *n.* 5. *t.* 22. *f.* 29.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 314. *n.* 5. *β.* Caſſida rubra maculis rubris variegata.
Habitat in Europae *plantis, ſtatura viridis.* J. A. Murray.

atrata. 32. C. atra, clypeo anterius ſanguineo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 7.
Habitat in Auſtria, *ſtatura nebuloſae, at minor.*

nebuloſa. 3. C. pallido-nebuloſa, fuſco punctata. *Fn. ſuec.* 468.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 6.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 313. *n.* 2.
Raj. inſ. p. 88. *n.* 13.
Friſch inſ. 4. *p.* 30. *t.* 15.
Goed. inſ. 1. *p.* 96. *t.* 44.
Liſt. goed. 287. *t.* 117.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 3. *p.* 13. *t.* 6.
Schaeff. ic. t. 27. *f.* 4.
Habitat in Europae *carduis.*

nobilis. 4. C. griſea, elytris linea caerulea nitidiſſima. *Fn. ſuec.* 469. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 21.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 313. *n.* 3.
Raj. inſ. p. 107. *n.* 7.
Schaeff. ic. t. 96. *f.* 6.
Habitat in Europae *carduis, et plantis ſtellatis.*
Linea *elytrorum cum vita perit, in aqua calida reviviſcens.*

cribraria. 33. C. rufeſcens, thorace punctis quatuor, elytris muneroſis nigris, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 20.
Habitat in America.

deuſta. 34. C. rufeſcens, thorace punctis duobus elytris numeroſis cyaneo nigris, clypeo integro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 19.
Habitat in nova Hollandia.

octopunctata. 35. C. rufeſcens, thorace punctis duobus, elytris quatuor cyaneo nigris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 63. *n.* 18.
Habitat in Siam, *ſtatura et magnitudine deuſtae.*

interrupta. 36. C. flaveſcens, thorace immaculato elytris ante marginem punctisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 17.
Habitat in nova Hollandia.

ſexpunctata. 37. C. flaveſcens, coleoptrorum diſco ferrugineo: punctis ſex nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 16.
Habitat in Cayenna.

annulus. 38. C. flaveſcens, coleoptrorum diſco atro: annulo faſciaque poſteriore flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *ſtatura judaicae.*

judaica. 39. C. ferruginea, coleoptrorum diſco punctis impreſſis maculisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 14.
Habitat in Cayenna, *hebraea minor.*

hebraea. 40. C. pallida, coleoptris lineolis numeroſiſſimis difformibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 13.
Habitat in Cayenna, *parva, flaveſcens.*

cincta. 41. C. thorace elytrisque obſcuris: margine flaveſcente, elytris ante marginem macula albo-hyalina. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 12.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura interruptae.*

marginella. 42. C. viridis, thoracis elytrorumque marginibus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 11.
Habitat in Braſilia.

limbata. 43. C. capite thoraceque pubeſcentibus obſcure aeneis: margine pubeſcente. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 10.
Habitat Halae Saxonum *in diantho carthuſianorum, ſtatura et magnitudine ferrugineae.*

ferruginea. 44. C. nigra, thorace elytrisque ferrugineis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 9. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 50. *n.* 6. *t.* 22. *f.* 28.
Schranck Beytr. 62. 3. Caſſida ſubferruginea.
Habitat in Germania, *in* Calabria *viridi paulo minor.*

Vibex. 5. C. virens, ſutura dorſali ſanguinolenta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 5.
Habitat in Germaniae *plantis, viridi ſimilis, elytrorum tamen dorſo vireſcente.*

affinis. 45. C. elytris griſeis nigro-punctatis, thorace flaveſcente immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 4.
Habitat in Germania, *viridi valde affinis.*

maculata. 6. C. viridis, elytris rarius, ſutura dorſali confertius nigro maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 314. *t.* 5. *f.* 6. Caſſida viridis maculis nigris variegata.
Degeer inſ. 5. *p.* 175. *n.* 3. Caſſida ſupra viridis, ſubtus nigra &c.
Habitat in Germaniae *plantis, an varietas viridis?*

equeſtris. 46. C. viridis, elytrorum baſi argentea, abdomine atro: margine pallido. *Fabr. mant.* 1. *p.* 62. *n.* 2.
Habitat Halae Saxonum *in mentha aquatica, viridi major, pedibus flaveſcentibus.*

truncata. 47. C. rufa, elytris ſubreticulatis nigro-maculatis dorſo gibbis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 41.
Habitat - - - *magna.*

gibboſa. 48. C. atra, thorace maculis duabus villoſo-aureis, elytris vireſcenti-reticulatis: ſpina ſuturali obtuſa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 40.
Habitat in Braſilia, *magna.*

bidens. 49. C. atra, elytris anterius porrectis: ſpina ſuturali erecta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 39.
Habitat in Braſilia, *magna.*

ſpinifex. 7. C. ferruginea, elytris angulo anteriore ſpina porrecta, thorace utrinque ſpina transverſali. *Amoen. acad.* 6. *p.* 92. *n.* 7.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 38.
Habitat in India, *ad baſin elytrorum linea nigra notata.*

bicornis. 8. C. cyanea, elytris angulo anteriore ſpina truncata. *Amoen. acad.* 6. *p.* 393. *n.* 9.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 36.
Habitat in America *auſtrali et* India.

perforata. 50. C. teſtacea, elytris angulo anteriore ſpinoſo baſique perforatis. *Pall. ſpicil. zool.* 9. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 35.
Habitat in America *meridionali.*

51. C.

Caſſidarum *larvae plantarum folia ſubtus exedunt.*

margaritacea. 51. C. virens, elytris viridi-argenteis lucidis, capite pectoreque nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 259. *Fabr. mant.* 1. *p.* 63. *n.* 22.
Habitat Halae Saxonum *vere ſub lapidibus, nebuloſae proxime affinis, colore cum vita pereunte.*

faſtuoſa. 52. C. atra, elytris rubro-aeneis nigro maculatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 259.
Habitat rarior Halae Saxonum *in populo alba, nobili vix major, colore cum vita pereunte.*

fuſca. 53. C. ſpadicea, elytris ſtriis duabus elevatis. *Laichart. inſ. tyr.* 1. *n.* 4. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 51. *n.* 9.
Habitat in Germania, *viridi minor.*

cruciata. 9. C. pallida, elytris diſco fuſco-cruciato.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 110. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 23. Caſſida flaveſcens, coleoptris diſco nigro: maculis quatuor flaveſcentibus.
Degeer inſ. 5. *p.* 187. *n.* 12. *t.* 15. *f.* 15. Caſſida hyalina pallide flava &c.
Habitat in Europae *plantis.*

Crux. 54. C. flava, thoracis linea dorſali ferruginea, coleoptrorum diſco ferrugineo: maculis quatuor flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 119. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 24.
Habitat in Cayenna, *an vere a cruciata diverſa?*

11punctata. 55. C. flaveſcens, thoracis puncto medio, coleoptris undecim nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 25.
Habitat in America *meridionali, ſubtus dilute ferruginea.*

bifaſciata. 10. C. pallida, corpore faſciis duabus fuſcis.
Habitat in America *meridionali.*

flava. 11. C. flava immaculata, corpore teſtaceo, puncto ſcutellari nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 42.
Degeer inſ. 5. *p.* 184. *t.* 15. *f.* 13. Caſſida pallide flava immaculata &c.
Habitat in Europa *auſtrali.*

purpurea. 12. C. flava, ſupra corpus purpurea.
Habitat in America, *parva.*

13. C.

leucophaca. 13. C. teſtacea, margine punctis flavis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 392. *n.* 8. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 43.
Habitat in America.

tuberculata. 14. C. teſtacea, margine thoracis elytrorumque flavo, coleoptris baſi trituberculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 26.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 576. *n.* 14. Caſſida marginata.
Degeer inſ. 5. *p.* 186. *n.* 11. *t.* 15. *f.* 14. Caſſida cincta.
Habitat in Sierra Leon Africae.

ſuturalis. 56. C. brunnea, elytris flavis: ſuturis brunneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 27.
Habitat ad caput bonae ſpei.

biguttata. 57. C. thorace flavo, elytris rufeſcentibus: margine nigro; maculis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 28.
Habitat in Cayenna.

miliaris. 58. C. flava, thorace immaculato, elytris nigro-punctatis: margine bifaſciato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 29.
Habitat in inſula S. Helenae.

punctata. 59. C. nigra, clypeo brunneo, elytris flavis nigro-punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 30.
Habitat ad caput bonae ſpei, *miliaris magnitudine.*

reticularis. 15. C. flava, elytris caeruleo-variegatis: lateribus unifaſciatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 44.
Degeer inſ. 5. *p.* 188. *n.* 14. *t.* 15. *f.* 17. Caſſida pellucida albo-flaveſcens &c.
Habitat in America *meridionali, magna.*

variegata. 16. C. rufa, elytris caeruleo-variegatis: lateribus unifaſciatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 45.
Degeer inſ. 5. *p.* 178. *n.* 2. *t.* 15. *f.* 6. Caſſida fuſco-rubra &c.
Habitat in America, *magna.*

trifaſciata. 60. C. rufa, elytrorum lateribus trifaſciatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 46.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

annulata. 61. C. caerulea, thorace maculis duabus, elytris annulis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 47.
β) Caſſida ornata. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 50. *n.* 8. *t.* 22. *f.* 30.
Habitat in America *auſtrali et* India *magna.*

groſſa. 17. C. ſanguinea, elytris diſco punctis nigris ſparſis: margine lineis ramoſis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 48.
Schulze Naturf. 6. *p.* 89. *t.* 4. *f.* 1.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 1.
Degeer inſ. 5. *t.* 15. *f.* 5.
Habitat in America *meridionali, congenerum maxima.*

clathrata. 18. C. ferruginea, elytris margine omni, linea longitudinali et dimidiata transverſali nigris.
Habitat in India. De Geer.
Thorax *immaculatus;* elytra *latiſſima;* femina *lineis transverſis dimidiatis tribus diſtincta.*

7guttata. 19. C. nigra, coleoptris maculis ſeptem albis.
Habitat in India, *an varietas blattae Petiverianae?* Brünnich.

exclamationis. 20. C. flava, elytris lineis ternis nigris, intermedia ſignum ! referente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 49.
Habitat in America *meridionali, viridi paulo major, ſubtus livida.*

lineata. 62. C. cineraſcens, lineis elytrorum quatuor albidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 50.
Habitat ad caput bonae ſpei, *caſſidae exclamationis magnitudine et ſtatura.*

jamaicenſis. 21. C. luteo-aenea, elytris immaculatis excavato-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 34.
Sloan. jam. 2. *p.* 208. *t.* 233. *f.* 27. 28.
Habitat in America, *ad ſuturam anterius gibba, colorem in ſpiritu vini deperditum in aqua calida recuperans.*

dorſata. 63. C. thorace elytrisque obſcuris, elytris ſpina ſuturali margineque albicante: baſi obſcuro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 33.
Habitat in Siam, *ſtatura jamaicenſis, at duplo minor.*

quadripuſtulata. 64. C. thorace obſcuro, elytris ſanguineis: margine cyaneo; maculis duabus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 32.
Habitat in America, *mediae magnitudinis, atra.*

cyanea. 22. C. cyaneo-aenea, elytris immaculatis excavato-punctatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 39.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 37.
Petiv. gazoph. t. 57. *f.* 6.
Degeer inſ. 5. *p.* 181. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 9.
Habitat in America.

marginata. 23. C. elytris teſtaceis, corpore elytrorumque margine nigro, thorace aeneo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 31. *Schulze Naturf.* 9. *p.* 103. *t.* 2. *f.* 3.
Degeer inſ. 5. *p.* 185. *n.* 10. Caſſida thorace violaceo nigro &c.
Habitat in America *auſtrali et* India.

inaequalis. 24. C. ferrugineo-aenea, elytris macula flava ſubovata diſci. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 51. *Schulze Naturf.* 9. *t.* 2. *f.* 6. *Muſ. petrop.* 650. *n.* 130.
Degeer inſ. 5. *p.* 182. *n.* 6. *t.* 16. *f.* 2. Caſſida bimaculata &c.
Habitat in America *meridionali.*

ſuppoſita. 25. C. elytris nigris anterius annulatis: puncto centrali fulvo. *Lederm. microſc. t.* 28. *f.* F. g. *et t.* 44. *f.* b. c. d.
Habitat in America *calidiore.*

lateralis. 26. C. fuſco-aenea, elytris macula flava laterali. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 52.
Degeer inſ. 5. *p.* 184. *n.* 8. *t.* 15. *f.* 12. Caſſida fuſco-aenea &c.
Sulz. hiſt. inſ. 1. *t.* 3. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, inaequali duplo minor.*

diſcoides. 27. C. viridi-aenea, elytris macula didyma flava diſci. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 53.
Degeer inſ. 5. *p.* 183. *n.* 7. *t.* 15. *f.* 11. Caſſida quadrimaculata &c.
Habitat in America *meridionali.*

decuſſata. 28. C. nigro-caeruleſcens, elytris flavo-maculatis, maculis dorſalibus reticulatis, lateralibus diſtinctis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 57.
Habitat in Jamaica.

bipuncta-ta. 29. C. flaveſcens, elytris punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 58.
Habitat in India, *nebuloſae magnitudine et facie, elytrorum punctis interdum tribus.*

bipuſtu-lata. 30. C. viridis, elytris maculis duabus lateralibus ſanguineis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 392. *n.* 8. *Schulze Naturf.* 6. *p.* 91. *t.* 4. *f.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 54.
Habitat in Cayenna.

ſexpuſtu-lata. 65. C. cayanea, elytris maculis tribus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 55.
Habitat in Braſilia, *mediae magnitudinis.*

16puſtu-lata. 66. C. nigra, thorace punctis duobus, elytris ſeptem rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 56.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

anguſtata. 31. C. flaveſcens, elytris poſterius anguſtatis.
Habitat in India.

bituber-culata. 32. C. brunnea albo marginata, elytris nigro maculatis baſi unituberculatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Cayenna, *tuberculatae affinis, at duplo minor.*

Taurus. 33. C. atra, elytris angulo anteriore ſpina truncata. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 380.
Habitat in Cayenna, *ſtatura bicornis, at paulo minor.*

retifor-mis. 34. C. nigra thorace bimaculato, elytris flavis nigro-reticulatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna, *ſtatura tauri.*

palliata. 35. C. nigra, thorace villoſo vireſcente, elytris viridibus: margine lineaque media ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 370.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

cuprea. 36. C. ſupra cuprea, thoracis margine, elytrisque maculis duabus marginalibus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

rubigino-ſa. 37. C. ferruginea, thorace elytrisque fuſcis, punctatis: marginibus externis ciliatis. *Muſ. Leſk. p.* 12. *n.* 236.
Habitat in Europa.

nitens. 38. C. nigra, thorace elytrisque griſeis aureo nitentibus, pedibus lividis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 237.
Habitat - - -

ſuperba. 39. C. nigro, elytris punctatis clypeoque viridi-aureis, antennis abdomine pedibusque viridibus. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 238.
Habitat in Europa, *aureo nitore cum vita pereunte.*

ſanguinolenta. 40. C. aureo-flava, elytrorum annulo ovali tuberculoque ſuturali ſanguineis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 11.
Habitat in Rio Janeiro, *ſubtus pallida, magnitudinis mediae.*

arcuata. 41. C. albida, diſco communi nigro: limbo, annulo ovali arcuque poſterius flaviſſimis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 12.
Habitat in Rio Janeiro, *mediae magnitudinis, pectore et abdomine nigris.*

198. COCCINELLA. *Antennae* clavatae: clava ſolida.

Palpi anteriores ſecuriformes, poſteriores filiformes.

Corpus hemiſphaericum, thorace elytrisque marginatis, abdomine plano.

* *coleoptris rubris flaviſve: punctis nigris maculatis.*

marginata. 1. C. coleoptris flavis immaculatis: margine nigro, thoracis margine punctis duobus albis.
Coccinella coleoptris rubris: margine nigro, thorace utrinque puncto marginali albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 1.
Habitat in America, *mediae magnitudinis, nigra.*

immaculata. 155. C. coleoptris flaveſcentibus immaculatis, thoracis macula nigra: punctis duobus albis. *Muſ. Lesk. p.* 11. *n.* 211.
Habitat in Suecia.

marginella. 6. C. coleoptris obſcure teſtaceis: margine flavo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 3.
Habitat in America, *magna.*

limbata. 50. C. atra, coleoptrorum diſco rubro: punctis duobus atris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 497. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 2.
Habitat Hamburgi, *mediae magnitudinis.*

ſurinamenſis. 2. C. coleoptris rubris immaculatis, thorace, capiteque nigris. *Amoen. acad.* 6. *p.* 393. *n.* 12.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 4.
Habitat in America *meridionali.*

ſanguinea. 3. C. coleoptris ſanguineis immaculatis, thorace maculis nigris. *Amoen. acad.* 6. *p.* 393. *n.* 11.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 5.
Habitat in America *meridionali, parva, ſubtus atra.*

impunctata. 4. C. coleoptris rubris: puncto nullo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 6.
Habitat in Sueciae *hortis, minor.*

livida. 51. C. coleoptris rubris impunctatis, ſcutello nigro, thorace maculis quinque nigris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 42. *n.* 1. *t.* 22. *f.* 1. a.
Habitat Berolini, *ſupra ex luteo pallide fuſceſcens, ſubtus fuſca.*

Colon. 52. C. coleoptris rubris: puncto nigro, ſcutello maculaque thoracis obſolete nigris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 42. *n.* 2. *t.* 22. *f.* 1. b.
Habitat Berolini, *magnitudine et colore ad lividum accedens.*

fimbriata. 53. C. elytris flavis immaculatis: margine nigro, thoracis margine poſteriori punctis quatuor nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 11. *f.* 10.
Habitat - - - *magnitudine quinquepunctatae.*

minuta. 54. C. elytris rubris thoraceque immaculatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 11.
Habitat in India, *minima.*

dimidiata. 55. C. coleoptris ſanguineis apice atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 7.
Habitat in Coromandel, *magna.*

albida. 56. C. coleoptris flavis: margine albido; punctis utrinque duobus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 8.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 260. Coccinella margine punctata.
Habitat Halae Saxonum, *magna.*

Lineola. 57. C. elytris rubris: lineola baſeos apicisque nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 9.
Habitat in nova Hollandia.

unifaſciata. 58. C. coleoptris rubris: faſcia media atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 10.
Habitat Hamburgi, *punctis duobus capitis thoracisque margine albis varians.*

annulata. 5. C. coleoptris rubris: macula ſublunari nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 11.
Habitat in Germania, *nigra, mediae magnitudinis.* D. Schreber.
Thorax *marginibus lateralibus pallidus;* elytra *ſanguinea; faſcia media nigra, alteraque poſteriore, exterius cum priore connexa.*

trinotata. 59. C. elytris rubris hirtis: punctis tribus nigris, capite rubro. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 11. *f.* 11.
Habitat ad caput bonae ſpei, *congenerum minima.*

trilineata. 60. C. coleoptris flavis: lineis tribus abbreviatis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 12.
Habitat in America, *parva, atra.*

ſexlineata. 61. C. coleoptris flavis: lineis ſex punctisque tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 54. *n.* 15.
Habitat in Sibiria, *magna, nigra.*

moſcovica. 62. C. coleoptris flavis: lineis quatuor abbreviatis punctis ſex atris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 54. *n.* 13.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali, magna.*

abbreviata. 63. C. coleoptris rubris: faſcia poſteriore abbreviata punctisque duobus nigris, thorace atro: lineis duabus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 54. *n.* 14.
Habitat in America *boreali, oblonga, atra.* Blagden.

bipuncta- 7. C. coleoptris rubris: punctis nigris duobus. *Fn. ſuec.* 471.*
ta. *Scop. ent. carn.* 234. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 54. *n.* 16.
Petiv. gazoph. 34. *t.* 21. *f.* 4.
Merian. inſ. 69. *t.* 136.
Raj. inſ. 86. *n.* 2.
Liſt. loq. 383. *n.* 8.
Bradl. natur. t. 27. *f.* 4.
Reaum. inſ. 3. *t.* 31. *f.* 16.
Friſch inſ. 9. *p.* 33. *t.* 16. *f.* 4.
Sulz. inſ. hiſt. t. 3. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 9.
Stroem act. Nidroſ. 3. *t.* 6. *f.* 2.
Degeer inſ. 5. *p.* 389. *n.* 2.
Habitat in Europae *hortis et ſilvis frequens, victitans aphidibus.*

tripun- 8. C. coleoptris rubris: punctis nigris tribus. *Fn. ſuec.* 472.*
ctata. *Fabr. mant.* 1. *p.* 54. *n.* 17.
Habitat in Germania, *ſtatura ſeptempunctatae.*

quadri- 9. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuor. *Fabr. ſp. inſ.* 1.
punctata. *p.* 95. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 28.
Habitat in Europa, *mediae magnitudinis, ſubtus nigra.*
Thorax *flavus: punctis quatuor nigris;* pedes *flavi.*

hebraea. 10. C. coleoptris luteis: maculis luteis ſex longitudinalibus difformibus. *Fn. ſuec.* 473.*
Habitat in Europa.

quadrino- 64. C. coleoptris rubris: punctis quatuor baſeos nigris, tho-
tata. racis marginibus albidis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 56. *n.* 29.
Habitat Kilonii.

quadri- 65. C. coleoptris rubris: punctis quatuor nigris, thorace atro:
maculata. macula marginali alba. *Fabr. mant.* 1. *p.* 56. *n.* 30.
Habitat Halae Saxonum, *nigra.*

quinque- 11. C. coleoptris ſanguineis: punctis nigris quinque. *Fn.*
punctata. *ſuec.* 474.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 31.
Degeer inſ. 5. *p.* 370. *n.* 7.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 8.
Merian. europ. t. 69.
Habitat in Europae *arboribus.*

quinque-maculata. 66. C. oblonga, coleoptris flaveſcentibus: punctis nigris quinque, thorace atro: margine anteriore triradiato albo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 56. *n.* 32.
Habitat Halae Saxonum.

ſexpunctata. 12. C. coleoptris fulvis: punctis nigris ſex. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 33.
Habitat in Europae *hortis, parva, atra, thoracis margine punctisque duobus albis.*

glacialis. 67. C. coleoptris rubris: punctis ſex nigris; intermediis majoribus ſinuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 34.
Habitat in America *boreali.*

ſexmaculata. 68. C. coleoptris rubris: punctis ſex nigris: anterioribus quatuor transverſis ſinuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 35.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 262. Coccinella (undulata) coleoptris rufis: faſciis binis interruptis undulatis nigris, poſtice puncto unico.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 7. *p.* 160. *t.* 43. *f.* 12.
Habitat in India, *mediae magnitudinis, pallide flaveſcens.*

ſexnotata. 69. C. elytris flavis: arcubus quatuor punctisque duobus nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 9. *n.* 15. *t.* 1. *f.* 2.
Habitat in Suecia, *thorace flavo punctis* 5 *nigris contiguis variis, bipunctatae magnitudine.*

trifaſciata. 13. C. coleoptris rubris, faſciis nigris tribus. *Fn. ſuec.* 475.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 26.
Raj. inſ. p. 87. *n.* 9. Scarabaeus hemiſphaericus minor &c.
Habitat in Europae *hortis.*

bifaſciata. 70. C. coleoptris ferrugineis: faſciis duabus punctisque quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 27.
Thunb. nov. inſ. ſpec. 1. *f.* 24. Coccinella flexuoſa.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magna nigra, capite, thorace pedibusque ferrugineis.*

71. C.

Species diverſas conjunctas vidi, ut bipunctatam cum ſexpuſtulata; ipſae species maculis interdum variant, unde incautis plures numerantur, niſi rationem thoracis habeas.

inaequalis. 71. C. coleoptris flavis: punctis anterioribus tribus ſutura faſciaque apicis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 25.
Habitat in nova Hollandia.

cingulata. 72. C. coleoptris luteis: punctis quatuor baſeos faſcia poſteriore punctoque apicis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 24.
Habitat Tranquebariae, *magna, nigra, capite, thorace pedibusque flavis.*

flexuoſa. 73. C. ovata, coleoptris luteis: faſcia flexuoſa punctisque duobus nigris, thoracis margine albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 23.
Habitat Hamburgi.

undata. 74. C. oblonga, coleoptris luteis: faſcia flexuoſa punctisque duobus nigris, thorace flavo punctato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 22.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magna, atra.*

arcuata. 75. C. ovata, coleoptris rubris: punctis quatuor, faſciis duabus punctoque apicis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 21.
Habitat in Sina, *mediae magnitudinis, nigra, capite albido.*

tricincta. 76. C. ovata, coleoptris rubris: faſciis tribus atris; anteriore abbreviata tricuſpidata. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 20.
Habitat in Sina, *mediae magnitudinis, nigra.*

rivularis. 77. C. coleoptris luteis: faſciis duabus dorſalibus ſinuatis punctisque ſex nigris, thorace atro flavo-bipunctato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 54. *n.* 19.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis.*

hieroglyphica. 14. C. coleoptris luteis: maculis duabus nigris longitudinalibus ſinuatis. *Fn. ſuec.* 476.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 54. *n.* 18.
Degeer inſ. 4. *p.* 382. *n.* 15. Coccinella coleoptris flavo-rubris &c.
Sulzer hiſt. inſ. t. 3. *f.* 4.
Habitat in Europae *hortis, affinis decempuſtulatae.*

ſeptempunctata. 15. C. coleoptris rubris: punctis nigris ſeptem. *Fn. ſuec.* 477.*
Scop. ent. carn. 235. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 321. *t.* 6. *f.* 1.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 96. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 36.
Friſch

Friſch inſ. 4. p. 1. t. 1. f. 4.
Petiv. gaz. 33. t. 21. f. 3.
Goed. inſ 2. p. 58. t. 18.
Raj. inſ. 86. n. 1.
Merian. europ. 24. f. 11.
Albin. inſ. 61. f. C.
Roeſ. inſ. 2. ſcar. 3. p. 7. t. 2.
Reaum. inſ. 3. t. 31. f. 18.
Bradl. nat. t. 27. f. 4.
Liſt. ſc. angl. 382. n. 7.
Ammir. inſ. t. 14.
Sulz. inſ. t. 3. f. 13.
Hollar t. 4. f. 8.
Degeer inſ. 5. p. 370. n. 4. t. 10. f. 14.
Schaeff. ic. t. 9. f. 7.
Habitat in Europae *plantis frequens.*
Elytrorum *puncta in triangulum poſita.*

ſeptem-maculata. 78. C. oblonga, coleoptris rubris: punctis nigris ſeptem; communi trilobo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 37.
Habitat in Germania.
Thorax *ater, margine albus.*

octopunctata. 79. C. coleoptris rubris: punctis nigris octo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 38.
Habitat in Germania, *an varietas ſexpunctatae?*

transverſalis. 80. C. coleoptris luteis: maculis octo nigris; anterioribus quatuor transverſis ſinuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 39.
Habitat in Coromandel, *mediae magnitudinis, nigra.*

octomaculata. 81. C. coleoptris luteis: punctis nigris octo; anterioribus ſex transverſis ſinuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 40.
Habitat - - - magna, nigra, capite et thorace luteis.

novem-maculata. 82. C. coleoptris rubris: punctis novem nigris; poſteriori communi, thorace bipunctato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 41.
Fabr. ſyſt. ent. p. 81. *n.* 15. Coccinella novempunctata.
Habitat in nova Hollandia.

16. C.

Coccinellarum *larvae aphides conſumunt, eoque plantas a phthiriaſi hac purgant.*

novem-punctata. 16. C. coleoptris rubris: punctis nigris novem. *Fn. ſuec.* 478.* *Scop. ent. carn.* 236. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 42.

Uddm. diſſ. 14. Coccinella nigra, elytris rubris, punctis novem nigris.

Fabr. ſyſt. ent. p. 81. *n.* 16. Coccinella decempunctata.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 322. *n.* 4.

Degeer inſ. 5. *p.* 373. *n.* 6.

β) Coccinella coleoptris rufeſcentibus: punctis 1. 2. 1. cum puncto communi ad ſcutellum, thorace albido: macula ſcutiformi nigra: punctis duobus albis, capite poſterius faſcia nigra. *Muſ. Lesk. p.* 10. *n.* 193.

Habitat in Europae *hortis et juniperetis.*

decem-punctata. 17. C. coleoptris fulvis: punctis nigris decem. *Fn. ſuec.* 479.* *Scop. ent. carn.* 237. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 43.

Degeer inſ. 5. *p.* 374. *n.* 7.

β) Coccinella coleoptris flavo rufeſcentibus: punctis 1. 3. 1. thorace maculis 4 punctisque interpoſitis 3 nigris. *Muſ. Lesk. p.* 11. *n.* 195.

Habitat in Europae *plantis.* Thorax *maculis quatuor.*

decem-maculata. 83. C. oblonga, elytris fulvis: punctis nigris decem; duobus communibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 44.

Habitat in America *boreali, atra, ſtatura tredecimpunctatae.*

dilatata. 84. C. ſubrotunda, coleoptris marginatis fulvis: punctis nigris decem, thorace bipunctato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 45.

Habitat in America.

11puncta-ta. 18. C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim. *Fn. ſuec.* 480.* *Ström act. nidr.* 3. *p.* 388. *t.* 6. *f.* 2. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 325. *n.* 9. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 46.

Merian. europ. 168.

Degeer inſ. 5. *p.* 375. *n.* 8.

β) C. thorace albo: punctis quinque ſeptemve nigris, coleoptris rubicundis; punctis 11, aliis 6, aliis 4 nigris. *Muſ. Lesk. p.* 10. *n.* 181.

γ) C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim 1. 3. 1. una cum communi ad ſcutellum, thorace flaveſcente: guttis 5 nigris et utrinque punctulo nigro. *Muſ. Lesk. p.* 11. *n.* 194.

Habitat in Europa *boreali.*

11maculata. 85. C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim, corpore ferrugineo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 47. *Schaeff. ic. t.* 254. *f.* 3. a. 3. b?

Habitat in Hiſpania, 11*punctata duplo major.*

11punctata. 19. C. coleoptris flavis: punctis nigris ſex; extimo lineari repando. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 48.

Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 45. *n.* 13. *t.* 22. *f.* 8. h?

Habitat in Europa, *minuta, flava, ſubtus nigra.*

variegata. 86. C. coleoptris flavis: punctis nigris duodecim faſciaque media nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 49.

Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis, flava.*

chryſomelina. 87. C. coleoptris rufis: punctis nigris duodecim, thorace immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 50.

Thunb. nov. ſp. inſ. 1. *p.* 16. *f.* 21.

Habitat in cacto opuntia Africae, *et in* Calabria, *ovata, gibba, oculatae magnitudine.*

borealis. 88. C. coleoptris flavis: punctis nigris duodecim; duobus communibus, ultimis orbiculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 51.

Thunb. nov. inſ. ſpec. 1. *p.* 15. *f.* 20. Coccinella elytris rufis: punctis duodecim nigris, thorace quadripunctato.

Habitat ad caput bonae ſpei, *gibba, ſubtus lutea, ocellatae magnitudine.*

caſſidea. 89. C. oblonga rubra, coleoptris punctis duodecim, thorace quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 52.

Habitat in America *boreali.*

13maculata. 90. C. coleoptris flavis: punctis nigris tredecim, corpore orbiculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 53.

Forſter

Forſter nov. inſ. ſp. cent. 1. *p.* 18. *n.* 18. Coccinella coleoptris luteis: punctis nigris tredecim, thorace albo nigro-punctato.
Habitat in Europa *boreali.*

13notata. 91. C. elytris flavis; punctis nigris tredecim thorace luteo: punctis ſeptem nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 10. *n.* 16. *t.* 1. *f.* 4.
Habitat in Europa, *bipunctatae magnitudine, flava, antennis rubris.*

13punctata. 20. C. coleoptris luteis: punctis nigris tredecim, corpore oblongo. *Fn. ſuec.* 481. *Scop. ent. carn.* 238. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 323. *n.* 6. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 54.
Degeer inſ. 5. *p.* 375. *n.* 9.
Reaumur inſ. 3. *t.* 31. *f.* 79.
Schaeff. ic. t. 48. *f.* 6.
β) Coccinella oblonga. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 43. *n.* 7. *t.* 22. *f.* 4. d.
Habitat in Europa *frequens.*

urſicolor. 92. C. coleoptris flavis: punctis quatuordecim nigris; duobus communibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 55.
Habitat in Sina, *orbiculata, gigantea, flava, olivacea aut nigra.*

14punctata. 21. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim; quibusdam contiguis. *Fn. ſuec.* 482. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 56.
Scop. ent. carn. 243. Coccinella teſſulata.
Schaeff. ic. t. 62. *f.* 6.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *t.* 22. *f.* 5. e.
Habitat in Europae *hortis, frequens.*

14maculata. 93. C. coleoptris luteis: ſutura punctisque quatuordecim nigris diſtinctis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 57.
Habitat Halae Saxonum, 14*punctata major, thorace nigro-punctato et capite albis.*

16punctata. 22. C. coleoptris flavis: punctis nigris ſedecim. *Fn. ſuec.* 483.* *Scop. ent. carn.* 240. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 59. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 44. *n.* 11. *t.* 22. *f.* 6. f.

Habitat

Habitat in Italia, *et* Germania *major, oblonga, albida, capite quadripunctato.*

16macu-lata. 94. C. coleoptris rubris: punctis nigris ſedecim, capite immaculato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 60.

Habitat Halae Saxonum, *majuſcula, oblonga.*

oculata. 95. C. elytris rubris: punctis novem nigris, circulo flavo circum oculos. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 14. *f.* 18.

Habitat ad caput bonae ſpei, *atra, magnitudine ſeptempunctatae.*

ocellata. 23. C. coleoptris luteis: punctis nigris quindecim ſubocellatis. *Fn. ſuec.* 484.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 58.

Gadd ſat. 26. Coccinella elytris flavo-luteis, punctis quindecim nigris ocello flavo cinctis.

Degeer inſ. 5. *p.* 376. *n.* 10. *t.* 11. *f.* 1.

Merian. inſ. eur. 48. *f.* 5.

Sulz. inſ. t. 13. *f.* 14.

Schaeff. ic. t. 1. *f.* 2.

elem. t. 47. *f.* 1.

Habitat in Europae *hortis, congeneribus plurimis major.*

18puncta-ta. 24. C. coleoptris flavis: punctis nigris octodecim, ultimo arcuato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 61. *Muſ. Lesk. p.* 10. *n.* 184.

Coccinella gemella. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 44. *n.* 12. *t.* 22. *f.* 7. g.

Habitat in Europa *boreali, thoracis lateribus flavis.*

19puncta-ta. 25. C. coleoptris flavis: punctis nigris novendecim. *Fn. ſuec.* 485. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 325. *n.* 10. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 62.

Müll. prodr. zool. dan. p. 67. *n.* 632. Coccinella lutea &c.

Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 45. *n.* 14. *t.* 22. *f.* 9. l.

Habitat in Europae *plantis.*

20puncta-ta. 96. C. coleoptris flavis: punctis nigris viginti. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 329. *n.* 17. *Scop. ent. carn.* 242. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 63.

Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *par. t.* 22. *f.* 10. k.

Habitat rarior in Europa.

26. C.

22puncta-ta. 26. C. coleoptris flavis: punctis nigris viginti duobus. *Fn. ſuec.* 486. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 64.
Degeer inſ. 5. *p.* 379. *n.* 12.
Raj. inſ. p. 87. *n.* 6.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 10.
Habitat in Europae *hortis, parva.*

23puncta-ta. 27. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti tribus diſtinctis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 65.
Habitat in Europae *plantis, parva, rubra, ſubtus rufa.*

24puncta-ta. 28. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quatuor. *Fn. ſuec.* 487. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 326. *n.* 11. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 66. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 45. *n.* 16. *t.* 22. *f.* 11. l.
Degeer inſ. 5. *p.* 381. *n.* 14. Coccinella coleoptris rufo-fuſcis &c.
Habitat in Europae *hortis.*

25puncta-ta. 29. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quinque. *Fn. ſuec.* 488.
Habitat in Europa.
Puncta *quadrata, paſſim ovalita.*

28puncta-ta. 97. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti octo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 67.
Habitat Tranquebariae.

conglo-bata. 30. C. coleoptris rubris: punctis nigris plurimis ſubcontiguis. *Fn. ſuec.* 489.*
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 326. *n.* 12.
Degeer inſ. 5. *p.* 378. *n.* 11. Coccinella roſea.
Friſch inſ. 9. *p.* 34. *t.* 17. *f.* 6.
Habitat in Europa, *an mera conglomeratae varietas?*

conglo-merata. 31. C. coleoptris flaveſcentibus: punctis nigris plurimis contiguis. *Fn. ſuec.* 490.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 68.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 316. *n.* 12.
Degeer inſ. 5. *p.* 383. *n.* 17.
Raj. inſ. p. 87. *t.* 5.
Liſt. loq. p. 383. *n.* 9.
Friſch inſ. 9. 34. *t.* 17. *f.* 4. 5.
Schaeff. ic. t. 171. *f.* 1. a. b.

Herbſt

Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *t.* 22. *f.* 14. 15?
Habitat in Europae *hortis frequens.*

tricolor. 98. C. coleoptris flavis: punctis decem rubris, maculisque decem atris marginalibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 69.
Habitat in inſula Amſterdam *maris auſtralis.*

detrita. 99. C. flava, coleoptris immaculatis, thorace albo maculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 70.
Habitat in nova Hollandia.

japonica. 100. C. elytris flavis, cruce ſuturae duplici maculisque quatuor nigris. *Thunb. nov. inſ. ſpec.* 1. *p.* 12. *f.* 12.
Habitat in Japonia, *magnitudine hieroglyphicae.*

grandis. 101. C. elytris flavis: punctis nigris tredecim thorace nigro: marginibus flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 12. *f.* 13.
Habitat in Sina, *coccinellarum maxima.*

gibba. 102. C. elytris rubris, faſcia punctisque ſex nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 13. *f.* 14.
Habitat ad caput bonae ſpei, *tenuiſſime hirta, rubra, pectore nigro, magnitudine ſeptempunctatae.*

capenſis. 103. C. elytris rubris: punctis octo nigris, thorace immaculato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 13. *f.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei, *rubra, magnitudine ſeptempunctatae.*

Pſi. 104. C. elytris flavis: margine exteriore maculis quatuor nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 13. *f.* 16.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine fere ſeptempunctatae, flavicans, pectore nigro.*

iridea. 105. C. elytris rubris: punctis novem nigris ocellaribus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 14. *f.* 17.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glabra, rubra, magnitudine fere ſeptempunctatae.*

ſimilis. 106. C. elytris rubris: faſciis duabus punctisque quatuor nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 15. *f.* 19.
Habitat - - magnitudine ſeptempunctatae, ſupra pilis breviſſimis cinereis hirta, ſubtus nigra.

puſilla. 107. C. elytris flavis: punctis octo nigris quadrifariis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 16. *f.* 22.
Habitat - - - flaveſcens, glabra, pulice vix major.

diſtincta. 108. C. elytris rubris: punctis ſedecim nigris diſtinctis. *Thunb. nov. inſ. ſp. 1. p. 17. f. 23.*

Habitat ad caput bonae ſpei, *nigra*, *ſupra pilis minimis cinereis adſperſa*, *quinquepunctatae magnitudine.*

repanda. 109. C. elytris flavis: faſciis tribus undatis nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp. 1. p. 18. f. 25.*

Habitat ad caput bonae ſpei, *glabra*, *nigra*, *ſeptempunctatae magnitudine.*

flavicollis. 110. C. elytris ſanguineis: punctis decem nigris, thorace flavo. *Thunb. nov. inſ. ſp. 1. p. 18. f. 26.*

Habitat ad caput bonae ſpei, *flavicans*, *pilis tenuiſſimis hirta*, *ſeptempunctatae magnitudine.*

undulata. 111. C. elytris rubris: faſciis undatis dentatisque variis nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp. 1. p. 18. f. 27.*

Habitat ad caput bonae ſpei, *ſeptempuſtulatae magnitudine, ſupra pilis breviſſimis cinereis hirſuta flaveſcens*, *ſubtus nigra.*

lunaris. 112. C. elytris flavis: faſciis duabus, arcu punctisque quinque nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp. 1. p. 19. f. 28.*

Habitat ad caput bonae ſpei, *ſeptempunctatae fere magnitudine*, *glabra*, *nigra.*

Crux. 113. C. elytris flavis: lineis duabus cruceque nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp. 1. p. 20. f. 29.*

Habitat ad caput bonae ſpei, *ſubtus nigra.*

Comma. 114. C. elytris flavis: ſutura, margine lineaque nigris. *Thunb. nov. ſp. inſ. 1. p. 20. f. 30.*

Habitat ad caput bonae ſpei, *quinquepunctatae magnitudine, ſupra flava.*

lineata. 115. C. elytris rubris: margine omni maculisque duabus oblongis nigris. *Thunb. nov. ſp. inſ. 1. p. 21. f. 31.*

Habitat ad caput bonae ſpei, *glabra*, *quinquepunctatae magnitudine*, *flava*, *abdomine femoribusque nigris.*

octoguttata. 116. C. elytris rubris: maculis octo flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp. 1. p. 24. f. 37.*

Habitat in Japonia, *ocellata paulo major*, *glabra*, *rubra.*

variabilis. 117. C. elytris rubris: maculis undecim nigris, thoracis quatuor cordatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 42. *n.* 6. *t.* 22. *f.* 3. c.

Habitat Berolini, *bipunctata paulo major, magis oblonga, macularum punctorumque numero varians.*

centum-punctata. 118. C. elytris fulvis: punctis nigris plurimis; multis confluentibus. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 45. *n.* 17. *t.* 22. *f.* 13.

Habitat in India, *ſeptem lineas longa.*

quadrilineata. 119. C. elytris flavis: lineis tribus longitudinalibus transverſaque maculisque duabus confluentibus nigris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 46. *n.* 18. *t.* 22. *f.* 12. m.

Habitat - - - *oblonga, nigra.*

ſparſa. 120. C. elytris ſpadiceis: punctis viginti quatuor nigris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 160. *n.* 37. *t.* 43. *f.* 11.

Habitat in India, *ſeptempunctatae magnitudine, pilis albicantibus hirſuta, ſpadicea.*

Punctum. 121. C. elytris fulvis immaculatis, thoracis macula media anguloſa nigra. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 161. *n.* 40. *t.* 43. *f.* 14. g. h.

Habitat - - - 1½ *lineas longa, capite nigro, thorace fulvo.*

** *coleoptris rubris flavisve, albo-maculatis.*

bimaculoſa. 122. C. elytris fulvis: lituris duabus obſoletis albis ſemilunaribus. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 160. *n.* 39. *t.* 43. *f.* 13. e. f.

punctato-guttata. 32. C. coleoptris rubris: punctis albis quatuordecim, nigris tribus. *Fn. ſuec.* 491.*

Habitat in Europa, *an ſolo ſexu a decempuſtulata diſtincta?*

biguttata. 123. C. coleoptris rufis: punctis duobus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 72.

Habitat - - - *parva, thorace glabro atro, margine laterali flavo.*

camtſchatcenſis. 124. C. coleoptris obſcure rufis: punctis octo albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 71.

Habitat in Camtſchatca, *mediae magnitudinis, atra.*

10guttata. 33. C. coleoptris luteis: punctis albis decem. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 73. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 47. *n.* 20. *t.* 22. *f.* 16. p. g.
β) Coccinella 10guttata minor, coleoptris rubris, puncto anteriori marginali lunato. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 263.
Habitat in Sueciae *hortis, minor.* Fabricius.

12guttata. 125. C. coleoptris ex luteo fuſcis: punctis albis 12. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 47. *n.* 26. *t.* 22. *f.* 10. v.
β) *Schranck enum. inſ. Auſtr. p.* 61. *n.* 111.
γ) C. coleoptris flavo rufeſcentibus: guttis ſex albis 1. 2. 2. 1. *Muſ. Lesk. p.* 11. *n.* 210.
Habitat - - - -

biſſeptemguttata. 126. C. coleoptris luteis: punctis quatuordecim albis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 265.
Habitat - - - *citrea,* 16*guttatae ſtatura et magnitudine.*

14guttata. 34. C. coleoptris rufis: punctis quatuordecim albis. *Fn. ſuec.* 492.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 327. *n.* 13. *Scop. ent. carn.* 248. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 74.
Raj. inſ. p. 86. *n.* 3.
Liſt. loq. 383. *n.* 10.
Degeer inſ. 5. *p.* 385. *n.* 20.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 11.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 47. *n.* 21. *t.* 22. *f.* 17. r.
Habitat in Europae *ſalicibus, ex teſtaceo lutea, capite nigro.*

cayennenſis. 156. C. coleoptris fulvis: punctis duodecim lunulisque utrinque duabus connatis albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna, *rufa, mediae magnitudinis.*

15guttata. 127. C. coleoptris luteis: punctis quindecim albis; communi medio obſoleto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 75.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 327. *n.* 14.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 47. *n.* 22. *t.* 22. *f.* 18. ſ.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

16guttata. 35. C. coleoptris luteis: punctis albis ſedecim. *Fn. ſuec.* 493. *Scop. ent. carn.* 249. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 76.
Degeer inſ. 5. *p.* 385. *n.* 21.

 Sulz.

Sulz. hiſt. inſ. t. 3. f. 5.
Herbſt apud Fueſſii arch. inſ. 7. p. 161. *n.* 42. *t.* 43. *f.* 16. l. m.
Habitat in Europa.

18gutta-ta. 36. C. coleoptris rubris: punctis albis octodecim. *Fn. ſuec.* 494. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 77. *Scop. ent. carn.* 241.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 12.
β) Coccinella ornata. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4 *p.* 47. *n.* 23. *t.* 22. *f.* 19. t.

20gutta-ta. 37. C. coleoptris rubris: punctis albis viginti. *Fn. ſuec.* 495. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 78. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 47. *n.* 24. *t.* 22. *f.* 20. u.

oblongo-guttata. 38. C. coleoptris rubris; lineis punctisque albis. *Fn. ſuec.* 496. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 79. *Scop. ent. carn.* 242.
Degeer inſ. 5. *p.* 384. *n.* 19.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 10.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 9. *f.* 6.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 14.
Habitat rarior in Europae *hortis.*

oblitera-ta. 39. C. coleoptris flavis: punctis quatuor rufis; anterioribus obſoletis. *Fn. ſuec.* 497.*
Habitat in Europa.

pallida. 128. C. elytris flavis: lineis quatuor fuſcis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 9. *n.* 14. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat Upſaliae, *flava, bipunctatae magnitudine.*

**** Coleoptris nigris: rubro maculatis.*

impuſtu-lata. 40. C. coleoptris nigris: puncto nullo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 58. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 80.
Habitat in Germaniae *nemoribus, ſtatura quadripuſtulatae, tota atra, thoracis lateribus flavis: puncto nigro.*

analis. 129. C. coleoptris atris apice rubris immaculatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 81.
Habitat Halae Saxonum, *haemorrhoidali affinis, at duplo minor.*

haemor-rhoidalis. 130. C. coleoptris atris apice rubris: faſcia nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 59. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 82.

Habitat

Habitat Hamburgi, *frequenter punſto ſanguineo communi in dorſo notata.*

flavipes. 131. C. elytris nigris, thorace nigro: maculis duabus flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 21.

Habitat ad caput bonae ſpei, *bipuſtulatae magnitudine, impuſtulatae affinis, at punctum nigrum nullum ad latera thoracis.*

Cacti. 41. C. coleoptris atris: maculis duabus rubris.† *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 83.

Gron. zooph. 609. Coccinella coleoptris marginatis nitidis atris, macula ſolitaria ſubrotunda utrinque.

Merian. ſurin. p. 2. *t.* 2. *f.* ſumma.

Pet. gaz. t. 1. *f.* 5.

Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 31-33. *et t.* 9. *f.* 13.

Habitat in Americae *cactis, ſaepius inter coccos cacti lecta, bipuſtulatae ſimilis.*

bipuſtulata. 42. C. coleoptris nigris: punctis rubris duobus, abdomine ſanguineo. *Fn. ſuec.* 498.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 61. *mant.* 1. *p.* 60. *n.* 84. *Laichart. inſ. tir.* 1. *p.* 134.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 334. *n.* 26.

Degeer inſ. 5. *p.* 387. *n.* 27. *t.* 10. *f.* 25.

Friſch inſ. 9. *p.* 34. *t.* 16. *f.* 6.

Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 3. *p.* 10. *t.* 3.

β) *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 48. *n.* 27. *t.* 22. *f.* 22. w.

Habitat in Europae *hortis frequens, etiam in* America *ſeptentrionali.*

Elytrorum *ſingula puncta e tribus conflata.*

mutabilis. 132. C. coleoptris nigris, punctis duobus rubris orbiculatis ſubmarginalibus, corpore oblongo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 62. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 85.

Habitat Hamburgi.

Elytra *junioribus luteſcentia; puncto flaveſcente.*

frontalis. 133. C. coleoptris nigris: punctis duobus rubris, fronte pedibusque anterioribus rubris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 86.

Habitat Halae Saxonum; *capite interdum nigro, punctisque elytrorum quatuor.*

tripuſtulata. 157. C. coleoptris nigris: baſi macula magna lutea, medio puſtulis duabus apiceque unica rubra. *Lesk. muſ. p.* 12. *n.* 215.
Habitat in Europa.

lunulata. 158. C. coleoptris nigris margine reflexis: puncto medio baſeosque lunula media rubris. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 317.
Habitat - - -

limbata. 159. C. coleoptris nigris: lunula ad marginem baſeos exteriorem rubra thorace nigro: margine albo. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 219.

leucocephala. 160. C. nigra, thorace anterius, capite, punctisque elytrorum ſeptem albis. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 223.
Habitat - - - macula capitis trigona nigra, punctis elytrorum tribus ad marginem externum poſitis margine connexis.

nigra. 161. C. nigra, elytris ſingulis poſterius gutta rubra notatis. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 224.

ruficauda. 162. C. rubra, elytris nigris apice rubris. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 225.
Habitat in Europa.

bifaſciata. 163. C. nigra, thoracis margine externo elytrisque flavis: faſcia media longitudinali et communi ſuturae nigrae. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 226.
Habitat in America.

quadripuſtulata. 43. C. coleoptris nigris: punctis rubris quatuor: interioribus longioribus. *Fn. ſuec.* 449.* *Scop. ent. carn.* 244. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 63. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 87.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 333. *n.* 25.
Degeer inſ. 5. *p.* 389. *n.* 24.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 9. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 16. 17.
Habitat in Europae *hortis, aliquando cum bipunctata copula conjuncta.*

erythrocephala. 134. C. coleoptris atris: punctis rubris ſex, capite thoracisque margine pallide rufeſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 88. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 220.
Habitat Kilonii, *ſexpuſtulata minor, capite et abdomine rubris.*

ſexpuſtulata. 44. C. coleoptris nigris: punctis rubris ſex. *Fn. ſuec.* 500.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 331. *n.* 20. *Scop. ent. carn.* 245. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 64. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 89.
Degeer inſ. 5. *p.* 390. *n.* 25.
Raj. inſ. p. 87. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 12.
β) *Sulz. hiſt. inſ. t.* 3. *f.* 6.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in Europae *hortis, rarius varians puncto adhuc minutiſſimo ad ſuturam rubro.*

lunata. 135. C. coleoptris nigris: maculis decem rubris, ſex lunatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 65. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 90.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 22. *f.* 33. Coccinella rivoſa.
Habitat in inſula S. Helenae *et ad* caput bonae ſpei, *gibba, glabra, ocellatae magnitudine.*

hirta. 136. C. elytris nigris: maculis duodecim rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 23. *f.* 35.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ocellatae magnitudine, atra, pilis cinereis hirta.*

Reppenſis. 137. C. oblonga elytris nigris: maculis fulvis orbicularibus duabus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 48. *n.* 28. *t.* 22. *f.* 23. x.
Habitat in Marchia, *nigra.*

campeſtris. 138. C. ſubrotunda, elytris nigris: maculis duabus orbicularibus fulvis, pedibus anterioribus fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 48. *n.* 29. *t.* 22. *f.* 24. y.
Habitat in Marchia.

faſciata. 139. C. elytris nigris: faſcia transverſa maculis quatuor fulvis conflata. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 49. *n.* 30. *t.* 22. *f.* 25. z.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 334. *n.* 26.
Habitat in Gallia *et* Germania.

decempuſtulata. 45. C. coleoptris nigris: punctis fulvis decem. *Fn. ſuec.* 501.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 66. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 91.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 330. *n.* 19.
Degeer inſ. 5. *p.* 391. *n.* 26.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 10. *et t.* 171. *f.* 2.
Liſt. loq. 383. *n.* 9.

Friſch inſ. 9. *t.* 17. *f.* 4. 5.
Raj. inſ. 87. *n.* 15.
Habitat in Europae *hortis, varians elytrorum punctis flavis et rubris.*

ruſſica. 140. C. elytris nigris: punctis duodecim fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 49. *t.* 22. *f.* 26.
Habitat in Ruſſia, *ſeptempunctatae magnitudine.*

16puſtulata. 47. C. coleoptris nigris: punctis fulvis ſedecim. *Fn. ſuec.* 503.
Habitat in Europa.

20puſtulata. 141. C. elytris nigris: punctis fulvis viginti. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 24. *f.* 36.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſeptempunctatae magnitudine, gibba, nigra, tenuiſſime hirta.*

guttato-puſtulata. 142. C. coleoptris nigris: punctis duobus flavis quatuorque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 94.
Habitat in nova Hollandia.

**** *Coleoptris nigris, albo flavoque maculatis.*

atra. 143. C. elytris nigris: maculis duabus flavis, thoracis marginibus anoque flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 21.
Habitat - - bipuſtulata minor, valde gibba, glaberrima.

laevis. 144. C. elytris nigris: punctis ſex flavis, thoracis angulis anterioribus flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 22. *f.* 32.
Habitat - - - glabra, nigra, capite pedibusque flavis, bipuſtulatae magnitudine.

dentata. 145. C. elytris nigris: margine exteriore linea tridentata punctisque ſex flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 23. *f.* 34.
Habitat ad caput bonae ſpei, 14*punctatae magnitudine, nigra, capite, thoracis et abdominis margine pedibusque flavis.*

pantherina. 48. C. coleoptris nigris: punctis flavis octo. *Fn. ſuec.* 504.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 106. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 96.
Degeer inſ. 5. *p.* 392. *n.* 28.
Habitat in Europa *boreali.*

humera-lis. 146. C. coleoptris nigris: punctis flavis octo; anterioribus duobus uncinatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 266.
Habitat Halae Saxonum, *flavicans, ad* 14*puſtulatam accedens.*

14puſtulata. 46. C. coleoptris nigris: punctis flavis quatuordecim. *Fn. ſuec.* 502.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 330. *n.* 18. *Scop. ent. carn.* 246. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 93.
Uddm. diſſ. 15. Coccinella coleoptris nigris: maculis decem pallide flavis.
Pod. inſ. 26. Coccinella 14maculata.
Degeer inſ. 5. *p.* 391. *n.* 27.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 10.
Habitat in Europae *floribus.*

tigrina. 49. C. coleoptris nigris: punctis albidis viginti. *Fn. ſuec.* 505.* *Uddm. diſſ.* 11. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 74. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 100.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 49. *n.* 36. *t.* 22. *f.* 27.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 9.
Habitat in Europa *boreali, an varietas 20guttatae?*

felina. 147. C. coleoptris atris: punctis ſex albis, corpore globoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 70. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 95.
Habitat in America *boreali.*

pardelina. 148. C. coleoptris nigris: punctis decem margineque ſinuato albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 72. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 97.
Habitat - - - magna, atra.

urſina. 149. C. coleoptris atris: punctis decem albis, capite thoracisque margine anteriore albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 98.
Habitat in America *boreali, parva, nitida, atra, capite pedibusque albis.*

12puſtulata. 150. C. coleoptris nigris: punctis duodecim albis; exterioribus margine connexis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 67. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 92.
Habitat Hamburgi.

leonina. 151. C. coleoptris nigris: punctis albis ſedecim. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 73. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 99.
Habitat in nova Hollandia.

canina. 152. C. coleoptris nigris: punctis albis viginti, capite thoraceque villoſis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 75. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 101.

Habitat ad caput bonae ſpei, *magna*, *nigra.*

Thunbergii. 153. C. elytris nigris: margine punctisque duobus albis, capite nigro: punctis albis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 10. *n.* 17.

Habitat Upſaliae, *bipuſtulatae magnitudine*, *nigra.*

villoſa. 154. C. villoſa nigra, elytrorum marginibus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 379.

Habitat in Cayenna, *magna.*

ALURNUS. *Antennae* filiformes.

Palpi ſex breviſſimi.

Maxilla cornea, fornicata.

groſſus. 1. A. ater, thorace coccineo, elytris flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 1.

Habitat in America *auſtrali et* India.

femoratus. 2. A. viridi-aeneus, femoribus tibiisque poſterioribus dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 2.
Drury inſ. 2. *t.* 34. *f.* 5. Tenebrio femoratus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 8. Tenebrio viridis.

Habitat in India, *magnus*, *laevis*, *nitidus*, *antennis corpore dimidio brevioribus: articulis ultimis nigris.*

dentipes. 3. A. niger, femoribus tibiisque poſterioribus dentatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 3.

Habitat ad caput bonae ſpei, *laevis*, *immaculatus*, *femorato affinis.*

199. CHRYSOMELA.

Antennae moniliformes.

Palpi ſex extrorſum craſſiores.

Thorax, nec elytra, marginatus.

Corpus (pleriſque) ovatum.

* *femoribus poſterioribus aequalibus.*

tenebrioides. 1. Chr. aptera atra, antennis pedibusque violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 1. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *t.* 23. *f.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 29. Tenebrio (laevigatus) apterus niger laevis, elytris laevibus, thorace lunato, ſubtus caeruleus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 265. *n.* 19. Chryſomela atro-purpurea &c.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*
Larva *gibba, violacea, ano rufo, polyphaga, plantis victitat.*

Morio. 2. Chr. atra, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 2.
Habitat in terra van Diemen, *tenebrioide paulo minor.*

goettingenſis. 4. Chr. atra, pedibus violaceis. *Fn. ſuec.* 506.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 3.
Degeer inſ. 5. *p.* 298. *n.* 8. Chryſomela violaceo-nigra &c.
Laichart. inſ. tyr. 1. *p.* 143. *n.* 2. Chryſomela coriaria.
Habitat in Europa.

vittata. 3. Chr. cyanea, elytris margine vittaque media flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 4.
Habitat in America, *magna, craſſa.*

bicolor. 72. Chr. viridi-aenea, ſubtus violacea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 5.
Forſk. Fn. ar. p. 77. *n.* 2. Chryſomela viridi-aenea.
Habitat Alexandriae.
Elytra *punctato-ſtriata.*

affinis. 73. Chr. obſcure aenea, ſubtus violacea, elytris laevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 6.
Habitat ſub lapidibus Barbariae, *bicolori affinis, at duplo minor.*

luſitanica. 74. Chr. thorace cupreo; elytris aeneis: punctis impreſſis caeruleſcentibus, ſubtus violacea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 7.
Habitat in Luſitania, *major Chr. Bankſii.*

ferruginea. 75. Chr. ferruginea, ſubtus nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 8.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magna.*

Bankſii. 76. Chr. ſupra aenea, ſubtus teſtacea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 7. *mant. inſ. p.* 67. *n.* 9.
Habitat in Luſitania *et* Calabria.

Sophiae. 77. Chr. caerulea, tibiis plantisque flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 73. *n.* 86.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 272. Chryſomela ovata viridis, elytris poſtice acuminatis, tibiis plantisque ferrugineis.
Habitat Halae Saxonum *in Siſymbrio Sophia, laevis, glabra, ſtatura et magnitudine chr. ermoraciae.*

pallipes. 78. Chr. nigra, elytris pedibusque palleſcentibus. *Fabr. mant.* 1. *p.* 73. *n.* 215.
Habitat Kilonii, *parva.*

bimaculata. 79. Chr. oblonga atra, elytris teſtaceis: macula atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 67. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 87.
Habitat in America.

faſciata. 80. Chr. oblonga atra, elytris faſciis tribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 88.
Habitat in America.

ruficollis. 81. Chr. oblonga viridi-aenea, thorace pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 89. *Herbſt apud Fueſſli. arch. inſ.* 7. *p.* 162. *n.* 61. *t.* 45. *f.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 263. *n.* 16. Chryſomela nigra &c.
Habitat in Europa *magis auſtrali, etiam* Germania.

82. Chr.

Chryſomelarum *et* cryptocephalorum *larvae conſumunt folia, relictis eorum vaſis, pulpa contentae.*

flavicornis. 82. Chr. oblonga punctata viridi-aenea, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 90.
Habitat in Cayenna, *minor.*

crenata. 83. Chr. oblonga ſubtus aenea, ſupra cuprea, antennis flavis: articulo quinto et ultimo fuſcis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 73. *n.* 91.
Habitat in Cayenna, *flavicorni major.*

littoralis. 84. Chr. oblonga atra, elytris porcatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 74. *n.* 92.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 252. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 6. Galleraca atro fuſca, lineis tribus elevatis punctis numeroſis.
Habitat ad Europae *auſtralis littora, ſtatura chr. tanaceti, at major.*

cayennenſis. 85. Chr. oblonga atra, capite, thorace, femoribusque quatuor anterioribus obſcure rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 93.
Habitat in Cayenna, *ſtatura chr. tanaceti, at paulo major.*

tanaceti. 5. Chr. atra punctata, antennis pedibusque nigris. *Fn. ſuec.* 507. *It. gotl.* 270.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 128. *n.* 70. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 94.
Degeer inſ. 5. *p.* 299. *n.* 4. *t.* 8. *f.* 27. Chyſomela oblonga nigra punctata, elytris coriaceis.
Merian. inſ. eur. t. 68.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 14.
Habitat in Europae *tanaceto, rarius tota obſcure griſea.*

ruſtica. 86. Chr. oblonga nigra, thorace elytrisque griſeis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 95.
Schaller Abh. hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 274. Chryſomela ovata nigra, elytris griſeis: ſtriis quinque eminentibus.
Habitat in Europae *fruticibus, affinis chr. tanaceti.*

12punctata. 87. Chr. oblonga, thorace flaveſcente, elytris viridibus: punctis ſex nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 96.
Habitat - - -

haemorrhoidalis. 6. Chr. nigra nitida, antennis baſi flaveſcentibus, ano ſupra rubro. *Fn. ſuec.* 508.* *Scop. ent. carn.* 225. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 78.
Degeer inſ. 5. *p.* 287. *n.* 6.
Habitat in betula *et* alno, *elytris ſtriato-punctatis.*

88. Chr.

fucata. 88. Chr. atra, thorace elytrisque viridi-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 79.
Habitat in Italia, *ſtatura et magnitudine haemorrhoidalis.*

fuſcicornis. 89. Chr. viridi-aenea, antennis tibiisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 62. *mant. inſ. p.* 73. *n.* 80.
Habitat in Ruſſia, *magnitudine et ſtatura haemorrhoidalis.*

graminis. 7. Chr. viridi-caerulea nitida, antennis pedibusque concoloribus. *Fn. ſuec.* 509. *Scop. ent. carn.* 220. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 21.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 260. *n.* 10.
Degeer inſ. 5. *p.* 304. *n.* 16.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 10.
Habitat in Europae *plantis, praeſertim gramine.*

cuprea. 90. Chr. capite thoraceque aeneis, elytris cupreis, corpore atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 22.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 263. *n.* 15.
Laichart. inſ. tir. 1. *p.* 144. *n.* 3. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 55. *n.* 26. *t.* 23. *f.* 14. Chryſomela metallica?
Habitat in Germania.

aſiatica. 91. Chr. viridi-aenea nitidiſſima elytris cyaneis. *Pall. it.* 1. *p.* 463. *n.* 10. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 20.
Habitat in Sibiria, *ſurinamenſi major.*

glaberrima. 92. Chr. cyanea glaberrima, antennis plantisque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 19.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 16. Chryſomela americana.
Habitat Surinami, *rarior in* Europa *boreali, aliquando tota aenea.*

ignita. 93. Chr. cyanea nitida, elytris aeneis, antennis plantisque fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 18.
Habitat in Cayenna, *maxima.*

aenea. 8. Chr. viridis nitida, abdomine poſterius ferrugineo. *Fn. ſuec.* 510.*
Fn. ſuec. 1. *n.* 420. Chryſomela viridis nitida, thorace antice excavato.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 130. *n.* 80. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 106.
Geoffr.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 261. *n.* 12.
Degeer inſ. 5. *p.* 305. *n.* 18. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in betula alno, *etiam in* Calabria.

dresdenſis. 95. Chr. oblonga, capite thoraceque obſcure ferrugineis, elytris nigro-aeneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 105.
Habitat Dresdae, *ſtatura et magnitudine vitellinae.*

alni. 9. Chr. violacea, elytris vage punctatis, pedibus antennisque nigris. *Fn. ſuec.* 511.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 72. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 97.
Degeer inſ. 5. *p.* 314. *n.* 21. *t.* 9. *f.* 18.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 332. *n.* 1.
Friſch inſ. 7. 13. *t.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 13.
Schaeff. elem. t. 53. *f.* 1. 2.
Habitat in betula alno.

abſinthii. 97. Chr. oblonga pallida, thorace macula, elytris lineis tribus nigris. *Pall. it.* 2. *p.* 725. *n.* 70. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 73. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 98.
Habitat in Sibiria, *magnitudine Chr. tanaceti.*

concolor. 98. Chr. oblonga flaveſcens nitida, oculis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 74. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 99.
Habitat in Africa *aequinoctiali, Chr. tanaceti paulo major.*

picea. 99. Chr. oblonga picea, pedibus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 75. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 100.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magna, glabra, nitida.*

betulae. 10. Chr. violacea, elytris punctato ſtriatis. *Fn. ſuec.* 514. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 76. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 101. *Scop. ent. carn.* 221.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 264. *n.* 17. Chryſomela nigro-purpurea &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 318. *n.* 24. *t.* 9. *f.* 24. a. b. Chryſomela caerulea ſalicis &c.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 3. *t.* 1.
Raj. inſ. 90. *f.* 5.
Muſ. Lesk. p. 14. *n.* 267?
Habitat in betulae albae *foliis, paginam inferiorem exedens.*

tricolor. 100. Chr. oblonga, thorace fulvo-viridi punctato, elytris viridibus nitidis, abdomine nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 77. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 102.

Habitat

Habitat - - - major Chr. betulae, capite viridi, ore, pectore pedibusque fulvis, antennis fuſcis.

haemoptera. 11. Chr. violacea, plantis alisque rubris. *Fn. ſuec.* 512.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 23. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 258. *n.* 5. Chryſomela tota violacea. *Degeer inſ.* 5. *p.* 312. *n.* 20. *t.* 9. *f.* 13. Chryſomela hyperici? *Pod. inſ.* 26. Chryſomela graminis. *Habitat in* Europa.

fuſcipes. 250. Chr. violacea, antennis tibiis plantisque fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 243. *Habitat in* Europa.

nitens. 251. Chr. oblonga violacea nitida, elytris laeviſſime punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 261. *Habitat - - -*

ſemiſtriata. 101. Chr. nigra, elytris flavis: faſcia media nigra, anterius et poſterius nigro-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 26. *Habitat in* Braſilia.

centaurei. 102. Chr. cuprea nitens, ſubtus viridi-aenea, pedibus cupreis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 68. *n.* 25. *Habitat in* Germaniae *centaureo, variantis ſtatura et magnitudine.*

varians. 103. Chr. caerulea ſ. viridis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 68. *n.* 24. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p* 271. Chryſomela ſubgloboſa nitida, colore varians, antennis nigris. *Habitat in* Saxonia, *ſtatura et magnitudine faſtuoſae.*

occidentalis. 12. Chr. viridi-aenea, pedibus antennisque flavis. *Habitat in* America, *chr. vitellinae ſimilis.* Rolander.

ceraſi. 13. Chr. livida, antennarum apicibus, oculisque nigris. *Fn. ſuec.* 570.* *Habitat in* pruni padi *foliis, quae cribri inſtar perforat ſubtus haerens larva, depreſſa, viridis, ſetoſa.* T. Bergman. Magnitudo *cimicis lectularii;* thoracis *margo anterior nigricans.*

padi. 14. Chr. nigra, elytris apice lividis. *Fn. ſuec.* 813.*
Habitat in pruno pado, *pulice major.*

minutiſſima. 15. Chr. nigra opaca.
Habitat in Suecia, *pulice quadruplo minor, elytris abdomine brevioribus.*

armoraciae. 16. Chr. nigra nitidiſſima ſubcaeruleſcens, ſubtus nigra. *Fn. ſuec.* 515.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 66. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 84. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *t.* 44. *f.* 7. c. d.
Degeer inſ. 5. *p.* 322. *n.* 25. Chryſomela plantaginis.
Habitat in plantagine, cochlearia armoracia, ranunculo aquatili, flammula.

melanoſtoma. 254. Chr. oblonga nigra, capite, thorace elytrisque rubris: illo poſterius puncto oreque, iſto utrinque puncto, dorſo ſcutelloque, his ſutura nigris. *Muſ. Lesk. p.* 14.

carbonaria. 255. Chr. nigra, elytris laeviſſime punctatis: punctorum ſeriebus novem. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 285.
Habitat in Europa.

decempunctata. 256. Chr. nigra, elytris ordinibus punctorum quinque parium. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 266.
Habitat in Europa.

luteicornis. 257. Chr. nigra, antennis luteo-rufeſcentibus, elytris laeviſſime punctatis: punctorum ſeriebus novem; margine inflexo teſtaceo. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 275.
Habitat in Europa.

ſubpunctata. 258. Chr. nigra aeneo nitens, elytris laeviſſime punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 276.
Habitat in Europa.

erythromelas. 259. Chr. atra, elytris laevibus punctatis margine ſanguineis. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 270.
Habitat in Europa, *an diſtincta ſatis a limbata?*

cyanomelas. 260. Chr. violacea, capite thorace elytrisque nigris: his profunde punctatis, antennarum baſi rubra. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 265.
Habitat in Europa.

dichroa. 261. Chr. oblonga violacea, thorace, elytris tibiisque viridibus. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 280.
Habitat in Europa.

262. Chr.

elegans. 262. Chr. oblonga violaceo-aenea, capite, thorace, elytris profunde punctatis pedibusque viridi-aeneis. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 281.
Habitat in Europa.

ruſſica. 104. Chr. cyanea antennarum baſi, thorace pedibusque rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 55.
Habitat in Ruſſia *meridionali, ſtatura chr. polygoni, at paulo minor.*

brunnea. 105. Chr. teſtacea, elytris ſutura lineolaque media fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 56.
Habitat in nova Hollandia, *parva.*

quinque-maculata. 252. Chr. oblonga teſtacea, elytris punctis profundis ſtriatis: ſingulis maculis quinque nigris notatis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 260.
Habitat in Europa.

erythroptera. 253. Chr. aenea, capite thoraceque fuſco aeneis, elytris rubris baſi gibbis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 257.

cerealis. 17. Chr. aurata, thorace lineis tribus, coleoptrisque quinque caeruleis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 57.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 262. *n.* 14. Chryſomela aurea.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 3.
Habitat in Europae *magis auſtralis ſegete*, montis vogeſi *ſpartio ſcopario, mediae magnitudinis, ſubtus obſcure violacea, rarius tota purpurea.*

americana. 106. Chr. viridi-aenea, elytris ſtriis quinque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 58.
Habitat in America *et* Galliae *auſtralis lavandula, verticis macula coccinea.*

feſtiva. 107. Chr. nigro-aenea, elytris lineis tribus ſuturaque anteriore flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 59.
Habitat in America.

faſtuoſa. 18. Chr. aurea, coleoptris lineis tribus caeruleis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 60. *Scop. ent. carn.* 232. *Herbſt apud Fueſsli arch. inſ.* 4. *p.* 53. *n.* 15. *t.* 23. *f.* 6.

Geoffr.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 261. *n.* 11. Chryſomela viridis nitida &c.
Gron. zooph. 561.
Habitat in Europae *lamio albo, urticis, rubis.*

glorioſa. 108. Chr. viridis nitida, elytris linea caerulea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 497. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 61.
Habitat in Italia, *faſtuoſae affinis, at duplo major.*

ſpecioſa. 19. Chr. viridi-ſericea, elytris lineis duabus aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 62. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 54. *n.* 16. *t.* 23. *f.* 7?
Scop. ent. carn. 231. Chryſomela ſpecioſiſſima.
Hollar inſ. t. 6. *f.* 2.
Habitat in Germaniae *ſilvis.*
Elytrorum *lineae anterius et poſterius coeunt.*

cyanea. 109. Chr. thorace rotundato cylindrico, corpore cyaneo nitido, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 63.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

nitida. 110. Chr. thorace rotundato viridi-aeneo, antennis cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 64.
Habitat in Siam, *auratae affinis, at paulo major.*

aurata. 111. Chr. thorace rotundato cyaneo, elytris aureis: margine cyaneo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 65.
Habitat in America *boreali.*

limbata. 112. Chr. atra, coleoptrorum limbo ſanguineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 66.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 260. *n.* 9. Chryſomela nigro-caerulea &c.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 20.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

hypochaeridis. 21. Chr. aurata, antennis nigris, elytris abbreviatis. *It. ſcan.* 210. *Fn. ſuec.* 516.
Scop. ent. carn. 193. Bupreſtis ſyngeneſiae.
Habitat in hypochaeridis maculatae *floribus.*

vulgatiſſima. 22. Chr. oblonga caerulea, antennis baſi ferrugineis. *Fn. ſuec.* 517.* *Scop. ent. carn.* 223. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 79. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 104.

Degeer inſ. 5. *p.* 317. *n.* 23. Chryſomela caerulea betulae.
Habitat in Europa, *potiſſimum in ſalice.*

vitellinae. 23. Chr. viridi-caerulea. *Fn. ſuec.* 519.* *Scop. ent. carn.* 224.
Fn. ſuec. 426. Chryſomela aenei coloris.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 130. *n.* 78. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 103.
Chryſomela oblonga viridi-aenea.
Degeer inſ. 5. *p.* 323. *n.* 27.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 3. *p.* 5. *t.* 1.
Habitat in Europae *ſalicibus glabris populoque, vulgatiſſima paulo minor, folia ſubtus conſumens.*
Larvae, *dum paſcuntur, per lineas parallelas diſpoſitae.*

polygoni. 24. Chr. caerulea, thorace, femoribus anoque rufis. *Fn. ſuec.* 520.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 54.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 283. *n.* 4.
Degeer inſ. 5. *p.* 322. *n.* 26.
Raj. inſ. 100. *n.* 4.
Reaumur inſ. 3. *t.* 17. *f.* 14. 15.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 5. *et t.* 161. *f.* 4. *et t.* 173. *f.* 4.
Habitat in polygono aviculari, rumice acetoſa, *pedibus interdum rufis, ut tamen plantae nigrae ſint.*
Femina *ovis gravida ultra coleoptra ventricoſa.*

18guttata. 113. Chr. elytris fuſcis: punctis octo pallidis; quibusdam connexis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 53.
Habitat in nova Hollandia.

pallida. 25. Chr. flaveſcens, oculis nigris. *Fn. ſuec.* 521.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 44.
Fn. ſuec. 1. *n.* 423. Chryſomela pallido-griſea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 243. Cryſomela pallida, oculis nigris.
Habitat in Europae *ſalicibus.*

ſtriata. 114. Chr. atra nitida, elytris ſtriatis teſtaceis, ſutura atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 45.
Habitat ad caput bonae ſpei, *gibba, mediae magnitudinis.*

notata. 115. Chr. thorace fulvo: punctis quatuor nigris, elytris pallidis nigro-variis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 46.
Habitat ad caput bonae ſpei, *pallida, capite fulva, ſtatura pallidae.*

116. Chr.

rumicis 116. Chr. thorace fulvo: punctis quatuor nigris, elytris fulvis: ſutura vittaque media nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 47.
Habitat in Hiſpaniae *rumice ſpinoſo*; *ſtatura et magnitudine pallidae.*

vulpina. 117. Chr. atra, elytris margine, punctis quatuor apiceque nigro-maculato albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 48.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura notatae.*

craſſicornis 118. Chr. flaveſcens, elytris maculis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 49.
Habitat in nova Hollandia.

ſtaphylaea. 26. Chr. obſcure teſtacea tota. *Fn. ſuec.* 518.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 29.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 263. *n.* 15. Chryſomela ſupra rubrocuprea &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 294. *n.* 3. *t.* 8. *f.* 24. Chryſomela cuprea.
Habitat in Europae *pratis.*

fervida. 119. Chr. teſtacea, elytris aeneis: margine teſtaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 30.
Habitat in inſula Java.

polita. 27. Chr. thorace aurato, elytris rufis. *Fn. ſuec.* 522.* *Scop. ent. carn.* 229.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 119. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 31. Chryſomela ovata, thorace aurato, elytris teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 257. *n.* 2.
Degeer inſ. 5. *p.* 294. *n.* 2. *t.* 8. *f.* 2. 3.
Schaeff. ic. t. 65. *f.* 9.
Habitat in ſalice, populo.

lurida. 28. Chr. nigra, elytris caſtaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 33.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 258. *n.* 3.
Habitat in Galliae *vite*, Germania, *ſtatura politae, at dimidio minor.*

lunata. 120. Chr. ferruginea, elytris margine, vitta lunulaque media flavicantibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 32.
Habitat - - - ſtatura et magnitudine politae.

clavicornis. 29. Chr. nigra, elytris abdomineque nigris, antennis clavatis.
Habitat in America, *chr. populi facie.* Rolander.

tremula. 121. Chr. caeruleſcens, elytris teſtaceis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 69. *n.* 28.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 256. *n.* 2.
Habitat in Europae *populo, chr. populi duplo minor.*

populi. 30. Chr. thorace caeruleſcente, elytris rubris apice nigris. *Fn. ſuec.* 523.*
Scop. ent. carn. 228. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 27. *Pod. inſ.* 27. Chryſomela 7 punctata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 256. *n.* 1.
Degeer inſ. 5. *p.* 290. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 16.
Liſt. ſcar. angl. 381. *n.* 6.
Merian. inſ. eur. 14. *t.* 27.
Albin. inſ. 63. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 9. *et t.* 9. *et t.* 47. *f.* 4. 5.
Habitat in populo tremula, *folia ſaepe devaſtans, quae excorticata rudis vaſis relinquit.*
Larva *foetens, hexapus, albo nigroque varia ex tuberculorum duplici ſerie humorem lacteum fundit.*

viminalis. 31. Chr. nigra, thorace rufo bimaculato, elytris rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 39.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 590. *n.* 31. *Fn. ſuec.* 524.* Chryſomela ovata nigra, thorace bimaculato, elytris teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 265. *n.* 18. Chryſomela rubra &c.
Scop. ent. carn. 233. Chryſomela ſignata.
Degeer inſ. p. 297. *n.* 6.
Habitat in Europae *ſalicibus, aliquando cum haemorrhoidali copia conjuncta.*

cyanipes. 122. Chr. rufa, elytris punctis poſteriusque cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 40.
Habitat in nova Hollandia.

cyanicornis. 123. Chr. rufa, thorace macula dorſali punctisque duobus, coleoptris maculis octo cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 41.
Habitat in nova Hollandia.

10punctata. 32. Chr. thorace rubro poſterius nigro, elytris rufis: punctis ſubquinis nigris. *Fn. ſuec.* 525. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 42.

Fn. ſuec. 1. *n.* 436. Chryſomela ſupra rufa, thoracis punctis nigris duobus, elytrorum pluribus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 258. *n.* 4. Chryſomela rubra &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 294. *n.* 4. *t.* 8. *f.* 25. Chryſomela rufipes.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 13.
β) Chryſomela rubra, elytro ſingulo maculis quinque nigris. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 1354.
Habitat in Europae *populo, punctorum in elytris numero varians.*

ſexpunctata. 124. Chr. nigra, thorace rufo: punctis duobus, elytris rufis: punctis tribus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 43.
Habitat in Europae *plantis, decempunctatae affinis.*

varioloſa. 33. Chr. nigra, elytris rubris: punctis ſparſis impreſſis caeruleis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 50.
Habitat in Africa.

lapponica. 34. Chr. thorace viridi, elytris rubris, faſcia inter punctum maculamque lunatam caerulea. *Fn. ſuec.* 526.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 51.
Degeer inſ. 5. *p.* 302. *n.* 12. *t.* 9. *f.* 3. Chryſomela curvilinea.
Schaeff. ic. t. 44. *f.* 2.
Habitat in Europa *boreali,* Saxoniae *fraxino, elytrorum ſutura caerulea.*

undulata. 35. Chr. rufa, elytris faſciis tribus atro-caeruleis undulatis. *Amoen. ac.* 6. *p.* 393. *n.* 14. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 52.
Habitat in India.

boleti. 36. Chr. nigra, elytris faſciis tribus flavis repandis. *Fn. ſuec.* 527.* *Sulz. hiſt. inſ. t.* 3. *f.* 9. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 34.
Uddm. diſſ. 4. *f.* 3. Dermeſtes ater nitens, elytris nigris: faſciis duabus flavis undulatis.
Scop. ent. carn. 247. Coccinella faſciata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 337. *t.* 6. *f.* 3. *Schaeff. elem. t.* 58. *ic. t.* 77. *f.* 6. Diaperis.
Degeer inſ. 5. *p.* 49. *n.* 9. *t.* 3. *f.* 3. Tenebrio boleti.
Habitat in boletis *arboreis.*

novem-vittata. 125. Chr. thorace nigro aeneo, coleoptris flavis: vittis novem fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 35.

Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine chr. boleti.*

ſtolida. 126. Chr. ferruginea, capite thoraceque flavis, elytris variegatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 36.

Habitat in America.

nigricornis. 127. Chr. nigro-aenea, capite, thoracis lateribus, elytrorumque macula duplici baſeos ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 37.

Habitat in nova Hollandia.

collaris. 37. Chr. violacea, thoracis marginibus albis: puncto nigro. *Fn. ſuec.* 528.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 38.

Degeer inſ. 5. *p.* 302. *n.* 13.

Schaeff. ic. t. 52. *f.* 11. 12.

Habitat in Europae *et borealis* Americae *ſalicibus.*

ſanguinolenta. 38. Chr. atra, elytris margine exteriori ſanguineis. *Fn. ſuec.* 529.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 67.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 259. *n.* 8. *t.* 4. *f.* 8. Chryſomela nigro-caerulea &c.

Degeer inſ. 5. *p.* 298. *n.* 7. *t.* 8. *f.* 26. Chryſomela rubromarginata.

Scop. ent. carn. 203. Bupreſtis ſanguinolenta.

Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 10.

Schaeff. ic. t. 21. *f.* 15.

Habitat in Europae *ſalicetis.*

marginata. 39. Chr. nigro-aenea, elytris margine luteis. *Fn. ſuec.* 529.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 68.

Degeer inſ. 5. *p.* 303. *n.* 14.

Schaeff. ic. t. 21. *f.* 19.

Habitat in Europae *pratis apricis.*

Elytra *ſtriato-punctata.*

ruſta. 128. Chr. thorace cyaneo nitido, elytris punctatis cyaneis: margine rubro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 69.

Habitat Dresdae, *magnitudine et ſtatura marginatae.*

marginella. 40. Chr. nigro-caerulea, thorace elytrisque margine luteis. *Fn. ſuec.* 530.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 70. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *t.* 23. *f.* 9.
Degeer inſ. 5. *p.* 304. *n.* 15. Chryſomela ranunculi.
Raj. inſ. 99.
Habitat in Europae *ranunculis.*

hannoveriana. 129. Chr. cyanea, thorace margine, elytris margine vittaque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 71. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 54. *n.* 22. *t.* 23. *f.* 10.
β) Chryſomela potentillae. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 55. *n.* 23. *t.* 23. *f.* 11.
γ) Chryſomela ranunculi. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 55. *n.* 24. *t.* 23. *f.* 11.
Habitat in Germania.

5punctata. 130. Chr. nigra, thorace rufo, coleoptris teſtaceis: punctis quinque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 72.
Habitat Hamburgi, *mediae magnitudinis.*

ſcutellata. 131. Chr. rufa, coleoptris maculis quinque nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 58. *n.* 32. *t.* 23. *f.* 20. c. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 73.
Habitat in Germania, *parva.*

litura. 132. Chr. rufeſcens, elytris ſutura lineaque longitudinali nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 74. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 57. *n.* 30. *t.* 23. *f.* 18. a.
Habitat in Anglia *et* Germania.

flavicans. 133. Chr. flaveſcens, elytris viridi-cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 75.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura et magnitudine liturae.*

caſtanea. 41. Chr. fuſca, elytris margine exteriore caſtaneo. *Amoen. ac.* 6. *p.* 394. *n.* 15.
Habitat Surinami.

analis. 42. Chr. atra, elytris fuſcis: margine exteriore teſtaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 81. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 107.
Habitat in Europa, *capta primum ad praedium* Hammarby. Fabricius.

cruenta. 134. Chr. oblonga ſanguinea, thorace immaculato, elytris punctis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 82. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 108.
Habitat in India, *coccineae ſtatura.*

coccinea. 43. Chr. thorace marginato ſanguineo: macula nigra, elytris ſanguineis: maculis duabus nigris. *Fn. ſuec.* 532.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 83. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 109.
Uddm. diſſ. 13. Coccinella coleoptris rubris, maculis quatuor nigris.
Degeer inſ. 5. *p.* 301. *n.* 10. *t.* 9. *f.* 1. Chryſomela quadrimaculata.
Habitat in Europae *borealis corylo.*

cruciata. 135. Chr. oblonga rubra, coleoptris cruce nigra. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 273. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 110.
Habitat Halae Saxonum, *coccinea minor, elytris &c. marginatis a plurimis congeneribus diſtans, an forte cum chr. ruſtica, et cryptocephalis capreae, nymphaeae &c. proprii generis?*

quadrimaculata. 136. Chr. oblonga, thorace teſtaceo immaculato, elytris teſtaceis: maculis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 84. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 111.
Habitat in nemoribus Kilonienſibus.

decemmaculata. 137. Chr. oblonga nigra, coleoptris rubris: punctis decem nigris; duobus communibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 85. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 112.
Habitat in America.

20punctata. 138. Chr. oblonga viridi-aenea thoracis marginibus albis; elytris albis: maculis decem aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 86. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 112.
Berg ſtr. nomencl. 1. *p.* 87. *t.* 13. *f.* 10. Chryſomela vicies maculata.
Petiv. gazoph. t. 29. *f.* 5.
Habitat in Anglia.

bipunctata. 139. Chr. teſtacea, elytris macula fuſca. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 64. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 82.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura philadelphicae, at major.*

philadelphica. 44. Chr. viridis, elytris flavis: punctis vireſcentibus oblongiuſculis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 65. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 83.
Degeer inſ. 5. *p.* 353. *n.* 6. *t.* 16. *f.* 13.
Petiv. gaz. t. 26. *f.* 11.
Habitat in Penſylvania, *elytrorum ſutura nunc viridi, nunc flava.*

trimaculata. 45. Chr. cyanea, coleoptris flavis: faſcia maculisque duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 11.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 592. *n.* 45. Chryſomela ovata nigra, elytris flavis, maculis tribus oblongis nigris, intermedia ſuturae communi.
Habitat in America, *minuta, forma coccinellae.*

Adonidis. 140. Chr. atra, thoracis margine flavo: puncto nigro, elytris flavis: ſutura vittaque nigris. *Pall. it.* 1. *p.* 463. *n.* 29. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 12. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 56. *n.* 39. *t.* 23. *f.* 17.
Habitat in Tibiriae *adonide et* Auſtria.

dorſalis. 141. Chr. atra, thoracis margine teſtaceo: puncto nigro, elytris teſtaceis: ſutura abbreviata atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 13.
Habitat in Auſtria.

clavata. 142. Chr. capite thoraceque ferrugineis, elytris nigris: vitta flaveſcente. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 14.
Habitat - - - nigra, mediae magnitudinis.

bifaſciata. 143. Chr. teſtacea, elytris aeneis nitidis: punctis duobus faſciisque duabus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *magna.*

ſuturalis. 144. Chr. aenea, elytris flavis: ſutura vittaque aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 16.
Habitat in America *boreali.*

barbarica. 46. Chr. viridi-aenea, elytris lineis quinque rubris, alis ſanguineis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 16.
Habitat in Barbaria, *inter coccos officinarum lecta, ex caeruleo vireſcens, ſubtus ex piceo aenea.*

Lineola. 47. Chr. flava, coleoptris punctis undecim lineisque duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 58. *mant. inſ. p.* 72. *n.* 76.

Habitat in America, *pulicis magnitudine, capite et thorace pallidis, oculis nigris.* Brünniche.

aeſtuans. 48. Chr. ferruginea, elytris maculis quatuor flavicantibus difformibus. *Gron. zooph.* 565.

Habitat in America, *coccinellae maximae magnitudine, elytris glabris obſolete punctato-ſtriatis.*

ſacra. 49. Chr. ſupra rufa, thoracis linea, punctis duobus, elytrorumque ſutura nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 40.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 59. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 77.

Habitat in Palaeſtina, *alis ſanguineis.*

14punctata. 94. Chr. teſtacea, coleoptris flavis: punctis ſedecim nigris; duobus communibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 17.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 599. Chryſomela cylindrica, femoribus poſticis incraſſatis dentatis, thorace rufo, coleoptris flavis punctis XIV nigris.

Habitat in India, *bipunctatae ſimilis, at major.*

obſcura. 96. Chr. nigra, thorace rotundato anguſtiori, pedibus poſterioribus elongatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 63. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 81.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 599. *Fn. ſuec.* 561.* Chryſomela ſubcylindrica, thorace pedibusque nigris.

Degeer inſ. 5. *p.* 336. *n.* 40. Chryſomela nigro-quadrata.

Habitat in Europae *plantis, thorace gibbo, elytris anguſtiore.*

violacea. 145. Chr. violacea, elytris lineis quatuor virideſcentibus. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 270.

Schaeff. ic. t. 21. *f.* 10.

Habitat aeſtate gregaria in Europae *ſalicibus, chr. alni major, ceterum cereali ſimilis.*

olivacea. 146. Chr. aeneo-olivacea, thoracis marginibus lateralibus craſſis, elytris punctato-ſtriatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 272.

Habitat in Germaniae *plantis, ſtaphyleae ſtatura et magnitudine, nitida, punctorum excavatorum in elytris ſeriebus* 9.

ſternicornis. 147. Chr. violacea, ſterno porrecto. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 274. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in India, *ſcarabaei vernalis magnitudine, punctis plurimis in thorace et elytris excavatis.*

globoſa. 148. Chr. elytris nigris, thorace ſanguineo, pedibus rufo-fuſcis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 11. *n.* 18.
Habitat in Suecia, *pediculo duplo major, globoſa, nigra.*

hollandica. 149. Chr. ſupra aenea, elytris punctatis, ſubtus nigra, cinereo-tomentoſa. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 11. *n.* 19.
Habitat in Hollandia Sueciae, *ſtatura et magnitudine Chr. vitellinae.*

undata. 150. Chr. elytris teſtaceis: punctis faſciisque duabus nigris, capite thoraceque teſtaceis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 12. *n.* 20.
Habitat Upſaliae, *pallidae ſtatura et magnitudine, ſubtus teſtacea.*

bipuſtulata. 151. Chr. elytris nigris: apicis macula flava, capite thoracisque lateribus flavis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 13. *n.* 21.
Habitat in Suecia, *pediculo duplo major, nigra, glabra, ſubdepreſſa.*

gibba. 152. Chr. oblonga, elytris brunneis, capite thoraceque fuſcis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 14. *n.* 24.
Habitat Upſaliae, *magnitudine vulgatiſſimae, ſubdepreſſa.*

gigas. 153. Chr. tota cyanea, oculis ex luteo-fuſcis, elytris glaberrimis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 51. *n.* 2. *t.* 23. *f.* 2.
Habitat in India.

Gronovii. 154. Chr. nigra nitida, thoracis faſcia duplici et margine nigris, elytris luteis: macula, vitta interrupta, punctisque duobus nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 52. *n.* 4. *t.* 23. *f.* 4.
Habitat - - - ultra dimidium pollicem longa, faſcia thoracis priore dentata.

indica. 155. Chr. nigra, abdomine luteo, elytris ſubdiaphanis fuſcis: faſciis tribus luteis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 52. *n.* 5. *t.* 23. *f.* 5.
Habitat in India.

156. Chr.

Jonlata. 156. Chr. nigra, capite, thorace, elytriſque cyaneis, his obſolete punctatis margine ſanguineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 1. *p.* 54. *n.* 20. *t.* 23. *f.* 8.
Habitat in Germania, *marginatae affinis.*

centaura. 157. Chr. viridi-aurea, thorace elytriſque rubris punctatis, antennis nigris, tarſis fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 56. *n.* 27. *t.* 23. *f.* 15.
Habitat Berolini, *ultra 2 lineas longa.*

taraxaconis. 158. Chr. rubro aurea, ſubtus viridi-aurea, elytris punctato-ſtriatis, antennis nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 56. *n.* 28. *t.* 23. *f.* 16.
Habitat Berolini *in taraxacone.*

exilis. 159. Chr. nigra, capite et thorace glaberrimis pedibusque fulvis, elytris punctis fuſcis ſeriatis maculiſque duabus nigris confluentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 57. *n.* 31. *t.* 23. *f.* 19. b.

unicolor. 160. Chr. livida, elytris glabris: punctis ſparſis excavatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 161. *n.* 56. *t.* 44. *f.* 1.
Habitat in America, *maxima.*

griſea. 161. Chr. ex vireſcente griſea ſubvilloſa, pedibus antenniſque flaveſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 161. *t.* 44. *f.* 2. a. b.
Habitat Berolini, *vix lineam ſuperans.*

rubi. 162. Chr. anguſta chalybea, elytris glabris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 562. *n.* 59. *t.* 44. *f.* 4. c. f.
Habitat Berolini.

cacaliae. 163. Chr. virens, elytris ſtria longitudinali ſuturaque caeruleis, alis rubris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 162. *n.* 62. *t.* 45. *f.* 2.
Habitat in Auſtria.

bulgarenſis. 164. Chr. atra, elytris nigro-aeneis punctatis, unguiculis rubris. *Schrank inſ. auſtr. p.* 70. *n.* 127. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 55. *n.* 25. *t.* 23. *f.* 13.
Habitat in Auſtria.

165. Chr.

Huc referas quoque Chryſomelam bimaculatam. *Schaeff. ic. inſ. t.* 51. *f.* 7. *et lir.* M. *t.* 21. *f.* 1. 2.

binotata. 165. Chr. teſtacea, elytris baſi ferrugineis. *Müll. fn. fridrichsd. p.* 8. *n.* 73.
Habitat in Dania.

Fridrichsdalenſis. 166. Chr. thorace macula nigra, elytris ſanguineis immaculatis, abdomine nigro. *Müll. fn. fridr. p.* 8. *n.* 74. *prodr. zool. dan. p.* 81. *n.* 885.
Schaeff. ic. t. 194. *f.* 4.
Habitat in Europa *boreali.*

ſimilis. 167. Chr. nigro-violacea, thorace lateribus, antennisque baſi rubris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 81. *n.* 880.
Habitat in Dania.

orichalcea. 168. Chr. nigra, ſupra aenea, elytris punctis ſtriatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 82. *n.* 889.
Habitat in Dania.

groſſa. 169. Chr. atra, ſubtus violacea, tarſis ſpongioſis ſubtus fuſcis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 81. *n.* 875.
Schaeff. ic. t. 126. *f.* 1.
Habitat in Dania.

punctata. 170. Chr. violacea, elytris punctato-ſtriatis, ano rubro. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 82. *n.* 890.
Habitat in Dania.

obtuſa. 171. Chr. violacea, thorace pedibusque rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 82. *n.* 895.
Habitat in Dania.

thoracica. 172. Chr. violacea, thoracis margine laterali dilatato, elytris punctato-ſtriatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 82. *n.* 898.
Habitat in Dania.

bilineata. 173. Chr. viridi-aurea, thorace anterius excavato, elytrorum linea duplici caerulea. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 83. *n.* 904.
Act. nidr. 4. *p.* 8. *t.* 16. *f.* 5.
Habitat in Scandinavia.

ſerotina. 174. Chr. nitida rufa, oculis nigris, tibiis poſterioribus arcuatis. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 83. *n.* 905.
Habitat in Dania.

caerulea. 175. Chr. caerulea, thorace violaceo. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 259. *n.* 6.
Habitat in Gallia.

atrata. 176. Chr. atra, alis ſanguineis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 259. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

decemſtriata. 177. Chr. viridis nitida, ſtriis decem cupreis, punctorum ſerie duplici diviſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 261. *n.* 13.
Habitat in Gallia.

ruficauda. 178. Chr. viridi-aenea obſcura nitida, abdominis lateribus, ano alarumque margine rubris. *Degeer inſ.* 5. *p.* 305. *n.* 17.
Habitat - - -

viridula. 179. Chr. viridis aurata nitida, thorace anterius aequali, abdomine ſupra toto nigro. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 421. 2. *n.* 520. B.
Goed. inſ. 1. *t.* 45.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 261. *n.* 11.
Degeer inſ. 5. *p.* 311. *n.* 19.
Habitat in Europa.

amethyſtina. 180. Chr. ſupra ex caeruleo violacea, ſubtus ex violaceo viridis, punctis excavatis ſparſis.
Degeer inſ. 5. *p.* 316. *n.* 22.
Habitat - - - *thorace amplo, antennis brevioribus nigris.*

longicornis. 181. Chr. oblonga, thorace teretiuſculo, ſupra ex griſeo fuſca nitida, ſubtus nigra capite nigro.
Degeer inſ. 5. *p.* 325. *n.* 29. *t.* 9. *f.* 35.
Habitat in Europa, *antennis longis.*

cruentata. 182. Chr. nigra, elytris glabris: faſciis transverſis undulatis maculisque rubris.
Degeer inſ. 5. *p.* 350. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 9.
Habitat in America *auſtrali.*

haemoſtata. 183. Chr. capite thoraceque viridi-aeneis obſcuris, elytris nigris: maculis plurimis rubris punctisque excavatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 350. *n.* 3. *t.* 16. *f.* 10.
Habitat in America *auſtrali.*

fuliginoſa. 184. Chr. fuſca depreſſa, thorace elytrisque griſeo-fuſcis, antennis nigris.
Degeer inſ. 5. *p.* 354. *n.* 8. *t.* 16. *f.* 15.
Habitat Surinami.

aſclepiada. 185. Chr. obſcure caerulea nitida, antennis nigris, thoracis punctis ſparſis, elytrorum lineatis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 69.
Habitat ad Volgam *et* Irtin Sibiriae *in Aſclepiada.*

186. Chr.

ſapphirina. 186. Chr. cyanea nitida, ore oculisque rubris, antennis nigris. *Forſt. nov. inſ. gen. p. 19. n. 19.*
Habitat - - - ſanguinolenta triplo major, thorace elytrisque punctis minutiſſimis conſperſis.

anglica. 187. Chr. atro-caerulea, elytris nigro-aeneis ſtriato-punctatis, alis rubris. *Forſt. nov. inſ. gen. p. 20. n. 20.*
Habitat in Angliae *hypericone perforato, faſtuoſae magnitudine.*

rhois. 188. Chr. ferruginea, capite, thorace et ſtriis aliquot elytrorum pallidis. *Forſt. nov. inſ. gen. p. 21. n. 21.*
Habitat in Americae *ſeptentrionalis rhoe glabro, politae magnitudine.*

noveboracenſis. 189. Chr. thorace rufo: diſco punctis nigris, elytris rufis: ſutura, punctis lineolisque nigris. *Forſt. nov. inſ. gen. p. 22. n. 22.*
Habitat in Noveboraco, *habitu chr. populi, magnitudine fere politae.*

vernalis. 190. Chr. nigra, capite, thorace, elytris pedibusque olivaceis, elytris ſtria longitudinali et ſutura nigra. *Forſt. nov. inſ. gen. p. 23. n. 23.*
Habitat in Anglia, *primo vere in arena conſpicua, magnitudine et habitu chr. vitellinae.*

frontalis. 191. Chr. nigra, capite antennarum baſi, elytrorum margine et pedibus ferrugineis. *Forſt. nov. inſ. gen. p. 24. n. 24.*
Habitat in America *ſeptentrionali, mediae magnitudinis.*

ſiſymbrii. 192. Chr. capite atro, thoracis elytrorumque marginibus undique ſanguineis. *Lepechin it. 1. p. 10. t. 4. f. 16.*
Habitat in Ruſſiae *Siſymbrio Sophia.*

Lepechini. 193. Chr. capite caeruleo, thorace elytrisque rubris: faſciis duabus caeruleis. *Lepech. it. 1. p. 29. t. 4. f. 7.*
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

rubicunda. 194. Chr. atra, thorace elytrisque rubicundis, inciſuris abdominis albis. *Lepech. it. 1. p. 311. t. 20. f. 3.*
Habitat in Ruſſiae *auſtralis polygono fruteſcente.*

diſtincta. 195. Chr. obſcure viridis, thoracis elytrorumque limbo interrupto flaveſcente. *Lepech. it. 1. p. 312. t. 20. f. 6.*
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

196. Chr.

quadri-punctata. 196. Chr. capite nigro, thorace nigro; margine rubro, elytris miniatis: punctis quatuor nigris. *Lepech. it.* 2. *p.* 208. *t.* 11. *f.* 20.
Habitat in Sibiria.

menthae. 197. Chr. nigro-aenea nitida. *Schranck Beytr.* z. *Naturg. p.* 63. §. 5.
Habitat in mentha aquatica; *an propria ſpecies?*

pruni. 198. Chr. nigra, capite, thorace, elytrorumque apicibus rufis. *Schranck Beytr.* z. *Naturg. p.* 63. §. 6.
Habitat in pruno.

cognata. 199. Chr. caerulea, pedibus nigris, ano ſupra, primisque antennarum articulis fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 58. *n.* 37.
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine chr. vitellinae, ceterum haemorrhoidali affinis.*

erythropus. 200. Chr. viridis nitens granulata elytris obtuſe mucronatis, antennis fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 59. *n.* 38.
Habitat Berolini *in ſalicibus, ſtatura et magnitudine chr. vitellinae.*

raphani. 201. Chr. viridis nitens, elytris granulatis, antennarum ultimis articulis tarſisque nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 59. *n.* 42. *t.* 23. *f.* 21.
Habitat Berolini *in armoracia.*

aeroſa. 202. Chr. nigra caeruleſcenti irrorata, ſubtus fuſca, antennis pedibusque nigris, punctorum in elytris ſeriebus ſeptem. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 60. *n.* 43. *t.* 23. *f.* 22.
Habitat in Pomerania.

melanopus. 203. Chr. caerulea ſubtus fuſca, antennis pedibusque nigris, elytrorum punctis ſparſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 60. *n.* 44.
Habitat Berolini, *aeroſae affinis.*

japonica. 248. Chr. teſtacea, thorace livido: margine poſteriori punctisque 5 nigris, elytris nigro caeruleis. *Hornſtedt Schrift. der berl. Naturf.* 8. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Japonia, *chr. alni magnitudine.*

malaccenſis. 249. Chr. capite, thorace pedibusque ferrugineis, elytris nigro-aeneis: margine interiori ferrugineo. *Hornſt. Schrift. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 9.
Habitat in Malacca, Sumatra *et* Java, *marginatae magnitudine.*

craſſipes. 263. Chr. teſtacea, oculis nigris, elytris vix punctatis, femoribus craſſis. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 277.
Habitat in Europa.

janthina. 264. Chr. oblonga, fuſco aenea, elytris violaceis: punctorum ordinibus novem, tibiis compreſſis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 286.
Habitat in Europa.

bimaculata. 265. Chr. oblonga rufa, elytris teſtaceis, punctato ſtriatis: maculis duabus oblongis obſolete fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 287.

** *ſaltatoriae, femoribus poſterioribus incraſſatis:* Alticae.

flava. 204. Chr. flava, thorace nigro punctato, elytris violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 87. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 113.
Fabr. ſyſt. ent. app. p. 821. Altica thoracica.

caroliniana. 205. Chr. flaveſcens, thorace punctis duobus, coleoptris vittis quinque flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 75. *n.* 114.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 156. *n.* 38. Crioceris caroliniana.
Habitat in America *boreali.*

oleracea. 51. Chr. vireſcenti-caerulea. *Fn. ſuec.* 534. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 94. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 126.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 245. *a.* 1. *Scop. ent. carn.* 212. Altica oleracea.
Degeer inſ. 5. *p.* 344. *n.* 49.
Habitat in Europae *plantarum, praeſertim tetradynamarum, cotylidonibus, quas miſere deſtruit, niſi forte ante ſeminationem immorſis ſeminibus, cineribus herbarum, potiſſimum tabaci, pollenda.*

albicollis. 206. Chr. thorace pallido elytris aeneis: maculis duabus faſciaque aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 95. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 127.
Habitat in nova Hollandia.

fulvicollis. 207. Chr. thorace rufeſcente, elytris pallidis: ſutura maculisque duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 96. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 128.

Habitat - - - *mediae magnitudinis, pallida, capite pedumque geniculis nigris.*

bicolor. 52. Chr. rufa, elytris femoribusque poſterioribus caeruleis *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 192. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 124. *Degeer inſ.* 5. *p.* 357. *n.* 12. *t.* 16. *f.* 20.

Habitat in America.

Corpus *colore et magnitudine chr. polygoni.*

famelica. 208. Chr. flaveſcens, elytris viridibus: margine pallida. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 123.

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 132. *n.* 91. Chryſomela marginata.

leucopicta. 209. Chr. nigra, thorace albo, elytris obſcure violaceis: punctis quatuor albis; interiori lineari. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 122.

Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

quadrifaſciata. 210. Chr. ferruginea, elytris ſtrigis quatuor albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 121.

Habitat in Cayenna, *magna.*

cincta. 211. Chr. nigra, elytris viridi-aeneis: margine punctisque duobus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 90. *mant. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 119.

Habitat in Luſitania, *magna.*

equeſtris. 212. Chr. thorace elytrisque albis: margine baſeos faſciaque media ferrugineis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 118.

Habitat in America, *magna.*

quadriguttata. 213. Chr. ferruginea, thorace albo, elytris atris: punctis quatuor albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 89. *mant. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 117.

Habitat in Cayenna, *biguttatae affinis.*

biguttata. 214. Chr. ferruginea, thorace elytrorumque maculis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 88. *mant. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 116.

Habitat in America.

215. Chr.

glabrata. 215. Chr. thorace pallido: punctis tribus nigris, elytris nigris: vittis duabus albis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 115.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 156. *n.* 39. Crioceris glabrata.

nobilitata. 216. Chr. ferruginea, elytrorum margine faſciaque albis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 120.
Habitat in Cayenna, *magna.*

chryſocephala. 53. Chr. atro-caerulea, capite pedibusque quatuor anterioribus luteis. *Fn. ſuec.* 535. *Scop. ent. carn.* 213.
Habitat in Suecia.

hyoſcyami. 54. Chr. vireſcenti-caerulea, pedibus teſtaceis, femoribus poſterioribus violaceis. *Fn. ſuec.* 536.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 97. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 129.
Fn. ſuec. 540. Mordella ovata caerulea nitida, tibiis ferrugineis.
Degeer inſ. 5. *p.* 345. *n.* 51. Chryſomela ovata ſaltatoria. &c.
Geoffr. inſ. par 1. *p.* 248. 11. Altica caerulea &c.
Raj. inſ. 98. 9. Capricornus exiguus ſaltatorius.
Habitat in Europae *hyoſcyamo*, *braſſica.*

quadripuſtulata. 217. Chr. nigra, coleoptris punctis quatuor rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 107. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 139.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 250. *n.* 15.
Habitat in Angliae, Galliae *hortis.*

anglicana. 218. Chr. atra, elytris tibiisque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 106. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 138.
Habitat in Angliae *plantis.*

dorſalis. 219. Chr. nigra, thorace elytrorumque margine pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 105. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 137.
Habitat in Anglia, *ſtatura atricillae, an varietas?*

atricillae. 55. Chr. nigra, thorace, elytris tibiisque teſtaceis. *Fn. ſuec.* 537.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 135. *n.* 104. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 136.
Chryſomela ſaltatoria nigra, thorace elytriſque cinereis.
β) Chryſomela melanocephala. *Degeer inſ.* 5. *p* 348. *n.* 57.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 251. *n.* 19.
Habitat in Europae *plantis.*

erythrocephala. 56. Chr. atro-caerulea, capite geniculiſque pedum rufis. *Fn. ſuec.* 538.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 103. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 135.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 246. *n.* 4. Altica nigro-aenea &c.
Habitat in Europae *plantis.*

Modeeri. 57. Chr. aenea nitida, elytris apice flavis, pedibus anterioribus tibiisque poſterioribus luteis. *Fn. ſuec.* 539.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 134. *n.* 102. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 134. Chryſomela ſaltatoria viridi-aenea, elytris macula poſtica pedibusque anticis flavis.
Habitat in Europae *plantis.*

helxines. 58. Chr. viridi-aenea, antennis fuſcis, pedibus teſtaceis. *Fn. ſuec.* 543. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 100. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 132.
Fn. ſuec. 539. Mordella atro-aenea ſubrotunda.
Degeer inſ. 5. *p.* 345. *n.* 52. Chryſomela viridi-aurata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 209. *n.* 14. Altica aurea, pedibus flavis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 12.
Habitat in polygono fagopyro *aliisque.*

exoleta. 59. Chr. ferruginea, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 143.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 594. *Fn. ſuec.* 541.* Chryſomela ſaltatoria livida, elytris teſtaceis, abdomine capiteque fuſco.
Fn. ſuec. 533. Mordella flava.
Degeer inſ. 5. *p.* 338. *n.* 42.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 250. *n.* 16.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 163. *n.* 63. *t.* 44. *f.* 7. *l. m.*
Habitat in Europae *echii floribus, quos conſumit.*

nitidula. 60. Chr. viridis nitens, capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 99. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 131.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 594. *Fn. ſuec.* 542.* Chryſomela ſaltatoria, elytris caeruleis, capite thoraceque aureo, pedibus ferrugineis.
Degeer inſ. 5. *p.* 346. *n.* 54.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 249. *n.* 13.
Schaeff. ic. t. 87. *f.* 5.
Habitat in Europae *ſalice.*

trifaſciata. 61. Chr. ſupra albida, faſciis tribus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 101. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 132.
Habitat in Europae *plantis, mediae magnitudinis.*
Capitis faſcia una, elytrorum duae.

nigripes. 220. Chr. viridi - aenea, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 98. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 130.
Habitat in Anglia.

tabida. 221. Chr. pallida oculis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 113. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 145.
Habitat in Angliae *plantis.*

braſſicae. 222. Chr. atra, elytris pallide teſtaceis: margine omni faſciaque media atris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 78. *n.* 146.
Habitat in Germaniae *oleribus*, *parva.*

nemorum. 62. Chr. elytris flavis: margine omni nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 114. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 147.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 595. *Fn. ſuec.* 543.* *Scop. ent. carn.* 215. Chryſomela ſaltatoria, elytris linea flava, pedibus pallidis.
Fn. ſuec. 542. Mordella oblonga atra, elytris longitudinaliter in medio flaveſcentibus.
Degeer inſ. 5. *p.* 347. *n.* 55. Chryſomela faſciata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 247. *n.* 9.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 11.
Habitat in pulmonaria, dentaria, cardamine, *polyphaga.*

atra. 223. Chr. atra nitida, antennarum baſi plantisque piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 148.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 247. *n.* 8.
Habitat Hafniae.

ruſtica. 63. Chr. atra, antennis, pedibus elytrorumque apicibus teſtaceis.
Habitat in Europa, *elytris ſubtiliſſime punctatis.*

pulicaria. 64. Chr. nigra, elytris poſterius macula ferruginea.
Habitat in Europa, *pulicis magnitudine.*

rufipes. 65. Chr. caerulea obovata, capite, thorace, pedibus antennisque rufis. *Fn. ſuec.* 545.* *Scop. ent. carn.* 212. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 108. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 140.
Degeer inſ. 5. *p.* 343. *n.* 47. *t.* 10. *f.* 11.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 245. *n.* 2.
Schaeff. ic. t. 166. *f.* 5.
β) Chryſomela africana. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135.
Habitat in Europae *plantis*, *praeſertim malva parviflora*, β) *major in* Africa *aequinoctiali.*

fuſcipes. 224. Chr. violacea, capite thoraceque rufis, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 109. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 141.
Habitat in Angliae *plantis, an varietas rufipedis?*

teſtacea. 225. Chr. teſtacea gibba, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 110. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 142.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 250. *n.* 17.
Habitat in Angliae *plantis.*

faſcicornis. 66. Chr. caerulea obovata, capite, thorace pedibusque rufis, antennis fuſcis. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 8. *n.* 9. *t.* 1. *f.* 10.
Habitat in Germania, *et* Java, *ad rufipedem proxime accedens, at paulo major.*

holſatica. 67. Chr nigra nitida, elytris apice puncto rubro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 112. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 144.
Habitat in Holſatia *frequens, olera devaſtans.*

hemiſphaerica. 68. Chr. ſuborbiculata depreſſa nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 116. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 149.
Degeer inſ. 5. *p.* 348. *n.* 8.
Habitat in Saxoniae *corylo.*

ſurinamenſis. 69. Chr. flaveſcens, elytris margine faſciaque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 117. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 150.
Degeer inſ. 5. *p.* 355. *n.* 10. *t.* 16. *f.* 17.
Habitat Surinami.

S. littera. 70. Chr. pallida, elytris nigris: linea longitudinali flexuoſa alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 118. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 151.
Degeer inſ. 5. *p.* 357. *n.* 13. *t.* 16. *f.* 21.
Habtat Surinami.

aequinoctialis. 71. Chr. thorace rubro, elytris violaceis: maculis quatuor albis alternis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 93. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 115.
Degeer inſ. 5. *p.* 356. *n.* 11. *t.* 16. *f.* 19.
Habitat in America *meridionali.*

226. Chr.

Chryſomelae *ſaltatoriae plantarum cotyledonibus et tenellis foliis infeſtae; an huc ſpectat chryſomela maulica. Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 183. *aurata, antennis caeruleis, in umbellis viſnagae in provincia* Chilenſi Maule *habitans, muſcae magnitudine?*

Lens. 226. Chr. tota caeruleo-nigra; elytris punctatis. *Thunberg nov. act. Upſ. 4. p. 13. n. 22.*
Habitat Upſaliae *glabra, lentis magnitudine.*

exclamationis. 227. Chr. thorace nigro, elytris nigris: maculis quatuor flavis. *Thunb. nov. act. Upſ. 4. p. 14. n. 23.*
Habitat Upſaliae, *pulice fere minor.*

flavipes. 228. Chr. chalybea, elytris obſolete granulatis, pedibus antennarumque articulis primis luteis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. p. 61. n. 53.*
Habitat Berolini.

pedicularia. 229. Chr. viridi-aurea, granulata ſubtus nigra, pedibus antennisque fuſceſcentibus: articulis extremis nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. p. 61. n. 54.*
Habitat Berolini, *vix pediculi magnitudine.*

minima. 230. Chr. ex atro virens, elytris tenerrime punctatis, antennis exortum fuſcis, verſus finem nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. p. 61. n. 55.*
Habitat Berolini, *pulice dimidio minor.*

tamaricis. 231. Chr. capite nigro, thorace flavo: diſcis macula nigra, elytris glaberrimis ex fuſceſcente nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. p. 163. n. 64. t. 45. f. 6. g. h.*
Habitat in Auſtria.

fimbriata. 232. Chr. oblonga, capite, thorace quadripunctato, elytrisque pallide teſtaceis linea nigra cinctis, femoribus rufis. *Forſt. nov. inſ. gen. p. 25. n. 25.*
Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine et ſtatura cryptocephali capreae.*

hudſonias. 233. Chr. atra oblongiuſcula, antennarum baſi ferruginea. *Forſt. nov. inſ. ſp. p. 26. n. 26.*
Habitat in America *ſeptentrionali, nitens, magnitudine cryptocephali cyanotae.*

quadrinotata. 234. Chr. nigra, antennarum baſi flaveſcente, elytrorum maculis quatuor teſtaceis. *Pontoppid. Naturg. Daeunem. p. 204. t. 16.*
Habitat in Dania.

puſilla. 235. Chr. nigra, antennis pedibusque pallidis. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 923.
Habitat in Dania.

luteola. 236. Chr. lutea, oculis, pectore antennarumque apice nigris. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 924.
Habitat in Dania.

flaveola. 237. Chr. nigra, thorace capiteque rufo, elytris, antennis pedibusque luteis. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 925.
Habitat in Dania.

latiuſcula. 238. Chr. ex nigro fuſca, tibiis tarſisque ſubluteis. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 926.
Habitat in Dania.

caeruleſcens. 239. Chr. viridi-caerulea nitidiſſima, thorace laevi, antennis pedibusque rufis, femoribus poſterioribus nigris. *Degeer inſ.* 5. *p.* 346. *n.* 53.
Habitat in Europa.

cyanopicta. 240. Chr. thorace punctato vireſcenti-caeruleo, elytris violaceis punctato-ſtriatis, pedibus rufis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 344. *n.* 50.
Habitat in Europa.

ſtriata. 241. Chr. caerulea, capite, thorace, antennis pedibusque rufis, elytris ſtriatis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 343. *n.* 48.
Habitat in Europa.

ferruginea. 242. Chr. ferruginea, oculis nigris. *Scop. ent. carn. n.* 216.
β) Chryſomela (lurida) fuſco-rufa, abdomine oculisque nigris. *Scop. ent. carn. n.* 219.

truncata. 243. Chr. nigra, elytris truncatis apice ferrugineis, pedibus antennisque rufis. *Scop. ent. carn. n.* 218.
Habitat in Carniola.

verſicolor. 244. Chr. nigra, elytris nigro-aeneis ſtriatis, thorace rubro. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 245. *n.* 3. *t.* 4. *f.* 4. Altica bicolor.
Habitat in Gallia.

ovalis. 245. Chr. nigro-aenea, pedibus nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 246. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

246. Chr.

crucife-rarum. 246. Chr. nigro-aenea oblonga, pedibus nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 246. *n.* 6.
Habitat in Galliae *tetradynamis.*

ochro-pus. 201. Chr. nigra, pedibus rufis, elytris non ſtriatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 246. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

denigra-ta. 248. Chr. nigra, thorace elytrisque flavis: oris nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 248. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

laevigata. 247. Chr. caerulea, elytris punctis ſparſis, tibiis ferrugineis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 249. *n.* 12.

picipes. 266. Chr. viridi-aenea punctata pedibus piceis, elytris ſpadiceis ſuturam verſus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 324.
Habitat in Europa.

concolor. 267. Chr. fuſco aenea, elytris ſtriatis, antennis pedibusque rufis, femoribus poſterioribus fuſco-aeneis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 325.
Habitat in Europa.

crenata. 268. Chr. nigra, elytris aeneis: ſtriis crenatis antennarum baſi tibiisque piceis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 331.
Habitat in Europa.

diſcolor. 269. Chr. capite thoraceque nigro, elytris teſtaceo-fuſcis glabris, pedibus quatuor anterioribus tibiisque poſterioribus ſubteſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 332.
Habitat in Europa.

annulata. 270. Chr. fuſco-aenea, elytris ſtriis crenatis, antennarum baſi tibiisque quatuor anterioribus rufis: annulo fuſco-aeneo. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 333.
Habitat in Europa.

CRYPTOCEPHALUS. *Antennae* filiformes.
Palpi quatuor.
Thorax, nec elytra, marginatus.
Corpus ſubcylindricum.

* *palpis aequalibus filiformibus.*
† *maxilla unidentata.*
‡ *labio integro, cylindrici.*

longipes. 1. Cr. niger obſcurus, elytris pallidis: maculis tribus nigris, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 1.
Laichart. inſ. tir. 1. *p.* 166. *n.* 1. Clytra longipes.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 3.
Habitat in Germaniae, Calabriae *corylo, ſalice.*

ſexmaculatus. 2. Cr. niger, thorace rubro immaculato, elytris rubris: punctis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 2.
Habitat in Italia, *quadripunctato paulo major.*

quadripunctatus. 3. Cr. niger, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis brevibus ſerratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 76. *Fn. ſuec.* 432. *Degeer inſ.* 5. *p.* 32. *t.* 10. *f.* 7. Chryſomela quadripunctata.
Scop. ent. carn. 206. Bupreſtis quadripunctata.
Laichart. inſ. tir. 1. *p.* 167. *n.* 2. Clytra quadripunctata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 195. *t.* 3. *f.* 4. Melolontha coleoptris rubris &c.
Schaeff. elem. t. 83. *f.* 1.
ic. t. 6. *f.* 1. 2. 3.
Habitat in Europae *corylo frequens.*
Larva *ſaccata: ſacco ovato ſcabro anterius oblique truncato.*

quadrinotatus. 4. Cr. cyaneo-niger, elytris rubris: maculis duabus cyaneis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 4.
Habitat in Barbaria, *ſtatura quadripunctati, at quadruplo minor.*

atrapha-xidis. 5. Cr. niger, thorace rubro trimaculato, elytris teſtaceis: maculis tribus nigris, tibiis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 5.

Pall. it. 2. *p.* 725. *n.* 68. Chryſomela atraphaxidis.

Habitat in Sibiriae *atraphaxide, magnitudine quadripunctati.*

lunulatus. 6. Cr. ater nitidus, elytris flavis: lunula, faſcia punctoque apicis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 6.

Habitat - - - *quadripunctato paulo minor.*

12macu-latus. 7. Cr. niger, thorace elytrisque rubris: punctis quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 7.

Habitat ad caput bonae ſpei, *lunulati ſtatura et magnitudine.*

obſitus. 8. Cr. teſtaceus, antennis elytrorumque margine nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 8.

Habitat in America *meridionali.*

tridenta-tus. 9. Cr. caeruleſcens, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 9.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 73. *Fn. ſuec.* 546. Chryſomela tridentata.

Degeer inſ. 5. *p.* 333. *n.* 36. *t.* 10. *f.* 10. Chryſomela caerulea nitida &c.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 196. *n.* 3. Melolontha nigro-viridis &c.

Schaeff. ic. t. 77. *f.* 5.

Habitat in corylo, Lonicera xyloſteo, *etiam in* Calabria. Feminae *pedes anteriores elongati.*

lineatus. 10. Cr. rufeſcens, thorace maculis, elytris lineis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 10.

Habitat in Braſilia.

venuſtus. 11. Cr. griſeo-fuſcus, thorace margine maculisque duabus flavis, elytris flavis: vittis duabus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 11.

Habitat in America, *mediae magnitudinis.*

Gorte-riae. 12. Cr. ater glaber, thorace elytrisque punctis quatuor flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 12.

Syſt.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 74. *Amoen. acad.* 6. *p.* 394. *n.* 16. Chryſomela Gorteriae.

Habitat in capitis bonae ſpei *Gorteriis.*

octopunctatus. 13. Cr. niger, thorace rufo, elytris teſtaceis: punctis quatuor nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 13.

Habitat in Barbariae *plantis, ſtatura et magnitudine Cr. Gorteriae.*

maxilloſus. 14. Cr. capite thoraceque fulvis, elytris flavis: puncto baſeos ſcutelloque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 14.

Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis, antennis ſerratis.*

auritus. 15. Cr. ater, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 15.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 75. Chryſomela aurita.

Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 163. *n.* 19. *t.* 44. *f.* 5. g. h.

Habitat in Saxoniae *corylo, in* Calabria.

didymus. 16. Cr. rufus, elytris maculis tribus nigris, anteriore poſterius didyma. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 16.

Habitat in nova Hollandia.

quadrimaculatus. 17. Cr. rufus, capitis baſi elytrorumque maculis duabus cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 17.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 77. *Fn. ſuec.* 547.* Chryſomela quadrimaculata.

Fn. ſuec. 432. Chryſomela oblonga nigra, coleoptris rubris: maculis quatuor nigris.

Scop. ent. carn. 206. Bupreſtis quadripunctata.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 195. *t.* 3. *f.* 4.

Pontopp. atl. dan. 1. *t.* 29.

Schaeff. ic. t. 6. *f.* 6. 7.

Habitat in Germania, Calabria, *abdomine cinereo.*

flavicollis. 18. Cr. niger, thorace fulvo: punctis ſex nigris, elytris pallidis: punctis duobus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 18.

Habitat in Sibiria, *quadrimaculato proxime affinis.*

19. Cr.

longimanus. 19. Cr. obſcure aeneus, elytris teſtaceis: puncto baſeos nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 19.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 599. *n.* 95. *Fn. ſuec.* 562. *Pall. it.* 2. *app. n.* 67? Chryſomela longimana.
Habitat in Europae *borealis trifolio montano, euphorbia cypariſſia, tridentato affinis, ſed minor, pedibus anterioribus in altero ſexu longiſſimis.*
Larva *ſaccata.*

Lar. 20 Cr. rufus, elytris fuſcis cyaneo nitidis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 20.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

marginatus. 21. Cr. nigro-aeneus, elytris flavis: margine nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 21.
Schaller Abh. der hall. Nat. Geſ. 1. *p.* 276. Chryſomela phalerata.
Habitat in Germania, *longimano affinis.*

hirſutus. 22. Cr. thorace elytrisque obſcure aeneis pubeſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 22.
Habitat in America *boreali.*

bipunctatus. 23. Cr. niger nitidus, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longitudine corporis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 23.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 234. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 3. Cryptocephalus niger &c.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 78. *Fn. ſuec.* 548. Chryſomela bipunctata.
Uddm. diſſ. 22. Chryſomela atra, elytris rubris, punctis 4 nigris.
Petiv. gaz. t. 31. *f.* 4.
Degeer inſ. 5. *p.* 332. *n.* 35.
β) *Uddm. diſſ.* 21. Chryſomela nigra, elytris rubris, macula nigra longitudinali.
Gadd diſſ. 25. Caſſida nigra, elytris flavis nitidis, maculis quatuor nigris &c.
Habitat in Europae *borealis corylo.*

bimaculatus. 24. Cr. niger obſcurus, thorace fulvo, elytris teſtaceis: punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 120. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 24.

Schaller

Schaller Abh. der hall. Nat. Geſ. 1. *p.* 274. Chryſomela melanocephala.
Habitat in Italia *et* Saxonia.

cordiger. 25. Cr. thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 25.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 235. *n.* 7. Cryptocephalus niger.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 91. *Fn. ſuec.* 558. Chryſomela cordigera.
Uddm. diſſ. 23. Chryſomela nigra, elytris ſubflavis, punctis quatuor nigris.
Degeer inſ. 5. *p.* 330. *n.* 33.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 1.
Habitat in Europae *corylo, ſalice, thoracis macula media interdum cordata.*

bothnicus. 26. Cr. ater, thorace linea longitudinali rubra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 26.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 90. *Fn. ſuec.* 557. Chryſomela bothnica.
Degeer inſ. 5. *p.* 335. *n.* 39. Chryſomela cylindrica nigra &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 164. *n.* 21. *t.* 44. *f.* 8. n. o.
Habitat in Suecia, *cum decempunctato copula interdum connexus.*

vitis. 27. Cr. niger glaber, elytris rufis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 233. *n.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 27.
Habitat in Europae *magis auſtralis vite vinifera, quam miſere aliquando devaſtat.*

coryli. 28. Cr. niger, thorace elytrisque teſtaceis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 28.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 88. *Fn. ſuec.* 555.* Chryſomela coryli.
Habitat in Europae *corylo.*

pallens. 29. Cr. niger, thorace, elytris tibiisque pallidis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 81. *n.* 29.
Habitat in Sina, *Cr. coryli proxime affinis.*

variegatus. 30. Cr. niger, thorace linea dorſali abbreviata marginibusque rubris, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 497. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 31.
Habitat in Italia, *ſtatura cr. coryli.*

31. Cr.

triſaſcia- 31. Cr. ſupra teſtaceus, thorace faſcia, elytris tribus atris.
tus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 31.
Habitat in Sina, *ſtatura et magnitudine cr. coryli.*

ruficollis. 32. Cr. niger, thorace rufo, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 32.
Habitat in inſula S. Helenae.

nigripes. 33. Cr. capite thoraceque rufis, elytris pallidis, pedibus apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 33.
Habitat in America *boreali.*

ſexpun- 34. Cr. niger, thorace variegato, elytris rubris: maculis tri-
ctatus. bus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 34.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 599. *n.* 92. *Fn. ſuec.* 559.* Chryſomela ſexpunctata.
Degeer inſ. 5. *p.* 331. *n.* 34. *t.* 10. *f.* 9. Chryſomela rubra &c.
Scop. ent. carn. 208. Bupreſtis ſexpunctata.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 18.
Schaeff. ic. t. 90. *f.* 1-3.
Habitat in Europae *borealis corylo, etiam in* Calabria.

caeruleus. 35. Cr. cyaneus nitidus, antennis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 35.
Habitat in Africa *aequinoctiali, oblongus.*

cupreus. 36. Cr. rubro-cupreus nitidus ſubtus cyaneus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *calcarati ſtatura et magnitudine.*

rubri- 37. Cr. cyaneus nitidus, fronte, thoracis faſcia, femoribus-
frons. que rubris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 37.
Habitat - - - - ſtatura calcarati. Leske.

calcara- 38. Cr. violaceus, capite, thorace femoribusque dentatis rufis.
tus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 38.
Habitat in Sierra Leon Africae.

ſapphiri- 39. Cr. cyaneus, thorace pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1.
nus. *p.* 143. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 39.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 197. *n.* 4. Melolontha caerulea, thorace pedibusque ferrugineis.
Habitat in Gallia.

cinctus. 40. Cr. capite thoraceque rufis, elytris nigris: margine rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 40.
Habitat in America *meridionali*, *ſapphirini ſtatura*, *ſed triplo minor.*

bucephalus. 41. Cr. cyaneus, ore, thoracis marginibus pedibusque rubris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 41.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 276. Chryſomela bucephala.
Habitat in Saxoniae *anthyllide vulneraria.*

collaris. 42. Cr. cyaneus nitidus, thoracis lateribus, elytrorum apicibus femoribusque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 42.
Habitat in Sibiria, *ſericeo major.*

ſericeus. 43. Cr. viridi-caeruleus antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 43.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 233. *n.* 3. Cryptocephalus viridi-auratus ſericeus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 86. *Fn. ſuec.* 554. Chryſomela ſericea.
Degeer inſ. 5. *p.* 334. *n.* 37.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 13.
Habitat in Europae *ſelicibus*, *varius tota aenea.*

nitens. 44. Cr. viridis nitens, ore pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 44.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 84. *Fn. ſuec.* 551. Chryſomela nitens.
Degeer inſ. 5. *p.* 334. *n.* 38.
Habitat in Europae *ſalice.*

glabratus. 45. Cr. violaceus, thorace elytrisque aeneis, antennis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 45.
Habitat in Braſilia.

leuadrum. 46. Cr. ater, elytris flavis: vitta media abbreviata atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 46.
Habitat in Germania.

vittatus. 47. Cr. niger, elytris margine ſtriaque abbreviata flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 47.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 233. *n.* 4.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 62. *n.* 10. *t.* 23. *f.* 23.
Habitat in Europae *magis auſtralis graminoſis.*

48. Cr.

limbatus. 48. Cr. ferrugineus, thorace rufo, elytrorum ſuturis cyaneonitidis. *Fabr. ſp. inſ. 2. app. p.* 498. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 48.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

Moraei. 49. Cr. ater, elytris maculis duabus flavis marginalibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 49.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 234. *n.* 5. Cryptocephalus niger &c.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 82. *Fn. ſuec.* 550. Chryſomela Moraei.
Scop. ent. carn. 202. Bupreſtis Moraei.
Uddm. diſſ. 28. Caſſida nigra nitida, clypeo caput fere integrum tegente, macula ad apicem et baſin elytrorum lutea.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 5.
Habitat in Europae *hypericonibus.*

octogut-tatus. 50. Cr. ater, elytris maculis quatuor flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 50.
Habitat in Saxoniae *fraxino*, *magnitudine cr. Moraei.*

15gutta-tus. 51. Cr. rufus, thorace maculis tribus, elytris ſex flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 51.
Habitat in Braſilia.

decem-punctatus. 52. Cr. capite thoraceque variegatis, coleoptris flavis: punctis decem nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 52. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *t.* 45. *f.* 4. a. b.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 599. *n.* 93. *Fn. ſuec.* 561. Chryſomela decemmaculata.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 64. *n.* 18. *t.* 43. *f.* 26. c. Cryptocephalus hieroglyphicus?
Habitat in Europa.

bipuſtula-tus. 53. Cr. ater, elytris macula apicis rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 53.
Laichart. inſ. tir. 1. *p.* 197. *n.* 7. Cryptocephalus Podae.
Schaeff. ic. t. 77. *f.* 7.
Habitat in Europae *chryſanthemo coronario.*

bifaſcia-tus. 54. Cr. rufus, thorace maculis duabus, elytris faſciis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 54.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

quadripuſtulatus. 55. Cr. niger, elytris laevibus rufo bimaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 55.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 80. *Fn. ſuec.* 549.* Chryſomela quadripuſtulata.
Habitat in Sueciae *nemoribus.*

notatus. 56. Cr. niger, elytris punctato-ſtriatis: faſcia punctoque apicis teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 56.
Habitat in America, *parva, immaculata.*

Hiſtrio. 57. Cr. niger, thorace elytrisque ferrugineo-variegatis, pedibus ferrugineis: geniculis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 57.
Habitat in Italia, *magnitudine Cr. Scopolii.*

Scopolii. 58. Cr. niger, thorace rufo, elytris rufis: faſciis duabus cyaneis, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 58.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 81. Chryſomela Scopolina.
Habitat in Europa *auſtrali et* America, *mediae magnitudinis.*

Koenigii. 59. Cr. rufus, elytris punctis duobus caeruleſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 59.
Habitat Tranquebariae, *ad Cr. Scopolii proxime accedens.*

Paracentheſis. 60. Cr. elytris flavis: lineola punctisque tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 60.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1066. *n.* 1. Chryſomela Paracentheſis.
Habitat in Europae *ſalice, betula, ſupra flavus, thorace nigro variegato.*

hordei. 61. Cr. aeneus nitidus, fronte cuprea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 61.
Habitat in Barbariae *hordeo marino, parvus, antennis ſerratis.*

pini. 62. Cr. teſtaceus, elytris pallidis, antennis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 84. *n.* 62.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 89. *Fn. ſuec.* 556.* Chryſomela pini.
Habitat in Sueciae *pino.*

reticulatus. 63. Cr. thorace elytrisque albis, teſtaceo reticulatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 84. *n.* 63.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

puſillus. 64. Cr. thorace fulvo, elytris teſtaceis nigro-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 84. *n.* 64.
Habitat Hamburgi.

nitidulus. 65. Cr. thorace aeneo nitido, elytris cyaneis, capite, antennarum baſi pedibusque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 84. *n.* 65.
Habitat in Ruſſia *meridionali, labiato major.*

labiatus. 66. Cr. ater nitidus, ore, pedibus baſique antennarum luteſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 84. *n.* 65.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 87. *Fn. ſuec.* 553.* Chryſomela labiata.
Habitat in Europae *roſis.*

flavilabris. 67. Cr. obſcure aeneus nitidus, ore luteſcente, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 84. *n.* 67.
Müll. prodr. zool. dan. n. 519.
Geoffr. inſ. par. 1. *n.* 8.
Habitat in Saxoniae *betula, labiato affinis, at elytra ſtriato-punctata.*
Larva *ſaccata.*

flavipes. 68. Cr. ater nitidus, capite pedibusque luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 84. *n.* 68.
Habitat in Italia, *labiato affinis, at quadruplo major.*

cyaneus. 69. Cr. ex fuſco cyaneus, thorace laevi marginato, antennis nigris.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 72. Chryſomela cyanea.
Habitat in America, *magnitudine chryſomelae graminis.*

bilineatus. 70. Cr. niger, elytris lineis duabus flaveſcentibus, pedibus ferrugineis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 83. Chryſomela bilineata.
Habitat in Europa, *minutus.*

Barbareae. 71. Cr. antennis baſi oreque ferrugineis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 85. *Fn. ſuec.* 552.* Chryſomela barbareae.
Habitat in Eryſimi barbareae *floribus; an varietas labiati?*

glaucocephalus. 72. Cr. niger nitidus, capite pedibusque flavis, thorace elytrisque anterius albo marginatis.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 277. Chryſomela glaucocephala.

Habitat Halae, *rarior in betula, ſtatura et magnitudine cr.* Moraei.

biguttatus. 73. Cr. niger, capite, apicibus elytrorum pedibusque flavis.
Schranck enum. inſ. auſtr. n. 169?
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 278. Chryſomela biguttata.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 163. *n.* 20. *t.* 44. *f.* 6. i. k?
Habitat rarior Halae Saxonum, *magnitudine chryſomelae nemorum.*

Martinius. 74. Cr. caeruleus nitidus, elytris rubris.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 278. Chryſomela Martinia.
Habitat in Malabar, *ſtatura et magnitudine ad quadripunctatum accedens.*

caſſimilis. 75. Cr. ex caeruleo niger, capitis maculis duabus, pedibus anterioribus antennisque flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 63. *n.* 13.
Habitat Berolini, *labiato ſimilis, ſed major.*

ornatus. 76. Cr. niger, capitis macula biloba fulva, thoracis linea et margine flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 63. *n.* 15. *t.* 23. *f.* 24.
Habitat - - - labiato ſimilis, at major.

peregrinus. 77. Cr. niger glaberrimus, capite, thorace elytrisque caeruleis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 63. *n.* 16. *t.* 23. *f.* 25.
Habitat in India, 5 *lineas longus.*

laticlavius. 78. Cr. niger, capite, thorace elytrisque rufis, ſutura et margine elytrorum nigris, antennis ſerratis.
Forſt. nov. inſ. ſpec. p. 27. *n.* 27. Chryſomela laticlavia.
Habitat in America *ſeptentrionali, ſericei magnitudine.*

viridans. 79. Cr. viridis, elytris marginatis.
Lepech. it. 1. *p.* 312. *t.* 20. *f.* 6. Chryſomela obſcure viridis.
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

octonotatus. 80. Cr. thorace elytrisque flavis: ſingulis punctis quatuor nigris.
Lepech. it. 2. *p.* 207. *t.* 11. *f.* 19. Chryſomela octopunctata.
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

ſexnotatus. 81. Cr. niger, thoracis margine rufo, elytrorum punctis duobus maculisque quatuor nigris.
Lepech. it. 2. *p.* 207. *t.* 10. *f.* 14. Chryſomela ſexpunctata.
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

Mülleri. 82. Cr. niger villoſus, elytris punctis duobus rubris.
Müll. zool. dan. prodr. p. 58. *n.* 511. Chryſomela bimaculata.
Habitat in Dania.

muſciformis. 83. Cr. viridi-caeruleus, thorace rubro: macula caerulea, tibiis ferrugineis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 197. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

Vibex. 84. Cr. niger, elytris rubris ſtriatis: maculis quatuor limboque nigris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 234. *n.* 6. *t.* 4. *f.* 3.
Habitat in Gallia.

livens. 85. Cr. ex caeruleo violaceus punctato-ſtriatus, antennarum baſi maculaque oris pallida.
Müll. zool. dan. prodr. p. 58. *n.* 519. Cryptocephalus parvulus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 235. *n.* 8.
Habitat in Europa.

punctatus. 86. Cr. caeruleus ſparſim punctatus, tibiis anterioribus ferrugineis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 236. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

pariſinus. 87. Cr. niger ſtriatus, pedibus rufis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 236. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

rufipes. 88. Cr. niger ſtriatus, thorace pedibusque rufis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 236. *n.* 11.
Habitat in Gallia.

fulvus. 89. Cr. capite thoraceque fulvo, elytris pallidis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 237. *n.* 12.
Habitat in Gallia.

ferrugineus. 90. Cr. niger nitidus antennis corpore duplo longioribus, elytris apice macula lutea.

 Schranck

Schranck Beytr. z. Naturg. p. 64. §. 7. Chryſomela ferrugata. *Poda muſ. Graec. p.* 38. *ſp.* 9.
Habitat in Germania *ſuperiore.*

multicolor. 246. Cr. elytris flavis: faſciis duabus coccineis. *Hornſt Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 3. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 6. Chryſomela bifaſciata.
Habitat in Java, *magnitudine chryſomelae vulgatiſſimae, thorace rubro, abdominis apice nigro.*

ſumatranus. 247. Cr. elytris luteis: macula in medio caſtanea. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 4. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 4. Chryſomela bimaculata.
Habitat in Sumatra, *rarior in* Java, *magnitudine chryſomelae vulgatiſſimae.*

coffeae. 248. Cr. thoracis ſulco transverſo, abdomine viridi, elytris flaveſcentibus. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 5. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat in Bantam *in hortis, in quibus coffea colitur, hujus orillos magnitudine, facie, colore referens.*

orientalis. 249. Cr. flavus, thorace rufo: ſulco transverſo, elytris nigro caeruleis. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 5. *n.* 6. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat in Malacca, Java, *aliisque* oceani indici *inſulis, cr. phallandrii magnitudine.*

batavienſis. 250. Cr. capite, thorace, elytris pedibusque lividis. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 6. *n.* 7. *t.* 1. *f.* 12.
Habitat in Java, *magnitudine chr. nympheae; an hujus generis et tribus?*

javanus. 251. Cr. ater, thorace elytrisque rubris nigro-maculatis, antennis nigris baſi rufeſcentibus.
Hornſt. Schr. berl. Naturf. 8. 1. *p.* 7. *n.* 8. *t.* 1. *f.* 2. 5. 8. 11. Chryſomela cryptocephala.
Habitat in Java, *4punctati magnitudine et facie; an idem cum* 10*maculato?*

cyanocephalus. 252. Cr. capite, thoracis margine, elytris femorum baſi et apice violaceis, vertice et thorace coccineis. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 298. b.
Habitat extra Europam.

253. Cr.

flavifrons. 253. Cr. ater nitidus, fronte, ore, pedibus, antennarum baſi elytrorumque margine luteſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 306.
Habitat in Europa.

fuſcatus. 254. Cr. fuſcus, capite thorace elytriſque violaceis: his profunde punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 310.
Habitat in Europa.

ochrocephalus. 255. Cr. niger, capite anterius, elytriſque flavis: his guttis quatuor punctoque apicis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 312.
Habitat in Europa, *thorace flavo, maculis utrinque* 2 *connatis.*

ſuturalis. 256. Cr. ater glaber, elytris flavis: ſutura vittaque atra apice connata. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 314.
Habitat in Europa.

chryſopus. 257. Cr. ater glaber, elytris punctato-ſtriatis, capite, elytrorum apicibus pedibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 315.
Habitat in Europa.

†† *labio bifido, oblongi,* Ciſtelae.

Gigas. 91. Cr. villoſus fuſcus, elytris, abdomine femoribusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 84. *n.* 1.
Habitat in Gallia *magis auſtrali, praegrandis.*

cervinus. 92. Cr. lividus, pedibus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 115. *Fn. ſuec.* 575. Chryſomela cervina.
Habitat in Europa *boreali, etiam in* Calabria.

cinereus. 93. Cr. lividus, elytris pedibusque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 3.
Habitat in Italia, *cervino proxime affinis, an varietas?*

lividus. 94. Cr. lividus, antennis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 4.
Habitat in terra del fuego, *cinereo affinis, at duplo minor.*

ceramboides. 95. Cr. ater, thorace anterius anguſtato, elytris ſtriatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 576. Chryſomela ceramboides.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 354. *n.* 3. Mordella nigra &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 64. *n.* 1. *t.* 23. *f.* 27.
Habitat in Europa *boreali, et* Calabria, *thorace rarius teſtaceo.*

rufitarſis. 96. Cr. ater, thorace quadrato, elytris ſtriatis teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 6. *Lesk. it.* 1. *p.* 15. *n.* 5. *t.* A. *f.* 4.
Habitat in Europae *magis auſtralis ſpicis ſecalinis, cerambicoidi affinis.*

teſtaceus. 97. Cr. niger, thorace, elytris et abdomine teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 7.
Habitat in chryſanthemo, ſambuco, aliisque Barbariae *plantis, polyphaga.*

ſulphureus. 98. Cr. flavus, elytris ſulphureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 8.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 114. Chryſomela ſulphurea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 351. *n.* 11. Tenebrio luteus.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 64. *n.* 2. *t.* 23. *f.* 28.
Habitat in Europae *umbellatarum floribus.*

rubricollis. 99. Cr. ater, thorace ferrugineo, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 9.
Habitat in Europae *ſantolina, ſtatura et magnitudine ſulphureae.*

caeruleſcens. 100. Cr. ater, elytris ſtriatis caeruleſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 10.
Habitat in Barbariae *plantis, rubricollis ſtatura et magnitudine.*

analis. 101. Cr. rufeſcens, antennis, macula elytrorum anoque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 11.
Habitat Tranquebariae, *macula elytrorum interdum duplici.*

varians. 102. Cr. teſtaceus, oculis nigris, elytris ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 12.
Habitat Halae Saxonum, *murinae proxime affinis, at paulo major, antennis pedibusque interdum teſtaceis.*

murinus. 103. Cr. niger, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 118. *Fn. ſuec.* 577. Chryſomela murina.

Geoffr.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 355. *n.* 4. Mordella nigra &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 64. *n.* 3. *t.* 23. *f.* 29.
Habitat in Europa *boreali.*

humeralis. 104. Cr. niger, elytris puncto baſeos ferrugineo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 141.
Habitat Halae Saxonum, *parvus.*

Morio. 105. Cr. niger obſcurus, pedibus teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 15.
Habitat in Suecia, *parvus, oblongus, anguſtus, villoſus.*

anguſtatus. 106. Cr. thorace elytrisque obſcure rufis medio nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 16.
Habitat in Anglia, *murini ſtatura, ſed anguſtior.*

pallidus. 107. Cr. pallidus, capite elytrorumque apicibus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 17.
Habitat in Anglia.

aerugineus. 108. Cr. flavus, capite pectoreque nigris, elytris viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 18.
Habitat in Africae *plantis.*

feſtivus. 109. Cr. ferrugineus, elytris cyaneo-viridibus: margine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 19.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parvus.*

aulicus. 110. Cr. ater, thorace rufo, elytris cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 20.
Habitat ad caput bonae ſpei.

innubus. 111. Cr. niger, thorace rufo, elytris nigris: margine vittaque luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 21.
Habitat in America.

americanus. 112. Cr. thorace flavo, elytris pallidis: vitta media nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 22.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

quinquevittatus. 113. Cr. teſtaceus, elytrorumque marginibus vittaque media nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 23.
Habitat in America *boreali.*

hirtus. 114. Cr. hirtus, capite thoraceque rufis, elytris cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 24.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ad lagrias accedens.*

ſexlineatus. 115. Cr. ferrugineus, elytris flavis: lineolis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 25.
Habitat - - -

minutus. 116. Cr. niger, elytris pubeſcentibus pedibusque griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 26.
Syſt. nat XII. 2. *p.* 593. *n.* 50. *Fn. ſuec.* 533.* Chryſomela minuta.
Habitat in Europae *plantis aquaticis, dytici facie.*

lepturoides. 117. Cr. obſcure aeneus, antennis plantisque ferrugineis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 30. *n.* 30.
Habitat in Noveboraco, *leptura melanura major.*

alpinus. 118. Cr. niger nitens, elytris caſtaneis rugoſis: ſutura nigra. *v. Moll naturh. Br. üb. Oeſtr. &c. vol.* 1. *p.* 49.
Habitat in alpibus Salzburgicis.

Luperus. 119. Cr. niger, elytris virenti nitentibus, pedibus antennarumque longarum articulo primo fulvis, ultimo palporum praegrandi cordato. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 65. *n.* 4. *t.* 23. *f.* 30.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 15.
Schaeff. elem. t. 80.
Habitat in Germania, *an hujus tribus?*

betulae. 120. Cr. niger, thorace ſuborbiculato piloſo, elytris fuſceſcentibus obſolete ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 65. *n.* 5. *t.* 23. *f.* 31.
Habitat Berolini, 5 *fere lineas longus.*

reppenſis. 121. Cr. niger, thorace anterius anguſtato, poſterius dilatato, elytris laevibus pedibusque fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 65. *n.* 6. *t.* 23. *f.* 32.
Habitat rarior in Marchia, 2 *circiter lineas longus.*

ſtrigoſus. 122. Cr. rubeſcens, abdomine nigro, fronte dua[illegible], thorace tribus, elytrisque quatuor faſciis nigris.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 16.
Habitat - - - *an hujus tribus?*

240. Cr.

Forſteri. 240. Cr. ſubvilloſus fuſcus, faſciis longitudinalibus nigricantibus interruptis.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 12. *n.* 12. Ciſtela faſciata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 116. *t.* 1. *f.* 8.
Schaeff. ic. t. 95. *f.* 3.
Habitat in Europae *arena, obovatus, chryſomelae politae magnitudine.*

puſtulatus. 241. Cr. niger ovatus, macula elytrorum rufa undata. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 116. *n.* 2.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 13. *n.* 13.
Habitat in Europae *arena, magnitudine chryſomelae faſtuoſae.*

denigratus. 242. Cr. totus niger nitens glaber.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 14. *n.* 14. Ciſtela nigra.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 117. *n.* 3.
Habitat in Europae *arena, puſtulato minor.*

quadrifaſciatus. 243. Cr. obovatus niger, elytris ſtriatis.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 15. *n.* 15. Ciſtela ſtriata.
Habitat in Angliae *arena, ſtatura et magnitudine cr.* Forſteri.

holoſericeus. 244. Cr. ovatus, fuſco-viridis, elytrorum faſciis longitudinalibus interruptis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 16. *n.* 16.
Habitat in Europae *arena, magnitudine denigrati.*

capucinus. 258. Cr. ferrugineus, capite, thorace elytrisque fuſcis: his crenato-ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 335.
Habitat in Europa.

conſperſus. 259. Cr. ſupra polline luteo, ſubtus argenteo conſperſus, antennis fuſcis, pedibus fuſco ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 337.
Habitat in Europa, *curculionis facie.*

ſulphuratus. 260. Cr. fuſcus, antennis elytris pedibusque ſulphureis, plantis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 338.
Habitat in Europa, *ſtatura ſulphurei, an varietas?*

truncatus. 261. Cr. fuſcus, elytris laevibus, antennis pedibusque flavo-rufeſcentibus; thorace poſterius truncato. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 339.
Habitat in Europa.

262. Cr.

brunneus. 262. Cr. brunneus, abdomine fuſco, elytris laevibus. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 340.
Habitat in Europa.

rufitarſis. 268. Cr. oblongus, corpore capite antennis pedibusque nigro-aeneis piloſis, elytris teſtaceis punctatis, tarſis rufis. *Lesk. it. p.* 15. *t.* A. *f.* 4.
Habitat in Luſatiae monte Keulenberg.

†† *maxilla bifida, oblongi,* Crioccrides.

trilobus. 123. Cr. capite thoraceque flaveſcentibus nigro-maculatis, elytris griſeis, corpore nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus niger.*

Lineola. 124. Cr. griſeus, thorace linea dorſali, elytris puncto baſeos nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 2.
Habitat in Italia, *ſtatura Cr. nymphaeae.*

nymphaeae. 125. Cr. fuſcus, elytrorum margine prominulo flaveſcente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 99. *Fn. ſuec.* 565. Chryſomela nymphaeae.
Degeer inſ. 5. *p.* 326. *n.* 31. *t.* 20. *f.* 1. 2. Chryſomela ovata nigro-fuſca.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 254. *n.* 4. Galleruca pallida &c.
Habitat in Europae *nymphaeis, tardus.*

capreae. 126. Cr. thorace nigro-maculato elytrisque griſeis, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 100. *Fn. ſuec.* 516. Chryſomela capreae.
Degeer inſ. 5. *p.* 325. *n.* 30. Chryſomela griſea alni.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 254. *n.* 5. Galleruca nigra &c.
Fn. ſuec 1. *n.* 424. Chryſomela nigra, thorace elytrisque griſeis.
Habitat in Europae *ſalicibus.*

atratus. 127. Cr. pallidus, elytrorum omni margine atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 5.
Habitat Tranquebariae.

palliatus. 128. Cr. luteus, elytris nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 6.
Schall. Abh. hall. Nat. Geſ. 1. *p.* 279. Chryſomela oblonga lutea, oculis elytrisque nigris.
Habitat Tranquebariae.

129. Cr.

calmarienſis. 129. Cr. ovatus cinereus, elytris vitta lineolaque baſeos nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 101. Chryſomela calmarienſis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 253. *n.* 3. Galleruca pallida &c.
Habitat in Europae *ſalice, alno.*

abdominalis. 130. Cr. flavus, antennis abdomineque fuſcis, ano flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 8.
Habitat in India, *et ad* caput bonae ſpei.

capenſis. 131. Cr. niger, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei, *minor, opacus.*

ſanguineus. 132. Cr. ovatus rufus, antennis oculisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 10.
Habitat Halae Saxonum, *pedibus utplurimum cinereis.*

tenellus. 133. Cr. ferrugineus, thorace elytrorumque margine flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 11.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 102. *Fn. ſuec.* 564. Chryſomela tenella.
Habitat in Europae *ſalice.*

pictus. 134. Cr. fuſcus, capite thoraceque flavis nigro-maculatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 12.
Habitat in India, *tenelli ſtatura.*

halenſis. 135. Cr. flaveſcens, capitis baſi elytrisque aeneis, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 589. *n.* 20. Chryſomela halenſis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 164. *n.* 15. *t.* 45. *f.* 5.
Habitat in Germania *chryſomela polygoni major.*

bituberculatus. 136. Cr. fulvus, elytris pallidis: margine omni fulvo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 14.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura melanocephali.*

bidentatus. 137. Cr. flavus, elytris nigris apice flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 15.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura bituberculati.*

melanocephalus. 138. Cr. rufus, capite nigro, elytris violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 16.
Habitat in nova Hollandia.

cantharoides. 139. Cr. violaceus, capite, thorace pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 17.
Habitat in Anglia, *ſtatura cr. nymphaeae.*

melanogaſter. 140. Cr. pallidus, elytrorum maculis duabus abdomineque atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 18.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 66. *n.* 6. *t.* 23. *f.* 33. Crioceris quadrimaculata.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* Germania.

pygmaeus. 141. Cr. rufus, capite abdomineque atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 19.
Habitat in Cayenna, *minutus.*

indicus. 142. Cr. niger, capite, thorace, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 20.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

exilis. 143. Cr. niger, thorace elytrisque pallidis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 20.
Habitat ad caput bonae ſpei.

erythrocephalus. 144. Cr. niger, capite thoraceque ferrugineis, elytris viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 22.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura exilis.*

ſiamenſis. 145. Cr. niger, elytris maculis duabus teſtaceis, thorace cylindrico. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 23.
Habitat in Siam, *ſtatura merdigeri, at duplo major.*

impreſſus. 146. Cr. ater elytris rubris, thorace cylindrico utrinque ſubimpreſſo. *Fabr. mant. inſ* 1. *p.* 88. *n.* 24.
Habitat in Siam, *ſtatura merdigeri, at paulo major.*

merdiger. 147. Cr. ſupra ruber, thorace cylindrico utrinque impreſſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 25.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 599. *n.* 97. *Fn. ſuec.* 563. Chryſomela merdigera.
Degeer inſ. 5. *p.* 338. *n.* 43. Chryſomela rubra liliorum.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 239. *n.* 1. Crioceris rubra.
Scop. ent. carn. 112. Attelabus lilii.
Blank. inſ. 91. *t.* 11. *f.* 1.
Valiſn. nat. 1. *p.* 265. *t.* 32.
Merian. inſ. eur. 3. *t.* 21.
Reaum. inſ. 3. *t.* 17. *f.* 12.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 14.

Schaeff.

Schaeff. elem. t. 52. *f.* 1.
icon. t. 4. *f.* 4.
Habitat in convallaria majali, liliis, *etiam* Calabriae.

12punctatus. 148. Cr. ruber thorace cylindrico, elytris punctis ſex nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 26.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 110. *Fn. ſuec.* 568. Chryſomela 12punctata.
Scop. ent. carn. 114. Attelabus 12punctatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 241. *n.* 2. *t.* 4. *f.* 5. Crioceris rubra, punctis 13 nigris.
Friſch inſ. 13. *t.* 28.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 5.
Habitat in aſperago, *frequens.*

14punctatus. 149. Cr. thorace cylindrico fuſco: punctis quinque nigris, elytris flavis: punctis ſeptem. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 27.
Scop. ent. carn. 116. Attelabus 14punctatus.
Habitat in Germania *magis auſtrali.*

cayennenſis. 150. Cr. thorace cylindrico rufo, elytris flavis: faſciis duabus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 28.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

fucatus. 245. Cr. cyaneus, elytris flavis: maculis duabus cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 381.
Habitat in inſula S. Barthomaei.

quinquenotatus. 151. Cr. niger, thorace rufo, coleoptris flaveſcentibus: maculis quinque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 29.
Habitat in Germania *ſuperiori, ſtatura cayennenſis.*

ebraeus. 152. Cr. flaveſcens, thorace rufo, elytris albis: maculis quinque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 30.
Habitat in Cayenna, *pedibus albis.*

auſtralis. 153. Cr. rufus, thorace cylindrico, elytris faſciis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 31.
Habitat in nova Hollandia.

unifaſciatus. 154. Cr. rufus, thorace cylindrico, elytris faſcia atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 32.
Habitat in nova Hollandia, *an varietas auſtralis?*

155. Cr.

novae Hollandiae. 155. Cr. flavus, thorace cylindrico, antennis, pectore pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 33.
Habitat in nova Hollandia.

griſeus. 156. Cr. pallidus, capite femoribusque ferrugineis, antennis tibiisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 34.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.*

oculatus. 157. Cr. flavus, thorace cylindrico, elytris baſi nigris: puncto flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 35.
Habitat in nova Hollandia.

biocula-tus. 158. Cr. teſtaceus, thorace immaculato, elytris maculis duabus ocellaribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 36.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura oculati,*

nigricor-nis. 159. Cr. pallidus, thorace ſubcylindrico, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 37.
Habitat - - - *oculato paulo minor.*

nitidus. 160. Cr. viridi-aeneus nitidus, elytris teſtaceis: maculis duabus cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 38.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Cyanel-la. 161. Cr. caeruleus, thorace cylindrico: lateribus gibbis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 39.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 104. *Fn. ſuec.* 572. Chryſomela cyanella.
Degeer inſ. 5. *p.* 340. *n.* 44. Chryſomela caeruleo-violcea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 243. *n.* 5. Crioceris tota caeruleo viridis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 67. *n.* 10. *t.* 23. *f.* 34.
Habitat in Europae *plantis.*

melano-pus. 162. Cr. caeruleus, thorace pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 40.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 105. *Fn. ſuec.* 573. Chryſomela melanopa.
Degeer inſ. 5. *p.* 342. *n.* 46.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 19.
Habitat in Europa, *in* Calabriae quercu.

ochropus. 163. Cr. niger, thorace pedibusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 41.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 106. Chryſomela flavipes.
Habitat in Germania, *frequens*, *melanopodi affinis.*

ſubſpinoſus. 164. Cr. niger, capite, thorace ſubſpinoſo, pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 42.
Habitat in Anglia, *ſtatura ochropodis.*

ſaxonicus. 165. Cr. ater nitidus, antennarum baſi pedibusque rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 43.
Habitat in Saxoniae *fruticibus*, *melanopode paulo major.*

cyanocephalus. 166. Cr. cyaneus, thorace rufo, antennis pedibusque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 44.
Habitat in nova Hollandia.

aſparagi. 167. Cr. thorace rubro: punctis duobus nigris, coleoptris flavis: cruce punctisque quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 45.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 112. *Fn. ſuec.* 567. Chryſomela aſparagi.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 241. *n.* 3. Crioceris thorace rubro &c.
Scop. ent. carn. 113. Attelabus aſparagi.
Friſch inſ. 1. *p.* 27. *t.* 6.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 3. *t.* 4.
Schaeff. ic. t. 52. *f.* 9. 10.
β) Cr. elytrorum maculis duabus baſi connatis.
γ) Cr. elytrorum faſciis duabus anguſtis rubris.
Habitat in Europa, *aſparagos depaſcens*, *β*) *in* Italia, *γ*) *in* Gallia.

phellandrii. 168. Cr. niger, thoracis margine, elytrorumque lineis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 46.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 14. *Fn. ſuec.* 569. Chryſomela phellandrii.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 266. *n.* 20. Chryſomela oblonga nigra.
Degeer inſ. 5. *p.* 324. *n.* 28. *t.* 9. *f.* 34. Chryſomela oblonga nigro-aenea.
Habitat ad phellandrii aquatici *radices.*

campeſtris. 169. Cr. nigro-caeruleſcens, thoracis limbo nigro, elytris punctis tribus poſterius margine flavo connexis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 47.

 Syſt.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 113. Chryſomela campeſtris.
Valiſn. op. 1. *t.* 7. Cancarella aſparagi.
Habitat in Europa *magis auſtrali, ſtatura et magnitudine cr. aſparagi.*

longus. 170. Cr. elongatus niger, elytris vitta flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 48.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magis elongatus, quam reliqui hujus tribus.*

trilineatus. 171. Cr. pallidus, thorace maculis tribus, elytris ſtriis abbreviatis tribus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 49.
Habitat ad caput bonae ſpei.

equeſtris. 172. Cr. capite thoraceque teſtaceis, elytris brunneis: margine, lineola baſeos faſciaque media flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 50.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

ſtolatus. 173. Cr. thorace rufo, elytris flavis: vitta nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 51.
Habitat in Carolina, *pedibus flaveſcentibus: geniculis nigris.*

crataegi. 174. Cr. ruber, elytrorum linea longitudinali punctoque nigris. *Forſt. nov. inſ. ſp. cent.* 1. *p.* 28. *n.* 28.
Habitat in Angliae *crataego oxyacantha, ſubtus niger, ſtatura et magnitudine cr. nymphaeae.*

trifuſcatus. 175. Cr. niger, thorace elytrisque pallidis, elytris margine et ſutura, furca tridente, punctisque octo nigris. *Forſt. nov. inſ. ſp. cent.* 1. *p.* 29. *n.* 29.
Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine et habitu ochropodis.*

parvus. 176. Cr. fuſcus, capite bimaculato, antennarum baſi fulva. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 66. *n.* 4.
Habitat Berolini, *cupreo dimidio minor.*

palleſcens. 177. Cr. pallidus, capite nigro, antennis flaveſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 66. *n.* 5.
Habitat Berolini, *cr. nymphaeae paulo major.*

erythropus. 178. Cr. totus ruber, femoribus ſolis ad finem nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 67. *n.* 8.
Habitat Berolini, *merdigero proxime affinis.*

beroli-nenſis. 179. Cr. capite et thorace coccineis glaberrimis, elytris granulatis oculisque nigris, pedibus fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 67. *n.* 12.
Habitat Berolini, *melanopode duplo minor.*

ochraceus. 180. Cr. ochraceus, thoracis puncto et abdomine nigris, ano fulvo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 165. *n.* 16. *t.* 44. *f.* 9. p. q.
Habitat in India, 3 *lineas longus.*

fulvipes. 181. Cr. ater nitens, antennarum baſi pedibusque ſupra fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 165. *n.* 17.
Habitat in Auſtria, 2 *lineas longus.*

triſtis. 182. Cr. niger, elytris caeruleis punctato-ſtriatis, pedibus fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 165. *n.* 18.
Habitat in Auſtria, *cyanellae ſimilis, ſed minor, ſeſquilineam longus.*

nigricans. 183. Cr. niger, thorace pedibusque rubris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 231. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 2. Luperus niger.
Habitat in Gallia.

erytromelas. 184. Cr. niger, pedibus rufis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 231. *n.* 2. Luperus rufipes.
Habitat in Gallia.

aeruginoſus. 185. Cr. pallidus, capite et pectore nigris, elytris viridibus politis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 84. *n.* 913. Luperus aeruginoſus.
Habitat in Dania.

aquaticus. 186. Cr. niger, thorace maculato, elytrorum margine ſuturaque lata, pedibusque flavis.
Müll. zool. dan. prodr. p 83. *n.* 908.
Habitat in Daniae *aquis; an hujus tribus?*

veris. 187. Cr. niger, thorace cupreo, elytris viridibus, pedibus rufis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 83. *n.* 910. Galleruca veris.
Habitat in Dania, *vere conſpicuus.*

ſtriatus. 188. Cr. ater, capite ſupra, elytris et abdomine apice albidis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 85. *n.* 940. Crioceris ſtriata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 307. *n.* 3. *t.* 5. *f.* 2. Anthribus &c.
Schaeff. ic. t. 89. *f.* 6.
Habitat in Europa.

ruſſicus. 189. Cr. viridis, elytris flavis, pedibus anterioribus longioribus.
Lepech. it. I. *p.* 312. *t.* 16. *f.* 10. Chryſomela longipes.
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

luſitanicus. 190. Cr. teſtaceus, capite, pectore pedibusque nigris.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1066. *n.* 2. Chryſomela luſitanica.
Habitat in Luſitania, *habitu tridentati.*

tricolor. 263. Cr. nigra, thorace cylindrico ad latera gibbo capite elytrorum ſutura marginibusque ferrugineis, elytris teſtaceis, pedibus antennis palpisque flavo-rufeſcentibus. *Muſ. Lesk.* *p.* 17. *n.* 354.
Habitat in Europa.

melanophthalmus. 264. Cr. thorace cylindrico ad latera gibbo luteo-rufeſcente, capite rufo poſterius nigro, elytris polline rufo, abdomine argenteo conſperſis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 3. 55.
Habitat in Europa.

gibbus. 265. Cr. thorace cylindrico ad latera gibbo, capite, thorace pedibusque flavo-rufeſcentibus, elytris nigris profunde punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 356.
Habitat in Europa.

fuliginoſus. 266. Cr. niger, thorace pedibusque rufis, elytris laeviſſime punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 357.
Habitat in Europa.

ochropus. 267. Cr. niger, elytris fuſcis, thorace antennarum baſi pedibusque flavis, femoribus baſi fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 358.
Habitat in Europa.

** *palpis inaequalibus, anterioribus ſecuriformibus.*

† *labio corneo*, Erotyli.

giganteus. 191. Cr. ovatus niger, coleoptris punctis fulvis numeroſiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 157. *n.* I. *mant. inſ.* I. *p.* 91. *n.* I.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 586. *n.* I. Chryſomela gigantea.
Degeer inſ. 5. *p.* 349. *t.* 16. *f.* 8. Chryſomela oblonga nigra &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 8. *et f.* 15. Coccinella gigantea.
Habitat in India.

cancellatus. 192. Cr. ater, elytris flavis nigro-reticulatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 2.
Habitat in Braſila, *magnus, fere globoſus.*

Hiſtrio. 193. Cr. ater, elytris nigro flavoque faſciatis: macula baſeos apicisque coccinea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 3.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

lugubris. 194. Cr. teſtaceus, antennis tibiisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 4.
Habitat in America.

gibboſus. 195. Cr. niger, elytris flaveſcentibus nigro-punctatis: faſcia media et poſteriore nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 586. *n.* 2. *Amoen. ac.* 6. *p.* 393. *n.* 13. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 8? *mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 10? Chryſomela gibboſa.
Gron. zooph. 606. *t.* 14. *f.* 5. Coccinella.
Habitat in America *meridionali.*

puſtulatus. 196. Cr. ater elytris faſciis quinque punctorum fulvorum. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 498. *mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 6.
Habitat - - - giganteo affinis, ſed non gibboſus.

concatenatus. 197. ater, elytris flavo nigroque reticulatis: faſciis duabus atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 7.
Habitat - - - magnus.

quinquepunctatus. 198. Cr. ovatus, elytris nigris: punctis quinque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 8.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 586. *n.* 3. Chryſomela quinquepunctata.
Gron. zooph. 613. *t.* 16. *f.* 7. Coccinella coleoptris nigris punctato-impreſſis: maculis decem rubris.
Habitat in America.

punctatiſſimus. 199. Cr. niger, elytris flavis: punctis numeroſiſſimis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 9.
Habitat in America.

varius. 200. Cr. ater, elytris punctatis medio fulvo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 10.
Habitat Surinami, *ſtatura punctatiſſimi, at minor, thorace atro, punctis quaſi cicatricibus notato.*

macro-cheiros. 201. Cr. ater, elytris faſciis atris flavisque undatis alternis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 11.
Habitat in India, *variegato affinis, at paulo major.*

faſciatus. 202. Cr. ater, elytris faſciis tribus flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 12.
Habitat - - - mediae magnitudinis.

Zebra. 203. Cr. flaveſcens, capite, thoracis baſi, faſciis tribus elytrorum pedibusque atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 13.
Habitat in Cayenna, *reliquis hujus tribus minor, capite atro.*

immaculatus. 204. Cr. ater immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 14.
Habitat in nova Hollandia.

venereus. 205. Cr. ater, thorace elytrisque cupreis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 15.
Habitat in nova Hollandia.

nebuloſus. 206. Cr. ater, thorace elytrisque ferrugineo variis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 16.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis, mediae magnitudinis.*

dilatatus. 207. Cr. ater, thorace elytrisque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 17.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ſmaragdulus. 208. Cr. ater, elytris ſtriatis viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 12. *mant. ipſ.* 1. *p.* 92. *n.* 18.
Habitat in nova Hollandia.

amethyſtinus. 209. Cr. ater, thorace elytrisque cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 19.
Habitat in nova Hollandia.

bicolor. 210. Cr. ater, ſupra aeneus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 20.
Habitat in nova Hollandia.

kilonienſis. 211. Cr. niger, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 21.
Habitat Kilonii.

212. Cr.

jamaicenſis. 212. Cr. viridis nitidus punctatus, antennis pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 22.
Habitat in Jamaica, *antennis elongatis, ore piceo.*

cichorei. 213. Cr. ore porrecto, roſtro depreſſo elongato oblongo. *Haſſelq. it. p.* 449. *n.* 101.
Habitat in Orientis *cichoreo, medius quaſi inter cryptocephalos, dermeſtes, curculiones, cantharides; an ex hac tribu?*

†† *labio membranaceo*, Lagriae.

aeneus. 214. Cr. obſcure aeneus immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 1.
Habitat in Americae *meridionali oppoſitis inſulis.*

tahitienſis. 215. Cr. lividus, oculis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 2.
Habitat in inſula Tahiti.

pacificus. 216. Cr. lividus, thorace lineis, elytris vitta fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 3.
Habitat in nova Seelandia.

fuſcicornis. 217. Cr. cyaneus, antennis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

meridionalis. 218. Cr. rufus, elytris fuſcis: marginibus lineaque media rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 5.
Habitat in America *meridionali, eleganti affinis, at duplo major.*

elegans. 219. Cr. rufus, elytris vitta abdomineque apice fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali.*

rufifrons. 220. Cr. cyaneus, capite thoraceque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 7.
Habitat in America *boreali.*

elongatus. 221. Cr. ater, thorace rufo villoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 8.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 603. *n.* 122. Chryſomela elongata.
Habitat in Europa, *praeſertim* Anglia.

ambulans. 222. Cr. glaber ater, elytris punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 9.
Habitat in Germania, *elongato proxime affinis, at thorax ater.*

tuberculatus. 223. Cr. ovatus glaber ater, elytris tuberculatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 93. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *villoſo major.*

villoſus. 224. Cr. villoſus ater, thorace elytrisque viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae ſpei, *hirto proxime affinis.*

pubeſcens. 225. Cr. niger, thorace marginato villoſo, elytris glabris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 12.
Syſt. nat XII. 2. *p.* 603. *n.* 120. Chryſomela pubeſcens.
Habitat in Germania, *hirto affinis.*

hirtus. 226. Cr. villoſus niger, thorace tereti, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 119. *Fn. ſuec.* 578.* Chryſomela hirta.
Degeer inſ. 5. *p.* 446. *t.* 2. *f.* 23. 24. Tenebrio alatus villoſus niger &c.
Habitat in Europae *ſaponariis.*

indus. 227 Cr. cyaneus, pedibus longitudine corporis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 603. *n.* 121. Chryſomela inda.
Habitat in India, *magnitudine ſcarabaei ſtercorarii.*

ventralis. 228. Cr. villoſus cyaneus, elytris lineis elevatis tribus, abdomine rufo. *Fabr. mant. inſ* 1. *p.* 93. *n.* 14.
Habitat in India, *tomentoſo affinis.*

tomentoſus. 229. Cr. villoſus cyaneus, abdomine femoribusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 15.
Habitat in nova Hollandia, *elytris rarius fuſcis.*

glabratus. 230. Cr. glaber, thorace ruſeſcente, elytris flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 16.
Habitat in Anglia.

ſcutellaris. 231. Cr. niger, cinereo-hirtus, ſcutello albo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 17.
Habitat in Hiſpania, *ſtatura et magnitudine triticei.*

niger. 232. Cr. piloſus niger, elytris laeviuſculis ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 19.

Syſt.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 564. *n.* 28. *Fn. ſuec.* 439. Dermeſtes niger.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 71. *n.* 5. Anobium nigrum.
Scop. ent. carn. 131. Cantharis biloſa.

barbarus. 233. Cr. antennis ſerratis, hirtus, obſcure aeneus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 23.
Habitat in Barbariae *floribus compoſitis, dermeſti hirto affinis.*

antherinus. 234. Cr. niger, elytris faſciis duabus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 24.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 681. *n.* 16. *Fn. ſuec.* 829. Meloë antherinus.
Syſt. nat. X. *p.* 418. *n.* 7. Tenebrio pedicularius.
Habitat frequens in floribus, agilis, curſitans, vix pediculo major.

floralis. 235. Cr. niger, thorace ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 25.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 681. *n.* 15. *Fn. ſuec.* 829? Meloë floralis.
Habitat in Europae *plantis.*

Marchiae. 236. Cr. niger villoſus, thorace cylindrico capitisque margine poſteriore rubris, elytris ſtriato punctatis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 68. *n.* 2. *t.* 23. *f.* 35.
Habitat Berolini, 4 *lineas longus.*

++ *dubiae ſpecies.*

caraboides. 237. Cr. niger, elytris ſubcaeruleis, plantis ferrugineis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 115. *Fn. ſuec.* 574. Chryſomela caraboides.
Habitat in Europa.

punctulatus. 238. Cr. viridi-aeneus punctatiſſimus, pedibus ferrugineis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 108. *Amoen. ac.* 6. *p.* 394. *n.* 18. Chryſomela punctatiſſima.
Habitat Surinami.

lampyroides. 239. Cr. elytris ſubtomentoſis nigris: linea longitudinali margineque pallidis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 107. Chryſomela tomentoſa.
Habitat in Carolina, *cr. capreae affinis, facie lampyridis, lividus.*

200. HISPA. *Antennae* cylindricae, baſi approximatae, inter oculos ſitae.
Palpi fuſiformes.
Thorax et *elytra* ſaepius aculeata.

atra. 1. H. corpore toto atro. *Schr. der berl. Naturf. Geſ.* 4. *t.* 7. *f.* 6.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 83. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 9. Hiſpa antennis fuſiformibus, thorace elytriſque ſpinoſis, corpore atro.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 243. *n.* 7. Crioceris atra ſpinis horrida.
Habitat in Europa *auſtrali et* Africa *boreali ad radices graminum.*

teſtacea. 2. H. corpore teſtaceo, antennis aculeiſque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 10.
Habitat in Barbaria, *atrae magnitudine; thorace ſpina ſextuplici armato.*

bihamata. 3. H. inermis nigra, rubro-maculata, elytris truncatis hamatis.
Habitat in India, *oblonga, depreſſa, cr. capreae magnitudine.*

mutica. 4. H. inermis, antennis piloſis.
Fn. ſuec. 413. Dermeſtes (clavicornis) niger, antennis clavatis piloſis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 83. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 7. Hiſpa antennis piloſis, nigra, elytris ſtriatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 47. *t.* 3. *f.* 1. Tenebrio hirticornis.
Habitat in Europae *quiſquiliis, muſeis.*

ſanguinicollis. 5. H. inermis atra, thorace ſanguineo. *Mant.* 530.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 83. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 11. Hiſpa antennis fuſiformibus, thorace elytrorumque baſi ſanguineis, elytris ſerratis.
Habitat in America *meridionali.*

ſerrata. 6. H. antennis fuſiformibus, nigra, elytris rufeſcentibus apice ſerratis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 12.
Habitat Surinami, *ſtatura ſanguinicollis.*

picipes. 7. H. antennis fuſiformibus, atra, elytris pedibuſque piceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 8.
Habitat Halae Saxonum, *congeneribus longior.*

cornuta. 8. H. tota atra, thorace anterius poſteriusque ſpinoſo, elytris porcatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 15. *n.* 25. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in Suecia, *opatri ſabuloſi magnitudine, ſed anguſtior.*

ſcabra. 9. H. tota nigra, thorace alato elytrisque margine ſerrato-ciliatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 15. *n.* 26. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in Suecia, *ſilphae ferrugineae magnitudine.*
Huic et cornutae, et ſcabrae antennae fuſiformes.

capenſis. 10. H. picea hiſpida, thoracis ſpina palmata. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 66. *f.* 76.
Habitat ad caput bonae ſpei, *pediculi majoris magnitudine, colore nigro et piceo varians.*

angulata. 11. H. antennis fuſiformibus, flava, capite, thoracis linea dorſali elytrorumque margine ſinuato nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna.

dentata. 12. H. antennis filiformibus, nigra, thoracis margine, elytrorum ſerratorum macula baſeos faſciaque media flavis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Cayenna.

caerulea. 13. H. antennis ſubſerratis caerulea hirta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 7.
Habitat in Germania.

bipuſtulata. 14. H. antennis ſerratis, atra hirta, elytris macula baſeos rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 6.
Habitat in Italia, *dermeſte hirto minor.*

cornigera. 15. H. antennis ſerratis, thorace rufo, elytris caeruleis, capite bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 5.
Habitat in Anglia, *an proprii generis.*

ſerraticornis. 16. H. fuſca, antennis ſerratis, elytris ſtriatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 5. *n.* 8. Ptinus ſerraticornis.
Habitat Upſaliae, *ptini mollis magnitudine.*

pectinicornis. 17. H. fuſca, antennis pectinatis, pedibus luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 565. *n.* 1. Ptinus pectinicornis.
Fn. ſuec. 412. Dermeſtes pectinicornis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 65. *n.* 2. Ptinus atro-fuſcus &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 6.
Habitat in Europae *quiſquiliis, coryli foliis.*

18. H.

bicornis. 18. H. antennis pectinatis, thorace elytrisque viridi-aeneis, capite bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 4.

Habitat in America *boreali, an hujus generis?*

flabellicornis. 19. H. nigra, antennis pectinatis, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 2.

Schaeff. ic. t. 215. *f.* 3?

Habitat in Anglia.

myſtacina. 20. H. antennis pectinatis, elytris ſtriatis albo punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 1.

Drury inſ. 3. *t.* 48. *f.* 7.

Habitat in nova Hollandia, *praegrandis.*

201. BRUCHUS. *Antennae* filiformes.
Palpi aequales, filiformes.
Labium acuminatum.

piſi. 1. Br. elytris nigris albo-maculatis, podice albo: punctis binis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 35. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 4.

Syſt. nat. X. *p.* 356. Dermeſtes piſorum.

Amoen. ac. 3. *p.* 347. Curculio piſorum.

Kalm it. 2. *p.* 294. Bruchus Americae ſeptentrionalis.

Degeer inſ. 5. *p.* 278. *n.* 1. *t.* 16. *f.* 3. 4. Bruchus nigrofuſcus &c.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 267. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 9. Mylabris fuſca cinereo-nebuloſa &c.

Scop. ent. carn. 63. Laria ſalicis.

Ledermüll. micr. 195. *t.* 100.

Gron. zooph. 569.*

Habitat in America *ſeptentrionali, nuperius quoque in* Europa *auſtrali, piſorum agros devaſtans, pomonae etiam floribus infeſtus, devoratur a gracula quiſculá.*

umbellatarum. 8. Br. ſquamoſus ſupra griſeus ſubtus cinereus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 3.

Habitat in Barbariae *ambulatis, magnus.*

Robiniae. 9. Br. griſeo-nitidulus, elytris vix abdomine brevioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 5.

Habitat in Robiniae Pſeudacaciae *ex* America *allatis ſeminibus, magnus.*

gibboſus. 10. Br. thorace gibboſo cupreo, elytris nigris tuberculato-ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 6.
Habitat in America *boreali.*

ſcabroſus. 11. Br. niger, elytris rufis elevato-ſtriatis: punctis nigris ſparſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 7. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 28. *n.* 1. *t.* 20. *f.* 15.
Habitat in Europae *potiſſimum aeſculo.*

clathratus. 12. Br. totus niger, thorace albido-cancellato, elytrorum ſtriis ex nigro et griſeo variis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 158. *n.* 5.
Habitat Berolini, *ſcabroſi ſtatura et magnitudine.*

Cacao. 13. Br. corpore fuſco griſeo-maculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 8.
Habitat in Theobromatis *ſeminibus.*

undatus. 14. Br. niger, elytris fuſcis: ſtrigis undatis albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 9.
Habitat in Africae *floribus, mediae magnitudinis.*

Theobromatis. 2. Br. elytris griſeis nigro-maculatis, pedibus rufis, ſcutello albo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 10.
Habitat in Theobromatis *ſeminibus, indicus, ex nigro caneſcens, br. piſi dimidio minor.*

marginalis. 15. Br. niger, elytris cinereis: maculis tribus nigris margine connexis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 11.
Habitat in Germania.

canalis. 16. Br. ſubferrugineus, elytris apice atris, ano atro: linea media alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 12.
Habitat in India, *parvus.*

bipunctatus. 17. Br. cinereus, elytris fuſcis: puncto baſeos ocellari atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 13. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 4. *f.* 2.
Habitat in Helvetiae *plantis.*

varius. 18. Br. elytris nigris: punctis albis nigrisque alternis ſtriatis, femoribus muticis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 14.
Habitat in Sueciae *pinetis, ſtatura bipunctati.*

Gleditſchiae. 3. Br. elytris ſtriatis longitudine abdominis, corpore piceo, antennis nigris.
Amoen. ac. 6. *p.* 392. *n.* 5. Dermeſtes Gleditſiae.
Habitat in Americae *ſeptentrionalis Gleditſiae ſeminibus.* Femora *mutica.*

ſpinoſus. 19. Br. griſeus, thorace elytrisque ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 1.
Habitat in Jamaica.

Bactris. 4. Br. cinereus, elytris ſublaevibus, femoribus poſterioribus ovatis, tibiis incurvis. *Amoen. ac.* 6. *p.* 392. *n.* 6. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 2.
Jacq. hiſt. ſtirp. amer. t. 170.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 28. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 16.
Habitat in Bactris, *palmae americanae, nucleis.*

rufipes. 20. Br. niger, elytris albo-punctatis, pedibus anterioribus rufis, poſterioribus nigris unidentatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 29. *n.* 4.
Habitat in Pomerania, *granario proxime affinis, at minor, an varietas?*

granarius. 5. Br. elytris nigris: atomis albis, femoribus poſterioribus unidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 15.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 605. *n.* 5. Bruchus elytris nigris: atomis albis, pedibus anticis rufis, poſticis dentatis.
Fn. ſuec. 628. Curculio atomarius.*
Habitat in Europae *plantarum ſeminibus.*

ciſti. 21. Br. ater immaculatus, femoribus muticis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 12. *maut. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 16.
Habitat in ciſti helianthemi *floribus frequens.*

abdominalis. 22. Br. niger, abdomine cinereo immaculato, pedibus anterioribus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 17.
Habitat in India, *parvus.*

ſeminarius. 6. Br. ater, antennarum baſi pedibusque anterioribus teſtaceis, femoribus muticis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 18.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 268. *n.* 3. Mylabris nigra, abdomine albo ſericeo.
Habitat in Europae *floribus, pediculi magnitudine.*

maculatus. 23. Br. elytris punctatis teſtaceis nigro-maculatis, podice griſeo: punctis binis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 14. 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 19.
Habitat in Americae *ſeminibus.*

mimoſae. 24. Br. teſtaceus immaculatus, elytris ſubſtriatis femoribus poſterioribus acute dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 20.
Habitat in mimoſae Americae *meridionalis ſeminibus, ſeminario paulo major.*

ſerraticornis. 25. Br. antennis pectinatis corpore longioribus, corpore griſeo fuſco maculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 21.
Habitat in Oriente.

pectinicornis. 7. Br. antennis pectinatis corpore ferrugineo, longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 22.
Syſt. nat. X. *p.* 386. *n.* 79. Curculio chinenſis.
Degeer inſ. 5. *p.* 201. *n.* 2. Bruchus rufus.
Schaeff. elem. t. 86. *f.* 1.
Habitat in ſeminibus e Sina *allatis.*

PAUSUS. *Antennae* biarticulatae, clavatae; clava ſolida, uncinata.

microcephalus. 1. P. *Dall. diſſ. big. inſect. ſiſt. Upſ.* 1725. *Fueſſli arch. inſ.* 3. *p.* 1. *t.* 13.
Habitat in America *ſeptentrionali, totus niger, magnitudine dermeſtidis lardarii, capite minutiſſimo, thorace anguſto: anterius margine transverſo elevato, elytris abdomine poſterius fere truncato paulo longioribus truncatis.*

ZYGIA.

ZYGIA. *Antennae* moniliformes.
Palpi inaequales, filiformes.
Labium elongatum, membranaceum.
Maxilla unidentata.

oblonga. 1. Z. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 1.
Habitat in Oriente, *oblonga, rufa, capite elytrisque obſcure cyaneis.*

ZONITIS. *Antennae* ſetaceae.
Palpi quatuor filiformes, maxilla integra breviores.
Labium emarginatum.

chryſomelina. 1. Z. flava, elytris puncto medio apiceque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 1.
Habitat in Oriente, Aegypto, *ſubtus atra, ano rufeſcente.*

flava. 2. Z. rufeſcens, elytris flavis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 2.
Habitat in Oriente.

APALUS. *Antennae* filiformes.
Palpi aequales, filiformes.
Maxilla cornea, unidentata.
Labium membranaceum, truncatum, integrum.

bimaculatus. 1. Ap. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 1.
Syſt. nat. 2. *p.* 680. *n.* 9. *Fn. ſuec.* 828. *Uddm. diſſ.* 82.
Meloë (bimaculatus) alatus niger, elytris luteis macula nigra poſtica.
Degeer inſ. 5. *t.* 1. *f.* 18. Pyrochroa bimaculata.
Habitat primo vere in Sueciae *arenoſis.*

BREN-

BRENTUS. *Antennae* moniliformes, ultra medium roſtri exſertae.
Os roſtro porrecto, recto, cylindrico.

* *femoribus ſimplicibus.*

barbicornis. 1. Br. cylindricus, roſtro longiſſimo ſubtus barbato, elytris elongato-elevatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 1.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 171. *n.* 59. Curculio barbicornis.
Habitat in nova Seelandia.

aſſimilis. 2. Br. cylindricus, roſtro apice glabro atro, elytris ferrugineo-ſubfaſciatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 2.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 171. *n.* 60. Curculio aſſimilis.
Habitat in nova Seelandia.

monilis. 3. Br. cylindricus ater, elytris acuminatis uniſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 3.
Habitat in nova Hollandia, *ſtatura barbicornis, at minor.*

ſemipunctatus. 4. Br. cylindricus, thorace lineis, elytris punctis albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 4.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 171. *n.* 61. Curculio ſemipunctatus.
Habitat in nova Hollandia.

** *femoribus dentatis.*

Druryanus. 5. Br. aeneus, thorace tereti, antennis roſtro longioribus, elytris apice ſpinula mucronatis flavo-maculatis. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 16. *n.* 3.
Drury inſ. t. 42. *f.* 37.
Habitat - - -

Anchorago. 6. Br. linearis, elytris flavo-ſtriatis, thorace elongato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 5.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 182. *n.* 118.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 613. *n.* 56. *Muſ. Lud. Ulr.* 52. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 118. Curculio anchorago.
Degeer inſ. 5. *p.* 273. *n.* 8. *t.* 15. *f.* 28. Curculio longicollis.
Gron. zooph. 583. *t.* 15. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 6.
Habitat in America *auſtrali et* India.

haſtile. 7. Br. aterrimus roſtro tenuiſſimo longo ad apicem ſubarcuato, thorace medio coarctato, elytris ſubſulcatis, apice ſubacuminatis. *Pall. inſ. ruſſ.* 1. *p.* 25. *n.* 2.
Habitat - - - *ſesquipollicem longus, craſſitie vix libellae puellae.*

naſutus. 8. Br. femoribus omnibus tibiisque anterioribus dentatis, thorace elongato aeneo, elytris acuminatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 6.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 182. *n.* 119. Curculio naſutus.
Habitat in Jamaica, *anchoragini affinis, at paulo major.*

diſpar. 9. Br. linearis niger, elytris rubro-ſtriatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 96. *n.* 7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 613. *n.* 55. *Muſ. Lud. Ulr.* 50. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 120. Curculio diſpar.
Pall. inſ. ruſſ. 1. *p.* 24. *t.* B. *f.* 4. Curculio anomaloceps.
Habitat in America.

cylindricornis. 10. Br. thorace rotundato nigro-aeneo, elytris ferrugineis flavo ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 8.
Habitat in nova Seelandia, *ſtatura et magnitudine diſparis.*

bifrons. 11. Br. niger, elytris ſtriatis: maculis glabris flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 9.
Habitat in Cayenna, *ſtatura anchoraginis.*

202. CURCULIO. *Antennae* clavatae, inſidentes roſtro corneo, prominenti. *Palpi* quatuor filiformes.

* *Longiroſtres.*

† *femoribus ſimplicibus.*

Gigas. 55. C. thorace elytrisque ſcabris, antennis apice albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 1.
Habitat in Japonia.

palmarum. 1. C. ater, thorace ſupra plano, elytris abbreviatis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 42.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 2.
Degeer inſ. 5. *p.* 269. *n.* 4. *t.* 15. *f.* 26. Curculio longiroſtris, antennis fractis &c.

Rumpf

Rumpf amb. 1. *p.* 79. *t.* 17. *f.* g. Coſſus ſaguarius.
Petiv. gazoph. t. 35. *f.* 5.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 89. *n.* 40.
Gron. zooph. 578. *t.* 16. *f.* 4.
Merian. ſurin. t. 48. *f.* 3.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 20.
Habitat in Indiae *palmis.*
Larva *aſſata in deliciis. Jacq. ſtirp. am.* 278.

cruentatus. 56. C. ater, thorace lineis, elytrisque punctis duobus ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 3.
Habitat in Carolina, *c. palmarum minor.*

longipes. 96. C. nigricans, elytris ferrugineis, roſtro emarginato, pedibus anterioribus longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 4.
Drury inſ. 2. *t.* 33. *f.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei.

zaniae. 550. C. ruber, thoracis linea nigra, roſtro ſetaceo longiſſimo. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 29. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat ad caput bonae ſpei, *in cycade caffra, larva hexapus, ſetis albidis obſeſſa intra ſquamas ſtrobili feminei, nucibus rubraque carne hanc obvelanti victitans.*

exoticus. 554. C. griſeus, thorace baſi impreſſo, dorſi ruga brevi, elytris poſterius gibbis: punctorum alborum ordinibus decem; interſtitiis, profunde nigro punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 368.
Habitat extra Europam.

brachypteros. 555. C. ater, thorace plano punctato: linea media parum elevata, elytris abbreviatis ſubſtriatis: interſtitiis punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 374.
Habitat in Europa.

undatus. 556. C. niger, elytris ordine punctatis: faſciis undulatis interruptis albis. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 379.
Habitat in Europa.

atomarius. 557. C. fuſcus, elytris ſtriatis: interſtitiis laeviſſime punctatis atomis griſeis piloſis adſperſis, tibiis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 380.
Habitat in Europa.

coccineus. 558. C. coccineus, elytris punctatis: punctorum ordinibus decem. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 381.
Habitat in Europa.

ſuturalis. 559. C. griſeus, elytris ſtriatis: ſutura albida nigro punctata, macula communi oblonga verſus apicem marginumque exteriorum poſteriorum punctis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 384.
Habitat in Europa.

indus. 2. C. ater, thorace ſubovato excavato punctato, elytris rugoſo-ſulcatis, tibiis ſpinoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 43.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 5.
Degeer inſ. 5. *p.* 265. *n.* 1. *t.* 15. *f.* 22.
Habitat in India.

paganus. 97. C. griſeus, thoracis dorſo fuſco: arcubus cinereis, roſtro biſulcato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 6.
Habitat in America *auſtrali et* India.

Elephas. 98. C. fuſcus, thorace elytrisque varioloſis, elytris poſterius ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 7.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magnus.*

hemipterus. 3. C. obſcure purpuraſcens, elytris abbreviatis, femoribus mediis ciliatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 44.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 8.
Degeer inſ. 5. *p.* 271. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 25. Curculio ruſo-faſciatus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 5.
Habitat in India.

variegatus. 99. C. rufo nigroque varius, roſtro apice nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei.

alliariae. 4. C. violaceus totus. *Fn. ſuec.* 580.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 53.
Fn. ſuec. 468. Curculio nigro-caeruleſcens.
Degeer

Curculionum *longiroſtrium larvae plurimae fructus et ſemina, breviroſtrium vero folia conſumunt; aliae etiam caules conſumunt.*

Degeer inſ. 5. *p.* 251. *n.* 39. Curculio caeruleus.
Friſch inſ. 9. 35. *t.* 18.
Habitat in eryſimi alliariae *caulibus, quos perforat.*

eryſimi. 100. C. niger, thorace bituberculato vireſcente, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 54.
Habitat Kilonii, *cyaneo proxime affinis, at magis gibbus.*

cyaneus. 5. C. ater, elytris violaceis, ſcutello albo. *Fn. ſuec.* 581.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 55.
Degeer inſ. 5. *p.* 252. *n.* 41. Curculio longiroſtris, antennis rectis &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 70. *n.* 11. *t.* 24. *f.* 5. c.
Habitat in Europae *borealis potiſſimum ſalicibus.*

craccae. 6. C. gibbus ſupra ater, ſubtus cinereus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 56.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 606. *n.* 6. Curculio longiroſtris niger ovatus, roſtro ſubulato, abdomine pallido.
Degeer inſ. 5. *t.* 6. *f.* 31. 32? Curculio viciae.
Habitat in Europae *viciarum ſeminibus, pediculi magnitudine.*

malvae. 101. C. griſeus, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 57.
Habitat in Angliae *malvis.*
Roſtrum *et abdomen atra.*

campanulae. 7. C. niger ovatus elytris ſtriatis obtuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 40. *Lesk. it. p.* 16. *t.* A. *f.* 5.
Degeer inſ. 5. *p.* 226. *n.* 23. Curculio longiroſtris, antennis fractis fuſcis &c.
Habitat in campanulae rotundifoliae *pericarpiis incraſſatis.*

fuſciroſtris. 102. C. griſeus, pedibus rufis, roſtro femoribusque baſi nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 41.
Habitat in Germaniae *plantis.*

roboris. 103. C. roſtro thoraceque rufis, elytris violaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 42.
Habitat in Saxoniae *quercu, ſtatura et magnitudine fuſciroſtris.*

cupriroſtris. 104. C. oblongus viridi aeneus, elytris ſtriatis, roſtro cupreo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 43.
Habitat Dresdae *in betula, parvus.*

nigriroſtris. 105. C. viridis roſtro atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 44.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 69. *n.* 8. *t.* 24. *f.* 3.
Habitat in Angliae *arvis.*

variabilis. 106. C. ſubteſtaceus, thorace viridi lineato, roſtro apice fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 45.
Habitat Hamburgi.

rufiroſtris. 107. C. niger, roſtro dimidiato pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 46.
Habitat in Anglia.

piciroſtris. 108. C. oblongus niger argenteo-holoſericeus, roſtro dimidiato pedibusque piceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 47.
Habitat Hafniae, *rufiroſtri affinis, at major.*

ſalicariae. 109. C. niger, antennarum baſi, coleoptrorum diſco tibiisque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 48.
Habitat in Angliae *lythro ſalicaria, parvus.*

badenſis. 8. C. niger, pedibus piceis.
Habitat in Germania, *magnitudine c. ceraſi, thorace laeviuſculo ovato, elytris obſolete ſtriatis, femoribus clavatis.* Dr. Blom.

aequatus. 9. C. aeneus elytris rubris, roſtro nigro elongato.
Habitat in Germania, *ſtatura c. nucum, ſed dimidio minor.*

ceraſi. 12. C. ater, antennis ferrugineis, thorace bituberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 138.
Habitat in foliis pruni ceraſi.

quadrituberculatus. 110. C. thorace quadrituberculato nigro, elytris ſtriatis cinereo variegatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 39.
Habitat Kilonii, *parvus.*

acridulus. 13. C. piceus, abdomine ovato. *Fn. ſuec.* 584. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 62.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 291. Curculio pyriformis nigro-caeruleſcens.
Degeer inſ. 5. *p.* 235. *n.* 22. Curculio longiroſtris antennis fractis fuſcis &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *t.* 24. *f.* 12.

Habitat

Habitat frequens in Europae *borealis et* Calabriae *floribus tetradynamis.*

flavipes. 111. C. ater, femoribus luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 63.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 272. *n.* 8. Rhinomacer ſubgloboſus &c.
Habitat frequens primo vere in Europae *locis apricis calidis.*

purpureus. 14. C. purpureus nitens, roſtro longiſſimo. *Fn. ſuec.* 585. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 64.
Degeer inſ. 5. *p.* 250. *n.* 38. Curculio roſtro longiſſimo &c.
Petiv. gaz. t. 22. *f.* 5.
Liſt. loq. 394.
Bergſtr. nomencl. 1. 16. 12. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat in Europae *plantis, frumentario proxime affinis.*

frumentarius. 15. C. ſanguineus. *Fn. ſuec.* 586. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 65. *Degeer inſ.* 5. *p.* 251. *n.* 40.
Act. Stockh. 1750. *p.* 186. *n.* 1.
Act. nidroſ. 3. *p.* 391.
Leeuwenh. arc. nat. 168. *augm.* 6. *p.* 83. *f.* 3.
Habitat in Europae frumento *diutius aſſervato, peſſimus.*

bituberculatus. 112. C. ferrugineus, thorace longitudine elytrorum punctisque duobus dorſalibus elevatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 58. *mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 76.
Habitat in nova Seelandia, *granario proxime affinis.*

oryzae. 113. C. piceus, thorace punctato longitudine elytrorum, elytris punctis duobus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 75.
Amoen. acad. 6. *p.* 395. *n.* 19. Curculio (oryzae) longiroſtris oblongus niger, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis.
Habitat in oryza, *diutius aſſervata.*

granarius. 16. C. piceus, thorace punctato longitudine elytrorum. *Fn. ſuec.* 587. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 74. *Scop. ent. carn.* 89.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 285. *n.* 18. Curculio rufo-teſtaceus &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 239. *n.* 25. Curculio longiroſtris, antennis fractis &c.
Raj. inſ. 88. Scarabaeus parvus ſordide fulvus &c.

 Joblot

Joblot obſ microſcop. 1754. *t.* 7. *f.* 1.
Wilcke act. Stockh. 37. *tr.* 4. *nr.* 2.
Habitat in frumento *diutius in granariis aſſervato, peſſimus; iſatide, hyoſcyamo, ſambuco, thlaſpide pelli dicitur.*

dorſalis. 17. C. elytris rubris: ſutura nigra. *Fn. ſuec.* 588. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 66.
Fn ſuec. 1. *n.* 475. Curculio niger elytris in medio rufeſcentibus.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *t.* 44. *f.* 10. r. ſ.
Habitat in Europae *borealis ranunculo ficaria.*

melanocardius. 18. C. cinereus, coleoptris macula communi cordata fuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 18. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 10.
Sulz hiſt. inſ. 40. *t.* 4. *f.* 11.
Habitat in India.

cruciatus. 114. C. niger, thorace ſubſpinoſo: lineis, elytris poſterius cruce albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 11.
Habitat in nova Hollandia.

ſtriatulus. 115. C. niger, elytris holoſericeo-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 12.
Habitat in inſula terrae novae.

Rubetra. 116. C. ater laevis immaculatus, femoribus ſulcatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 13.
Habitat in Cayenna, *magnitudine c. pini.*

pini. 19. C. elytris teſtaceis: faſciis nebuloſis. *Fn. ſuec.* 589.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 14.
Degeer inſ. 5. *p.* 222. *n.* 15. Curculio longiroſtris, antennis fractis &c.
Friſch inſ. 11. *t.* 23. *f.* 5.
Habitat in pinus ſylveſtris *cortice, cum c. abietis aliquando copula junctus.*

onopordi. 117. C. niger cinereo-villoſus, roſtro atro: utrinque ſulco abbreviato baſeos. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 15.
Habitat in Africae *onopordis, vittato affinis, at major.*

ſtolatus. 118. C. ferrugineo fuſcus albo-lineatus, roſtro nigro: utrinque ſulco abbreviato baſeos. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 16.
Habitat in Italia, *majuſculus.*

119. C.

jaceae. 119. C. niger cinereo irroratus, elytris puncto baſeos diſtincto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 17.
Habitat in Centaurea Jacea, *adultior magis glaber.*

punctulatus. 120. C. flavo fuſcoque varius, abdomine cinereo nigro punctato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 18.
Habitat in America, *ſtatura c. jaceae, at paulo minor.*

cynarae. 121. C. niger vireſcenti irroratus, roſtro nigro ſubcarinato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 19.
Habitat in Africae *floribus cynarae, c. jaceae affinis, at duplo fere major.*

Colon. 122. C. griſeus, elytris puncto albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 20.
Mant. p. 531. Curculio longiroſtris caneſcens, femoribus anticis ſubdentatis, thorace utrinque linea, elytrisque puncto albo.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 280. *n.* 6. Curculio oblongus fuſcus.
Scop. ent. carn. 104. Curculio paluſtris.
Schaeff. ic. t. 155. *f.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 68. *n.* 3. *t.* 24. *f.* 1.
β) Curculio (ſemicolon) nigricans. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 69. *n.* 4.
Habitat in Germania.

bimaculatus. 123. C. fuſcus, elytris puncto cinereo, roſtro pedibusque atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 21.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura C. Colon, at paulo minor.*

biguttatus. 124. C. niger, elytris puncto elevato, abdomine pedibusque poſterioribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 22.
Habitat in Germania.

bilineatus. 125. C. fuſcus, elytris lineis duabus punctorum alborum. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 23.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

teſſellatus. 126. C. cinereus, elytris apice ſtriis albis nigro punctatis: *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 24.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

decurtatus. 127. C. ater, thorace plano punctato, elytris abbreviatis ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 25.

Habitat Halae Saxonum, *ſtatura fere c. palmarum, at quadruplo minor.*

equiſeti. 128. C. thorace laevi, elytris muricatis nigris: punctis duobus apiceque albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 26.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 69. *n.* 5. *t.* 24. *f.* 2.
Habitat in Angliae *equiſeto arvenſi.*

Bufo. 129. C. fuſcus, elytris ſubreticulatis: faſcia media alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 27.
Habitat in Sibiria.

atriroſtris. 130. C. cinereus, roſtro arcuato atro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 499. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 28.
Habitat Lipſiae, *magnitudine et ſtatura c. equiſeti.*

cupreus. 21. C. obſcure aeneus ſubtus obſcurior. *Fn. ſuec.* 593. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 608. *n.* 21.
Habitat in Europa.

Tragiae. 131. C. aeneus, roſtro pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 35.
Habitat in Tragiae volubilis *ſeminibus e* Braſilia *allatis.*

aeneus. 132. C. niger, elytris aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 36.
Habitat in Angliae *nemoribus.*

curviroſtris. 133. C. ater nitidus, roſto arcuato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 37.
Habitat in nova Hollandia, *parvus.*

ſcaber. 22. C. cinereus, pedibus rufis, elytris ſcabris. *Fn. ſuec.* 592.*
Habitat in Europae *urticis.*

T. album. 23. C. ater, abdomine ad latera et poſterius lacteo. *Fn. ſuec.* 594.*
Habitat in Weſterbothnia.

ruficollis. 24. C. ferrugineus, elytris capitisque baſi atro-caeruleis. *Fn. ſuec.* 595.*
Habitat in Europa.

Dryados. 134. C. cinereus, thoracis dorſo fuſco, elytris teſtaceis cinereo-undatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 67.
Habitat in Sueciae *quercu, parvus.*

135. C.

ſuturalis. 135. C. ovatus fuſcus, linea longitudinali alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 68.
Habitat in Germaniae *ſalice.*

crux. 136. C. ater, thorace punctis duobus baſeos, elytris ſutura punctisque ſparſis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 69.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 70. *n.* 14. *t.* 24. *f.* b. d.
Habitat Hamburgi.

exclamationis. 137. C. ater, elytris puncto lineolaque apicis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 70.
Habitat in nova Hollandia.

venuſtus. 138. C. fuſcus, thorace elytrisque albo lineatis, pedibus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 54. *mant inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 71.
Habitat in Anglia, *parvus.*

plantaginis. 139. C. elytris cinereis: macula media fuſca. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 72.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura c. rumicis.*

viſcariae. 27. C. ſubrotundus cinereus, thorace elytrisque cinereo-virentibus. *Fn. ſuec.* 598.*
Habitat in lychnidis viſcariae *fructificationibus.*

bipunctatus. 28. C. cinereus, elytris macula nigra, tibiis flaveſcentibus. *Fn. ſuec.* 599.*
Habitat in Europa.

quadrimaculatus. 29. C. nigricans, coleoptris maculis quatuor albidis. *Fn. ſuec.* 600.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 58.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 287. *n.* 22. Curculio cinereus &c.
Habitat in Europa.

unifaſciatus. 140. C. ſupra fuſcus, faſcia media cinerea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 59.
Habitat Halae Saxonum, *mediae magnitudinis.*

bifaſciatus. 141. C. niger, elytris faſciis duabus cinereis: baſeos majore undata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 60.
Habitat in Kilonii *plantis.*

lythri. 142. C. ater, elytris faſcia media abbreviata punctoque poſteriore albis, pedibus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 61.
Habitat in Uplandiae *floribus lythri*, *parvus*.

quinque-maculatus. 30. C. griſeus, coleoptris maculis quinque albis. *Fn. ſuec.* 601.*
Habitat in Europa.

pericarpius. 31. C. ſubgloboſus nebuloſus, elytrorum ſutura baſi alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 49.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 609. *n.* 31. *Fn. ſuec.* 602.* Curculio longiroſtris ſubgloboſus nebuloſus, coleoptris macula cordata alba.
Habitat in ſcrophulariae *pericarpiis*.

ſiſymbrii. 143. C. albo-fuſcoque varius, elytris puncto baſeos elevato atro, roſtro nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 50.
Habitat Kilonii, *in ſiſymbrio amphibio*.

capreae. 144. C. coleoptris faſciis duabus abbreviatis undatis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 51.
Habitat in Angliae *ſalice caprea*, *parvus*.

Rana. 145. C. thorace fuſco: limbo teſtaceo, elytris teſtaceis: faſciis tribus undatis cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 52.
Habitat Kilonii, *parvus*, *gibbus*.

paraplecticus. 34. C. cylindricus ſubcinereus, elytris mucronatis. *Fn. ſuec.* 604.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 62. *mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 77.
Fn. ſuec. 445. *It. ſcan.* 184. Curculio fuſcus oblongus, elytris rectis acuminatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 279. Curculio oblongus &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 224. *n.* 18. *t.* 7. *f.* 8. Curculio phellandrii.
Schreber Samml. 11. *p.* 336. *t.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 44. *f.* 1.
Habitat in Europae *et* Sibiriae *umbellatis aquaticis*, *praeſertim phellandrio*, *larva intra caulem*, *ſaepe ſub aqua latente*, *et paraplegiae*, *ut fertur*, *apud equos cauſſa*, *ſuis ſtercore antidoto*.

146. C.

umbellatarum. 146. C. thorace nigro cinereo lineato, elytris mucronatis griſeis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 78.
Habitat in Barbariae *umbellatis, ſtatura fere paraplectici, at duplo fere minor.*

filiformis. 147. C. cylindricus ſubcinereus, thorace lineis tribus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 63. *mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 79.
Habitat in Italia, *ſtatura paraplectici, at quadruplo minor.*

cylindricus. 148. C. cylindricus ſupra niger, elytris acuminatis: faſcia pallida. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 64. *mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 80.
Habitat in Sibiria, *ſtatura paraplectici, ſed minor.*

notatus. 149. C. thorace fuſco: punctis quatuor albis, elytris fuſcis; faſcia ſesquialtera teſtacea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 81.
Habitat in Barbariae *plantis, cylindricus.*

barbiroſtris. 150. C. niger, roſtro barbato, tibiis anterioribus tridentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 65. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 82. *Seb. muſ.* 4. *t.* 95. *f.* 5.
Habitat in America *auſtrali, et* India.

anguſtatus. 151. C. cylindricus ater, elytris obtuſis punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 66. *mant. inſ.* 1. *p.* 104 *n.* 83.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 71. *n.* 18. *t.* 24. *f.* 7.
Habitat rarior in Anglia.

bardanae. 152. C. cylindricus griſeo tomentoſus, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 84.
Habitat Dresdae *in arctio lappa, ſtatura et magnitudine paraplectici.*

anguinus. 35. C. cylindricus canus, fuſco lineatus.
Habitat in Germania, *ſtatura paraplectici, ſubtus pedibusque canus nigro punctatus; roſtro magis arcuato, elytris longitudinaliter duplici ſerie punctorum excavatorum minutiſſimorum ornatis, apice mucronatis.*

Aſcanii. 36. C. cylindricus ater, lateribus ſubcaeruleſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 67. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 85.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 71. *n.* 19. *t.* 24. *f.* 8.
β) Curculio cylindricus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 71. *n.* 20.

Habitat

Habitat in Europa *auſtrali, ſtatura paraplectici, ſubtus caneſceus, elytris acutis.* Aſcanius.

lineola. 153. C. cylindricus niger, elytris vitta teſtacea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 86.

Habitat in nova Hollandia.

linearis. 154. C. elongatus niger, antennis pedibusque piceis, roſtro baſi attenuato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 87.

Habitat Argentorati, *rarior totus ferrugineus.* Hermann.

craſſipes. 155. C. femoribus anterioribus ſubclavatis, corpore atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 70. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 88.

Habitat Argentorati. Hermann.

atriplicis. 156. C. elongatus ater, thorace nitido, elytris ſtriatis obtuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 89.

Habitat in littoris Kilonienſis *et* Norwegici *atriplice littorali.*

Bacchus. 38. C. cupreus, roſtro plantisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 29.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 270. *n.* 4. Rhinomacer niger &c.

Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 4.

Schaeff. ic. t. 37. *f.* 13.

Habitat in Europae *magis auſtralis vite, corylo, ſupra ſubvilloſus.*

betulae. 39. C. corpore viridi-aurato, ſubtus concolore. *Fn. ſuec.* 605.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 30.

Degeer inſ. 5. *p.* 248. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 25. Curculio longiroſtris, antennis rectis nigris &c.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 270. *n.* 2. Rhinomacer totus viridicaeruleus.

Friſch inſ. 12. 17. *t.* 8. *f.* 2.

Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 5.

Schaeff. ic. t. 6. *f.* 4.

Habitat in betula alba, *et frequentiſſimus in* vite, *folia contorquens, aliquando totus caeruleus, alterius ſexus thorace antrorſum ſpinoſo.*

populi. 40. C. corpore viridi-ignito, ſubtus atro-caeruleſcente. *Fn. ſuec.* 606. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 24. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 31.

Degeer

Degeer inſ. 5. *p.* 249. *n.* 37. Curculio longiroſtris, antennis rectis nigris &c.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 270. *n.* 3. Rhinomacer viridi-auratus, ſubtus nigro-violaceus.

Habitat in betula, populo, *alterius ſexus thorace antrorſum ſpinoſo.*

bicolor. 157. C. niger, thorace elytrisque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 32.

Habitat in America.

caeruleocephalus. 158. C. violaceus nitens, thorace elytrisque teſtaceis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 282. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 33.

Habitat in Saxoniae *crataego, ſtatura bicoloris.*

ſturnus. 159. C. ovatus niger flavo-irroratus. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 280.

Habitat Halae Saxonum *gregarius in urticis, c. jaceae affinis, c. pini magis ovatus.*

pariſinus. 160. C. elytris thoraceque viridibus, roſtro pedibusque nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 16. *n.* 27.

Habitat Lutetiis Pariſiorum, *pediculo duplo major, oblongo-cylindricus.*

cylindroides. 161. C. elongatus flavo irroratus, elytris punctato-ſtriatis apice obtuſiuſculis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 38. *n.* 1.

Habitat ad caput bonae ſpei, *paraplectico affinis.*

porifer. 162. C. thorace ſubgloboſo: ſpinulis brevioribus trifariis apice pertuſis, elytrisque nigricantibus albo-lineatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 38. *n.* 2.

Habitat ad caput bonae ſpei, *ſubtus cinereo-pubeſcens.*

caffer. 163. C. ater thorace ſcabro, antennis utrinque cicatrice notato, elytris punctato-ſtriatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 39. *n.* 3.

Habitat ad caput bonae ſpei, *ſubtus griſeo-pubeſcens, antennarum clava ſericeo-argentea.*

armillatus. 164. C. thorace utrinque ſubſpinoſo, femoribus ad apicem cingulo griſeo notatis, tibiis fere omnibus dentatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 40. *n.* 10.

α) Cur-

α) Curculio totus ex fuſco cinereus.
β) Curculio elytris cinereo-nebuloſis: maculis utrinque obliquis oblongis cinereis.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ulicis. 165. C. cinereus, abdomine ovato, antennis, tarſis, tibiis omnibus et femoribus primi paris rufis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 31. *n.* 31.
Habitat in Anglia, *in floribus ulicis europaei, primo vere conſpicuus, vix pediculi magnitudine.*

latus. 166. C. ater depreſſus flavo irroratus thorace granulato: linea media elevata transverſa, elytris ſulcatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 71. *n.* 21. *t.* 24. *f.* 9.
Habitat in Hungaria, *c. Aſcanii affinis.*

rumicis. 60. C. griſeus nigro-nebuloſus, antennis fuſcis. *Fn. ſuec.* 590. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 73.
Degeer inſ. 5. *p.* 231. *n.* 20. *t.* 7. *f.* 10. 11.
Raj. inſ. 85. *n.* 36.
Habitat in Europae *rumice.*

ungaricus. 167. C. niger, thorace elytrisque purpureis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 71. *n.* 22. *t.* 24. *f.* 10.
Habitat in Hungaria, *ſtatura et magnitudine bacchi.*

cyanocephalus. 168. C. niger villoſus, capite chalybeo, thorace rubro, elytris ſubſpadiceis punctato ſtriatis, femoribus vireſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 72. *n.* 23. *t.* 24. *f.* 11.
Habitat frequens in Marchiae *betula, 2 lineas longus.*

ſtriatus. 169. C. cinereo-pubeſcens, thoracis ſtriis tribus albidis, elytrorum totidem nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 72. *n.* 25. *t.* 24. *f.* 13.
Habitat Berolini, *rarior, 3 circiter lineas longus, c. polygoni proxime affinis.*

canus. 170. C. ſubgloboſus cinereo-pubeſcens, elytris abbreviatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 73. *n.* 26. *t.* 24. *f.* 14. c.
Habitat Berolini.

cruciger. 171. C. nigerrimus, antennarum baſi tarſisque fuſcis, elytris abbreviatis ſtriatis albo maculatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 73. *n.* 27. *t.* 24. *f.* 15.
Habitat Berolini, *2 circiter lineas longus.*

172. C.

Grus. 172. C. niger, ſubtus cinereus, thorace elytriſque punctato-ſtriatis ſcabris, femoribus clavatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 73. n. 28.*
Habitat in Pomerania, *vix ſeſquilineam longus.*

alauda. 173. C. cinereus, ſubgloboſus thoracis dorſo faſcia transverſa maculiſque nigris, pedibus fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 74. n. 29. t. 24. f. 16. f.*
Habitat in Pomerania.

urticarius. 174. C. fuſcus: faſciis villoſis albidis undulatis, pedibus fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 74. n. 30.*
Habitat in Pomerania, *vix pulicis magnitudine.*

Punctum album. 175. C. nigerrimus, ſubtus et ad latera ochroleuco irroratus, antennis fulvis, elytrorum ſutura puncto medio albo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 74. n. 31. t. 24. f. 17.*
Habitat in nymphaeae luteae *floribus, magnitudine et ſtructura c. ſcrophulariae.*

albovittatus. 176. C. flavo-cinereus, elytris vitta utrinque alba, roſtro nigro. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 74. n. 32.*
Habitat in Marchia.

Lineola alba. 177. C. convexus piceus, elytris ſtriatis albo villoſis: ſuturae linea alba abbreviata. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 74. n. 33.*
Habitat in Marchia, *pulicis magnitudine.*

verſicolor. 178. C. piceus albido-pubeſcens, roſtro nigro. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 75. n. 34.*
Habitat in Marchia, *ſtatura et magnitudine granari.*

melas. 179. C. anguſtus nigerrimus, tenuiſſime punctatus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. p. 166. n. 94.*
Habitat in Auſtria, *vix ſeſquilineam longus.*

roſarum. 180. C. ſubgloboſus niger albido-pubeſcens, elytris ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. p. 167. n. 97.*
Habitat Berolini, *ſeſquilineam longus.*

quadripunctatus. 181. C. griſeus, thorace lineis duabus, elytris punctis quatuor albis. *Lepechin it. 2. p. 204. t. 11. f. 23.*
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

varius. 182. C. albo nigroque varius, elytris apice acuminatis. *Lepech. it.* 2. *p.* 204. *t.* 11. *f.* 33.
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

piceus. 183. C. piceus, elytris abdomen aequantibus. *Pall. it.* 1. *app. n.* 34. *inſ. muſ.* 1. *p.* 23. *t.* B. *f.* 3.
Habitat in muria lacus Inderienſis, *c. palmarum affinis, at quadruplo minor.*

nomas. 184. C. oblongus, ſubtus albo-tomentoſus, elytris caneſcentibus: ſtriis punctato-ſulcatis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 31.
Habitat in Sibiria.

picatus. 185. C. oblongus ex nigro piceus, antennis fuſcis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 221. *n.* 14.
Habitat - - - $4\frac{1}{2}$ *lineam longus.*

gibboſus. 186. C. ovatus niger, elytris tuberculatis, poſterius cinereis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 224. *n.* 17.
Habitat - - - $2\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

caſtaneus. 187. C. oblongus caſtaneus, ſubtus niger, elytris ſtriato-punctatis gibboſis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 231. *n.* 19.
Habitat - - - $3\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

faſciatus. 188. C. cinereus oblongus, faſciis longitudinalibus dilutioribus. *Fn. ſuec. ed.* 2. *n.* 2274. *Degeer inſ.* 5. *p.* 234. *n.* 21.
Habitat - - -

naevius. 189. C. ovatus griſeus, thorace faſciis, elytris macula magna punctisque fuſcis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 237. *n.* 24. *t.* 7. *f.* 17. 18.
Habitat in plantagine, *Julii fine frequens.*

roſtratus. 190. C. oblongus rufus, capite elytrisque viridi-caeruleis nitidis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 252. *n.* 42. *t.* 7. *f.* 27. 28.
Habitat in Sueciae *hortis.*

melanocephalus. 191. C. ſubgloboſus fuſcus, capite roſtroque nigris, elytris gibbis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 272. *n.* 6. *t.* 15. *f.* 27.
Habitat Surinami, 4 *lineas longus.*

frugilegus. 192. C. oblongus caſtaneus coleoptris thoracem aequantibus: maculis quatuor rufis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 273. *n.* 7.
Habitat Surinami *et in* Oriente, *parvus, fruges conſumens.*

193. C.

An ſpecies a Schaefſero ic. t. 56. *f.* 4. *et t.* 95. *f.* 6. 7. *depictae, teſtaceus et Schaefferi hujus ordinis?*

pulverulentus. 193. C. fuſcus, thorace granulato, elytris transverſim rugoſis. *Scop. ent. carn. n.* 75.
Habitat in Carniola.

centaureae. 194. C. ovatus fuſcus ſubrufo-villoſus, roſtro deflexo marginato: linea ad apicem elevata media. *Scop. ent. carn. n.* 76.
Habitat in centaureis.

auratus. 195. C. viridi-auratus, antennis roſtrique apice dilatato nigris. *Scop. ent. carn. n.* 77.
Habitat in Carniolia.

icoſandriae. 196. C. atro-caeruleus, roſtro porrecto, elytris octo-ſtriatis. *Scop. ent. carn. n.* 87.
Habitat in plantis icoſandris.

oleraceus. 197. C. globoſus nigricans, elytris puncto lunulaque apicis albis. *Scop. ent. carn. n.* 88.
Habitat in Carniolia.

pellucens. 198. C. flavicans, oculis roſtrique apice nigris. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 90. *n.* 41.
Habitat circa Schemniz Hungariae, *vix* 2 *lineas longus.*

gibbus. 199. C. ovatus niger, elytris violaceis ſulcatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1014.
Habitat in Dania.

ſimilis. 200. C. ater, elytris ovatis punctato-ſtriatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1015.
Habitat in Dania.

nemoralis. 201. C. niger, oculis fuſcis, elytris punctato-ſtriatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1016.
Habitat in Daniae *nemoribus.*

politus. 202. C. niger, elytris cyaneis ſtriatis nitidis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1017.
Habitat in Dania.

ochropus. 203. C. niger ovatus, femoribus ex flavo rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1018.
Act. Nidroſ. 4. 15.
Habitat in Scandinavia.

griſeus. 204. C. oblongus cinereus, antennis rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 974.
Habitat in Dania.

nitens. 205. C. oblongus ex nigro violaceus, thorace elytriſque ex nigro virentibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 975.
Habitat in Dania.

arvenſis. 206. C. griſeus, thorace trilineato, elytris rufis obſcure teſſellatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 978.
Habitat in Dania.

tuberculatus. 207. C. niger, thorace rugoſo, elytris lineis tuberculiſque muricatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 979.
Habitat in Dania.

glaucus. 208. C. niger, thorace utrinque linea pallida, tibiis rufis. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 88. *n.* 989.
Habitat in Dania.

trifolii. 209. C. niger, femoribus pallidis, abdomine albo. *Syſt. nat.* XII. 3. *add. p.* 224.
Habitat in trifolii montani *ſpicis, intra quas declaratur, pulicis magnitudine.*

longus. 210. C. anguſtus elongatus niger, thorace faſciis quatuor albicantibus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 269. *n.* 1.
Habitat in Gallia.

fuliginoſus. 211. C. ex atro fuſcus glaber punctato-ſtriatus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 271. *n.* 6.
Habitat in Gallia.

teres. 212. C. ex nigro virideſcens oblongus ſtriatus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 272. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

Pulex. 213. C. ſubgloboſus villoſus niger, pedibus elytriſque rufis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 272. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

rugoſus. 214. C. totus fuſcus rugoſus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 278. *n.* 2.
Habitat in Gallia.

ſulcatus. 215. C. fuſco-nebuloſus, thorace ſulcato, elytris ſtriatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 278. *n.* 3.
Habitat in Gallia.

carduelis. 216. C. niger ſtriatus, maculis villoſo-fuſcis nebuloſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 281. *n.* 8.
Habitat in Galliae *carduis.*

napobraſſicae. 217. C. ex atro cinereus, capite globoſo, roſtro elytrisque nigris, antennis fuſcis. *Bjerkander nov. act. Stockh.* 1780. 3. *n.* 4. *p.* 185.
Habitat in napobraſſicae *caulibus, quós exedit, lineam longus, an hujus ordinis?*

erythropus. 560. C. griſeus, elytris ſtriatis, roſtro pedibusque nigris, tibiis apice incurvis plantísque rubris. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 385.
Habitat in Europa.

chalybeus. 561. C. glaber nigro-caeruleſcens, roſtro arcuato, thorace punctato, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 388.
Habitat in Europa.

crenulatus. 562. C. niger glaber, roſtro longitudine corporis, elytris ſtriatis: ſtriis profunde crenatis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 390.
Habitat - - -

foveolatus. 563. C. viridi-aureus, roſtro pedibusque nigris, abdomine violaceo elytris profunde punctatis, antennas inter oculosque fovea oblonga. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 391.
Habitat in Europa.

virens. 564. C. cylindricus viridis nitens, roſtro pedibusque cupreis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 392.
Habitat in Europa.

craſſicornis. 565. C. niger, roſtro compreſſo, antennis non fractis apice craſſioribus, thorace elytrisque leviſſime punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 393.
Habitat in Europa.

glabratus. 566. C. niger glaber, elytris nigro-aeneis ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 398.
Habitat in Europa, *ſtatura c. alliarii.*

atomarius. 567. C. fuſcus, elytris ſtriatis: atomis griſeis piloſis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 399.
Habitat in Europa.

ſtriatulus. 568. C. niger, elytris ſulcatis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 400.
Habitat in Europa, *ſtatura aterrimi.*

rugoſus. 569. C. fuſcus, elytris rugoſis, tibiis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 405.
Habitat in Europa.

crinitus. 570. C. niger globoſus griſeo piloſus, roſtro glabro incurvo, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 407.
Habitat in Europa.

haematopus. 571. C. niger, thorace punctato, elytris ſtriis crenatis, antennis tibiisque ſanguineis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 417.
Habitat in Europa.

†† *femoribus poſterioribus incraſſatis*, ſaltatorii.

quercus. 25. C. pallide flavus, oculis nigris. *Fn. ſuec.* 596.* *Uddm. diſſ.* 25.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 184. *n.* 126. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 155. Curculio (viminalis) longiroſtris, femoribus ſaltatoriis, corpore teſtaceo.
Degeer inſ. 5. *p.* 260. *n.* 48. *t.* 8. *f.* 5. Curculio ulmi.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 286. *n.* 19. Curculio rufus.
Reaumur inſ. 3. 31. *t.* 3. *f.* 17. 18.
Habitat in Europae *ſalicis*, *ulmi*, *quercus foliis*, *inter venas majores ſubcutaneus*, *folia maculans*, *magnitudine pediculi.*

multidentatus. 572. C. rufus, oculis nigris, pedibus poſterioribus multidentatis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 441.

meticuloſus. 218. C. griſeo fuſcus, ſubtus elytrisque poſterius albidus villoſus, roſtro inflexo nigro. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 8.
Habitat ad caput bonae ſpei.

pudicus. 219. C. pallide griſeus, roſtro inflexo ſanguineo, capite pedibusque rubicundis, elytris ſtriatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ilicis. 220. C. nigricans, elytris ſtriatis cinereo variis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 156.
Habitat in Uplandiae *quercu*, *parvus*, *ſtatura c. quercus.*

Jota. 221. C. ater, elytris ſtriatis, ſutura baſi alba. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 157.
Habitat in Uplandia, *parvus.*

alni. 42. C. niger, elytris teſtaceis: maculis duabus obſcuris. *Fn. ſuec.* 608.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 123. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 151.

Fn.

Fn. ſuec. 1. *n.* 473. Curculio lividus, coleoptris maculis quatuor obſcuris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 286. *n.* 20. Curculio rufus.
Degeer inſ. 5. *p.* 262. *n.* 49. Curculio alni ſaltator.
Habitat in Europae *alno.*

piloſus. 222. C. niger, cinereo variegatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 124. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 152.
Habitat in Anglia, *parvus.*

Calcar. 223. C. niger, femoribus unidentatis, antennis plantisque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 153.
Habitat Kilonii, *parvus.*

ſalicis. 43. C. elytris atris: faſciis duabus albis. *Fn. ſuec.* 610.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 125. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 154.
Degeer inſ. 5. *p.* 264. *n.* 51.
Habitat in ſalicis *floribus.*

fagi. 44. C. corpore atro, femoribus pallidis. *Fn. ſuec.* 609. *It. ſcan.* 111. *Scop. ent. carn.* 73. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 127. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 158.
Habitat in fagi ſylvaticae *foliis.*

ſegetis. 45. C. corpore piceo, elytris oblongis. *Fn. ſuec.* 611.
Habitat in agris ſuper ſpicas.

rhei. 279. C. ater opacus, thorace ſubpunctato, elytris punctato-ſtriatis, ſubtus albido-pubeſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 78. *n.* 50.
Habitat Berolini, *ſine roſtro* 3 *lineas longus.*

rhamni. 280. C. ater opacus, roſtro nitido, thorace grundato, elytris ſubſulcatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 78. *n.* 51.
Habitat in Marchia, *absque roſtro* 4 *lineas longus, c. rhei ſimilis.*

curviroſtris. 282. C. nigricans albido-pubeſcens, thorace punctato, elytris ſtriatis, roſtro incurvo, antennarum clavis fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 78. *n.* 53.
Habitat in Marchia, 1½ *lineam longus.*

Vanellus. 283. C. capite thoraceque ſubvilloſo brevibus elytris ſtriatis, pedibus fuſceſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 79. *n.* 55. *t.* 24. *f.* 23. I.
Habitat Berolini, *vix lineam ſuperans.*

 284. C.

arator. 284. C. ſubovatus, thorace fuſco: lineis tribus pallidis, elytrorum ſutura nigro dentata, pedibus fuſcis. *Mant. p.* 531.
Habitat - - - cimicis magnitudine.

maricatus. 285. C. ex fuſco nigricans, elytris verrucoſo-ſtriatis, femoribus unidentatis. *Drury inſ.* 2. *t.* 34. *f.* 4.

varicoſus. 454. C. elytris connatis ſulcatis ſupra ſextuberculatis, poſterius bimucronatis. *Pall. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 22. *t.* B. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, inter maximos congenerum, vaginali affinis, ater.*

rhynchoceros. 455. C. elytris connatis tuberculatis mucronatis, roſtro baſi bicorni. *Pall. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 23. *t.* B. *f.* 2.
Habitat in America, *varicoſo paulo brevior et latior.*

exeſus. 456. C. corpore nigro luteſcente irrorato, thorace elytrisque maculis exeſis albis. *Pall. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 33. *t.* H. *f.* B. 15.
Habitat Surinami, *germano affinis, at major.*

danubialis. 478. C. elytris cervinis: punctis nigris ſparſis.
Habitat in inſulis danubialibus Viennenſibus *in corticibus arborum, 2 lineas longus.*

††† *femoribus dentatis.*

aterrimus. 10. C. ater, elytris nitidis. *Fn. ſuec.* 582.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 103. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 132.
Habitat in Europae *plantis frequentiſſimus, ſtatura et magnitudine ocelliariae.*

ceraſi. 11. C. ater, elytris opacis oblongis. *Fn. ſuec.* 583. *Scop. ent. carn.* 84. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 104. *mant. inſ.* 1. *p.* 108 *n.* 133.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 299. *n.* 48. Curculio niger, thorace utrinque dentato.
Friſch inſ. 11. 31. *t.* 23. *f.* 1. 3.
Habitat in ceraſi pyri*que foliis, epidermidem exedens, commaculans,* 1750 *in Suecia frequentiſſimus.*

beccabungae. 41. C. niger, elytris rufis: margine omni nigro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 130.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 614. *n.* 41. *Fn. ſuec.* 607.* Curculio fuſcus, elytris ſubſanguineis: margine anoque fuſcis?
Habitat in Sueciae *beccabunga, magnitudine et ſtatura C. ceraſi.*

Troglodytes. 224. C. thorace linea dorſali cinerea, elytris pedibusque teſtaceis, pedibus fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 108. *n.* 131.
Habitat Kilonii, *parvus.*

lapathi. 20. C. albo nigroque varius, thorace elytrisque muricatis. *Fn. ſuec.* 591.* *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 176. *n.* 86. *mant. inſ.* I. *p.* 106. *n.* 109.
Degeer inſ. 5. *p.* 223. *n.* 16. *t.* 7. *f.* I. 2. Curculio albicaudis.
Habitat in Europae *ſalicibus et rumicibus, pectoris lateribus elytrisque poſterius albidis.*

irroratus. 225. C. albus ſupra fuſcus albo maculatus, femoribus fuſco annulatis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 106. *n.* 110.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine C. lapathi.*

ſexguttatus. 226. C. niger, elytris maculis tribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 176. *n.* 87. *mant. inſ.* I. *p.* 106. *n.* 111.
Habitat in America.

luridus. 227. C. ovatus obſcure niger, elytris punctato-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 176. *n.* 88. *mant. inſ.* I. *p.* 106. *n.* 112.
Habitat in nova Hollandia.

ſtolidus. 228. C. fuſcus, tibiis poſterioribus incurvis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 176. *n.* 89. *mant. inſ.* I. *p.* 106. *n.* 113.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.*

meditabundus. 229. C. elytris ſtriatis, poſterius acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 176. *n.* 90. *mant. inſ.* I. *p.* 106. *n.* 114.
Habitat in nova Hollandia.

ſtupidus. 230. C. niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris ſubſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 177. *n.* 91. *mant. inſ.* I. *p.* 107. *n.* 115.
Habitat in nova Hollandia.

mangiferae. 231. C. griſeus thorace linea punctisque duobus dorſalibus albis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 177. *n.* 92. *mant. inſ.* I. *p.* 107. *n.* 116.
Habitat in mangiferae *nucleis.*

ſtultus. 232. C. griſeus, elytris macula communi lunata cinerea, roſtro atro. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 107. *n.* 117.
Habitat in Coromandel, *c. mangiferae minor.*

ſqualidus. 233. C. villoſo-griſeus, roſtro teſtaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 93. *mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 118.
Habitat Surinami, *mediae magnitudinis.*

pomorum. 46. C. femoribus anterioribus dentatis, corpore griſeo nebuloſo. *Fn. ſuec.* 612.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 115. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 145.
Friſch inſ. 1. *p.* 32. *t.* 8. Curculio in floribus arborum.
Habitat in pomonae *floribus.*

ovalis. 47. C. corpore ovato nigro albo maculato. *Fn. ſuec.* 613.
Habitat in Europa.

carbonarius. 48. C. corpore nigro oblongo, elytris ſtriatis. *Fn. ſuec.* 614. *Scop. ent. carn.* 29.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 27. *n.* 47. *t.* 24. *f.* 21.
Habitat in Europa. Solander.

mucoreus. 49. C. femoribus quatuor anterioribus dentatis, elytris polline flaveſcentibus, ſupra apicem gibboſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 53.* *Gron. muſ.* 589.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 74. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 92.
Habitat in America *auſtrali et* India.

jamaicenſis. 234. C. obſcurus ſcaber, thorace utrinque faſciculato tuberculato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 73. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 91.
Habitat in America *meridionali*, *magnus.*

bidens. 235. C. niger, femoribus poſterioribus dentatis, elytris uniſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 72. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 90.
Habitat in nova Seelandia.

puſio. 50. C. femoribus quatuor poſterioribus dentatis, elytris ſtriatis nigris: linea repanda griſea. *Muſ. Lud. Ulr.* 46.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 75. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 93.
Habitat in America *auſtrali et* India, *elytrorum linea longitudinali.*

vaginalis. 51. C. elytris ſtriatis: tuberculis ſparſis, juxta apicem mucronatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 47.*
Habitat in America *et* Sibiria.
Pro roſtro *foſſula in thorace*; elytrorum *ſtriae ex punctis cavis villoſis.*

ſpinipes. 236. C. niger, thorace lineis duabus, elytris ſtriis quatuor albis, tibiis anterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 174. *n.* 76. *mant. inſ.* I. *p.* 104. *n.* 94.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis, magnus.*

Bombina. 237. C. ferrugineo-fuſcus, elytris ſtriatis: tuberculis elevatis atris. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 104. *n.* 95.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

Scorpio. 238. C. ater, thorace plano baſi cinereo, coleoptris tuberculatis acuminatisque, medio cinereis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 105. *n.* 96.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

Scaber. 239 C. thorace carinato, elytris ſulcatis tuberculato-ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ* I. *p.* 174. *n.* 77. *mant. inſ.* I. *p.* 105. *n.* 97.
Habitat in Cayenna.

trifaſciatus. 240. C. thorace linea laterali, elytris albo punctatis: maculisque duabus brunneis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 105. *n.* 98.
Habitat in Cayenna, *teſtaceus c. abietis paulo major.*

cylindriroſtris. 241. C. thorace ſcabro, elytris poſterius bituberculatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 174. *n.* 78. *mant. inſ.* I. *p.* 105. *n.* 99.
Habitat in nova Hollandia.

ſtigma. 52. C. elytris macula magna ferruginea. *Muſ. Lud. Ulr.* 48.* *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 174. *n.* 79. *mant. inſ.* I. *p.* 105. *n.* 100.
Habitat in America *auſtrali et* India.

hebes. 242. C. femoribus ſubdentatis, thorace ſcabro, elytris ſulcatis tuberculatis, ore barbato. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 174. *n.* 80. *mant. inſ.* I. *p.* 105. *n.* 101.
Habitat ad fluvium Senegal, *mediae magnitudinis.*

depreſſus. 53. C. thorace depreſſo, lateribus obtuſe angulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 49.* *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 181. *n.* 114. *mant. inſ.* I. *p.* 109. *n.* 144.
Seb. muſ. 4. *t.* 95. *f.* 4.
Habitat in America *meridionali, griſeus: punctis nigris glabris prominulis.*

annulatus. 54. C. pallidus, thorace elytrisque ſtrigis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 51.* *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 175. *n.* 81. *mant. inſ.* I. *p.* 105. *n.* 102.

Habitat

Habitat in America *auſtrali et* India, *thoracis ſtriga una, elytrorum duabus.*

caliginoſus. 243. C. elytrorum ſtriis punctatis approximatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 82. *mant. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 103.
Habitat in Anglia, *rarior.*

dubius. 244. C. niger, thorace laevi, elytris ſtriatis ſcabris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 104.
Habitat - - - - magnus.

adſperſus. 245. C. fulvo irroratus, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 105.
Habitat in Cayenna, *magnitudine et ſtatura c. cynarae.*

brunneus. 246. C. brunneus, roſtro fuſco, elytris teſtaceis punctato ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 83. *mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 106.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus.*

abietis. 57. C. elytris fuſcis: faſciis duabus linearibus interruptis albidis. *Fn. ſuec.* 615.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 84. *mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 107.
It. oel. 26. Curculio ſubfuſcus.
Pet. gazoph. 14. *t.* 8. *f.* 9. Curculio norwegicus.
Degeer inſ. 5. *p.* 205. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 11.
Schaeff. ic. t. 25. *f.* 1.
Habitat in pini ſylveſtris *cortice et reſina; an alter ſexus c. pini?*

reticulatus. 247. C. oblongus piceus, elytris reticulatis: faſciis obliquis pallidis, tibiis anterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 85. *mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 108.
Habitat Tranquebariae.

germanus. 58. C. ater, thorace utrinque punctis duobus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 94. *mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 119.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 613. *n.* 58. Curculio longiroſtris, femoribus ſubdentatis, corpore ovato nigro, punctis teſtaceis adſperſo.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 91. *n.* 44.
Sulz. hiſt. inſ. 39. *t.* 4. *f.* 8.
Schaeff. ic. t. 25. *f.* 2.
Friſch inſ. 13. *p.* 28. *t.* 26.
Habitat in Europa, *frequens in* Germania, *inter maximos europaeos.*

nucum. 59. C. corpore griſeo longitudine roſtri. *Fn. ſuec.* 616. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 156. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 135.
Uddm. diſſ. 24. Curculio ovatus griſeus, roſtro filiformi longitudine corporis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 295. *n.* 42.
Degeer inſ. 5. *p.* 205. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 14-16.
Roeſ. inſ. 3. *t.* 67. *f.* 5. 6.
Scop. ent. carn. 105.
Poda inſ. t. 1. *f.* 3.
Schaeff. el. t. 55. *f.* 1.
ic. t. 50. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 22.
Habitat in coryli avellanae *nucibus frequens.*

proboſcideus. 248. C. griſeus, roſtro corpore duplo longiore. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 107. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 136.
Habitat in America *boreali, an varietas c. nucum?*

varians. 249. C. griſeo nigroque varius, roſtro pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 108. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 137.
Habitat in Cayenna.

ceraſorum. 250. C. fuſcus, ſcutello elytrorumque faſciis obſoletis cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 109. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 138.
Habitat in Anglia, *c. nucum triplo minor.*

amoenus. 251. C. ater, thorace punctis duobus, coleoptris quinque niveis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 110. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 139.
Habitat in nova Hollandia.

bicornis. 252. C. femoribus acute dentatis, capite bidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 111. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 140.
Habitat in nova Seelandia, *ex fuſco et cinereo varius.*

tenuiroſtris. 253. C. niger, elytris albo ſubfaſciatis, antennis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 112. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 141.
Habitat in Anglia, *ſtatura c. ceraſorum, at minor.*

ſcrophulariae. 61. C. coleoptris maculis duabus dorſalibus atris. *Fn. ſuec.* 603. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 95. *mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 120.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 296. *n.* 44.
Degeer inſ. 5. *p.* 208. *n.* 3. *t.* 6. *f.* 17-20.

Liſt.

Liſt. ſcar. angl. p. 395. *n.* 35.
Reaumur. inſ. 3. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat in ſcrophulariis, *quarum pericarpia exedit larva, folliculos ovatos, operculatos, fuſcos ſubſtituens.*

verbaſci. 254. C. niger, thoracis lateribus flaveſcentibus, elytris punctis albis nigrisque alternis ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 121.
Habitat Kilonii, *an varietas C. ſcrophulariae.*

gravis. 255. C. niger, elytris ferrugineo variis, femoribus canaliculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 96. *mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 122.
Habitat ad caput bonae ſpei.

druparum. 62. C. elytris teſtaceis, obſolete faſciatis. *Fn. ſuec.* 617. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 113. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 142.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 296. *n.* 43.
Degeer inſ. 5. *p.* 214. *n.* 7.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 11.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 21.
Habitat in ceraſi padi *nucleis.*

fraxini. 256. C. fuſcus, femoribus ferrugineis, capite dorſoque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 143.
Habitat in Sueciae *fraxino, magnitudine c. druparum.*

violaceus. 63. C. totus violaceus. *Fn. ſuec.* 579. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 105. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 134.
Degeer inſ. 5. *p.* 213. *n.* 5.
Bergſtr. nomencl. 1. 16. 13. *t.* 2. *f.* 13.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 271. *n.* 5.
Habitat in Europae pinetis, *frequens in turionibus.*

quinquepunctatus. 64. C. elytris ſutura maculisque duabus albis. *Fn. ſuec.* 618. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 97. *mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 123. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 75. *n.* 40. *t.* 24. *f.* 18. *g.*
Habitat in Europa *boreali.*

guttula. 257. C. niger, thorace tuberculato, elytris ſtriatis: puncto poſteriore albo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 124.
Habitat Halae Saxonum, *parvus.*

didymus. 258. C. ſupra fuſcus, elytris ſtriatis: macula laterali tranſverſa alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 98. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 125.
Habitat in Germania, *parvus.*

haemor-rhoidalis. 259. C. thorace fuſco: lateribus cineraſcentibus, elytrorum ſutura apice ferruginea. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 178. *n.* 99. *mant. inſ.* I. *p.* 108. *n.* 126.
Habitat in nova Hollandia.

trimaculatus. 260. C. coleoptris nigris: maculis tribus cinereis; poſteriori communi lunata. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 178. *n.* 100. *mant. inſ.* I. *p.* 108. *n.* 127.
Habitat in Alſatia *et* Suecia. Hermann *et* Pajkal.

Litura. 261. C. albo nigroque varius, roſtro vario. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 178. *n.* 101. *mant. inſ.* I. *p.* 108. *n.* 128.
Habitat in Europa.

villoſus. 262. C. villoſus griſeus, ſcutello faſciaque elytrorum poſteriore albis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 178. *n.* 102. *mant. inſ.* I. *p.* 108. *n.* 129. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 76. *n.* 41. *t.* 24. *f.* 19.
Habitat in Germania.

hiſpidus. 65. C. corpore ſulcato, adſperſo ſquamis erectis. *Fn. ſuec.* 619.*
Habitat in Europa.

pedicularius. 66. C. corpore rubro, elytris albido ſubfaſciatis. *Fn. ſuec.* 620.*
Habitat in Europa.

Tortrix. 67. C. corpore teſtaceo, pectore fuſco. *Fn. ſuec.* 622.* *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 181. *n.* 116. *mant. inſ.* I. *p.* 109. *n.* 146.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 300. *n.* 51.
Degeer inſ. 5. *p.* 214. *n.* 16.
Habitat in populo tremula, *folia contorquens.*

tremulae. 263. C. nigricans, elytris ſtriatis griſeo irroratis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 109. *n.* 147.
Habitat in Sueciae *populo, ſtatura et magnitudine tortricis.*

taeniatus. 264. C. thorace nigro: margine anteriore et poſteriore rufis, elytris pallidis nigro maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 181. *n.* 118. *mant. inſ.* I. *p.* 109. *n.* 148.
Habitat in Anglia, *tortrice minor.*

quadripuſtulatus. 265. C. niger, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 183. *n.* 121. *mant. inſ.* I. *p.* 109 *n.* 149.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura brevi diſparis.*

elongatus. 266. C. thorace elongato, tibiis anterioribus bidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 122. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 150.
Habitat in Jamaica.

byrrhinus. 267. C. thorace elytrisque nigris margine ferrugineis, pectore utrinque niveo. *Sparrm. nov. act. Stock.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 39. *n.* 4.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ater, ovatus.*

ſtrigiroſtris. 268. C. thorace granulato, elytris punctato-ſtriatis, roſtro longitudinaliter utrinque ſulcato. *Sparrm. nov. act. Stock.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 39. *n.* 5.
Habitat ad caput bonae ſpei, *nunc totus nigricans, nunc, praeter caput et thoracem, ſpadiceus.*

laniger. 269. C. elytris cicatriſato-reticulatis: poſterius maculis duabus albidis lunatis, tibiis anterioribus dentatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 6.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſupra niger, ſubtus rubicundo-lanuginoſus, thorace granulato: maculis tribus minoribus griſeis.*

tibialis. 270. C. niger cinereo-nebuloſus oblongus, thorace ſubgloboſo, elytris ſtriatis, roſtro inflexo canali pectoris immerſo, tibiis anterioribus intus barbatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 7.
Habitat ad caput bonae ſpei.

glyphicus. 271. C. corpore ovato nigro, elytris lineis albis reticulatis. *Schall. Abh. der. hall. Geſ. Naturf. Fr.* 1. *p.* 282.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura c. nucum, ſed minor.*

capucinus. 272. C. elytris griſeo-nebuloſis, maculis poſterius ad ſuturam oblongis punctisque binis albidis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 283.
Habitat Halae Saxonum, *magnitudine fere nebuloſi, at magis ovatus.*

Forſteri. 273. C. manibus longiſſimis. *Forſt. nov. inſ. ſpec.* 1. *p.* 32. *n.* 32.
Habitat in Anglia, *oblongus, magnitudine c. pomorum, piceus, pilis cinereis tomentoſus, antennis tarſisque rufis, elytris cinereis nigro-punctatis.*

pollinaricus. 274. C. elytris depreſſis planis abbreviatis, ventre, elytrorum margine et pedibus polline aſperſis. *Forſt. nov inſ. ſp. 1. p. 33. n. 33.*
Habitat in Angliae *plantis variis, praeſertim urtica dioica, ſupra planus fuſcus.*

cinnamomi. 275. C. cinnamomeus, roſtro anterius analiculato ad marginem denticulato: apice erecto mucronato bifurco, poſterius gibbo granulato. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 76. n. 46. t. 24. f. 20.* h. i.
Habitat in India, 10 *lineas longus; elytris punctato-ſtriatis: macula punctisque aurantiis; an brenti ſpecies?*

affinis. 276. C. niger, elytris caeruleis punctato ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 77. n. 48.*
Habitat Berolini, *carbonarii ſtatura et magnitudine.*

glaber. 277. C. ater nitidus, ſubtus punctatus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 78. n. 49.*
Habitat Berolini, 2 *fere lineas longus.*

denigratus. 278. C. ater, thorace punctato, elytris punctato ſtriatis apice ſubtus rubicundis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 78. n. 52.*
Habitat in Marchia, *ſine roſtro lineam longus, aterrimo affinis.*

cardui. 281. C. gibbus ex flavicante cinereus, thorace tuberculato, elytris convexis abbreviatis: lineola, puncto ſcutelloque flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 79. n. 54. t. 24. f. 22.* k.
Habitat Berolini *in carduis.*

ireos. 286. C. totus candidus. *Pall. it. 2. app. n. 57.*
Habitat in Sibiriae *iride, c. ſcrophulariae triplo major.*

crucifer. 287. C. fuſcus, ſubtus ex flavo cinereus nitenti-tomentoſus, elytris ad ſuturam cruce notatis. *Pall. it. 1. app. n. 35.*
Habitat in Sibiria, *c. ſcrophulariae magnitudine.*

albicans. 288. C. thorace tuberculis quinque, elytris ſex, ano albo. *Lepech. it. 2. p. 206. t. 10. f. 6.*
Habitat in Ruſſia.

urticae. 289. C. niger planiuſculus, thorace utrinque dentato, elytris ſtriatis poſterius bipunctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 88. n. 983.*
Habitat in urticis.

rufus. 290. C. ſubgloboſus rufus, elytrorum lineis elevatis albo nigroque teſſellatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 89. *n.* 998.
Habitat in Dania, *c. ſcrophulariae affinis.*

tuberculoſus. 291. C. niger, thorace lateribus albidis, elytris tuberculorum ſeriebus quatuor. *Scop. ent. carn. n.* 80.
Habitat in Carniolia.

carioſus. 292. C. oblongus, roſtro nitidulo, elytris ſtriatis, femoribus anterioribus craſſioribus majore dente notatis. *Scop. ent. carn. n.* 81.
Habitat in Carniolia.

ſyngeneſiae. 293. C. cervinus, breviſſime villoſus, roſtro nigro apice nitido. *Scop. ent. carn. n.* 82.
Habitat in Carnioliae *ſyngeneſiis.*

fuſcus. 294. C. fuſcus, ſcutello puncto albo, elytris macula rubeſcente notatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 300. *n.* 50.
Habitat in Gallia.

Geerii. 295. C. ſubgloboſus griſeus, coleoptris macula magna fuſca dorſali. *Degeer inſ.* 5. *p.* 212. *n.* 4.
Habitat in fraxino.

ulmi. 296. C. oblongus ex rufo fuſcus, proboſcide nigra, elytris macula nigricante.
Degeer inſ. 5. *p.* 215. *n.* 8. *t.* 6. *f.* 26. 27.
Habitat in ulmo.

pulverulentus. 297. C. oblongus niger, elytris cinereo maculatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 268. *n.* 3. *t.* 15. *f.* 24.
Habitat Surinami.

frigidus. 548. C. fuſcus, elytris ſtriatis ſubtuberculatis ferrugineo variis.
Fabr. mant. inſ. 2. *app. p.* 381.
Habitat in Amboina, *mediae magnitudinis.*

bohemus. 552. C. elytris griſeis punctatis, antennis pedibusque rufis.
Mayer Abh. der boehm. Geſ. 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiae *pomariis, pulicis magnitudine, celerrime currens.*

reticulatus. 573. C. oblongus niger, elytris profunde punctatis reticulatisque: rugis transverſe leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n* 423.
Habitat in Europa.

574. C.

ſubfaſciatus. 574. C. ferrugineus, elytris fulvo obſolete faſciatis. *Muſ. Leſk. p.* 20. *n.* 426.
Habitat in Europa.

tricolor. 575. C. teſtaceus, capite, thorace pedibusque rufis, elytris faſciis duabus dentatis ferrugineis. *Muſ. Leſk. p.* 20. *n.* 427.
Habitat in Europa.

dentatus. 576. C. rufus, femoribus dente valido armatis. *Muſ. Leſk. p.* 20. *n.* 431.
Habitat in Europa.

acutus. 577. C. rufus, elytris ſtriatis, femoribus acute dentatis. *Muſ. Leſk. p.* 20. *n.* 432.
Habitat in Europa, *an ſatis diſtincta ſpecies?*

cineraſcens. 578. C. niger ſubtus cineraſcens, elytris ſtriatis, roſtro longitudine corporis. *Muſ. Leſk. p.* 20. *n.* 434.
Habitat in Europa.

muricatus. 579. C. ſubglobosus niger, elytris ſulcatis piloſis cinereis, poſterius muricatis, tibiis tarſisque rufis. *Muſ. Leſk. p.* 20. *n.* 435.
Habitat in Europa.

cinereus. 580. C. ſubgloboſus cinereus, antennis pedibusque rufeſcentibus. *Muſ. Leſk. p.* 20. *n.* 436.
Habitat in Europa.

bipunctatus. 581. C. ſubgloboſus cinereus, thorace griſeo: anterius tuberculis quatuor, elytris ſtriatis: ſingulorum diſco punctis duobus griſeis. *Muſ. Leſk. p.* 20. *n.* 439.
Habitat in Europa.

Davieſii. 601. C. albido griſeus, elytris anterius angulatis: macula magna laterali ferruginea. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 13. *t.* 8. *f.* 5.
Habitat in Noveboraco, *c. nucum duplo fere major.*

zonatus. 602. C. niger, thorace lateribus elytrisque faſciis tribus diſtinctis albidis. *Swederus nov. act. Stockh.* 1787. 8. *n.* 3. 14.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis, ſubovatus.*

*** Breviroſtres.*

† femoribus dentatis.

ſpectabilis. 298. C. corpore viridi nigroque variegato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 208. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 269.
Habitat in nova Hollandia.

pinguis. 299. C. gibbus nigricans, femoribus poſterioribus muticis, thorace lineis, elytris ſtrigis duabus lineaque apicis flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 270.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

tridens. 300. C. cinereus, elytris dentibus tribus apiceque emarginatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 271.
Habitat in nova Seelandia, *magnus.*

fuſco-maculatus. 301. C. ater, femoribus ſubdentatis, thorace elytrisque laevibus fuſco maculatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 272.
Habitat in Germania, *magnus, laevis.*

liguſtici. 68. C. abdomine ſubovato murino. *Fn. ſuec.* 621.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 197. *n.* 209. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 273. Curculio breviroſtris femoribus dentatis, corpore obſcuro.
Degeer inſ. 5. *p.* 218. *n.* 10. Curculio apterus antennis fractis &c.
Schaeff. ic. t, 2. *f.* 12.
Bonsd. curc. Suec. 2. *f.* 33.
Habitat in liguſtico leviſtico.

nubilus. 302. C. griſeus, elytris punctis obſcurioribus numeroſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 210. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 274.
Habitat Hamburgi.

nigrita. 303. C. niger obſcurus, thorace ſcabro, elytris crenato-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 211. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 275.
Habitat in Italia, *ſtatura et magnitudine ſulcati.*

ſulcatus. 304. C. ater, elytris ſtriatis ferrugineo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 212. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 276. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 35.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 85. *n.* 86. *t.* 24. *f.* 35?
Habitat in Saxoniae *nemoribus.*

gemmatus. 305. C. ater, elytris punctis viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 213. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 277. *Scop. ent. carn. n.* 90.
Schulze Naturf. 6. *t.* 4.
Habitat in Europa.

picipes. 306. C. griſeus, elytris nebuloſis, femoribus poſterioribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 214. *mant. inſ.* 3. *p.* 122. *n.* 278.
Habitat in Kilonii *plantis.*
Elytra *punctis ſubocullaribus ſtriata.*

ovatus. 69. C. abdomine ovato nigro, pedibus antennisque rufis. *Fn. ſuec.* 626.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 221. *mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 287. *Bonsd. curc. ſuec.* 2. *f.* 26.
Degeer inſ. 5. *p.* 219. *n.* 11. Curculio roſae.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 85. *n.* 90. *t.* 24. *f.* 36.
Habitat in Europae *pomona.*

attelaboides. 307. C. roſtro elytrisque unituberculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 222. *mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 288.
Habitat in Braſilia.

oblongus. 71. C. antennis, elytris pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 625.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 220. *mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 286.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 294. *n.* 39. Curculio oblongus niger, elytris pedibusque teſtaceis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 168. *n.* 102. *t.* 45. *f.* 9. e. f.
Habitat in Europa.

pyri. 72. C. aeneo-fuſcus. *Fn. ſuec.* 623.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 217. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 281.
It. ſcan. 355. Curculio viridis opacus, pedibus antennisque magis fuſcis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 282. Curculio ſquamoſo-viridis &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 246. *n.* 34.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 11.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 23.
Habitat in pyri *foliis larva, in hujus* prunique *corollis imago*

mali. 308. C. ſubpubeſcens fuſcus, femoribus acute dentatis, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 499. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 282. *Lesk. it. p.* 47. *t.* A. *f.* 13.
Habitat Lipſiae, *c. pyri proxime affinis.* Leske.

arboreti. 309. C. cinereus, femoribus anterioribus dentatis, elytris punctato ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 283.
Habitat in Cayenna, *argentati magnitudine et ſtatura.*

argentatus. 73. C. corpore viridi-argenteo. *Fn. ſuec.* 624.* *Scop. ent. carn.* 91. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 218. *mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 284. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 12.
Fn. ſuec. 459. Curculio femoribus omnibus denticulo notatis, corpore viridi oblongo.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 293. *n.* 38. Curculio ſquamoſus viridi-auratus.
Degeer inſ. 5. *p.* 219. *n.* 12. Curculio urticae.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 9.
Habitat in Europae *urtica, betula, corylo, quercu.*

viridanus. 310. C. viridis, ore antennisque nigris, oculis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 219. *mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 285.
Habitat Tranquebariae.

Morio. 311. C. ater nitens elytris glabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 215. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 279. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 29.
Habitat in Germania, *et* Suecia *magnus.*

biſulcatus. 312. C. niger, coleoptrorum limbo cinereo, roſtro biſulcato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 216. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 280.
Habitat in Italia, *ſtatura ſulcati.*

aeruginoſus. 313. C. oblongus totus viridis, femoribus ferrugineis, antennis longioribus. *Bonsd. hiſt. curc.* 2. *p.* 23. *n.* 7. *f.* 8.
Habitat in Suecia, *ſtatura magis oblonga et antennis longioribus a c. pyri diſtinctus.*

erythropus. 315. C. oblongo ovatus niger, antennis longioribus pedibusque rufis. *Bonsd. curc.* 2. *p.* 25. *n.* 10. *f.* 10.
Stroem act. Hafn. 2. *p.* 57. *n.* 28. 29. Curculio ſalicis et dubius.
Habitat in Scandinaviae *herbidis, frequentior; an a rufipede ſatis diſtinctus, cum femora non ſemper dentata.*

teſſulatus. 316. C. ovatus niger, elytris ſtriatis: ſtriarum intervallis albo nigroque alternatim maculatis. *Bonsd. curc.* 2. *p.* 38. *n.* 31. *f.* 32. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 967.
Habitat in Scandinavia, *punctatulo affinis.*

floricola. 317. C. niger, elytris incanis, antennarum articulis mediis ſpadiceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 86. n. 93.*
Habitat - - - 3 lineas longus, c. pyri affinis.

Fullo. 318. C. elytris nigris albo punctatis. *Schranck enum. inſ. Auſtr. p. 116. n. 221. Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 86. n. 91. t. 24. f. 37.*
Habitat in Auſtriae *plantis variis, praeſertim arboribus, niger, 3½ lineas longus.*

anthracinus. 319. C. niger, elytris punctatim ſtriatis, femoribus unidentatis. *Scop. ent. carn. n. 92.*
Habitat in Carniolia.

lugubris. 320. C. fuſcus, elytris punctis ſcabris ſubſtriatis villoſulis coadunatis. *Scop. ent. carn. n. 93.*
Habitat in Carniolia.

infidus. 321. C. obſolete cupreus, caeruleſcenti-villoſus. *Scop. ent. carn. n. 94.*
Habitat in Carniolia.

pruni. 322. C. niger ſubvilloſus, antennis, elytris pedibusque rufis. *Scop. ent. carn. n. 95.*
Habitat in Carniolia.

caeleſtinus. 323. C. caeruleus, antennis pedibusque ſanguineis. *Scop. ent. carn. n. 96.*
Habitat in Germania.

carniolicus. 324. C. fuſcus, glauceſcenti-villoſus, elytris ſparſim punctatis. *Scop. ent. carn. n. 97.*
Habitat in Carniolia.

Scopolii. 325. C. fuſcus villoſulus, antennis pedibusque rufis. *Scop. ent. carn. n. 98.*
Habitat in Carniolia, *an diſtinctus ab ovato?*

Roeſelii. 326. C. thorace obſcure viridi: linea longitudinali alba, elytris fuſco-fulvis: lineis elevatis ſulcatis. *Roeſ. inſ. 3. p. 391. t. 67. f.* A. B. C. D.
Habitat in Germania, *roſtro craſſo.*

Mülleri. 327. C. niger, elytris ſubſtriatis, oculis rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 963.*
Habitat in Daniae *leviſtico.*

danicus. 322. C. ater, elytris ſubſulcatis pallide punctatis, oculis rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 964.
Habitat in Dania.

ſquamifer. 323. C. oblongus, elytris griſeo nigroque ſtriatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 968.
Habitat in Dania.

auſtriacus. 324. C. cinereus apterus, elytris lineis albidis nigro-punctatis. *Schranck inſ. Auſtr. p.* 117. *n.* 222.
Habitat in Auſtria.

religioſus. 325. C. ater nitens, elytris albo maculatis. *Schranck inſ. Auſtr. p.* 118. *n.* 225.
Habitat in monte Auſtriae Oettſcher *ad* cellas Marianas, 4 *lineas longus, habitu germani.*

coronatus. 326. C. niger apterus, thorace utrinque puncto duplici fulvo: baſi pilis fulvis coronata. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 291. *n.* 34.
Habitat in Gallia.

Tigris. 327. C. niger, maculis flavo-villoſis, elytris ſubrugoſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 292. *n.* 35.
Habitat in Gallia.

corrugatus. 328. C. fuſcus apterus, elytris rugoſo-ſtriatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 293. *n.* 37.
Habitat in Gallia.

geographicus. 329. C. ſubgloboſus ex nigro fuſcus, ſquamoſus, lineolis albis varius. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 294. *n.* 40.
Habitat in Gallia.

faſcialis. 330. C. ſuſcus, elytris ſtriatis: macularum albarum faſcia triplici transverſa. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 295. *n.* 41.
Habitat in Gallia.

albo-punctatus. 331. C. ſubgloboſus ſquamoſus ex cinereo fuſcus, elytrorum maculis tribus et apice albis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 299. *n.* 47.
Habitat in Gallia.

ſericeus. 332. C. obſcure rufus cinereo-villoſus, roſtro thorace breviore. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 300. *n.* 52.
Habitat in Gallia.

Virgo. 333. C. oblongus cinereo-villoſus, roſtro thoraci aequali. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 301. *n.* 53.
Habitat in Gallia.

334. C.

ſtritos. 334. C. oblongus niger flaveſcente-punctatus, antennis longis fractis. *Degeer inſ. 5. p. 217. n. 9.*
Habitat - - - 2 lineas longus.

granuloſus. 601. C. niger, thorace varioloſo, elytris punctis elevatis rugoſis: interſtitiorum punctis minoribus. *Muſ. Lesk. p. 23. n.* 490.
Habitat in Europa.

leproſus. 602. C. villoſus ferrugineus albido-maculatus, thorace punctis confluentibus, elytris punctato-ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 491.
Habitat in Europa.

ſulcatus. 603. C. fuſcus thorace punctis profundis rugisque longitudinalibus, elytris punctatis: rugis complanatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 492.
Habitat in Europa.

chryſoſtictos. 604. C. fuſcus glaber, thorace punctato, elytrorum ſulcis crenatis maculisque tribus auro conſperſis, antennis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 493.
Habitat in Europa.

argentatus. 605. C. viridi-argenteus, antennis tibiisque rufis, femoribus fuſcis clavatis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 500.
Habitat in Europa.

haemorrhous. 606. C. fuſcus, antennis, pedibus abdominisque apice rufis, elytris fuſco vireſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 501.
Habitat in Europa.

†† *femoribus muticis.*

polygoni. 26. C. thorace lineato, elytris cinereis: lineolis fuſcis ſuturaque nigro-punctata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 151. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 200.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 609. *n.* 26. *Fn. ſuec.* 597. Curculio longiroſtris teſtaceus, coleoptrorum ſutura nigra repanda.
Habitat in Europae *polygono, mediae magnitudinis.*

griſeus. 335. C. ſupra griſeo fuſcus, ſubtus cinereus, roſtro canaliculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 152. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 201.
Habitat in Anglia.

trigutta-tus. 336. C. nigricans, elytris griſeis: maculis duabus albis, poſteriori majori communi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 153. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 202.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 11.
Habitat in Anglia.

gemina-tus. 337. C. cinereus, thorace trilineato, elytris ſtriis numeroſis fuſcis per paria approximatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 203.
Habitat Kilonii, *mediae magnitudinis, fere globoſus.*

diadema. 338. C. flaveſcenti-villoſus, roſtro apice retuſo atro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 204.
Habitat in Cayenna, *ſtatura c. coryli, at paulo major.*

coryli. 339. C. cinereo fuſcoque varius, elytrorum ſutura dimidiata atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 154. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 205.
Habitat in Angliae *corylo.*

Spengleri. 32. C. fuſcus, elytris flavis: lineis atris glaberrimis abbreviatis inaequalibus, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 174. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 229. *Herbſt Beſch. der berl. Naturf. Fr.* 4. *t.* 7. *f.* 7.
Habitat in America, *ſtatura c. pini.*

vittatus. 33. C. ater, elytris ſtriis albis rubrisque abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 173. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 228.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 610. *n.* 33. Curculio longiroſtris, elytris lineis albis luteisque.
Sloan. jam. 2. *p.* 210. Scarabaeus Curculio.
Habitat in America *meridionali, inſulisque oppoſitis.*

bivitta-tus. 340. C. niger, elytris punctato ſtriatis: vitta marginali dorſalique interrupta flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 230.
Habitat in inſula S. Thomae, *ſtatura c. Spengleri.*

lividus. 341. C. griſeus, thorace elytrisque cinereo atroque maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 175. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 231.
Brown illuſtr. 129. *t.* 49. *f.* 8.
Habitat in America *meridionali, magnus.*

pulcher. 342. C. coleoptris atris: ſtriis ſex dorſalibus approximatis abbreviatis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 176. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 232.
Brown illuſtr. 126. *t.* 49. *f.* 6.
Habitat in Jamaica, *ſtatura vittati.*

343. C.

hiſtrionicus. 343. C. griſeus, thorace lineis lateralibus fulvis, elytris albis: maculis atris fulvisque. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 177. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 233. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *p.* 44. *n.* 17. *t.* 2.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Rohrii. 344. C. elytris acumininatis griſeis: baſeos margine flaveſcente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 178. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 234.
Habitat in inſulis, Americae *oppoſitis.* v. Rohr.

impreſſus. 345. C. niger, thorace elytrisque punctis impreſſis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 179. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 235.
Habitat in Jamaica, *ſtatura pulchri.*

cervinus. 70. C. griſeus, antennis baſi ruſeſcentibus. *Fn. ſuec.* 627. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 160. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 213. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 15.
Degeer inſ. 5. *p.* 220. *n.* 13. Curculio griſeo-aeneus.
Habitat in Europa, *femoribus interdum dentatis.*

ſtriatus. 346. C. fuſcus, elytris ſtriis cinereis nigro-punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 214.
Habitat in Africa, *parvus.*

Lacerta. 347. C. griſeus, elytris ſtriatis, antennis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 214. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 215.
Habitat in India, *ſtatura cervini, at triplo major.*

velox. 348. C. piloſus niger, elytris margine, puncto baſeos, faſcia interrupta, punctoque apicis albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 216.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

argyreus. 74. C. femoribus ſubmuticis, corpore toto viridi argenteo aureoque maculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 54.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 128. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 159.
Habitat in America *auſtrali et* India, *facie argentati, femoribus primoribus ſpina obſoleta armatis.*

imperialis. 349. C. elytris ſtriis elevatis atris ſulcisque punctatis viridiaureis alternis, baſi gibbis apice acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 129. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 160.
Drury inſ. 2. *t.* 33. *f.* 1.
Lindenberg Naturf. X. *p.* 86. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, maximus, inſectorum facile pulcerrimum.*

regalis. 75. C. corpore viridi-ſericeo: faſciis aureis repandis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 130. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 161.
Habitat in America *meridionali, magnitudine et ſtatura germanici, femoribus fuſcis; annulo aureo.*

marginatus. 350. C. fuſcus, elytrorum ſutura abdominisque marginibus aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 131. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 162.
Habitat in America.

19punctatus. 351. C. caneſcens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris novendecim. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 132. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 163.
Habitat in Cayenna.

viridis. 76. C. viridis, thoracis elytrorumque lateribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 139. *mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 175.
Bonsd. curc. Suec. 2. *f.* 7.
Syſt. nat XII. 2. *p.* 616. *n.* 76. Curculio breviroſtris, femoribus muticis, corpore viridi ſupra obſcuro, ſubtus flavidiore.
Degeer inſ. 5. *p.* 256. *n.* 45. Curculio flavo-cinctus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 24.
Schaeff. elem. t. 108.
icon. t. 53. *f.* 6.
Habitat in Europae *pomona, magnitudine et ſtatura c. pyri, antennis pedibusque nigris.*

gibber. 352. C. vireſcenti-albus, elytris baſi unidentatis poſterius gibboſis. *Pall. ic. inſ. Ruſſ.* 1. *p.* 32. *t.* B. *f.* 14. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 176.
Habitat in Cayenna.

fulvus. 353. C. fulvus, capitis baſi pedibusque fuſcis, roſtro emarginato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 177.
Habitat in Saxonia, *parvus.*

palliatus. 354. C. fuſcus, thoracis elytrorumque margine cinereo. *Fabr. mant inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 178.
Habitat in Germania, *ſtatura viridis, at paulo minor.*

aurifer. 355. C. corpore ferrugineo auro maculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 140. *mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 179.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 1.
Habitat in America, *pedibus anterioribus elongatis.*

356. C.

cyanipes. 356. C. albus, elytris vitta abbreviata dentata pedibusque cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 180.
Habitat in Cayenna, *antennis fuſcis cyaneo nitidis.*

tamariſci. 357. C. viridi-nitens, elytris viridi, ferrugineo nigro cinereoque variis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 181.
Habitat in Africae *tamariſco, ſtatura ſplendiduli, at duplo fere major.*

ſplendidulus. 358. C. viridi-nitens, coleoptrorum diſco cinereo, cupreo nigroque faſciato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 141. *mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 182.
Habitat in Sibiria, *ſtatura argentati, at minor.*

curvipes. 359. C. argenteo ſquamoſus, tibiis poſterioribus arcuatis intus dentatis ciliatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 183.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

ſpecioſus. 77. C. corpore luteo viridi-nitente, elytris ſpinis ſparſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 55.*
Habitat in America *auſtrali et* India, *ſpinis elytri utriusque* 5.

ruficornis. 78. C. corpore atro, thorace utrinque bituberculato, antennis rubris. *Fn. ſuec.* 636.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 162. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 217. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 13.
Habitat in Europa.

albinus. 79. C. niger, fronte anoque albis, thorace tuberculato. *Fn. ſuec.* 632. *Scop. ent. carn.* 66. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 180. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 236. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 1.
Degeer inſ. 5. *p.* 255. *n.* 44. *t.* 8. *f.* 1. Curculio breviroſtris, antennis longis rubris &c.
Uddm. diſſ. 27. Curculio niger, aculeis thoracis tribus, elytrorum ſex.
Habitat in Europa, *magis boreali, colore c. lapathi referens.*

latiroſtris. 360. C. roſtro latiſſimo plano, elytris apice albis: punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 181. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 237. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 2. 3.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 17. Silpha oblonga.
Geoffr. inſ. par. 1. *t.* 5. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 89. *f.* 6.
Habitat in Europa, *antennarum annulo rubro.*

albiroſtris. 361. C. roſtro latiſſimo plano elytrisque poſterius albis nigro variis. *Schall. Abh. d. hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 287. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 238.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 80. *n.* 66. *t.* 24. *f.* 26. m.
Habitat in Germaniae *inferioris betula, latiroſtri duplo major.*

planiroſtris. 362. C. nigro aeneus, roſtro latiſſimo plano pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 239.
Habitat Kilonii, *parvus.*

marginellus. 363. C. niger, thoracis elytrorumque margine albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 182. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 240.
Habitat in Africa *aequinoctiali ſtatura verrucoſi, at minor.*

lineatus. 80. C. fuſcus, thorace ſtriis tribus pallidioribus. *Fn. ſuec.* 630.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 155. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 206. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 16. 17.
Degeer inſ. 5. *p.* 247. *n.* 35. Curculio breviroſtris, antennis fractis &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 283. Curculio roſtro thoracis longitudine &c.
Schaeff. ic. t. 103. *f.* 8.
Habitat in Europae *ſalice putrida, plantisque variis.*

lunatus. 364. C. coleoptris elevato-ſtriatis: faſcia ſemicirculari maculaque poſteriore albis; lunula nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 156. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 207.
Habitat in Anglia.

fulvipes. 365. C. tomentoſo-vireſcens, pedibus teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 208.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura parva lineati.*

ruficollis. 366. C. teſtaceus, capite elytrisque ſtriatis cinereo-fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 209.
Habitat Halae Saxonum, *parvus.*

undatus. 367. C. fuſcus, elytris apice pallidis: ſtriga undata fuſca. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 157. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 210.
Habitat in Garmania, *parvus, ſtatura lunulati.*

hiſpidulus. 368. C. fuſcus, thorace cinereo lineato, elytris hiſpidis: punctis obſcurioribus ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 158. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 211.
Habitat Kilonii *in plantis aquaticis.*

ſcabriculus. 369. C. corpore cinereo hiſpido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 158. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 212.
Bonsd. curc. Suec. 2. *f.* 21.
Mant. p. 531. Curculio breviroſtris femoribus muticis, cinereus, elytris hiſpidis.
Habitat in Sueciae *arenoſis.*

incanus. 81. C. oblongus fuſcus, thoracis dorſo plano. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 147. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 193. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 37. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *t.* 24. *f.* 24.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 616. *n.* 81. *Fn. ſuec.* 631.* Curculio breviroſtris cinereus oblongus, elytris obtuſiuſculis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 282. *n.* 10. Curculio cinereo ſquamoſus &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 242. *n.* 28. Curculio griſeo apterus.
Liſt. ſcar. angl. p. 394. *n.* 30.
Habitat in Europae *pinetis.*

coſtatus. 370. C. cinereus, thorace nigro: lineis quatuor cinereis. *Fabr. mant inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 194.
Habitat in Gallia *auſtrali, magnitudine incani.*

interruptus. 371. C. obſcurus, coleoptrorum faſcia interrupta alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 148. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 195.
Habitat in nova Hollandia, *mediae magnitudinis.*

ſcutellaris. 372. C. ater, elytris crenato-ſtriatis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. ment. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 196.
Habitat in terra van Diemen, *magnus.*

longimanus. 373. C. fuſcus, thoracis margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 149. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 197.
Habitat in Braſilia.

raucus. 374. C. nigricans, elytris griſeis cinereo punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 150. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 198. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 82. *n.* 64. *t.* 24. *f.* 25.
Habitat in Germania.

ſpiniſex. 375. C. cinereus fuſco irroratus, thorace acute ſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 199.
Habitat - - - *gibbus, mediae magnitudinis*

chloropus. 82. C. niger, antennis pedibusque rufis. *Fn. ſuec.* 635.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 163. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 218. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 19.
Habitat in Europae *plantis, parvus, valde oblongus.*

triſtis. 376. C. niger, elytris ſtriatis cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 164. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 219. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 28.
Habitat in Anglia, Suecia.

adſperſus. 377. C. ater, elytris poſterius albo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 165. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 220.
Habitat in nova Hollandia.

punctatus. 378. C. fuſcus, elytris punctis holoſericeis elevatis margineque flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 166. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 221.
Habitat in Europa *boreali.*

obſcurus. 379. C. ovatus ferrugineo-fuſcus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 167. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 222.
Habitat in Europa *boreali.*

niger. 380. C. ovatus ſcaber niger, pedibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 168. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 223.
Habitat in Germania.

varioloſus. 381. C. niger, thorace carinato varioloſo, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 169. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 224.
Habitat in Saxoniae *campis.*

ſticticus. 382. C. thorace elytrisque varioloſis nigris albo-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 170. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 225.
Habitat ad caput bonae ſpei.

vulgus. 383. C. ater nitens, elytris punctato-ſtriatis, femoribus annulo cinereo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 171. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 226.
Habitat in America *meridionali.*

ſuccinctus. 384. C. ater, elytris margine lineolisque duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 172. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 227.
Habitat ad caput bonae ſpei.

rufipes. 83. C. cinereus oblongus, pedibus rufis. *Fn. ſuec.* 634.*
Habitat in Europa.

nebuloſus. 84. C. canus, elytris faſciis obliquis nigris. *Fn. ſuec.* 635.* *Fabr. ſp. inſ.* 1: *p.* 186. *n.* 142. *mant. inſ. p.* 118. *n.* 184. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 4.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 278. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 8.
Fn. ſuec. 1. *n.* 448. Curculio albo nigroque varius, proboſcide planiuſcula carinata thoracis longitudine.
Degeer inſ. 5. *p.* 241. *n.* 27. Curculio carinatus.
Friſch inſ. 11. *p.* 32. *t.* 23. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 25. *f.* 3. *Knoch Beytr.* 1. *t.* 6. *f.* 8.
β) Curculio nebuloſus capenſis. *Sparrm. nov. act. Stokh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 44. *n.* 18. *t.* 2.
Habitat in Europae *campis frequens, β) duplo major ad* caput bonae ſpei.

ſulciroſtris. 85. C. oblongus cinereus ſubnebuloſus roſtro triſulcato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 143. *mant. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 185. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 45. *n.* 19. *t.* 2. *Bonsdorf curc. Suec.* 2. *f.* 5.
Habitat in Europae *plantis, et ad* caput bonae ſpei *ſtatura et magnitudine nebuloſi.*

emarginatus. 385. C. oblongus fuſcus, coleoptrorum dorſo cinereo: lineis duabus punctorum impreſſorum atrorum. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 186.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura nebuloſi, coleoptris apice emarginatis.*

perlatus. 386. C. niger, abdomine albo: punctis elevatis glabris atris, roſtro ſulcato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 187.
Habitat in Sina, *ſtatura et magnitudine ſulciroſtris.*

glaucus. 387. C. roſtro carinato thoraceque inaequali obſcuris, elytris glaucis: puncto poſterius elevato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 188.
Habitat Kilonii, *magnitudine et ſtatura albini.*

albidus. 388. C. oblongus fuſcus elytris albidis: faſcia media lituraque baſeos apicisque fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 189.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 83. *n.* 75. *t.* 24. *f.* 31. Curculio candidus.
Habitat in Germania, *nebuloſo minor.*

luſitanicus. 389. C. oblongus ſupra fuſcus, elytris macula baſeos alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 144. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 190.
Habitat in Luſitania, *ſtatura et magnitudine incani.*

crenulatus. 390. C. cinereus, elytris lineis elevatis tribus crenulatis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 145. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 191.
Habitat in nova Hollandia.

punctatulus. 391. C. niger, elytris punctis nigris albiſque alternis holoſericeis ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 146. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 192.
Habitat in inſula terrae novae, *magnitudine c. liguſtici.*

ater. 86. C. oblongus ater, antennis rufis. *Fn. ſuec.* 637.* *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 20.
Habitat in Europa, *an mera varietas chloropodis?*

emeritus. 87. C. niger, thorace elytriſque ſpinoſis fronte excavata. *Muſ. Lud. Ulr.* 56.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 190. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 249.
Habitat in America *auſtrali et* India, *aranei triſti facie.* Elytra *verrucis piloſis adſperſa.*

barbarus. 88. C. thorace ſubſpinoſo, elytris angulo duplici criſpato. *Fabr. ſp. inſ. p.* 194. *n.* 191. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 250.
Habitat in Barbaria *et* Calabria, *minor in* Apulia, *duplo minor in* Gallia; *punctis excavatis adſperſus.*

algirus. 392. C. cinereus, thorace ſpinoſo ſulcato, elytris angulo duplici ſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 251.
Habitat in Africa *et* Calabria, *barbaro triplo minor.*

criſpatus. 393. C. thorace mutico ſcabro, elytris lineis tribus elevatis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 192. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 252.
Habitat ad caput bonae ſpei.

globoſus. 394. C. thorace ſpinoſo quinqueſulcato, elytris laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 193. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 253. *Sparrm. nov act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 33. *Drury inſ.* 1. *t.* 32. *f.* 4.
Habitat ad caput bonae ſpei, *an vere diſtinctus ab obeſo?*

obeſus. 395. C. ater, thorace ſpinoſo inaequali, elytris rubris: punctis nigris confertis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 194. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 254. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 32. *t.* 2.
Habitat ad caput bonae ſpei.

396. C.

ſcalaris. 396. C. ater, thorace ſpinoſo inaequali, elytris ſtriis rufis denticulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 195. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 255.
Habitat ad caput bonae ſpei.

cultratus. 397. C. cinereus, thorace tuberculis duobus compreſſis, elytris tuberculatis poſterius cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 196. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 256.
Habitat in nova Hollandia.

capenſis. 89. C. ater, thorace elevato-punctato, elytris ſtriato-crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 59. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 184. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 242. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 44. *n.* 16. *t.* 2.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Vitulus. 398. C. niger, fronte bidentata, elytris uniſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 185. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 243.
Habitat in Terra del Fuego.

inaequalis. 399. C. griſeus, thorace inaequali anterius prominulo, elytris ſulcatis, poſterius bidentatis, roſtro triſulcato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 186. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 244.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.*

roſtratus. 400. C. fuſcus, capite thoraceque cylindricis anguſtioribus, elytris poſterius ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 187. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 245.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

Spectrum. 401. C. thorace coleoptrisque globoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 188. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 246.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parvus, ſingularis ſtaturae.*

acuminatus. 402. C. cylindricus fuſcus, elytris apice acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 189. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 247.
Habitat in nova Seelandia.

capiſtratus. 403. C. fuſcus, elytris acuminatis crenato-ſtriatis, roſtro ſulcato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 248.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus.*

verrucoſus. 90. C. aeneo-niger, elevato-punctatus, elytris poſterius verrucoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 60.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 183. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 241.
Drury inſ. 1. 32. *f.* 5.
Habitat in Aethiopia.

cornutus. 91. C. cinereus, thorace elytriſque ſubſpinoſis, capite ſpinis faſciculato - piloſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 57. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 197. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 257.
Bonsd. nov. act. Stockh. 1785. 1. *n.* 4. *p.* 46. *n.* 24. *t.* 2.
Habitat in nova Hollandia *et ad* caput bonae ſpei.

Tribulus. 404. C. cinereus, thorace ſcabro anterius impreſſo, elytris ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 198. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 258.
Habitat in nova Hollandia, *roſtro thoracem fere aequante, apice incraſſato.*

retuſus. 405. C. griſeo - fuſcus, elytris poſterius retuſis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 199. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 259.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura cornuti.*

quadridens. 406. C. cinereus, thorace ſcabro, elytris ſpinoſis: ſpinis quatuor; poſterioribus longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 200. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 260.
Habitat in nova Hollandia.

quadriſpinoſus. 407. C. albidus, elytris quadriſpinoſis, roſtro fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 201. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 261.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Clavus. 408. C. albicans, thorace canaliculato, coleoptris ſpinoſis: lineolis tribus baſeos rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 202. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 262.
Habitat in nova Hollandia.

noduloſus. 409. C. thorace lineis ſex noduloſis, elytris ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 203 *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 263.
Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. 1. *n.* 4. *p.* 42. *n.* 12? Curculio noduloſus.
Habitat ad caput bonae ſpei.

rubifer. 410. C. cinereus, thorace ſcabro, elytris ſpinis elevatis ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 204. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 264.
Habitat ad caput bonae ſpei.

globifer. 411. C. thorace ſcabro, elytris ſpinoſis poſterius acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 205. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 265.
Habitat ad caput bonae ſpei.

pilularius. 412. C. thorace utrinque ſpinoſo noduloſo, elytris tuberculato-ſtriatis apice acuminatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 266.
Habitat ad caput bonae ſpei, *globifero proxime affinis.*

frontalis. 413. C. ater, fronte retuſa, thorace elytrisque tuberculato-ſeriatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 43. *n.* 14.
Habitat ad caput bonae ſpei, *praecedentibus affinis.*
Thorax *tuberculorum lineis* 4, *elytra conicorum utrinque tribus aſpera.*

16punctatus. 92. C. caeruleſcens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris ſedecim. *Muſ. Lud. Ulr.* 58. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 133. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 164.
Habitat in Braſilia, *crabronis magnitudine, ad latera thoracis aureus.*

decorus. 414. C. ſupra fuſcus, thorace coleoptrisque vittis duabus viridi-aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 134. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 165.
Habitat in America *meridionali.*

nitidulus. 415. C. viridi-ſquamoſus, elytris punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 135. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 166.
Habitat in Cayenna, *ſquamis cum aetate pereuntibus niger.*

candidus. 416. C. elytris ſpinoſis albis: macula laterali fuſca. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 136. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 167.
Habitat in Cayenna.

niveus. 417. C. niveus, thoracis dorſo roſtroque fuſcis, elytris ſpinoſis acuminatisque. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 168.
Habitat in Cayenna, *ſtatura candidi.*

lacteus. 418. C. albus auro-nitidulus, elytris ſulcatis acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 137. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 169.
Habitat in Jamaica, *mediae magnitudinis, roſtri apice bifido.*

ſmaragdulus. 419. C. vireſcens, elytris punctatis: ſpina anteriore poſterioreque erecta valida. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 170.
Habitat in Cayenna, *ſtatura candidi, at paulo minor.*

8tuberculatus. 420. C. cinereo fuſcoque varius, coleoptris punctatis, poſterius gibbis: tuberculis octo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 171.
Habitat in Cayenna, *ſtatura candidi.*

Servus. **421.** C. capite thoraceque obſcure ferrugineis, elytris fuſcis: punctis maculisque albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 172.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine octotuberculati.*

modeſtus. 422. C. cinereus, thorace elytrisque fuſco-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 138. *mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 173.
Habitat in nova Seelandia, *mediae magnitudinis.*

flaveſcens. 423. C. obſcurus, thoracis elytrorumque acuminatorum lateribus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 174.
Habitat in America *meridionali, viridi affinis, at paulo major.*

granulatus. 93. C. viridis ſtriatus punctis nigris elevatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 61.*
Habitat in America *auſtrali et* India, *magnitudine ſcarabaei ſtercorarii.*

abbreviatus. 94. C. ſubfuſcus, elytris griſeis: ſtriis atris glabris elevatis abbreviatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 62.* *Gron. zooph.* 597.*
Habitat in Martinica.

apterus. 95. C. thorace ſpinoſo: cruce impreſſa, elytris ferrugineo-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 206. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 267.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 619. *n.* 95. Curculio breviroſtris, pedibus muticis, corpore atro, thorace ſpinoſo, elytris coadunatis, abdomine punctato.
Degeer inſ. 5. *p.* 275. *t.* 16. *f.* 1. Curculio cruciatus.
Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. 1. *n.* 4. *p.* 49. *n.* 31. *t.* 2.
β) Curculio ornatus. *Drury inſ.* 2. *t.* 34. *f.* 3.
Habitat in India *et ad* caput bonae ſpei, *maximus.*

ocellatus. **424.** C. thorace ſpinoſo anterius excavato, elytris cinereis: punctis atris ſubocellatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 207. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 268.
Habitat in Madagaſcar.

nivoſus. 425. C. thorace elytrisque ſeriatim tuberculatis niveo lineatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 41. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſubtus albido et flaveſcente pruinoſus vel minutim ſquamoſus.*

nycthemerus. 426. C. albus, thorace elytrisque in parte ſumma atris, faſciis longitudinalibus albis nigrisque utrinque alternantibus,

bus, abdomine atro, ad latera niveo maculato. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 41. *p.* 42. *n.* 12.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Argus. 427. C. tomentoſus, capite thoracisque margine anteriore griſeo alboque punctatis, elytris ſtriis elevatis albo cinereoque maculatis punctatisque. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 43. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Porculus. 428. C. cinereo-fuſcus piloſus, thorace lineis quinque, elytris poſterius maculis duabus albis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *n.* 4. *p.* 45. *n.* 20.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Tottus. 429. C. ex cinereo et fuſceſcente rufus, roſtro triſtriato, pedibus ſaepe rufeſcentibus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 45. *n.* 21.
Habitat ad caput bonae ſpei.

atratus. 430. C. glabriuſculus nigro-nitens, elytris ſtriatis: interſtitiorum punctis impreſſis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 46. *n.* 22.
Habitat ad caput bonae ſpei.

cordiger. 431. C. thorace ſubdidymo cordato, utrinque aculeato, elytris ſtriatis punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 46. *n.* 23.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Tauriculus. 432. C. niger, fronte rotundata punctata, thorace bicarinato punctato ſubcriſpato ſcabro, elytris lineis quatuor tuberculoſis, infimis abbreviatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 47. *n.* 25.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Juvencus. 433. C. fronte excavato-retuſa, thorace ſcabro utrinque unidentato, elytris utrinque tuberculorum ſerie abbreviata triplici. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 47. *n.* 26.
Habitat ad caput bonae ſpei, *tauriculo affinis, at quadruplo minor.*

ephippiatus. 434. C. thorace tuberculis rugisque ſcabro, elytris utrinque ſerie ſesquitertia ſpinularum: ſutura ſpinulis conniventibus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 47. *n.* 27.
Habitat ad caput bonae ſpei.

cuculatus. 435. C. fronte depreſſa ſcabra, thorace anterius porrecto roſtroque biſulcato canaliculatis, elytris pone bituberculatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 48. *n.* 28.
Habitat ad caput bonae ſpei, *griſeus, antennis, oculis, pedumque maculis nigris.*

Uva. 436. C. ater, capite emarginato, thorace anterius foveolato, elytris nodulis ſubgloboſis confertis glabris: macula baſeos thoracis utrinque ſupra et ſubtus femorumque ferruginea. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 49. *n.* 29.
Habitat ad caput bonae ſpei.

bigloba-tus. 437. C. niger roſtro canaliculato, thorace globoſo punctato ſcaberrimo, elytris punctato-ſcabris: tuberculorum utrinque ordinibus duobus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 49. *n.* 30.
Habitat ad caput bonae ſpei.

calvus. 438. C. ater, thorace utrinque punctis elevatis ſcabro: diſco laeviuſculo, elytris ſtriis elevatis glabriuſculis: ſulcis interjectis impreſſo punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 34.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ſenilis. 439. C. fuſcus griſeo-irroratus, thorace teretiuſculo, elytris ſtriis elevatis laevibus diſtantibus ternis aut quinis: interſtitiis planis impreſſo-punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 35.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Platina. 440. C. ſubtus lateribusque albo argenteo viridique aureo ſplendidus, ſupra pedibusque griſeus, elytrorum faſciis longitudinalibus atris. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 36.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Gallina. 441. C. griſeus, ſubtus canus, thorace utrinque ſulcis quinque ſubarcuatis obliquis, elytris leviter ſtriatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 51. *n.* 37.
Habitat ad caput bonae ſpei.

argynel-lus. 442. C. viridi-argenteus, oculis atris, roſtro ſupra plano: linea longitudinali nigra impreſſa. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. *n.* 4. *p.* 51. *n.* 39.
Habitat ad caput bonae ſpei.

443. C.

nigellus. 443. C. nigricans, ſubtus ex griſeo rufeſcens, antennis rectis, thorace elytrisque ſpinuloſis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 52. *n.* 40.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura albini, ſed minor.*

Bonsdorfii. 444. C. oblongus albidiſſimus maculis quibusdam faſciaque nigris, roſtro biſulcato fuſco. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 21. *n.* 5. *f.* 6.
Habitat in Sueciae, *potiſſimum ſalictis, ſtatura ſulciroſtris, at duplo minor.*

tereticollis. 445. C. oblongo-ovatus, capite et thorace cylindricis anguſtis, elytris cinereis nigro lituratis. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 28. *n.* 14. *f.* 14. *Degeer inſ.* 5. *p.* 246. *n.* 33.
Habitat in Sueciae *alnetis, non infrequens.*

lineellus. 446. C. oblongus cinereo fuſcus, thorace ſtriis tribus pallidioribus, elytris utrinque linea longitudinali albida una. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 30. *n.* 17. *f.* 18.
Fn. ſuec. 1. *n.* 472. Curculio cinereus, faſciis longitudinalibus dilutioribus.
Habitat in Suecia, *pediculi magnitudine, lineato affinis.*

echinatus. 447. C. ferrugineus, abdomine globoſo, elytris ſetis erectis denſe echinatis. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 33. *n.* 21. *f.* 22.
Müll. zool. dan. prodr. p. 86. *n.* 947. Curculio ſcaber?
Habitat in Suecia, *ſubtus fuſcus, ano rufo.*

Trunculus. 448. C. ater, abdomine ſubgloboſo, roſtro breviſſimo, antennis pedibusque rufis. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 33. *n.* 22. *f.* 23.
Habitat in Suecia.

capitatus. 449. C. fuſco cinereus, ſutura elytrorum baſi nigra, roſtro breviſſimo lato, abdomine ſubgloboſo. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 33. *n.* 23. *f.* 24. *Degeer inſ.* 5. *p.* 245. *n.* 32.
Habitat in Sueciae *pinetis, vulgatior, c. coryli proxime affinis.*

aſperatus. 450. C. cinereus, abdomine ovato, elytris ſetis erectis breviſſimis exaſperatis. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 34. *n.* 24. *f.* 25. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 288. *n.* 23.
Habitat Upſaliae *in arbuſtis, primo vere ſub ſiccis foliis conſpicuus.*

ſuecicus. 451. C. ovatus, poſterius obtuſiſſimus obſcurus, thorace carinulato, antennis et pedibus fuſcis. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 37. n. 29. f. 30.*
Habitat in Suecia.

murinus. 452. C. ovatus griſeo-fuſcus, elytris pallide maculatis, poſterius ſetoſis, roſtro ſulcato. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 37. n. 30. f. 31. Müll. zool. dan. prodr. p. 86. n. 943. fn. Fridrichsd. n. 116.*
Habitat in Scandinaviae *plantis.*

clavipes. 453. C. oblongo ovatus gibbus ater, antennis nigris, pedibus longis rufis, femoribus clavatis craſſis. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 40. n. 35. f. 36.*
Habitat in Hallandia Sueciae.

inderienſis. 454. C. apterus ovatus opalino-albus, thorace utrinque mucronato, elytris excavato punctatis. *Pall. inſ. roſſ. 1. p. 26. t. B. f. 5. it. 1. app. p. 464. n. 36.*
Lepech. it. 1. p. 508. t. 16. f. 5.
Habitat circa lacum ſalſum Inderienſem *frequens, fabae minoris magnitudine, tenebrionis apteri facie.*

nomas. 455. C. albus, roſtro craſſo biporcato, thorace ſcaberrimo, elytris fuſco oblique lituratis. *Pet. gaz. t. 23. f. 4?* *Pall. it. 1. app. p. 463. n. 31. inſ. roſſ. 1. p. 27. t. B. f. 6.*
Habitat in aridiſſimis deſerti caſpici, *frequens circa fontes lacusque ſalſos, habitu nebuloſi, ſed major, 10 lineas longus.*

candidatus. 456. C. albo-nebuloſus, roſtro craſſo: ſtria bifurca, thoracis dorſo cinereo: linea punctisque duobus niveis. *Pall. it. 1. app. p. 463. n. 32. inſ. roſſ. 1. p. 28. t. B. f. 7.*
Habitat in aridis deſerti caſpici, *frequentiſſimus circa lacum* Inderienſem, *ſulciroſtri paulo major, ſubtus candidiſſimus.*

roridus. 457. C. apterus rufeſcente albus, ſupra lituris punctisque ſubverrucoſis nigris, porco roſtri craſſi longitudinali. *Pall. inſ. roſſ. 1. p. 28. t. B. f. 8.*
Habitat in ſalſis torridis deſerti auſtralis ad Volgam, *circa ſalſolarum et atriplicum radices, ſulciroſtris magnitudine, at craſſior.*

Cenchrus. 458. C. dealbatus, thorace elytrisque lituris confluentibus cinereis nigro punctatis, roſtro craſſo uniporcato. *Pall. inſ. roſſ. 1. p. 29. t. B. f. 9.*

Habitat

Habitat in torridis et ſqualidis deſerti Volgenſis *rarior, ſulciroſtri minor, magis teres.*

tetragrammus. 459. C. apterus cineraſcens, thorace fuſco: lineis quatuor lacteis, elytrorum lituris quatuor nigris, roſtro craſſo. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 29. *t.* B. *f.* 10.
Lepech. it. 2. *app. p.* 329. *t.* 11. *f.* 28.
Habitat in ſqualidis aridiſſimis deſerti Volgenſis *maxime auſtralis rarior, major, elegans.*

tribuloides. 460. C. thorace bicriſtato ſcabro, elytris ſpinis conicis axillaribus poſterioribusque roſtro craſſo. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 30. *t.* B. *f.* 11.
Habitat in Rio Janeiro Americae, *habitu inderienſis, europaeis omnibus major.*

nigrivittis. 461. C. cylindricus dealbatus, capite thoraceque ſubcarinatis: faſcia utrinque longitudinali fuſca. *Pall. inſ. ruſſ.* 1. *p.* 31. *t.* B. *f.* 12.
Habitat in aridis ſqualentibus deſerti caſpici, *frequens, octo lineas longus.*

Vibex. 462. C. cylindricus albiſſimus, thorace elytrisque ſtriga utrinque nigra longitudinali. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 32. *t.* B. *f.* 13.
Habitat in arenoſis ad Selengam, *frequens.*

feneſtratus. 463. C. apterus albus, roſtro craſſo, elytrorum maculis ſex rhombeis fuſcis. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 33. *t.* H. *f.* B. 16.
Habitat in ſabuloſis ad Selengam, *nebuloſo minor.*

flaviceps. 464. C. apterus albatus, capite flaveſcente lateribus ruſo, roſtro craſſo, thorace elytrisque albo lineatis fuſco interruptis. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 34. *t.* B. *f.* 17.
Lepech. it. 2. *app. p.* 327. *t.* 11. *f.* 27.
Habitat in arenoſis ad Selengam *et* Chonem, *rarior in* Tatariae *deſertis, magnitudine ſeminis atri.*

pictus. 465. C. albus, roſtro craſſo, thorace faſciis tribus longitudinalibus, elytrorum arcuata fuſcis. *Pall. it.* 1. *app. p.* 463. *n.* 33. *inſ. roſſ.* 1. *p.* 35. *t.* H. *f.* B. 18.
Habitat rarior in aridiſſimis ſalſis deſerti caſpici, *circa lacum quoque* Inderienſem.

hololeucos. 466. C. ſubcylindricus totus albus immaculatus, roſtro craſſo, oculis atris. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 35. *t.* H. *f.* B. 19.
Habitat in ſqualidis deſerti caſpici, *ſub atriplicibus et ſalſolis.*

467. C.

tenebrioides. 467. C. apterus aterrimus glaber, elytris laevigatis. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 36. *t.* B. *f.* 20.
Friſch inſ. 13. *p.* 28. *t.* 26?
Schaeff. ic. t. 62. *f.* 11.
Habitat rarior in deſerti caſpici *aridis, hami inter tenebriones apteros.*

albator. 468. C. oblongus alatus niger, elytris nitidis punctatis, poſterius compreſſis pubeſcentibus: faſciis lateralibus niveis. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 36. *t.* B. *f.* 21.
Habitat in Braſilia, *major.*

noveboracenſis. 469. C. canus, elytris ſubfaſtigiatis: ſtriis quinque albidis nigro punctatis, ſcutello flavicante. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 35. *n.* 35.
Habitat in Noveboraco, 7 *lineas longus.*

melanogrammus. 470. C. corpore cano, ſutura elytrorum anterius nigra, nitida, roſtro breviſſimo. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 36. *n.* 36.
Habitat in Anglia, *incano dimidio minor.*

plagiatus. 471. C. ſubgloboſus, elytris punctis longitudinalibus impreſſis ſtriisque e cinereo et fuſco alternis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 284.
Habitat in Marchia, *ſtatura C. coryli, at multoties major.*

cinereus. 472. C. oblongus cinereus, elytris albido nebuloſis: poſterius faſcia albida. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 285.
Habitat, rarus, Halae Saxonum, *lineati ſtatura.*

ſericeus. 473. C. corpore viridi-argenteo, antennis pedibusque rufis, femoribus poſterioribus ſubdentatis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 286.
Habitat Halae Saxonum *in ſalice, aeſtate frequentiſſimus, argentato affinis, lineati ſtatura et magnitudine.*

tenebricoſus. 474. C. niger nitidus, oculis fuſcis, elytris connatis acuminatis excavato-punctatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 81. *n.* 67. *t.* 24. *f.* 27.
Habitat Berolini, *rariſſimus,* 5 *lineas longus, tenebrioidi affinis.*

Faber. 475. C. niger, roſtro lato, antennis fuſcis, elytris connatis: punctorum excavatorum ſeriebus octo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 81. n. 68. t. 24. f. 28.*

Habitat in Marchia.

major. 476. C. niger albido villoſus, thorace punctato rugoſo roſtrum aequante, elytris punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 81. n. 69. t. 24. f. 29.*

Habitat Berolini, *germanorum maximus.*

linzenſis. 477. C. apterus fuſcus, thoracis elytrorumque lateribus rufis. *Schranck enum. inſ. auſtr. p. 123. n. 234.*

Habitat Linzii.

ſplendidus. 479. C. viridis anguſtiſſimns, oculis fuſcis, antennis pedibusque fuſceſcentibus, elytris punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 82. n. 72. t. 24. f. 30.*

Habitat Berolini, 3 *lineas longus.*

trivialis. 480. C. cinereus, thorace lineis tribus exſoletis albis, elytris maculis fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch, inſ. 5. p. 82. n. 73.*

Habitat Berolini, 3 *fere lineas longus, ſtatura c. polygoni.*

arenarius. 481. C. capite cano, thorace granulato pedibusque nigris, elytris connatis griſeis punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 22. n. 74.*

Habitat Berolini, *ſtatura c. liguſtici, at dimidio minor.*

berolinenſis. 482. C. albicans, ſubtus varius, thorace rugoſo nigro ad latera variegato, elytris faſciis duabus undulatis nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 83. n. 75. t. 24. f. 31.*

Habitat Berolini, *frequens nebuloſo affinis, at multo minor.*

globatus. 483. C. capite thoraceque fuſceſcentibus ſubaeneis, thoracis margine arcubusque duobus mediis longitudinalibus cinereis, abdomine ſubgloboſo, elytris connatis punctato-ſtriatis: interſtitiis faſciis alternis cinereis et fuſceſcentibus maculisque obſoletis albidis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 83. n. 76. t. 24. f. 32.*

Habitat Berolini *frequens, variae magnitudinis.*

Viverra. 484. C. ſordide cinereus, roſtro lato, thorace ſcabro, anterius turgido, per mediam longitudinem ſulcato, elytris ſtriatis:

ſtriatis: interſtitiis ſcabris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 83. n. 77.*

Habitat in Pomerania, *vix ſeſquilineam longus, antennis fuſcis.*

Herbſtii. 485. C. cinereus, thorace ſubgloboſo granulato, elytris rotundatis ſtriatis: ocellis rubro-aureis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 84. n. 78.*

Habitat Berolini, *rarior.*

pyricola. 486. C. anguſtus ater, ſubtus antennisque ſpadiceus, thorace granulato, elytris ſulcatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 84. n. 79.*

Habitat in Pomerania, *vix* 2 *lineas longus, roſtro paulo longiore.*

granulatus. 487. C. ovatus griſeus, ſupra granulatus: granulis hinc inde rubris pellucidis, elytris connatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 84. n. 80. t. 24. f. 33.*

Habitat in Marchia, 3 *lineas longus.*

piniperda. 488. C. ſpadiceus, thorace elongato punctato, elytris punctato-ſtriatis, femoribus ſubdentatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 84. n. 81.*

Habitat in Marchia, 1½ *lineam longus, facie boſtrichi piniperdae.*

ſuturalis. 489. C. elongatus cinereus fuſco ſubvarius, ſubtus, lateribus ſuturaque albus, antennis oculisque nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 84. n. 82. t. 24. f. 34.*

Habitat in Marchia, *anguſtus,* 3 *lineas longus.*

Eremita. 490. C. ſupra flaveſcente-piloſus, roſtro tenui thoraceque ſubpunctato nigris, antennis elytrisque punctato-ſtriatis fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 85. n. 83.*

Habitat in Marchia, 2 *lineas longus.*

bruchoides. 491. C. thorace elytrisque abbreviatis nigris granulatis et ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 85. n. 84.*

Habitat in Marchia, *brucho ſimilis, vix ultra dimidiam lineam longus, teres, craſſus roſtro pendulo.*

ſingularis. 492. C. ſubbreviroſtris cinereus, elytris ſtriis punctatis: punctis excavatis centro eminentibus. *Syſt. nat. XII. 2. add. p. 1066. n. 3.*

Habitat

Habitat in Luſitania, *mediae magnitudinis, femoribus clavatis.*

carinatus. 493. C. ſubbreviroſtris niger, thorace ſubcarinato, elytris angulatis tuberculatis. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1066. *n.* 3.
Habitat in Luſitania, *barbaro ſimilis, at quadruplo minor.*

oedematoſus. 494. C. niger glaber politus, elytris rubris. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 40. *t.* 4. *f.* 10.
Habitat in Europa.

Cypri. 495. C. ſulcatus, linea dorſi longitudinali atra. *Haſſelq. it. p.* 449. *n.* 100.
Habitat in Cypro.

albidus. 496. C. apterus ſupra albicans, ſubtus dilute roſeus, thorace bicuſpidato, elytris ſulcatis: punctis canis. *Lepech. it.* 1. *p.* 313. *t.* 17. *f.* 7.
Habitat in Ruſſia.

bipunctatus. 497. C. thorace ſcabro, elytris nebuloſis: punctis ad apicem duobus nigris nitidis. *Lepech. it* 2. *p.* 205. *t.* 11. *f.* 25.
Habitat in Sibiria.

guttatus. 498. C. niger, vellere rufeſcente nigro punctato: punctis in elytris tranſparentibus. *Lepech. it.* 2. *p.* 205. *t.* 11. *f.* 30.
Habitat in Sibiria.

populneus. 499. C. ater, femoribus pallidis. *Scop. ent. carn. n.* 74.
Habitat in Carniolia, *c. fagi proxime affinis, at femoribus aequalibus.*

piger. 500. C. femoribus anterioribus clavatis, roſtro ſtriis elevatis ſenis; lateralibus apice conjunctis. *Scop. ent. carn. n.* 65.
Habitat in Carniolia.

iners. 501. C. roſtro linea elevato unica, elytris ſtriis decem punctatis. *Scop. ent. carn. n.* 68.
Habitat in Carniolia.

reſinoſus. 502. C. niger ſcaber, abdomine ſubtus, elytris apice albidis. *Scop. ent. carn. n.* 67.
Habitat in Carniolia.

picatus. 503. C. piceus, abdomine nigro, ſubtus albido, femoribus clavatis. *Scop. ent. carn. n.* 69.
Habitat in Carniolia.

erraticus. 504. C. roſtro apice concavo, elytris ſubvilloſis ſtriatis: ſtria tertia tuberculata. *Scop. ent. carn. n.* 70.
Habitat in Carniolia.

C. album. 505. C. ex cupreo nigroque varius, elytris ad angulum baſeos externum linea arcuata alba. *Scop. ent. carn. n.* 99.
Habitat in Carniolia.

ſenſitivus. 506. C. niger, femoribus fulvis apice nigris. *Scop. ent. carn. n.* 100.
Habitat in Carniolia.

nemoreus. 507. C. apterus niger opacus, capite glabro, roſtro bifido, thorace elytrisque ſcabris acuminatis. *Scop. ent. carn. n.* 101.
Habitat in Carniolia.

Momus. 508. C. roſtro ſupra biſulcato, abdomine poſterius fulvo villoſo, femoribus anterioribus craſſioribus. *Scop. ent. carn. n.* 102.
Habitat in Carniolia.

Zoilus. 509. C. roſtro deflexo, elytris ſtriatis nigro punctatis. *Scop. ent. carn. n.* 103.
Habitat in Carniolia.

quercinus. 510. C. niger, ſcutello trilobo: lobo anteriore albo, elytris puncto albo. *Scop. ent. carn. n.* 106.
Habitat in Carnioliae *et* Helvetiae *quercu.*

carniolicus. 511. C. niger, thorace albido, elytris ſtriis quinque elevatis nigris albo-punctatis. *Scop. ent. carn. n.* 107.
Habitat in Carniolia.

villoſulus. 512. C. rufus ſubvilloſus, elytris faſciis duabus obſcurioribus obſoletis. *Scop. ent. carn. n.* 108.
Habitat in Carniolia.

praecox. 513. C. ferrugineus, elytris ſtriatis ſubvilloſis. *Scop. ent. carn. n.* 109.
Habitat in Carniolia, *ſub finem Aprilis conſpicuus.*

tricolor. 514. C. niger, thorace punctis binis albis, elytris punctatis: margine interiore albo, lineisque binis longitudinalibus flavis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 91. *n.* 45.
Habitat - - -

dentiroſtris. 515. C. ovatus niger, roſtro apice quadridentato. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 85. *n.* 941.
Habitat in Dania.

tardus. 516. C. nigricans, thorace elytrisque utrinque rufis: macula apicis atra. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 86. *n.* 942.
Habitat in Dania.

nodoſus. 517. C. caneſcens, elytris nodulis minimis ſtriatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 86. *n.* 948.
Olaff. it. isl. 1. *p.* 319. Silakkepr.
Habitat in Islandia.

longicornis. 518. C. nigricans, thorace hirto, elytris cinereis: maculis flavicantibus, pedibus antennisque rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 86. *n.* 949.
Habitat in Dania.

opacus. 519. C. totus griſeus laeviſſimus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 950.
Habitat in Dania.

bicolor. 520. C. griſeus, antennis pedibusque rufeſcentibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 951.
Habitat in Dania.

maculoſus. 521. C. ovatus, obſcure flavicans, elytris luteo maculatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 952.
Habitat in Dania.

ſuturatus. 522. C. cervinus ovatus elytris lineis tribus elevatis: ſutura poſterius carinata. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 955.
Habitat in Dania.

terlineatus. 523. C. elongatus cinereus, thorace terlineato, antennis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 956.
Habitat in Dania.

mollis. 524. C. griſeo-auratus, elytris mollibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 960.
Act. Nidr. 4. *p.* 12. *t.* 16. *f.* 6.
Habitat in Scandinavia.

undulatus. 525. C. griſeus nitens, faſciis elytrorum undulatis ferrugineis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 961.
Act. Nidr. 4. *p.* 13.
Habitat in Scandinavia.

biſpinus. 526. C. caeruleus, thorace utrinque ſpinoſo, antennis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 91. *n.* 1023.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 4.
Habitat in Europa.

inermis. 527. C. violaceus, thorace punƈto utrinque impreſſo, antennis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 91. *n.* 1025.
Schaeff. ic. t. 56. *f.* 8.
Habitat in Europa.

fuſcatus. 528. C. nigro-fuſcus, thorace utrinque faſcia longitudinali, elytris duplici tranſverſa cinerea. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 280. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

fimbriatus. 529. C. niger, thorace punƈtato, elytris alternatim ſtriatis et punƈtatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 281. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

exaratus. 530. C. oblongus totus niger, thorace punƈtato, elytris ſulcatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 282. *n.* 11.
Habitat in Gallia.

ſquamoſus. 531. C. ſquamis nitentibus, thoracis elytrorumque faſciis longitudinalibus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 284. *n.* 14.
Habitat in Gallia.

Geoffroaei. 532. C. rufus ſubvilloſus, capite nigricante. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 284. *n.* 15.
Habitat in Gallia.

gramineus. 533. C. caeruleo-viridis nitens, thorace punƈtato, elytris ſtriatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 284. *n.* 16.
Pet. gazoph. p. 77. *n.* 6.
Habitat in Europa.

doloroſus. 534. C. oblongus niger, abdomine ſquamoſo: lateribus albis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 285. *n.* 17.
Habitat in Gallia.

denticulatus. 535. C. ovatus ex nigro cinereus, thorace utrinque denticulato. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 288. *n.* 24.
Habitat in Gallia.

aculeatus. 536. C. ſubrotundus niger ſquamoſus, elytris ſtriatis, thorace utrinque aculeato: lateribus lineaque media albis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 288. *n.* 25.
Habitat in Gallia.

537. C.

ſubglobo-ſus. 537. C. ſubgloboſus ex cinereo ater, ſtriatus, roſtro thoracis longitudine. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 289. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

erythroleucos. 538. C. globoſus rufus, elytris ſtriatis: faſcia rransverſa alba. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 289. *n.* 27.
Habitat in Gallia.

leucozonius. 539. C. globoſus niger, elytris ſtriatis: faſcia tranſverſa alba. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 289. *n.* 28.
Habitat in Gallia.

ſpinoſus. 540. C. totus fuſcus ſpinoſus, elytris ſtriis elevatis villoſo-ſpinoſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 412. *n.* 97.
Habitat in Gallia.

armus. 541. C. niger, ſcutello albicante, elytrorum ſtriis utrinque denticulatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 290. *n.* 31.
Habitat in Gallia.

marmoratus. 542. C. lividus, coleoptris faſciis plurimis obſcuris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 291. *n.* 33.
Habitat in Gallia.

bohemicus. 543. C. corpore, capite antennisque nigris, thorace papilloſo et elytris quatuor papillarum ordinibus inſignitis cinereis incanis. *Richter Abh. Naturg. Boehm. p.* 34.
Habitat in diſtrictu Bohemiae Reichenbergenſi, *ſubgloboſus, magnitudine dermeſtis pellionis.*

rotundatus. 544. C. apterus, corpore oblongo nitido nigro laevi. *Degeer inſ.* 5. *p.* 243. *n.* 29. *t.* 7. *f.* 22.
Habitat in Europa, 3½ *lineas longus.*

multicolor. 545. C. corpore ſubgloboſo ex rufo fuſco: punctis ex flavo griſeis, elytris carinatis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 244. *n.* 30.
Habitat in alno, *mediae magnitudinis.*

ochropus. 546. C. corpore oblongo viridi nitido, antennis pedibusque flavis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 245. *n.* 31.
Habitat in Europa, *ultra* 2 *lineas longus.*

faſciculatus. 547. C. corpore ovato fuſco: faſciculis piloſis griſeis, antennis longis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 276. *n.* 10. *t.* 16. *f.* 2.
Habitat Surinami.

fulviroſtris. 549. C. nigro-aeneus roſtro plano pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 381.
Habitat in Scania *parvus.*

triangularis. 551. C. obſcurus flavicans, thoracis baſi triangulari, elytris ſtriato-punctatis. *Petagn. inſ. Calabr. p.* 14 *n.* 71.
Habitat Brancaleoni *in* Calabria, *in* carduorum *floribus frequens.*

formoſus. 553. C. corpore vireſcente, antennis pedibusque rufis. *Mayer Abh. boehm. Geſ.* 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiae *floribus cardui, magnitudine c. pyri.*

carinatus. 582. C. griſeus oblongus, roſtro carinato: carina utrinque fuſcata, thorace elytrisque punctatis: his polline griſeo conſperſis: punctorum ordinibus decem, pedibus anticis longioribus: femoribus tibiisque fuſco annulatis. *Muſ. Lesk. p.* 21. *n.* 445.
Habitat extra Europam.

craſſiroſtris. 583. C. griſeus, roſtro craſſo ſupra rugoſo, thorace nigro punctato, elytris obſolete rugoſis: pilis erectis hiſpidis, abdomine fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 21. *n.* 449.
Habitat in Europa.

dealbatus. 584. C. oblongus varioloſus niger, polline albo conſperſus, elytris faſciis obliquis duabus maculisque tribus albis, abdomine nigro punctato. *Muſ. Lesk. p.* 21. *n.* 450.
Habitat in Europa.

incineratus. 585. C. niger, thoracis lineis quatuor elytrorumque vittis quatuor punctisque ſparſis cinereis. *Muſ. Lesk. p.* 21. *n.* 456.
Habitat in Europa.

planiroſtris. 586. C. ſubgloboſus griſeus, roſtro explanato, elytris ſtriatis erecto-piloſis. *Muſ. Lesk. p.* 21. *n.* 459.
Habitat in Europa.

varius. 587. C. elytris griſeo fulvoque variis punctato-ſtriatis: punctis holoſericeis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 21. *n.* 461.
Habitat in Europa.

naevius. 588. C. naevius, roſtro craſſo ſupra plano fuſco, elytris rugoſis: ſutura elevata poſterius carinata, femoribus fuſcis, tibiis rufis griſeo-ſquamoſis. *Muſ. Lesk. p.* 21. *n.* 463.
Habitat in Europa.

coracinus. 589. C. niger ovatus glaber, elytris connatis apice acuminatis thoraceque punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 465.
Habitat in Europa.

latiroſtris. 590. C. elytris punctato-ſtriatis cinereo-piloſis, roſtro brevi lato ſtria dorſali exarato. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 466.
Habitat in Europa.

hirtus. 591. C. fuſcus, thoracis lineis quatuor, elytrisque hiſpidis punctato-ſtriatis griſeis: horum marginibus externis albidis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 467.
Habitat in Europa.

rugatus. 592. C. griſeus, thoracis dorſo elytrorumque rugoſorum ſutura ferrugineo-fuſca, thoracis dorſo utrinque puncto. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 470.
Habitat in Europa.

infuſcatus. 593. C. roſtro thoraceque fuſcis: hujus lineis tribus griſeis, elytris tibiisque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 471.
Habitat in Europa.

obſoletus. 594. C. fuſco-griſeus, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 472.
Habitat in Europa.

ſubrufus. 595. C. fulvo-griſeus, antennis tibiisque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 473.
Habitat in Europa.

clavipes. 596. C. oblongus fuſcus cinereo adſperſus, antennis tibiisque rufis, femoribus clavatis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 475.
Habitat in Europa.

exoletus. 597. C. fuſcus, elytris ſtriatis, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 478.
Habitat in Europa.

nubilus. 598. C. fuſcus griſeo-nebuloſus, roſtro lato plano, elytris ſtriatis apice obtuſis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 479.
Habitat in Europa, *magnitudine pediculi, ſtatura c. Albini.*

tenebricoſus. 599. C. niger ſubaeneus ovatus hirtus punctato-ſtriatus, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 481.
Habitat in Europa.

lutoſus. 600. C. lutoſus ovatus, antennis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 482.
Habitat in Europa.

RHINOMACER. *Antennae* ſetaceae, roſtro inſidentes.

Palpi quatuor extrorſum craſſiores.

curculioides. 1. Rh. villoſo-griſeus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 1.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 199. *n.* 1. Rhinomacer curculioides.
Habitat in Italia, *ſtatura curculionis, ſubtus cinereus, pedibus nigris.*

attelaboides. 2. Rh. villoſo-piceus, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 2.
Habitat in Sueciae *pinetis, curculioide minor.*

caeruleus. 3. Rh. caeruleſcens ſubvilloſus antennarum baſi pedibusque flavis. *Petagn. inſ. Calabr. p.* 14. *n.* 72. *f.* XXXIV.
Habitat ad littora Calabriae, Brancaleoni; *an forte Attelabi ſpecies?*

ATTELABUS. *Caput* poſterius acuminatum, inclinatum.

Antennae moniliformes, apicem verſus craſſiores.

* *maxilla bifida.*

coryli. 1. A. niger, elytris rufis reticulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 619. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 638. *Amoen. acad.* 5. *t.* 3. *f.* 171. Attelabus niger, elytris rubris.
It. oel. 153. Curculio niger, elytris rubris, capite poſtice elongato.
Degeer inſ. 5. *p.* 257. *n.* 46. *t.* 8. *f.* 3. Curculio excoriato-ruber.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 273. *n.* 11.
Pontopp. atl. Dan. p. 205. *n.* 1. *t.* 16.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 75. *f.* 8.
Habitat in coryli *foliis, quae in cylindrum convolvit, et utrinque claudit.*

avellanae. 2. A. niger, elytris, thorace pedibusque rubris.
Scop. ent. carn. 71. Curculio collaris.
Schaeff. ic. t. 56. *f.* 5. 6.
Habitat in Germaniae *corylis, a. coryli ſimilis; an mera varietas?*

bicolor. 32. A. niger, thorace elytrisque rufeſcentibus, ſcutello femorum tibiarumque baſi et apice nigris. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 504.
Habitat in Europa.

denigratus. 33. A. niger, thorace elytrisque rubris, dorſi macula tibiis femorumque baſi et apice nigris. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 505.
Habitat in Europa.

erythropterus. 34. A. niger, elytris rubris laeviſſime ſtriato-punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 506.
Habitat in Europa.

bipuſtulatus. 11. A. ater, elytris macula baſeos rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 2.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

gemmatus. 14. A. ferrugineus, tuberculis nigris ſparſis. *Thunb. nov. inſ. ſpec.* 3. *p.* 68. *f.* 80. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 4.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine et figura a. coryli.*

indicus. 15. A. ferrugineus, capite, elytrorum baſi faſciaque cyaneis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 68. *f.* 81. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 5.
Habitat in India, *ſtatura et magnitudine melanuri.*

curculionoides. 3. A. niger, thorace elytrisque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 6.
Scop. ent. carn. 72. Curculio nitens.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 273. *n.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 12.
Schaeff. ic. t. 75. *f.* 8.
Habitat in Europae *corylo, ſalice, a. coryli ſimilis, ſed minor.*

ſurinamenſis. 4. A. elytris apice bidentatis.
Habitat Surinami, *penſylvanico ſimilis, a. coryli minor, niger; elytris fuſcis, pedibus ferrugineis, antennis albo nigroque annulatis.* Rolander.

penſylvanicus. 5. A. niger, elytris rubris: faſcia media apicisque nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 3.
Habitat in America *boreali, ſtatura ſurinamenſis, ſed minor, maxillis pedibusque rufis, antennis obtuſis baſi flaveſcentibus, thorace oblongo glabro.*

melanúros. 6. A. niger, elytris teſtaceis apice nigris.
Habitat Upſaliae, *penſylvanico ſimilis, ſed major, antennarum abdominisque baſi et elytris teſtaceis.*

angulatus. 16. A. ferrugineus, coleoptris angulatis: diſco nigro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *ſtatura A. coryli, antennis et pectore nigris.*

ruficollis. 17. A. rufus, capitis vertice nigro, elytris caeruleis nitidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 8.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 87. *n.* 3. *t.* 25. *f.* 1. a.
Habitat in Sibiria, *ſtatura a. coryli, antennarum apice caeruleo.*

pubeſcens. 18. A. violaceus hirtus, roſtro atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 9.
Habitat in Germania, *roſtro longiori.*

betulae. 7. A. ater, pedibus ſaltatoriis. *Fn. ſuec.* 640.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 10.
Degeer inſ. 5. *p.* 259. *n.* 47. Curculio excoriato-niger.
Habitat in betulae foliis, *quae rodendo pulcre criſpa reddit, ocyſſime ſaliens.*

** *maxilla unidentata.*

† *palpis poſterioribus ſecuriformibus,* Cleri.

mutillarius. 19. A. niger, elytris faſcia triplici alba baſi rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 1. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 87. *n.* 1. *t.* 25. *f.* 2.
Schranck inſ. auſtr. n. 34. Dermeſtes formicarioides.
Habitat Halae Saxonum.

dubius. 20. A. rufus, elytris nigris: faſcia duplici alba baſique rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 2.
Habitat in America *boreali.*

ichneumonius. 21. A. capite thoraceque rufis, elytris nigris: faſcia media rufa ſtrigaque apicis alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 3.
Habitat in America *boreali.*

formicarius. 8. A. niger, thorace rufo, elytris faſcia duplici alba baſique rubris. *Fn. ſuec.* 641. *Scop. ent. carn.* 111. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 5.
Degeer inſ. 5. *p.* 160. *n.* 3. *t.* 5. *f.* 8. Clerus formicarius.
Schranck inſ. auſtr. p. 21. *n.* 31. Dermeſtes formicarius.
Raj. inſ. p. 103. *n.* 29.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 8.
Habitat in Europa *et boreali* America, *ptinum pertinacem devaſtans, larva inter corticos putridos.*

ſphageus. 22. A. niger, fronte elytrorumque faſcia cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 4.
Habitat in America *boreali, ſtatura et magnitudine formicarii.*

ſexguttatus. 23. A. niger, fronte cineraſcente, elytris maculis tribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali.*

quadrimaculatus. 24. A. niger, thorace rubro, elytris punctis duobus albis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 288. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 7.
Habitat in Halae Saxonum *pinetis, parvus.*

unifaſciatus. 25. A. niger, elytris faſcia alba baſi rubris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 13. Attelabus formicarius minor.
Habitat in Helvetiae *et* Africae *onopordo.*

octopunctatus. 26. A. cyaneus hirtus, elytris rufis: punctis quatuor nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 9.
Habitat in Hiſpaniae *umbellatis, ſtatura formicarii.*

tricolor. 27. A. rufus, capite nigro, elytris baſi caeruleis, medio rufis apice violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 10.
Habitat in Africa *aequinoctiali, formicario minor.*

bifaſciatus. 28. A. viridi-aeneus pubeſcens, elytris cyaneis: faſciis duabus coccineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 11.
Habitat in Sibiria, *formicarii magnitudine.*

ſipylus. 9. A. viridis, elytris faſcia duplici flava interrupta, thorace hirſuto. *Muſ. Lud. Ulr.* 63.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 12.
Habitat in Africa, *ſtatura et magnitudine formicarii.*

Ammios. 29. A. viridis hirtus, elytris cyaneis: maculis tribus flavis; poſterioribus lunatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 13.
Habitat in Africae *ammi majori*, *ſtatura et magnitudine apiarii.*

apiarius. 10. A. caeruleſcens, elytris rubris: faſciis tribus nigris.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 202. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 14. Clerus elytris rubris: faſciis tribus caeruleſcentibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 304. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 4. Clerus nigro-violaceus hirſutus &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 157. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 3. Clerus caeruleo-violaceus.
Schranck inſ. auſtr. p. 21. *n.* 36. Dermeſtes apiarius.
Swammerd. bibl. nat. t. 26. *f.* 3.
Reaum. inſ. 6. *t.* 8. *f.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 6. *et* 14.
Schaeff. el. t. 46.
ic. t. 48. *f.* 11.
Habitat in Europa, America, Sibiria, *larva frequens in alveariis, imago in floribus, formicario duplo major.*

cyaneus. 30. A. cyaneus, abdomine pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 15.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

crabroniformis. 31. A. niger hirtus, elytris rufis: faſciis tribus nigris; tertia terminali. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 16.
Habitat in Oriente, *apiario major.*

†† *palpis quatuor ſubfiliformibus*, Spondylides.

ceramboides. 12. A. ater, elytris rugoſis thorace latioribus. *Fn. ſuec.* 643.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 2.
Uddm. diſſ. 26. *t.* 1. *f.* 1. Curculio maximus ater oblongus, elytris irregulariter reticulatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 32. *n.* 2. Tenebrio varioloſus.
Habitat in boleto fomentario; *nonne potius tenebrio?*

bupreſtoides. 13. A. ater, elytris nervoſis, thorace ſubgloboſo. *Fn. ſuec.* 644.* *Fabr ſp. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 1.

Fn.

Fn. ſuec. 1. *n.* 554. Bupreſtis ater.
Degeer inſ. 5. *p.* 84. *n.* 21. *t.* 3. *f.* 21. Cerambyx maxillo-
ſus niger &c.
Friſch inſ. 13. *p.* 23. *t.* 19. Scarabaeus arboreus, collo craſſo.
Habitat in Europae *ſilvis.*

NOTOXUS. *Antennae* filiformes.
Palpi quatuor ſecuriformes.
Maxilla unidentata.

porcatus. 1. N. niger, elytris porcatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 1.
Habitat in terra van Diemen, *molli major.*

violaceus. 2. N. pubeſcens niger violaceo-nitidus, elytris laevibus: pun-
ctis tribus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 2.
Habitat in nova Seelandia.

mollis. 3. N. pubeſcens, elytris nigris: faſciis tribus pallidis. *Fabr.*
ſp. inſ. 1. *p.* 203. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 621. *n.* 11. *Fn. ſuec.* 642. Attelabus
griſeus pubeſcens, elytris faſciis tribus pallidis.
Uddm. diſſ. 28. *t.* 1. *f.* 9. Curculio oblongus ruber, ely-
tris nigris faſcia triplici albicante.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 305. *n.* 3. Clerus fuſcus villoſus &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 159. *n.* 2. *t.* 5. *f.* 6. Clerus fuſco-faſciatus.
Schranck inſ. auſtr. p. 22. *n.* 37. Dermeſtes mollis.
Habitat in Europae *floribus.*

monoceros. 4. N. thorace in cornu ſupra caput protenſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1.
p. 203. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 4. *Herbſt apud Fueſſli
arch. inſ.* 5. *p.* 88. *n.* 2. *t.* 25. *f.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 651. *n.* 14. Meloë monoceros.
Fn. ſuec. 638. Attelabus monoceros.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 356. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 8. Notoxus.
Habitat in Europae *floribus.*

204. CERAMBYX. *Antennae* ſetaceae.
Palpi quatuor.
Thorax ſpinoſus aut gibbus.
Elytra linearia.

* *palpis quatuor aequalibus.*

1 *filiformibus.*

† *maxilla cylindrica integra,* Prioni.

‡ *thorace ſpinis mobilibus.*

longimanus. 1. C. elytris baſi unidentatis apiceque bidentatis, antennis longis. *Muſ. Lud. Ulr.* 64.* *Gron. zooph.* 522.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 1.
Grew muſ. 163. *t.* 13. Nocoonaca.
Degeer inſ. 5. *p.* 102. *n.* 6.
Sloan. jam. 2. *p.* 209.
Merian. ſurin. t. 28.
Vinc. muſ. t. 1. *f. inſ. med.*
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 2. *p.* 11. *t.* 1. *f.* a.
Aubent. miſcell. t. 64. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, tibiis anterioribus in altero ſexu longiſſimis.*

trochlearis. 2. C. elytris fuſco canoque variis: punctis elevatis.
Habitat in India. Degeer.

†‡ *thorace marginato.*

fuliginoſus. 84. C. ater, thorace crenato unidentato, elytris apice crenato-dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 2.
Habitat in America *meridionali, antennis pedibusque interdum rufis.*

roſtratus. 85. C. thorace unidentato rufo, mandibulis inflexis acutis, ſterno ſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 3.
Habitat in Siam, *mediae magnitudinis, capite atro, antennis piceis, elytris nigris, pedibus rufis.*

cervicornis. 3. C. thorace utrinque tridentato, mandibulis porrectis extus uniſpinoſis, antennis brevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 65.* *Gron. zooph.* 523.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 12.

Degeer

Degeer inſ. 5. *p.* 94. *n.* 1.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 6.
Merian. ſurin. t. 48.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 2. *p.* 12. *t.* 1. *f.* B.
Brown jam. 429. *t.* 44. *f.* 8.
Aubent. miſcell. t. 90. *f.* 3.
Habitat larva in Americae *ligno* bombacis, *exemta edulis, incolis in* deliciis.

armillatus. 4. C. thorace utrinque quadridentato, elytris ferrugineis nigro marginatis, femoribus poſterioribus unidentatis. *Gron. zooph.* 525. *t.* 15. *f.* 6. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 15.
Habitat in India, *maximus.*

damicornis. 86. C. thorace denticulato, mandibulis porrectis bidentatis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 16.
Mant. 1. *p.* 532. Cerambyx thorace marginato crenulato angulato, maxillis porrectis corniformibus introrſum bidentatis, antennis mediocribus.
Degeer inſ. 5. *p.* 97. *n.* 2.
Drury inſ. 1. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, cujus incolis larva in deliciis.*

imbricornis. 5. C. thorace bidentato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, antennis perfoliato-imbricatis, brevioribus. *Gron. muſ.* 529.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 2. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Carolina, *ſtatura coriarii, an mera hujus varietas?*

Faber. 6. C. thorace utrinque unidentato rugoſo, elytris piceis, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 646.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 6.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 1.
Friſch inſ. 13. *p.* 2. *t.* 17.
Schaeff. ic. t. 72. *f.* 3.
t. 111. *f.* 1.
Habitat in Europae *ligno rarior.*

coriarius. 7. C. thorace tridentato, corpore piceo, elytris mucronatis, antennis brevioribus. *Fn. ſuec.* 647.* *Scop. ent. carn.* 161. *Gron. zooph.* 528. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 7.

Fn.

Fn. ſuec. 480. Cerambyx niger, thorace planiuſculo, margine utrinque tridentato, coleoptris piceis.
Gadd ſat. 79. Cerambyx cinereo nigricans, antennis et pedibus rufis.
Degeer inſ. 5. *p.* 59. *n.* 1. *t.* 3. *f.* 5. Cerambyx Prionus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 198. *n.* 1. *t.* 3. *f.* 9. Prionus.
Raj. inſ. p. 95. *n.* 1.
Friſch inſ 13. *t.* 9.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 26.
Roeſel inſ. 2. *ſcar.* 2. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Schaeff. el. t. 103.
ic. t. 67. *f.* 3.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 3. 4. 5. 6.
Voet coleoptr. 2. *t.* 3. *f.* 9.
Habitat in Europae *betulis putridis, ova magna, oblonga, flaveſcentia pariens.*

giganteus. 87. C. thorace utrinque tridentato, corpore nigro, elytris ferrugineis, antennis brevibus. *Mant.* 1. *p.* 531. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 14.
Aubent miſc. t. 64. *f.* 2.
Drury inſ. 3. *t.* 49. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, mandibulis bidentatis.*

melanopus. 8. C. thorace ſerrulato, corpore nigro, antennis brevibus, elytris mucronatis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 208. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 25. Prionus thorace marginato dentato, maxillis porrectis multidentatis, elytris mucronatis.
Gron. zooph. 531.
Merian. ſurin. t. 24. *f.* 1.
Drury inſ. 1. *t.* 38. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, coriario duplo major.*

ſpinoſus. 88. C. thorace multidentato nigro, elytris unidentatis teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 26.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis.*

barbatus. 89. C. thorace integro, mandibulis ferrugineo-hirſutiſſimis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 27.
Habitat in America *meridionali, magnus.*

Thomae. 9. C. thorace crenulato, corpore nigro, elytris glabris ferrugineis: margine luteo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 15. *mant.*

mant. inſ. 1. *p.* 129. *n.* 19. *Herbſt Beſch. der berl. Naturf. Fr.* 4. *t.* 7. *f.* 9.

Habitat in inſulis Americae, *meridionali oppoſitis*, 2 *pollices longus.*

bilineatus. 90. C. thorace crenato albo bilineato, elytris ferrugineis: atomis albis margineque luteo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 20.

Habitat in inſulis, Americae *oppoſitis.*

cinnamomeus. 10. C. thorace denticulato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 66.*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 208. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 24. Prionus thorace marginato denticulato, mandibulis porrectis tridentatis.

Merian. ſurin. 24. *t.* 24.

Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 2.

Drury inſ. 1. *t.* 40. *f.* 2.

Habitat in America *meridionali, elytris cinnamomeis.*

depſarius. 12. C. thorace ſubemarginato unidentato pubeſcente, corpore nigricante, antennis brevibus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 7.

Habitat in Suecia, *coriario minor, et dimidio anguſtior.*

mucronatus. 91. C. thorace bidentato, elytris rufis mucronatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 8.

Habitat in America *meridionali.*

curvus. 92. C. niger, thorace bidentato: dentibus arcuatis, elytris obtuſis teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 9.

Habitat in terra van Diemen, *mediae magnitudinis.*

Luzonum. 93. C. thorace multiſpinoſo, mandibulis porrectis unidentatis apice bifidis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 10.

Petiv. gazoph. t. 47. *f.* 1.

Habitat in inſulis Luzonum.

ſerripes. 94. C. thorace multiſpinoſo, mandibulis porrectis apice tridentatis, pedibus ſpinoſo-ſerratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 11.

Habitat in Africa *aequinoctiali, c. luzonum proxime affinis.*

13. C.

atratus.* 13. C. thorace utrinque bidentato, corpore atro, antennis mediocribus antrorſum aculeato-ſerratis. *Gronov. zooph.* 524. *t.* 14. *f.* 9.
Habitat in Zeylon.

lineatus. 14. C. thorace ſerrulato dentato, elytris nigris: linea alba, antennis compreſſis brevioribus.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 204. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 4. Prionus thorace marginato crenato unidentato niger albo-vittatus, elytris apice crenato-dentatis.
Sloan. jam. 2. *p.* 209. *t.* 237. *f.* 34.
Brown jam. 430. *t.* 43. *f.* 7.
Habitat in America *meridionali, inſulisque oppoſitis.*

nitidus. 95. C. thorace crenato unidentato, cyaneo-aeneus, elytris cupreis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 5.
Habitat in Braſilia, *coriario paulo minor.*

ſpinibarbis. 15. C. thorace ſubcrenulato, capite ſub maxillis ſpinoſo ſcabro, antennis brevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 67.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 208. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 21. Prionus thorace marginato crenato, capite ſub mandibulis tridentatis.
Merian. ſurin. 24. *t.* 24.
Habitat in America *meridionali, niger.*

maxilloſus. 96. C. thorace crenato, mandibulis porrectis intus hirſutis quadridentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 22.
Drury inſ. 1. *t.* 38. *f.* 3.
Habitat in America *meridionali, ſpinibarbi affinis.*

canaliculatus. 97. C. thorace crenato: canali dorſali villoſo albo, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 23.
Habitat in inſulis, Americae *oppoſitis, coriario minor.*

bifaſciatus. 16. C. thorace denticulato, corpore nigro, elytris rubris: faſciis duabus atris, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 17.
Gron. zooph. p. 532. *t.* 14. *f.* 4.
Habitat in America *meridionali.*

cylindroides. 98. C. obſcurus, thorace tridentato, pectore abdomineque ferrugineis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 18.
Habitat in America *boreali, mediae magnitudinis.*

planatus. 17. C. thorace ſcabro anterius dentato, corpore nigro, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 645.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 6. infuſus flavipes.
Habitat in Europae *truncis decorticatis, pediculo duplo major, antennis mediocribus, vix hujus generis.*

†† *maxilla obtuſa unidentata,* Cerambyces.

barbicornis. 18. C. thorace ſpinoſo, antennarum quatuor primis articulis nigro-barbatis, corpore teſtaceo nigro variegato. *Muſ. Lud. Ulr.* 68.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 34.
Habitat in Aſia.

Ammiralis. 19. C. thorace ſubſpinoſo, antennarum quarto articulo barbato, ſecundo ſpinoſo.
Habitat Surinami, *niger, elytrorum baſi, thoracisque lateribus rufis.*

Batus. 20. C. thorace ſpinoſo rugoſo, elytris bidentatis, antennis longis uncinato-aculeatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 69.
Muſ. Petrop. 652. *n.* 154. Capricornus niger cornutus.
Habitat in America *auſtrali et* India.

araneiformis. 21. C. thorace ſpinoſo tuberculatoque, elytris poroſis, antennis longis: articulo quinto barbato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 3.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 24.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 4.
Habitat in America *meridionali, griſeus, aedili duplo major.*

nodoſus. 99. C. thorace ſpinoſo, elytris cinereis nigro maculatis, antennis longiſſimis: articulo tertio apice nodoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 4.
Habitat in Marilendia.

cancriformis. 100. C. thorace multidentato: dorſo plano, elytris tibiisque anterioribus unidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 5.
Drury inſ. 2. *t.* 35. *f.* 1. Cerambyx puſtulatus.
Habitat in America *meridionali.*

tuberculatus. 101. C. thorace ſpinoſo tuberculatoque, elytris punctatis ſpinoſisque, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 6.
Habitat in Jamaica, *ſtatura cancriformis.*

hebraeus. 102. C. thorace acute dentato: dorſo bicarinato, elytris cinereis fuſco ſtriatis maculatisque. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 7.
Habitat in America *meridionali*, *cinereus.*

Scorpio. 103. C. thorace quadriſpinoſo, elytris tuberculato-granulatis, tibiis anterioribus apice dilatatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 8.
Habitat in America *meridionali*, *cinereus.*

Sentis. 23. C. thorace ſpinoſo laevi, elytris faſtigiatis biguttatis, antennis ſubtus aculeatis longioribus.
Habitat in India, *griſeus*, *linea alba ab antennis per latera thoracis et abdominis ducta*, *antennis corpore ſesquilongioribus.*

farinoſus. 24. C. piceus, thorace ſpinoſo, elytris punctis albis farinoſis ſparſis, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 35.
Degeer inſ. 5. *p.* 108. *n.* 9. *t.* 13. *f.* 17. Cerambyx niger &c.
Forſter nov. inſ. ſp. 1. *p.* 39. *n.* 39. Cerambyx chinenſis.
Merian. ſurin. t. 24. *f. inf.*
Drury inſ. 2. *t.* 31. *f.* 4.
Habitat in argemones mexicanae *radice*, *larva albicans*, *capite caudaque nigris*, *imago lineolis duabus elytrorum mediis approximatis glabris.*

ferrugineus. 25. C. thorace ſpinoſo rugoſo, elytris faſtigiatis ſubferrugineis, antennis longis. *Muſ. Lud. Ulr.* 70.*
Habitat in India.

depreſſus. 26. C. depreſſus niger, cinereo variegatus, thorace multiſpinoſo, elytris acuminatis, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 32.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 626. *n.* 26? Cerambyx thorace quadriſpinoſo: dorſo depreſſo, elytris faſtigiatis nebuloſis: anterius punctis elevatis ſparſis, antennis longis.
Schreb. inſ. 8. *f.* 10? Cerambyx lepturoides, thorace mucronato, elytris apice emarginatis, punctis elevatis ſcabris.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis*, *ſuccincti magnitudine.*

104. C.

Cerambycum *larvae cortices et ligna rodunt*, *perforant*, *penetrant*, *extrahuntur a picis.*

faſciatus. 104. C. cyaneus, thorace ſpinoſo, elytris faſcia flava, antennis mediocribus ante apicem flavis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 214. *n.* 23. *mant. inſ.* I. *p.* 134. *n.* 33.
Pall. ic. inſ. roſſ. 2. *t.* F. *f.* 4.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 25. *f.* 5.
Habitat Tranquebariae.

glaucus. 28. C. glaucus, thorace quinqueſpinoſo, elytris muricatis: latere faſciaque nigris, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 210. *n.* 7. *mant. inſ.* I. *p.* 131. *n.* 9.
Degeer inſ. 5. *p.* 111. *n.* 13. *t.* 14. *f.* 4. Cerambyx tuberculatus.
Habitat in America *meridionali, ſubtus fuſcus.* Rolander.

bidentatus. 105. C. thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis ſcabris cinereo fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 210. *n.* 8. *mant. inſ.* I. *p.* 131. *n.* 10.
Habitat in America *meridionali.*

nebuloſus. 29. C. thorace ſpinoſo, elytris faſtigiatis: punctis faſciisque nigris, antennis longioribus. *Fn. ſuec.* 650. *It. gotl.* 173. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 215. *n.* 26. *mant. inſ.* I. *p.* 134. *n.* 36. *Scop. ent. carn. n.* 173.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 204. *n.* 7.
Voet coleoptr. 2. *t.* 4. *f.* 4.
Degeer inſ. 5. *p.* 71. *n.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 7.
Habitat in abietum *truncis, quas librum deſtruendo necat.*

faſciculatus. 106. C. thorace ſpinoſo, elytris integris: punctis tribus hiſpidis, antennis mediocribus hirtis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 134. *n.* 37.
Habitat in Germania, *medius quaſi inter nebuloſum et hiſpidum.*

hiſpidus. 30. C. thorace ſpinoſo, elytris anterius albidis apice bidentatis, antennis mediocribus hirtis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 215. *n.* 27. *mant. inſ.* I. *p.* 134. *n.* 37.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 215. *n.* 27. *Fn. ſuec.* 651. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris ſubpraemorſis punctisque tribus hiſpidis, antennis hirtis longioribus.
Fn. ſuec. I. *n.* 484. *t.* I. Cerambyx cinereus, elytris praemorſis nigris faſciaque alba, antennis ſesquilongioribus.
Degeer inſ. 5. *p.* 71. *n.* 9. *t.* 3. *f.* 17. Cerambyx faſciculatus.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 206. *n.* 9.
Raj. inſ. p. 97. *n.* 4.

Schaeff. ic. t. 14. *f.* 9.
Friſch inſ. 13. *p.* 22. *t.* 16.
Habitat in Europa.

pilosſus. 107. C. thorace biſpinoſo, elytris griſeis apice unidentatis, antennis mediocribus hirtis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 39.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura hiſpidi, ſed minor, griſeus.*

rugicollis. 108. C. niger, thorace inermi rugoſiſſimo, antennis mediocribus pedibusque piceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 40.
Habitat Tranquebariae.

longicornis. 109. C. thorace inermi: dorſo plano, corpore fuſco griſeoque vario, antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 41.
Habitat in Coromandel, *mediae magnitudinis.*

marginalis. 110. C. thorace inermi, elytris ſubteſtaceis: margine omni nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 42.
Habitat ad caput bonae ſpei.

brevicornis. 111. C. thorace inermi viridi, elytris obſcuris, antennis brevibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 43.
Habitat in Sierra Leon Africae.

deſertus. 31. C. thorace ſpinoſo albo-lineato, elytris bidentatis albofaſciatis, antennis longioribus. *Muſ. Lud. Ulr.* 71.*
Habitat in America.

ſuccinctus. 32. C. thorace biſpinoſo rugoſo, elytris faſcia flava, antennis longioribus compreſſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 72.* *Gron. zooph.* 535. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 27.
Degeer inſ. 5. *p.* 113. *n.* 14. *t.* 14. *f.* 5. Cerambyx fuſco caſtaneus.
Marcgr. braſ. 254. Quici.
Drury inſ. 1. *t.* 39. *f.* 2.
Habitat in America, *praeſertim* Braſilia.

ſtrigoſus. 112. C. ferrugineus, thorace biſpinoſo rugoſo, elytris flavo ſtriatis, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 28.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine ſuccincti, antennarum corpore duplo longiorum femorumque apice nigro.*

113 C.

rufipes. 113. C. thorace biſpinoſo rufo, elytris laevibus nigris, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 29.
Habitat in America *meridionali, ſtatura et magnitudine ſtigmatis.*

dimidiatus. 114. C. thorace biſpinoſo rugoſo, flavus nigro punctatus, elytris nigris baſi flavis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 30.
Habitat in Cayenna, *ſuccincto paulo minor.*

bicolor. 115. C. ferrugineus, thorace biſpinoſo tuberculatoque, elytris ultra dimidium abdomineque atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 31.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine rufipedis.*

virens. 33. C. thorace rotundato ſpinoſo, corpore viridi femoribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 12.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 627. *n.* 33. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris obtuſis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus unidentatis.
Drury inſ. 1. *t.* 40. *f.* 1.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 39. 40.
Brown jam. 430. *t.* 43. *f.* 8.
Habitat in inſulis, Americae *oppoſitis, antennis nunc longioribus, nunc brevioribus, femoribus nunc muticis, nunc dentatis.*

nitens. 116. C. viridi-nitens, thorace rotundato ſubſpinoſo, femoribus clavatis: clava anteriorum rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 13.
Habitat in Africa *aequinoctiali, virenti affinis.*

afer. 117. C. thorace rotundato ſpinoſo, corpore viridi, antennis pedibusque rufis. *Mant. p.* 532. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 14.
Drury inſ. 1. *t.* 39. *f.* 4.
Habitat in Africa.

feſtus. 118. C. thorace ſpinoſo viridi, elytris violaceis baſi viridibus, femoribus ferrugineis unidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 15.
Habitat ad fluvium Gaboon Africae.

vittatus. 119. C. viridis nitens, thorace ſpinoſo, elytrisque nigro lineatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 16.
Habitat in Braſilia.

velutinus. 120. C. thorace ſpinoſo niger: vitta atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 17.

Habitat in America *meridionali, virenti proxime affinis.*

ſuturatus. 121. C. ater, thorace ſpinoſo, elytris ſutura vittaque media aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 18.

Habitat in America *meridionali, velutino proxime affinis.*

torridus. 122. C. niger, thorace ſubſpinoſo, elytris viridibus apice ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 19.

Habitat in Sierra Leon Africae.

Gigas. 123. C. niger, thorace rugoſo acuteque ſpinoſo, elytris ferrugineis, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 20.

Habitat in India, *maximus hujus tribus.*

moſchatus. 34. C. viridis nitens, thorace ſpinoſo, antennis cyaneis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 11.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 627. *n.* 34. *Fn. ſuec.* 652.* *Scop. ent. carn.* 165. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris obtuſis viridibus nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus.

Fn. ſuec. 1. *n.* 478. Cerambyx viridi caeruleſcens, antennis corpus ſubaequantibus.

Degeer inſ. 5. *p.* 64. *n.* 2. Cerambyx odoratus.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 203. *n.* 5. Cerambyx viridi-caeruleſcens.

Mouff. inſ. 149. *f. ult.* Cerambyx tertius.

Raj. inſ. p. 81. *n.* 17.

Liſter ſcar. p. 384. *n.* 11.

Friſch inſ. 13. *t.* 11.

Ammir. inſ. t. 33.

Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* e.

Schaeff. ic. t. 11. *f.* 7. *et t.* 55. *f.* 1.

Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 13. *n.* 2. *t.* 2. *f.* 2.

Habitat in Europae *ſalice, antennis pedibusque nunc cyaneis, nunc fuſcis, vivus odorem gratum et ſoporiferum ſpirans, ova pariens candida, ſapida.*

alpinus. 35. C. thorace ſpinoſo, coleoptris faſcia, maculisque quatuor atris, antennis longis. *Fn. ſuec.* 654. *Scop. ent. carn.* 166. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 23.

It.

It. ſcan. 260. Cerambyx ſubcaeruleſcens, faſcia maculisque 4 nigris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 202. *n.* 4. *t.* 3. *f.* 6.
Scheuchz. it. alp. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Jonſt. inſ. t. 15. *f.* 3.
Mouff. inſ. 150. *f.* 2.
Rob. ic. 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* d.
Schaeff. ic. t. 123. *f.* 1.
Drury inſ. 2. *t.* 31. *f.* 5.
Habitat in Europae *montoſis.*

ſcalatus. 124. C. fuſcus: linea longitudinali alba, thorace ſpinoſo, antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 24.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

cafer. 125. C. viridi-aeneus, thorace ſpinoſo, elytris teſtaceis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 25.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.*

Morio. 126. C. ater, thorace biſpinoſo rugoſo, antennis longioribus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 26.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine ſuccincti.*

aedilis. 37. C. thorace ſpinoſo: punctis quatuor luteis, elytris obtuſis nebuloſis, antennis longiſſimis. *Fn. ſuec.* 653.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 1.
It. oel. Cerambyx nebuloſus, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis.
Petiv. gaz. t. 8. *f.* 8. Capricornus ruſticus.
Degeer inſ. 5. *p.* 66. *n.* 5. *t.* 4. *f.* 1. 2.
Mouff. inſ. 151. *f.* 2.
Act. nidr. 4. *t.* 16. *f.* 8.
Friſch inſ. 13. *t.* 12.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 27.
Schaeff. ic. t. 14. *f.* 7.
Bergſtr. nomencl. 1. 3. 5. *t.* 1. *f.* 5. 6.* *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in Europae *borealis arborum truncis, antennis pro ſexu diverſis.*

varius. 127. C. thorace ſpinoſo tuberculatoque, corpore nigro cinereoque variegato, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 2.
Habitat in Auſtria, *aedili minor.*

Cerdo. 39. C. thorace ſpinoſo rugoſo niger, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 21.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 629. *n.* 39. *Scop. ent. carn.* 162. Cerambyx thorace ſpinoſo rugoſo nudo, corpore nigro, antennis longis: articulis quatuor primis clavatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 201. *n.* 2.
Mouff. inſ. 149. *f.* 1.
Friſch inſ. 13. *t.* 8.
Drury inſ. 1. *t.* 39. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 14. *f.* 8.
Bergſtr. nomencl. 1. 8. 10. *t.* 1. *f.* 10. *et t.* 2. *f.* 3.
β) Cerambyx Heros. *Scop. ent. carn.* 163.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 200.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 5. 6.
Habitat in Europae *ligno*, *β*) *major.*

Heros. 128. C. niger, thorace ſpinoſo rugoſo, elytris apice ſubſpinoſis teſtaceis, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 22.
Schaeff. ic. t. 24. *f.* 3.
Habitat in Europae *quercu*, *cerdoni affinis.*

auricomus. 40. C. thorace quadriſpinoſo ater, elytris taeniis geminis aureis, pedibus poſterioribus latiſſimis compreſſis. *Gron. zooph.* 534. *t.* 16. *f.* 1.*
Habitat in America *meridionali*, *antennis corpore paulo longioribus.*

Juvencus. 53. C. thorace inermi rugoſo, elytris acuminatis nigris, lanuginoſo-caneſcentibus, antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 44.
Habitat in America *meridionali ferrugineus*, *carchariae magnitudine.*

holoſericeus. 129. C. thorace inermi rugoſo, griſeus, elytris unidentatis holoſericeis fuſco cinereoque micantibus, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 45.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

longicollis. 130. C. thorace inermi elongato cylindrico niger ferrugineo irroratus, antennis longiſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 46.
Habitat in India, *mediae magnitudinis*, *capite fuſco.*

Herbſtii. 131. C. niger, thorace rugoſo utrinque uniſpinoſo, elytris ſupra viridi-aureis: margine ad apicem faſciisque duabus rubris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 168. *n.* 11. *t.* 45. *f.* 10.
Voet coleoptr. 2. *t.* 8. *f.* 26?
Habitat in America.

platypus. 132. C. caeſius, ſubtus, antennis pedibusque caeruleus, elytris ex purpureo viridi-aureis: lineis duabus elevatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 169. *n.* 12. *t.* 45. *f.* 11.
Degeer inſ. 7. *t.* 49. *f.* 3.
Habitat in India, *ſtatura moſchati.*

luſitanus. 133. C. thorace ſpinoſo, corpore toto teſtaceo, elytris faſcia undulata pallida. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 5.
Habitat in Luſitania, *culicis magnitudine, antennis ferrugineis, an hujus tribus?*

balteus. 134. C. thorace ſpinoſo, corpore ferrugineo, abdomine ovato, elytris faſcia nigricante. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 6.
Habitat in Luſitania, *culicis magnitudine, antennis corpore vix longioribus, an ad hanc tribum ſpectat?*

ſmirnenſis. 135. C. thorace teretiuſculo ſubconvexo ad latera utrinque mucronato. *Haſſelq. it. pal. p.* 451.
Habitat in Syria; *an huic tribui adſcribendus?*

††† *maxilla bifida.*
† *cornea*, Lamiae.

Tribulus. 136. C. thorace quadriſpinoſo, ſcutello elytrisque ſpinoſis, antennis longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 1.
Habitat ad fluvium Gaboon Africae.

fronticornis. 137. C. thorace ſpinoſo, frontis cornu porrecto apice emarginato recurvo, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 2.
Drury inſ. 2. *t.* 31. *f.* 2. Cerambyx bipunctatus.
Habitat ad caput bonae ſpei, *fuſcus.*

pedicornis. 138. C. thorace elytrisque ſpinoſis, femoribus anterioribus cornutis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 3.
Habitat in nova Hollandia.

Hyſtrix. 139. C. thorace quinqueſpinoſo, elytris faſciculato-piloſis, antennis mediocribus ſerratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 4.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Criſta. 140. C. griſeus, thorace acute ſpinoſo, elytris baſi tuberculo compreſſo tridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 5.
Habitat in nova Seelandia.

ambulator. 141. C. thorace anterius utrinque biſpinoſo, corpore nebuloſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 6.
Habitat in inſulis Luzonum.

Rubus. 21. C. thorace ſpinoſo bimaculato, elytris bidentatis baſi ſcabris mucronatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 59.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 625. *n.* 21. Cerambyx thorace ſpinoſo, antennis ſubtus hiſpidis longis, elytris bidentatis baſique mucronatis albo bimaculatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 106. *n.* 7. *t.* 13. *f.* 16. Cerambyx alboſaſciatus.
Habitat in India.

ſpinicornis. 142. C. thorace ſpinoſo rugoſo, elytris griſeis truncatis, antennis compreſſis, articulis apice ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 60.
Habitat in Africa *aequinoctiali, rubo minor.*

brunnus. 143. C. brunneus, thorace triſpinoſo, elytris obtuſis: ſtriis duabus elevatis obſcuris, antennis compreſſis brevioribus. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 37. *n.* 37.
Degeer inſ. 5. *p.* 99. *n.* 3. *t.* 13. *f.* 13. Cerambyx penſylvanicus.
Drury inſ. 1. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in America *ſeptentrionali, moſchato major, an propria ſpecies huc ſpectans?*

ſcabrator. 144. C. ſubteſtaceus, thorace ſpinoſo, elytris punctis atris baſeos ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 61.
Habitat in India.

Spengleri. 145. C. cinereus, thorace ſpinoſo tuberculato, elytris ſcabris: maculis duabus lateralibus atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 62.
Habitat in America *meridionali.*

146. C.

bidens. 146. C. griſeus, thorace acute ſpinoſo, elytris apice bidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 225. *n.* 48. *mant. inſ.* I. *p.* 142. *n.* 63.
Habitat in nova Hollandia.

Cantor. 147. C. thorace mutico cinereo nigro-punctato, elytris pallide teſtaceis apice bidentatis cinereis nigro maculatis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 142. *n.* 64.
Habitat in Sina, *mediae magnitudinis, niger, cinereo-villoſus.*

Solandri. 148. C. niger, thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis fuſcis cinereo irroratis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 225. *n.* 49. *mant. inſ.* I. *p.* 142. *n.* 65.
Habitat in nova Hollandia.

cornutus. 149. C. thorace obtuſe ſpinoſo, mandibulis baſi cornutis, antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 225. *n.* 50. *mant. inſ.* I. *p.* 142. *n.* 66.
Habitat in America.

leproſus. 150. C. thorace ſpinoſo, elytris baſi varioloſis cinereis: macula laterali nigra, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 225. *n.* 51. *mant. inſ.* I. *p.* 142. *n.* 67.
Habitat in America.

capenſis. 36. C. niger, thorace biſpinoſo, elytris faſciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 220. *n.* 21. *mant. inſ.* I. *p.* 138. *n.* 25.
Poda muſ. 32. *n.* 3.
Petiv. gazoph. t. 3. *f.* 8.
Drury inſ. I. *t.* 39. *f.* 3.
Voet coleoptr. 2. *t.* 8. *f.* 26.
Habitat ad caput bonae ſpei.

hottentotus. 151. C. thorace ſpinoſo rufo, elytris nigris: faſcia maculisque duabus marginalibus ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 220. *n.* 22. *mant. inſ.* I. *p.* 138. *n.* 26.
Brown ill. 118. *t.* 49. *f.* I. Cerambyx punctatus.
Voet coleoptr. 2. *t.* 8. *f.* 26.

ferrugator. 152. C. obſcure ferrugineus, thorace ſpinoſo, elytris obſcure vireſcentibus: ſtriga interrupta ſanguinea, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 138. *n.* 27.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus.*

humeralis. 153. C. thorace ſpinoſo, elytris flavis nigro faſciatis anterius mucronatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 128.
Habitat - - - -

trifaſciatus. 154. C. ater, thorace ſubſpinoſo, elytris faſciis tribus flavis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 29.
Habitat in Sierra Leon Africae.

jamaicenſis. 155. C. thorace ſpinoſo poſterius ſinuato: elytris flavis: faſciis duabus maculaque rhombea cyanea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 30.
Habitat in Jamaica.

nobilis. 156. C. thorace ſpinoſo atro: margine flavo, elytris atris: faſciis tribus flavis punctisque duobus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 31.
Habitat in Cayenna, *ſtatura bifaſciati.*

aethiops. 157. C. ater thorace ſpinoſo, elytris faſciis duabus punctoque apicis luteis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 32.
Habitat ad caput bonae ſpei.

variegator. 158. C. thorace ſpinoſo cinereo elytrisque fuſco variis, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 33.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

Sutor. 38. C. thorace ſpinoſo, elytris atris ferrugineo maculatis, ſcutello luteo, antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 17.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 628. *n.* 38. *Fn. ſuec.* 655.* *Scop. ent. carn.* 162. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris obtuſis atris ſubnebuloſis, ſcutello luteo, antennis longiſſimis.
Fn. ſuec. 1. *n.* 482. Cerambyx ater, elytris punctatis maculis pallidis ſparſis, antennis corpore longioribus, thorace ſpinoſo.
Gadd diſſ. 27. Cerambyx nigro nebuloſus, ſcutello pallido, elytris fuſco aeneis.
Degeer inſ. 5. *p.* 65. *n.* 4. Cerambyx atomarius.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 65. *f.* 1.
Habitat in Europae *ſilvis.*

159. C.

Sartor. 159. C. niger, thorace ſpinoſo, ſcutello flavo, elytris immaculatis, antennis longiſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 18.
Habitat Dresdae, *an major varietas ſutoris?*

reticulator. 160. C. niger, thorace ſpinoſo nigro-lineato, elytrisque reticulatis fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 19.
Habitat in India, *ſutoris magnitudine.*

molator. 161. C. obſcure cinereus fuſco-maculatus, thorace ſpinoſo, elytris apice rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 20.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

titillator. 162. C. thorace ſpinoſo, elytris cinereo fuſco glaucoque nebuloſis, antennis longiſſimis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 21.
Habitat in Carolina.

vittator. 163. C. thorace ſpinoſo, elytris cinereo pulverulentis: vittis duabus flavis nigro marginatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 22.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 38. *n.* 38. Cerambyx incanus.
Petiv. gazooph. t. 24. *f.* 6.
Habitat ad Sinus Campechienſis *littora.*

oculator. 164. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris maculis quatuor flavis ſubocellaribus, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 23.
Degeer inſ. 7. *t.* 49. *f.* 1. Cerambyx ocellatus.
Voet coleopt. 2. *t.* 7. *f.* 21.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Textor. 41. C. thorace ſpinoſo, elytris convexis atris, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 629. *n.* 41. *Fn. ſuec.* 656.* *Scop. ent. carn.* 164. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris obtuſis convexis atris punctatis, antennis mediocribus.
Uddm. diſſ. n. 29. Cerambyx ſordide niger, punctis elevatis ſparſis, antennis craſſis corporis longitudinem ſubaequantibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 201. *n.* 3.
Degeer inſ. 5. *p.* 64. *n.* 3.
Schaeff. ic. t. 10. *f.* 1.
Bergſtr. nomencl. 1. 5. 8. *t.* 1. *f.* 8.
Habitat in Europae *truncis arborum.*

vaginator. 165. C. niger, thorace ſpinoſo rugoſo, elytris emarginatis ferrugineis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 8.
Habitat in India, *magnus.*

pulcher. 166. C. niger, anterius faſciis, poſterius punctis viridibus, thorace ſpinoſo, elytris baſi mucronatis. *Fabr. ſp. inſ* 1. *p.* 217. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 9.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 6.
Habitat in Africa.

regalis. 167. C. thorace ſpinoſo viridi faſciato, elytris viridi irroratis: maculis tribus fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 10.
Brown illuſtr. t. 50. *f.* 1.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura pulchri.*

nigricornis. 168. C. griſeus, thorace mutico, elytris dorſo planis, antennis brevibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 11.
Habitat in Coromandel.

griſator. 169. C. griſeus, thorace mutico, elytris baſi tuberculis duobus apice ſpinoſis, antennis brevibus villoſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 12.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis.*

ſternutator. 170. C. thorace ſpinoſo, elytris baſi poroſis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 13.
Habitat in inſula Barbados.

gutturator. 171. C. thorace ſpinoſo, elytris teſtaceis albo irroratis: baſi punctis elevatis glabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 14.
Habitat in Africa.

nubilus. 172. C. thorace inermi ferrugineo nigro lineato, elytris fuſco ferrugineoque variis: macula marginali cinerea, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 15.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

ariolator. 173. C. thorace ſpinoſo lineato, elytris fuſcis: linea ſemicirculari alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 16.
Habitat in India.

triſtis. 42. C. fuſcus, thorace ſpinoſo, elytris maculis duabus atris, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 37.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 95. *n.* 54.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 90. *n.* 6. *t.* 25. *f.* 7.
Habitat in ligno cupreſſi Europae *auſtralis, antennis interdum corpore duplo longioribus.*

funeſtus. 174. C. fuſcus, thorace ſpinoſo, elytris laevibus: maculis duabus atris, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 38.
Habitat frequens in Galliae *ſambuco, triſti proxime affinis, at duplo minor.*

punctator. 175. C. ater, thorace ſpinoſo, elytris albo punctatis, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 39.
Forſter nov. inſ. ſp. 1. *p.* 39. *n.* 39. Cerambyx chinenſis.
Drury inſ. 2. *t.* 31. *f.* 4. Cerambyx farinoſus.
Habitat in Sina.

criſpus. 175. C. thorace ſpinoſo, elytris lineis tribus elevatis ferrugineis, antennis mediocribus, corpore cinereo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 40.
Habitat ad caput bonae ſpei.

rotator. 176. C. cinereus, thorace ſpinoſo, elytris ſubfaſciatis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 41.
Habitat in India.

glycyrrhizae. 177. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris albo-lineatis bicarinatis, pedibus ferrugineis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 42. *Pall. it.* 2. *p.* 723. *n.* 60.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 9. Cerambyx ovatus?
Habitat in Sibiria, *fuliginatore triplo major.*

cruciatus. 178. C. niger, thorace ſpinoſo, coleoptris cruce media alba. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 43. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 2. *t.* F. *f.* 5.
Lepechin it. 2. *p.* 198. *t.* 10. *f.* 8. Cerambyx crucifer.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali, ſtatura fuliginatoris, at paulo major.*

fuliginator. 43. C. niger, thorace ſubſpinoſo, elytris cineraſcentibus, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 44.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 205. *n.* 8.
Degeer inſ. 5. *p.* 70. *n.* 7.
Friſch inſ. 13. *t.* 19.
Voet coleoptr. 2. *t.* 8. *f.* 30.
Habitat in Europa *auſtrali, aetate totus niger, lanugine deraſa.*

cinerarius. 179. C. cineraſcens, thorace ſpinoſo, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 45.
Pall. ic. inſ. roſſ. 2. *t.* F. *f.* 11.
Habitat in Ruſſia *meridionali, ſtatura fuliginatoris, cui proxime affinis.*

carinatus. 180. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris piceis: carina laterali elevata albida, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 46.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 91. *n.* 8. *t.* 25. *f.* 8.
Habitat in Sibiria, *ſtatura et magnitudine fuliginatoris.*

eoquus. 44. C. thorace ſubſpinoſo hirſuto, elytris obtuſis ſulcatis atris anterius ferrugineis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 47.
Habitat in America *boreali, thoracis ſpinis minutiſſimis.*

ruſpator. 181. C. thorace ſpinoſo fuſco: maculis duabus ferrugineis, elytris fuſcis cinereo-variegatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 48.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

tornator. 182. C. thorace ſpinoſo quadripunctato, elytris rufis: maculis quatuor nigris, antinnis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 59.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 41. *n.* 41. Cerambyx tetrophthalmus.
Habitat in America *boreali.*

Bankſii. 183. C. griſeus, thorace ſubſpinoſo, elytris ferrugineo irroratis: faſciis duabus cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 50.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ſaltator. 184. C. griſeus, thorace inermi, elytris faſciis duabus macularibus abbreviatis ſtrigaque poſteriore punctata niveis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 51.
Habitat - - - - parvus.

testator. 185. C. thorace ſpinoſo cornuque brevi recumbente, corpore teſtaceo, antennis brevibus apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 52.
Habitat in Africa *æquinoctiali, parvus, brevis, villoſus.*

Kaehleri. 50. C. niger, thorace ſpinoſo elytriſque ſanguineis: macula nigra. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 96. *n.* 56. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 204. *n.* 6.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 1.
β) Cerambyx ungarica. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 90. *n.* 4. *t.* 25. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 153. *f.* 4.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

pedeſtris. 51. C. ater, vitta integra alba, thorace ſpinoſo, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 53.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 631. *n.* 51. Cerambyx thorace ſpinoſo apterus niger, elytris tomentoſis atris: ſutura alba, antennis mediocribus.
Poda inſ. p. 34. *n.* 9. Cerambyx pedeſtris.
Scop. ent. carn. n. 168. Cerambyx arenarius.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 91. *n.* 9. *t.* 25. *f.* 9.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

Scopolii. 186. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris unicoloribus, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 54.
Scop. ent. carn. n. 169. Cerambyx aethiops.
Habitat in Germania *auſtrali, pedeſtri proxime affinis, at paulo minor, elytris nunc nigris, nunc teſtaceis.*

germanicus. 187. C. ater, thorace ſpinoſo, elytris marginibus lineiſque duabus utrinque coeuntibus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 55.
Habitat in Germania, *ſtatura et magnitudine pedeſtris.*

molitor. 188. C. fuſcus, vittis tribus integris albis, thorace ſubſpinoſo, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 56.
Habitat in India, *an varietas pedeſtris?*

tuberculator. 189. C. griſeus, thorace mutico, coleoptris baſi bituberculatis: maculis duabus communibus albis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 57.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parvus.*

nutator. 190. C. villoſus, thorace mutico lineato cinereo, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 58.
Habitat in Tahiti, *tuberculatoris magnitudine.*

curculionoides. 64. C. fuſcus, thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 34.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 634. *n.* 64. Cerambyx thorace mutico, ocellis quatuor nigris, elytris ocello ſesqui-altero, antennis longis.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 101. *n.* 75. Leptura curculionoides.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 210. *n.* 5.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 1. *et t.* 155. *f.* 5.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

luſcus. 191. C. niger ferrugineo irroratus, thorace ſpinoſo rugoſo, elytris baſi macula ocellari atra, antennis longiſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 35.
Habitat in Siam, *triſti paulo major.*

notatus. 192. C. obſcurus thorace ſpinoſo, elytris punctis duobus approximatis atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *ſtatura curculionoidis.*

fulvus. 193. C. apterus niger, thorace ſpinoſo, elytris rubris, abdomine brevioribus. *Schrank inſ. auſtr. p.* 139. *n.* 263.
Scop. ent. carn. n. 170.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 25. *f.* 10.
Habitat in Auſtria.

ungaricus. 194. C. niger, capite thoraceque ſpinoſo linea longitudinali, elytris ſutura lineisque tribus albis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 91. *n.* 12. *t.* 25. *f.* 11.
Habitat in Ungaria.

trifaſciatus. 366. C. thorace ſpinoſo, elytris convexis nigris: faſciis tribus coccineis interruptis; apicis anguſtiore, antennis corpore longioribus. *Muſ. Lesk. p.* 24. *n.* 534.
Habitat extra Europam.

luteus. 367. C. oblongus, thorace quadriſpinoſo capite antennarum nigrarum baſi pedibusque luteis, dorſi lineis tribus fuſcis, elytris apice biſpinoſis flaveſcentibus: rugis duabus margineque fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 24. *n.* 535.
Habitat extra Europam.

Davieſii. 377. C. ater, thorace ſpinoſo, punctis maculisque plurimis fulvis, elytris ſubtriangularibus. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. *n.* 3. 3. 15. *t.* 8. *f.* 6.
Habitat in ſinu Hinduras Americae, *curculionoide paulo major.*

†† *membranacea*, Saperdae.

Carcharias. 52. C. thorace mutico cylindrico, corpore griſeo nigro punctato, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 660. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 1.
Degeer inſ. 5. *p.* 73. *n.* 10. *t.* 3. *f.* 19. Cerambyx punctatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 208. *n.* 1.
Pet. gaz. 5. *t.* 2. *f.* 1.
Goed. inſ. 2. *t.* 51.
Liſt. goed. f. 106.
Schaeff. ic. t. 38. *f.* 4. *et t.* 152. *f.* 4.
Drury inſ. 1. *t.* 41. *f.* 5.
Berg ſtr. nomencl. 1. 5. 7. *t.* 1. *f.* 7.
β) Cerambyx villoſus. *Lepech. it.* 2. *t.* 11. *f.* 18?
Habitat in Europae, β) Sibiriae *ſilvis.*

confluens. 368. C. niger, thorace cylindrico, antennis mediocribus, elytris punctis confluentibus. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 557.
Habitat in Europa.

fuſcicornis. 369. C. teſtaceus, thorace longo utrinque tuberculato, femoribus clavatis ferrugineis, antennis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 558.
Habitat in Europa.

ſurinamus. 54. C. thorace mutico ſubcylindrico, corpore ſubferrugineo, elytris litura una alterave fuſca, antennis mediocribus.
Habitat Surinami, *mediae magnitudinis, elytris ſpina acutiſſima terminatis.*

ſcalaris. 55. C. thorace mutico ſubcylindrico, coleoptris linea ſuturali dentata, punctisque flavis, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 697.* *Scop. ent. carn. n.* 175. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 2.
Degeer inſ. 5. *p.* 77. *n.* 14. Cerambyx flavoviridis.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 102. *n.* 77. Leptura ſcalaris.
Friſch inſ. 12. *p.* 29. *t.* 3. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 38. *f.* 5.
Hufn. inſ. t. 7.
Habitat in Europae *populo.*

candidus. 195. C. albus, thorace coleoptrisque fuſcis: vittis duabus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 3.
Habitat - - - ſtatura et magnitudine ſcalaris.

roridus. 196. C. ater, elytris albo punctatis, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 4.
Habitat in Africae *plantis, oculati magnitudine.*

modeſtus. 197. C. niger, capite, thorace anoque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 5.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura et magnitudine oculati.*

cardui. 56. C. fuſcus, thorace lineato, ſcutello flavo, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 16. *mant. inſ* 1. *p.* 149. *n.* 23. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 94. *n.* 5. *t.* 26. *f.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 632. *n.* 56. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 101. *n.* 74. Cerambyx thorace mutico cylindrico, corpore fuſco linea longitudinali flavicante, antennis longioribus.
Habitat in Europae *magis auſtralis* carduis, *quos majo devaſtat, ſtatura populnei.*

melanoceras. 198. C. cinereus, thorace lineato, elytris fuſcis unicoloribus, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 499. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 24.
Habitat Lipſiae, *ſtatura c. cardui, at paulo minor.*

ſuturalis. 199. C. vireſcens, thorace rotundato lineato, elytris acuminatis: ſutura alba. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 25.
Habitat in Africae *plantis, ſtatura c. cardui.*

moeſtus. 200. C. thorace quadriſpinoſo, corpore fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 26.
Habitat in nova Seelandia.

populneus. 57. C. thorace mutico cylindrico flavo-lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 661.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 27.
Gadd ſat. 79. Cerambyx fuſco-cinereus, antennis nigro alboque variegatis, elytrorum punctis octo luteis.
Degeer inſ. 5. *p.* 78. *n.* 15. Cerambyx decempunctatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 208. *n.* 3. Leptura nigra &c.
Schaeff. ic. t. 48. *f.* 5.
β) *Bergſt. nomencl.* 1. *t.* 2. *f.* 4?
Habitat in Europae *et* Americae *populetis,* β) *triplo minor.*

201. C.

tremulus. 201. C. viridis, thorace punctis duobus, elytris quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 28.
Schaeff. ic. t. 101. *f.* 1.
Habitat Halae Saxonum; *an varietas punctati?*

punctatus. 202. C. thorace mutico ſubcylindrico totus viridis: punctis nigris numeroſis, antennis mediocribus.* *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 7. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 29.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 10.
Habitat in Europa *magis auſtrali, antennis pedibusque nigris.*

vireſcens. 203. C. thorace villoſo cinereo, elytris ſubattenuatis viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 499. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 30.
Habitat in Italia *et* Galliae *ſambuco, ſtatura punctati.*

macroceras. 204. C. fuſcus, thorace cylindrico, pedibus teſtaceis, antennis longiſſimis nigris: annulo albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 31.
Habitat in Africa *aequinoctiali, parvus.*

Volvulus. 205. C. ſupra niger, thorace cylindrico elytrisque margine cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 33.
Habitat in Cayenna, *ſtatura cylindrici, at paulo minor.*

linearis. 58. C. niger, thorace mutico cylindrico, pedibus omnibus totis luteis, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 663.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 9.
Scop. ent. carn. n. 153. Leptura parallela.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 6.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 1.
Habitat in Europae *ſilvis.*

cylindricus. 59. C. cylindricus niger, pedibus anterioribus luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 10.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 633. *n.* 59. *Fn. ſuec.* 662. Cerambyx thorace cylindrico mutico, linea albida, elytris faſtigiatis nigris, pedibus anticis pallidis.
Degeer inſ. 5. *p.* 75. *n.* 12. Cerambyx cinereus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 208. *n.* 2. Leptura tota caeruleo-nigra.
Scopol. ent. carn. n. 157. Leptura cylindrica.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 2. *t.* 3.
Habitat in pyri pruni*que ramis.*

melanocephalus. 206. C. thorace cylindrico pedibusque rufis, corpore nigro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 11.
Habitat in Africa, *ſtatura et magnitudine cylindrici.*

pilicornis. 207. C. violaceus, thorace rotundato, antennarum articulo primo ſecundoque clavato piloſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 12.
Pall. inſ. roſſ. 2. *t.* F. *f.* 14.
Rozier Journ. de phyſ. 1. *t.* 1. *f.* B?
Habitat in America *meridionali, cylindrico paulo major.*

erythrocephalus. 208. C. rufus, thorace rotundato villoſo, antennis, pectore elytrisque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 13.
Schranck inſ. auſtr. n. 270.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 3.
Habitat in Germania, *cylindrici ſtatura et magnitudine.*

ſibiricus. 209. C. cyaneus, thorace ſubſpinoſo, elytris faſciis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 14.
Habitat in Sibiria, *ſtatura clavicornis, at paulo minor.*

clavicornis. 210. C. viridis, thorace rotundato, elytris maculis tribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei.

longipes. 211. C. violaceus, thorace ſubgloboſo, antennis longioribus, femoribus clavatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 16.
Habitat ad caput bonae ſpei.

latipes. 212. C. niger, thorace ſubgloboſo, femoribus clavatis apice violaceis, tibiis poſterioribus compreſſis, antennis longioribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 17.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.* Leske.

trilineatus. 213. C. griſeus, vittis tribus dentatis albis, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 18.
Mant. p. 532. Cerambyx thorace cylindrico, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, marginibus dentatis albis, antennis longiſſimis.

Fabr.

Antennae *breves, quae corpore breviores, mediocres, quae longitudine corporis, longae, quae corpore longiores ſunt.*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 226. *n.* 7. Stenocorus trilineatus.
Drury inſ. 1. *t.* 41. *f.* 1.
Habitat in inſulis, Americae *oppoſitis.*

lateralis. 214. C. niger, thoracis lateribus elytrorumque vitta laterali ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ,* 1. *p.* 233. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 19.
Habitat in America *boreali.*

lynceus. 215. C. thorace atro: puncto utrinque ferrugineo, elytris griſeis acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 20.
Habitat in nova Seelandia.

griſeus. 216. C. griſeus, ſcutello margine, elytris lineolis flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 21.
Habitat in nova Seelandia.

analis. 217. C. teſtaceus, elytrorum apicibus anoque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 22.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

oculatus. 60. C. thorace mutico cylindrico luteo: punctis duobus nigris, elytris faſtigiatis linearibus nigris. *Fn. ſuec.* 664. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 6.
Uddm. diſſ. 31. Cerambyx ferrugineo-rufus, elytris nigrocinereis punctis excavatis nigris.
Degeer inſ. 5. *p.* 74. *n.* 11. *t.* 3. *f.* 20.
Scop. ent. carn. n. 152. Leptura oculata.
Schaeff. ic. t. 128. *f.* 4.
Huffn. inſ. t. 13.
Habitat in Europae *ſilvis.*

hirtus. 218. C. ferrugineus griſeo-villoſus, ſcutello orbitaque oculorum fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 7.
Habitat in nova Seelandia.

unicolor. 219. C. teſtaceus, thorace rotundato punctato, antennis longis pedibusque concoloribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 8.
Habitat in inſula Amſterdam oceani auſtralis, *hirto minor.*

cantharinus. 82. C. ferrugineus, thorace cylindrico, antennis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 33.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 637. *n.* 82. Cerambyx thorace ſubmutico, corpore rufo, oculis femoribusque nigricantibus, elytris mollibus, antennis longioribus.
Fabr. ſp. inſ. 2. *app. p.* 500. Callidium thorace rotundato ſubſpinoſo rufum, antennis pedibusque nigricantibus.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

teutonicus. 220. C. niger, thorace cylindrico, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 34.
Habitat in Germania, *ſtatura cantharini.*

janthinus. 221. C. thorace cylindrico, corpore violaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 35.
Habitat in terra Pedamontana.

monſpelienſis. 222. C. niger, thorace cylindrico ſubſpinoſo, antennisque ferrugineis, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 36.
Habitat Monſpelii, *praeuſto major.*

praeuſtus. 223. C. niger, elytris flavis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 37.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 641. *n.* 24. *Fn. ſuec.* 506. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 103. *n.* 80. Leptura (praeuſta) thorace ſubgloboſo fuſco, elytris flavis apice nigris, pedibus quatuor pallidis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 209. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 52. *f.* 8.
Habitat in Europae *ſilvis.*

Lineola. 224. C. niger, thoracis linea dorſali femoribusque apice rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 38.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 4.
Habitat in Italia, *parvus.*

minutus. 225. C. fuſcus, thorace cylindrico, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 39.
Habitat in Anglia, *parvus.*

caeruleſcens. 226. C. thorace mutico cylindrico, albo-caeruleus, thoracis lineis tribus ſcutelloque pallidioribus. *Schranck inſ. auſtr. p.* 144. *n.* 271.
Scop. ent. carn. n. 160. Leptura caeruleſcens.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 5.
Habitat in Germania, Calabria, 5 *fere lineas longus.*

227. C.

ferreus. 227. C. plumbeo-niger immaculatus, thorace cylindrico inermi, ſcutello albido. *Schranck inſ. auſtr. p.* 145. *n.* 272. *Beytr. zur Naturg. p.* 66. §. 11.
Habitat in Auſtria, $4\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

puſtulatus. 228. C. niger, thorace inermi cylindrico: macula media fulva. *Schranck inſ. auſtr. p.* 145. *n.* 273. *Beytr. zur Naturg. p.* 66. §. 10.
Habitat in Auſtriae *floribus.*

ſilphoides. 229. C. niger, thorace mutico cylindrico, elytris lineis ſubtribus elevatis, femoribus tibiisque anterioribus medio fulvis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 145. *n.* 274.
Habitat Viennae, *ad Maji finem conſpicuus.*

lividus. 230. C. niger, thorace dilute ferrugineo: punctis nigris elevatis, elytris flaveſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 95. *t.* 26. *f.* 7.
Habitat Berolini, *cantharino affinis.*

cyaneus. 231. C. caeruleus: punctis elevatis, thorace cylindrico, antennis pedibusque nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 95. *n.* 13. *t.* 26. *f.* 6.
Habitat in Pomerania, 3 *circiter lineas longus.*

cincticornis. 232. C. thorace cylindrico: lineis ſex longitudinalibus albis, elytris dentatis fuſcis albo irroratis, antennis longis medio albo-annulatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 290. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat - - - *ſtatura populnei, longicorni affinis.*

M nigrum. 233. C. thorace mutico cylindrico, elytris griſeo-nebuloſis: macula albida M nigro notata. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 291.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 4?
Habitat, rarior, Halae Saxonum.

ictericus. 234. C. thorace mutico cylindrico: linea lutea, elytris fuſcis, ſcutello pedibusque luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 292.
Habitat, rarior, Halae Saxonum, *in floribus, cylindrico affinis.*

vulneratus. 235. C. thorace mutico cylindrico: tuberculo carinato luteo, elytris nigricantibus, pedibus luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 293.
Habitat in lapidicinis Giebichenſteinenſibus, *puſtulato affinis.*

tripunctatus. 378. C. thorace flavo: punctis tribus nigris, elytris nigris medio longitudinaliter albidis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 17.
Habitat in Noveboraco, *cylindrici facie, at minor.*

II *palpis capitatis*, Rhagia.

curſor. 45. C. thorace ſpinoſo, elytris obtuſis rufis: ſutura lineaque nigris, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 658.* *Scop. ent. carn.* 167. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 4.
Fn. ſuec. 1. *n.* 481. Cerambyx rufus, coleoptrorum lineis tribus nigris longitudinalibus.
Degeer inſ. 5. *p.* 127. *n.* 3. Leptura curſor.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 7.
Habitat in Europa *boreali.*

cinctus. 236. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris ſubferrugineis: faſcia flava, femoribus poſterioribus unidentatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 5.
Habitat in Auſtria, *magnitudine et ſtatura curſoris.*

noctis. 48. C. niger, thorace ſpinoſo, antennarum baſi ferruginea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 6.
Habitat in Europa *boreali, curſori proxime affinis, an ejus varietas?*

anglicus. 237. C. thorace ſpinoſo, elytris faſciis duabus obliquis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 7.
Fn. ſuec. 1. *n.* 486. Cerambyx cinereus, coleoptris faſciis duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace ſpinoſo.
Degeer inſ. 5. *p.* 124. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 6. Leptura mordax.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 222. *n.* 1. Stenocorus glaber &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 8.
Schaeff. elem. t. 118. *f.* 1.
ic. t. 8. *f.* 1. 3.
Habitat in Anglia, Gallia.

ornatus. 238. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris faſcia lata flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 8.
Habitat in Penſilvania.

exilis. 239. C. thorace ſpinoſo, elytris elevato-ſtriatis cinereis nigro-undatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 9.

indagator. 240. C. cinereus, thorace ſpinoſo, elytris ſtriatis: atomis faſciisque duabus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 3.
Habitat in Germania.

inquiſitor. 49. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris nebuloſis teſtaceo ſubfaſciatis, antennis brevioribus. *Fn. ſuec.* 659.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 2.
Fn. ſuec. 1. *n.* 485.* Cerambyx cinereus nigro-nebuloſus, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace ſpinoſo.
Degeer inſ. 5. *p.* 126. *n.* 2. *t.* 4. *f.* 1. Leptura inquiſitor.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 223. *n.* 2. Stenocorus niger &c.
Friſch inſ. 13. *t.* 14.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 7.
Habitat in Europae *truncis arborum, larva hexapus nuda alba, capite collarique corneis fuſcis; dorſo canaliculato.*

mordax. 241. C. griſeus, thorace ſpinoſo, elytris nebuloſis, teſtaceo ſubfaſciatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 1.
Schaeff. ic. t. 8. *f.* 2.
Habitat in Germania, *inquiſitori affinis, at paulo major.*

elegans. 242. C. ater, thorace utrinque uniſpinoſo, elytris caſtaneis: baſi, ſutura maculaque communi nigris; faſciis duabus flavis. *Schrank inſ. auſtr. p.* 133. *n.* 253.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 170. *n.* 6. *t.* 45. *f.* 12. Rhagium elegans.
Habitat in Bavaria, *et* Calabria.

ſycophanta. 243. C. nigro ferrugineoque varius, thorace ſpinoſo, elytris faſciis tribus obſcurioribus lineisque duabus elevatis, antennis brevibus. *Schrank inſ. Auſtr. p.* 137. *n.* 260.
Habitat Vindobonae.

niger. 365. C. thorace ovato: margine poſteriori ſcutelloque flavo, elytris faſtigiatis, antennis brevibus. *Petagn. inſ. Calab. p.* 17. *n.* 83. *f.* XXXVI.
Habitat in Calabria, *totus niger, an hujus tribus?*

111 *palpis clavatis*, Callidia.

ruſticus. 67. C. thorace nudo, corpore lurido, antennis ſubulatis brevioribus. *Fn. ſuec.* 666.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 15.
Fn. ſuec. 492. Cerambyx fuſcus, punctis thoracinis impreſſis.
Degeer

Degeer inſ. 5. *p.* 83. *n.* 20. Cerambyx griſeo-fuſcus &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 20.
Schaeff. elem. t. 13. *f.* 1. *et t.* 76. *f.* 1.
icon. t. 63. *f.* 6.
Habitat in Europae *ſilvis.*

agreſtis. 244. C. niger, thorace nudo, elytris ſtriatis fuſcis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 16.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura ruſtici, at duplo minor.*

dichrous. 370. C. niger, thorace rotundato, elytris ſtriatis tibiis plantisque brunneis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 570.
Habitat in Europa.

laevigatus. 371. C. niger opacus, thorace elytrisque laevibus, antennis mediocribus, femoribus rubris compreſſis, tibiis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 573.
Habitat in Europa.

viridans. 372. C. thorace rotundato viridi: fovea utrinque impreſſa, elytris teſtaceo viridibus rugoſo-reticulatis, antennis pedibusque fuſco-teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 574.
Habitat in Europa.

cyanochryſos. 373. C. violaceus pubeſcens, antennis apice fuſcis, femorum piceorum baſi tibiisque luteis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 578.
Habitat in Europa.

octonotatus. 374. C. capite nigro fulvo piloſo furca glabra antrorſum notato, thorace rotundato maculis punctisque quatuor fulvis piloſis, elytris fuſcis bifaſciatis quadripunctatis, abdomine pedibusque fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 580.
Habitat in Europa.

leucozonias. 375. C. niger, abdominis ſegmentorum trium priorum margine externo et pectore canis, elytris faſciis duabus linearibus deorſum arcuatis albis et apice cinereo. *Muſ. Lesk. p.* 27. *n.* 588.
Habitat in Europa.

luridus. 68. C. thorace ſubtuberculato nudo, niger, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 29.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 634. *n.* 68. Cerambyx thorace mutico ſubrotundo, corpore nigro, elytris luridis.
Habitat in Europae *borealis pinetis, bajulo ſimillimus, at triplo minor.*

fuſcus. 245. C. niger, thorace ſubtuberculato canaliculato nudo, elytris ſtriatis obſcure teſtaceis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 30.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura et magnitudine luridi.*

lugubris. 246. C. thorace ſubtuberculato nudo, elytris ſubſtriatis, corpore lurido immaculato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 31.
Habitat Halae Saxonum, *ruſtico proxime affinis, at triplo minor.*

raucus. 247. C. thorace laevi obſcure ferrugineo, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 32.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura luridi.*

hafnienſis. 248. C. thorace ſubvilloſo nigro; lineis quatuor albis, intermediis abbreviatis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 33.
Habitat Hafniae.

aulicus. 249. C. thorace laevi, nitido, corpore nigro opaco, elytris laevibus, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 34.
Habitat Hafniae.

erythropus. 250. C. thorace laevi nitido, elytris violaceis, tibiis rufis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 240. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 35.
Habitat in Germania *boreali.*

femoratus. 69. C. thorace nudo, corpore atro opaco, femoribus rubris, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 9.
Degeer inſ. 5. *p.* 93. *n.* 31.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 7.
Habitat in Germania, *ſtatura violacei, at dimidio minor, anguſtior.*

occidentalis. 251. C. ater, thorace pubeſcente, elytris faſciis duabus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 10.
Habitat in America *occidentali, magnitudine et ſtatura violacei; loco faſciae poſterioris macula interdum marginalis.*

acuminatus. 252. C. thorace verrucoſo nigricante, elytris acuminatis viridibus: ſutura cyanea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ruſſicus. 253. C. niger, thorace verrucoſo, elytris teſtaceis: macula media apiceque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 12.
Habitat in Ruſſiae *ſilvis.*

violaceus. 70. C. thorace ſubpubeſcente, corpore violaceo, antennis brevibus. *Fn. ſuec.* 667. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 8.
Degeer inſ. 5. *p.* 88. *n.* 24. Cerambyx violaceus.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 97. *n.* 59. Stenocorus violaceus.
Gadd diſſ. 28. Cantharis nigra, thorace rotundato, elytris caeruleſcentibus.
Friſch inſ. 12. *t.* 3. *ic.* 6. *f.* 1.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 10.
Habitat in Europa *boreali, frequens.*

auratus. 71. C. thorace dente laterali depreſſo, viridi-inauratus, antennis nigris, femoribus poſterioribus caeruleis.
Habitat in America, *violaceo ſimilis, pedibus purpureis, an hujus tribus?*

Stigma. 72. C. thorace punctato, corpore atro, elytris laevibus: ſtigmate albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 17.
Degeer inſ. 5. *p.* 119. *n.* 22. *t.* 14. *f.* 13. Cerambyx niger &c.
Habitat in America, *totus niger.*

equeſtris. 254. C. ater nitidus, thorace nudo, coleoptris faſcia interrupta nuda. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 18.
Habitat in Cayenna, *ſtatura ſtigmatis, at minor.*

hirtus. 255. C. thorace hirto, elytris acuminatis pallide teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 19.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus.*

tranquebaricus. 256. C. thorace ſubtus utrinque macula tomentoſa ferruginea, antennis longioribus barbatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 20.
Habitat Tranquebariae.

compreſſus. 257. C. obſcure niger, thorace laevi, antennis longis pedibusque teſtaceis: femoribus compreſſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 21.
Habitat in Siam, *barbato minor.*

Callidiis *omnibus thorax rotundatus, muticus.*

variegatus. 258. C. thoracis dorſo glabro atro: lineis quatuor albis, elytris flavo irroratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 22.
Habitat in nova Seelandia.

auſtralis. 259. C. thoracis lineis duabus, elytris quatuor albis; mediis coeuntibus abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 23.
Habitat in nova Seelandia.

ſulcatus. 260. C. thorace tomentoſo cinereo, elytris albo nigroque ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 24.
Habitat in nova Seelandia.

ſtriatus. 73. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris ſtriatis, antennis brevibus. *Fn. ſuec.* 668. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 240. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 36.
Degeer inſ. 5. *p.* 90. *n.* 26. Cerambyx niger nitidus &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 13.
Habitat in Europae *ſilvis.*

lynceus. 261. C. thorace ſubſpinoſo villoſo niger, elytris macula ſubdidyma fulva. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 240. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 37.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ſalicis. 262. C. rufus, thorace tuberculato ſpinoſoque, pectore elytrisque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 38.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 92. *n.* 3. *t.* 25. *f.* 13. Stenocorus ruficollis.
Habitat in Lipſiae *ſalicibus: an hujus tribus?*

puſillus. 263. C. niger, antennis tibiisque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 39.
Habitat in Germania, *parvus.*

bimaculatus. 264. C. fuſcus, thorace villoſo, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 240. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 40.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.*

flavus. 265. C. corpore flavo, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 240. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 41.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

variabilis. 74. C. thorace glabro, corpore fuſco-aeneo, antennis pedibusque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 635. *n.* 74. *Fn. ſuec.* 669. Cerambyx thorace mutico ſubrotundo inaequali glabro, pectore anoque ferrugineis, antennis ferrugineis.
Poda muſ. p. 36. Cerambyx ſcaber.
Friſch inſ. 12. *p.* 345. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 12.
Habitat in Europae *borealis pinetis.*

ſericeus. 266. C. thorace holoſericeo cinereo, elytris teſtaceis: punctis elevatis rubris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 14.
Habitat in Barbaria, *ruſtico major.*

teſtaceus. 75. C. thorace ſubtuberculato, corpore teſtaceo, antennis mediocribus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 26.
Syſt. nat. XII. 2 *p.* 635. *n.* 75. *Fn. ſuec.* 670. Cerambyx thorace ſubrotundo mutico glabro, corpore teſtaceo antennis mediocribus.
Degeer inſ. 5. *p.* 93. *n.* 30. Cerambyx teſtaceus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 218. *n.* 18. Leptura teſtacea, thorace glabro.
Schaeff. ic. t. 64. *f.* 6.
Habitat in Europae *ſilvis.*

deuſtus. 267. C. teſtaceus, thorace ſubtuberculato, elytris apice violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 500. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 27.
Habitat in Italia, *teſtaceo proxime affinis, an varietas?*

ligneus. 268. C. niger, thorace tuberculato villoſo, elytris rubris: macula apiceque violaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 28.
Habitat - - - mediae magnitudinis.

Portiter. 269. C. niger, thorace tranſverſim oblongo: maculis duabus nitentibus, elytris ex nigro rubeſcentibus, antennis longis.* *Schranck Schr. der berl. Geſ. nat. Fr.* 2. *p.* 312.
Friſch inſ. 13. *t.* 2. *f.* 17.
Habitat in Bavariae *pinetis, bajulo affinis, punctis excavatis inaequalis, mordax.*

270. C.

---

* *An hujus tribus Cerambyx flavo-faſciatus Schaefferi ic. t.* 34. *f.* 12?

obſcurus. 270. C. thorace ſubvilloſo fuſco elytris teſtaceo cinereoque variis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 1.
Habitat in terra van Diemen, *bajulo major.*

Bajulus. 76. C. thorace villoſo, tuberculis duobus, corpore fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 636. *n.* 76. *Fn. ſuec.* 672. *Muſ. Lud. Ulr.* 76. Cerambyx thorace mutico ſubrotundo villoſo, tuberculis duobus, antennis brevibus.
Degeer inſ. 5. *p.* 86. *n.* 82. Cerambyx caudatus.
Scop. ent. carn. n. 156. Leptura Bajula.
Fn. ſuec. 1. *n.* 489. Cerambyx nigricans, thorace villoſo cinereo, punctis duobus glabris.
Friſch inſ. 13. *t.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 29.
Schaeff. el. t. 76. *f.* 4.
icon. t. 64. *f.* 4. 5.
β) *Fn. ſuec.* 1. *n.* 490. Cerambyx teſtaceus, thorace villoſo-cinereo, lineolis duabus glabris.
γ) Cerambyx ſaxonicus duplo minor. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 151.
Habitat in Europae *borealis arborum truncis, ligna, parietes, aſſeres e pino deſumta perforans.*

fennicus. 77. C. thorace tuberculato ruſo, elytris violaceis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 636. *n.* 77. *Fn. ſuec.* 674. Cerambyx thorace mutico ſubrotundo: tuberculis ſubferrugineo-obſoletis, elytris violaceis, antennis longiuſculis.
Uddm. diſſ. 33. Cerambyx elytris nigro-caeruleis, apice abdominis ferrugineo.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 219. *n.* 19. Leptura atra.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 12.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 8.
Habitat in Europae *pinetis.*

italicus. 271. C. thorace ſubcylindrico hirto ruſo, elytris violaceis, antennis mediocribus piceis, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 4.
Habitat in Italia, *fennico minor.*

liciatus. 78. C. niger cinereo-nebuloſus, antennis brevibus.
Habitat in Europa, *bajuli magnitudine.*
Elytra *ſtrigis duabus undulatis cineraſcentibus obſoletis.*

undatus. 79. C. thorace tuberculato; elytris nigris: faſciis duabus undatis albis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 240. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 42.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 636. *n.* 79. *Fn. ſuec.* 675.* Cerambyx thorace mutico ſubrotundo tuberculato, elytris faſciis duabus undulatis, antennis ſubmediocribus.
Degeer inſ. 5. *p.* 91. *n.* 28. Cerambyx nigro-fuſcus.
Schaeff. ic. t. 68. *f.* 1.
Habitat in Europa *boreali.*

colonus. 272. C. elytris lividis: faſciis tribus fuſcis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 241. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 43.
Habitat in Carolina.

verſicolor. 273. C. thorace rufo, elytris nigris baſi rufis: faſciis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 241. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 44.
Habitat in America *boreali.*

flexuoſus. 274. C. thorace flavo-faſciato, elytris faſciis ſeptem flavis: anterioribus antrorſum, poſterioribus retrorſum arcuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 241. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 45.
Drury inſ. 1. *t.* 41. *f.* 2. Cerambyx pictus.
Forſt. nov. inſ. cent. 1. *p.* 43. *n.* 43. Leptura Robiniae.
Pet. gaz. t. 27. *f.* 3?
β) Callidium (angulatum) thorace globoſo nigro flavo faſciato, elytris nigris: faſciis ſex flavis, ſecunda tertiaque angulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 241. *n.* 32.
Habitat in Americae *robinia.*

exiguus. 275. C. teſtaceus, elytris faſcia abbreviata alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 241. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 46.
Habitat in nova Seelandia, *femoribus valde clavatis baſi albis.*

lunatus. 276. C. thorace globoſo nigro flavo-faſciato, elytris atris: faſciis quinque flavis: baſeos maculari. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 500. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 47.
Habitat in inſulis Americae *oppoſitis, major.*

floralis. 277. C. thorace globoſo albo-faſciato, elytris nigris: faſciis quinque albis; ſecunda tertiaque lunatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 241. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 48. *Pall. it.* 2. *p.* 724. *n.* 63.
Habitat in Italia, *ſtatura exigui.*

278. C.

fulminans. 278. C. thorace globoſo maculato, elytris nigris: faſciis undato-angulatis albis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 241. *n.* 34. *mant. inſ.* I. *p.* 155. *n.* 49.
Habitat - - -

arcuatus. 279. C. elytris faſciis quatuor flavis: prima interrupta; reliquis retrorſum arcuatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 241. *n.* 35. *mant. inſ.* I. *p.* 155. *n.* 50.
Uddm. diſſ. 20. *Leche nov. ſp.* 30. Cerambyx niger, elytris faſciis quatuor flavis arcuatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 640. *n.* 21. *Fn. ſuec.* 696. Leptura (arcuata) thorace globoſo nigro, elytris faſciis linearibus flavis, tribus retrorſum arcuatis, pedibus ferrugineis.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 212. *n.* 10.
Friſch inſ. 12. *t.* 3. *ic.* 4. *f.* I.
Raj. inſ. p. 83. *n.* 23.
Pet. gazoph. t. 63. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 38. *f.* 6. *et t.* 107. *f.* 2. 3.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 14.
Habitat in Europae *hortis.*

arietis. 280. C. thorace nigro, elytris nigris: faſciis flavis, ſecunda antrorſum arcuata, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 242. *n.* 36. *mant. inſ.* I. *p.* 155 *n.* 51.
Degeer inſ. 5. *p.* 81. *n.* 18. Cerambyx quadrifaſciatus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 640. *n.* 23. *Fn. ſuec.* 695. Leptura arietis.
Fn. ſuec. I. *n.* 507. Leptura nigra, elytrorum lineis transverſis flavis, pedibus teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 214. *n.* 11. Leptura nigra &c.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 96. *n.* 57. Stenocorus arietis.
Raj. inſ. p. 82. *n.* 22.
Liſt. ſcar. p. 385. *n.* 14.
Pet. gazoph. t. 63. *f.* 6.
Friſch inſ. 12. *p.* 32. *t.* 3. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 38. *f.* 7.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 15.
β) *Bergſtr. nomencl.* I. 9. 12. *t.* I. *f.* 12.
Habitat in Europae *hortis.*

plebejus. 281. C. thorace globoſo immaculato, elytris nigris: faſciis linearibus albis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 243. *n.* 37. *mant. inſ.* I. *p.* 156. *n.* 52.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 639. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 692. Leptura (ruſtica) thorace globoſo tomentoſo, elytris cinereis: faſciis linearibus albidis undatis.

Geoffr. inſ. par. I. *p.* 215. *n.* 12. Leptura nigra &c.
Raj. inſ. p. 83. *n.* 25.
Petiv. gazoph. t. 63. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 7.
Habitat in Europae *hortis.*

maculoſus. 282. C. thorace maculato, elytris mucronatis nigris: ſtrigis tribus arcuatis flavis, baſi ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 243. *n.* 38. *mant. inſ.* I. *p.* 156. *n.* 53.
Habitat in America.

americanus. 283. C. thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis fuſcis: ſtrigis quatuor flavis, femoribus clavatis compreſſis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 156. *n.* 54.
Fabr. ſp. inſ. I. *p.* 243. *n.* 39. Callidium acuminatum.
Habitat in America *boreali.*

detritus. 284. C. thorace flavo-faſciato, elytris nigris: faſciis quinque flavis, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 243. *n.* 40. *mant. inſ.* I. *p.* 156. *n.* 55.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 640. *n.* 20. *Fn. ſuec.* 694. Leptura (detrita) thorace globoſo nigricante, elytris fuſcis: faſciis quatuor transverſis flavis, pedibus rufis.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 216. Leptura nigra &c.
Schaeff. elem. t. 76. *f.* 2.
icon. t. 38. *f.* 9. *et t.* 64. *f.* 3.
Habitat in Europae *hortis.*

indus. 285. C. niger, elytris glaucis baſi nigro-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 243. *n.* 41. *mant. inſ.* I. *p.* 156. *n.* 56.
Habitat in India, *mediae magnitudinis, pube glauceſcente nitidus.*

portugallus. 286. C. thorace globoſo ferrugineo, elytris nigris: faſciis tribus atris; primo annulari. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 244. *n.* 42. *mant. inſ.* I. *p.* 156. *n.* 57.
Habitat in Luſitania, *ſtatura c. verbaſci.*

verbaſci. 287. C. thorace nigro-maculato, elytris ſubvireſcentibus faſciis tribus nigris; prima lunari. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 244 *n.* 43. *mant. inſ.* I. *p.* 156. *n.* 58.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 640. *n.* 22. Leptura (verbaſci), thorace ſubovato nigro, elytris faſciis tribus nigris, prima ſemiannulata.

Sulz.

Sulz. hiſt. inſ. t. 5. f. 12.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. t. 26. f. 19.
Habitat in Europae *magis auſtralis verbaſco.*

annularis. 288. C. thorace nigro-maculato, elytris bidentatis ſubvireſcentibus: faſciis tribus nigris, prima annulari. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 59.
Habitat in Siam, *c. verbaſci proxime affinis.*

aegyptiacus. 289. C. thorace ferrugineo, elytris cineraſcentibus: faſciis tribus fuſcis; prima annulari. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 244. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 60.
Habitat in Oriente.

myſticus. 290. C. elytris fuſcis: faſciis apiceque cinereis baſi rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 244. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 61.
Degeer inſ. 5. *p.* 82. *n.* 19. Cerambyx albo-faſciatus.
Scop. ent. carn. 177. Cerambyx quadricolor.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 639. *n.* 18. *Fn. ſuec.* 693.* Leptura (myſtica) thorace globoſo tomentoſo, elytris fuſco-cinereis antice rufis: faſciis linearibus arcuatis lataque canis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 215. *n.* 17. Leptura nigra &c.
Raj. inſ. p. 83. *n.* 26.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 9.
Habitat in Europa.

gibboſus. 291. C. niger, elytris cinereo-faſciatis baſi bituberculatis apice acuminatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 62.
Habitat Kilonii, *ſtatura et magnitudine myſtici.*

picipes. 292. C. ater, thorace globoſo, elytris ſtriga obliqua alba. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 63.
Habitat - - - c. alni paulo major.

alni. 293. C. niger, elytris faſciis duabus albis, elytrorum baſi antennis tibiisque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 245. *mant. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 64.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 639. *n.* 19. Leptura alni.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 21.
Habitat in Europa, *myſtico affinis, ſed octies minor.*

ſanguineus. 80. C. thorace ſubtuberculato elytrisque ſanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 25.
Raj. inſ. p. 97. *n.* 3. Cerambyx minor.

Degeer inſ. 5. *p.* 92. *n.* 29.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 220. *n.* 22.
Schaeff. ic. t. 64. *f.* 1.
Habitat in Europae *ſilvis*, Upſaliae *in parietibus.*

caſtaneus. 81. C. niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus. *Fn. ſuec.* 676.
Habitat in Europae *cortice abiegno.*
Thoracis *latera inferiora linea rubra longitudinali.*

ebulinus. 83. C. niger, thorace tuberculato, elytris violaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 637. *n.* 83. Cerambyx thorace mutico, corpore nigro, elytris viridi-caeruleis, antennis mediocribus.
Habitat in Africae *plantis*, *ſtatura italici.*

aeneus. 294. C. fuſcus, thorace elytrisque viridi-aeneis, femoribus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 6.
Habitat in Africa, *ſtatura italici.*

clavipes. 295. C. niger opacus, femoribus omnibus clavatis, antennis longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 7.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 9.
Habitat in Germania.

pannonicus. 296. C. niger, thorace margine ſubaeneo, medio elevato, elytris viridi-caeruleis, femoribus clavatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 96. *n.* 6. *t.* 26. *f.* 11.
Habitat in Ungaria, 8 *lineas longus.*

aeneus. 297. C. viridi-aeneus, ſubtus, antennis pedibusque fuſcus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 96. *n.* 7. *t.* 26. *f.* 12.
Habitat Berolini.

venuſtus. 298. C. thorace flavo: faſcia nigra, elytris nigris: faſciis tribus latis ex viridi flavis, antennis pedibusque nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 98. *n.* 16. *t.* 26. *f.* 16.
Habitat in India.

indicus. 299. C. niger ſubtus flavus, frontis maculis, thoracis faſciis duabus, elytrorum quinque flavis, antennis pedibusque rubris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 98. *n.* 17. *t.* 26. *f.* 17.
Habitat in India.

300. C.

confuſus. 300. C. niger pubeſcens, thoracis punctis obſoletis ſex, elytrorum faſciis undatis albidis quatuor, antennis fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ* 5. *p.* 98. *n.* 18. *t.* 26. *f.* 18.
Habitat Berolini *in* ſalicibus.

litteratus. 301. C. elytris nigris: faſciis apiceque cinereis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 99. *n.* 22. *t.* 26. *f.* 20.
Schranck inſ. auſtr. n. 306? Leptura figurata.
Habitat in Germania.

hiſpidus. 302. C. thorace globoſo ferrugineo, corpore teſtaceo, capite nigro, femoribus clavatis uſtulatis, antennis hiſpidis mediocribus. *Forſter nov. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 42.
Habitat in America *ſeptentrionali, myſtici magnitudine.*

viridis. 303. C. thorace tuberculato violaceo, elytris viridibus punctato-ſtriatis, antennis nigris *Müll. zool. dan. prodr. p.* 95. *n.* 1067. *Fn. Fridrichsd. p.* 14. *n.* 134.
Habitat in Dania.

multicolor. 304. C. thorace nigro ovato villo ex griſeo flavo pubeſcente, elytris ex griſeo flavoque variis.
Drury inſ. 1. *t.* 41. *f.* 6.
Habitat in Noveboraco.

pulverulentus. 306. C. thorace convexo nigro-fuſco, elytris caſtaneis griſeovilloſis apice bidentatis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 118. *n.* 21. *t.* 14. *f.* 12.
Habitat in Penſylvania, *pollicem fere longus.*

nigricans. 307. C. niger depreſſus, femoribus clavatis, antennis mediocribus craſſis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 88. *n.* 23.
Hufn. inſ. t. 16.
Habitat in conclavibus Sueciae, 7 *lineas longus.*

aurichalceus. 308. C. fuſco-aeneus nitidus, thorace depreſſo, antennis pedibusque nigris. *Degeer inſ.* 5. *p.* 89. *n.* 25.
Habitat - - - *dimidium pollicem longus.*

lucidus. 309. C. niger, elytris fuſco-caſtaneis lucidis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 98.
Habitat in Carniolia.

rufus. 310. C. niger thorace villoſo, antennis rufis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 98. *n.* 61.
Habitat in Carniolia.

carniolicus. 311. C. thorace ſubbituberculato, abdominisque apice rufis, elytris atro-violaceis.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 98. *n.* 63. Stenocorus ſenicus.
Habitat in Carniolia.

fuliginoſus. 312. C. totus ater opacus, antennis mediocribus. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 98. *n.* 62.
Habitat in Carniolia.

calcaratus. 313. C. nigro-violaceus, femoribus rufis poſterius dentatis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 98. *n.* 64.
Habitat in Carniolia.

caraboides. 314. C. rufus, elytris atro-violaceis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 99. *n.* 65.
Habitat in Ungariae *et* Carnioliae *collibus, ſtatura carabi minoris.*

ater. 315. C. niger, elytris truncatis, antennis mediocribus. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 100 *n.* 69.
Habitat in Carniolia.

braccatus. 316. C. niger, antennis pedibusque rufis: femoribus poſterioribus craſſis ſpina armatis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 100. *n.* 70.
Habitat in Carniolia.

tenuis. 317. C. niger nitens, elytris attenuatis, antennis mediocribus. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 100. *n.* 71.
Habitat in Carnioliae *floribus umbellatarum.*

octopunctatus. 318. C. viridis, thorace tereti, elytris punctis octo nigris. *Schranck inſ. auſtr. p.* 142. *n.* 267. *Beytr. z. Naturg. p.* 65. §. 9.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 101. *n.* 73. Leptura octopunctata.
Habitat rarior in Auſtriae *tiliis.*

glaucopterus. 319. C. ferrugineus, thorace quadriverrucoſo, oculis pectoreque nigris. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 294. *t.* 1. *f.* 4.
Habitat rarior Halae Saxonum, *variabili affinis, at dimidio major.*

vireſcens. 320. C. corpore lineari viridi-aeneo, antennis longis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 295.
Habitat - - - - *magnitudine circiter variabilis, ſtatura moſchati.*

** *palpis*

** *palpis inaequalibus, anterioribus 2 filiformibus, poſterioribus clavatis:* Stenocori Fabricii.

feſtivus. 11. C. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis viridibus; linea laterali lutea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 5.
Degeer inſ. 5. *p.* 100. *n.* 4. *t.* 13. *f.* 14. Cerambyx ſpinoſus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 6. Cerambyx ſulcatus.
Gron. zooph. 541. *t.* 16. *f.* 5.
Drury inſ. 1. *t.* 37. *f.* 5.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 25. *f.* 12.
Habitat in inſulis, Americae *oppoſitis.*

marilandicus. 321. C. thorace depreſſo tuberculato mutico, elytris bidentatis fuſco cinereoque nebuloſis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 6.
Habitat in Marilandia.

inſularis. 321. C. thorace inermi tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis biſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 7.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis, ex teſtaceo et cinereo varius.*

biſpinoſus. 322. C. thorace inermi ſubtuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis biſpinoſis, corpore teſtaceo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 8.
Habitat in America *meridionali, ſtatura inſularis, at minor.*

ſemipunctatus. 323. C. thorace ſpinoſo inaequali, elytris bidentatis baſi punctatis apice glabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 9.
Habitat in nova Hollandia.

quadrimaculatus. 27. C. rufeſcens thorace ſcabro ſpinoſo, elytris bidentatis: maculis duorum parium glabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 12. *Gron. zooph.* 542*.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 21.
Drury inſ. 1. *t.* 37. *f.* 3.
Habitat in America *meridionali, femoribus 4 poſterioribus apice ſpinoſis.*

geminatus. 324. C. thorace mutico nigro: macula utrinque rufa, elytris nigris: maculis duorum parium glabris, antennis longiſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 13.

Habitat in Sierra Leon Africae, *congeneribus hujus tribus minor et brevior.*

africanus. 325. C. thorace mutico atro, elytris bidentatis baſi teſtaceis apice atris: faſcia pallida. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 14.
Habitat in Africa *aequinoctiali, antennis longitudine corporis, nigris.*

circumflexus. 326. C. ferrugineus, thorace mutico, elytris unidentatis teſtaceis: ſtriga undata punctisque duobus fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 15.
Habitat in Cayennna, *mediae magnitudinis.*

annulatus. 327. C. thorace lineato, elytris unidentatis, antennis longioribus: annulis tribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 16.
Habitat - - - -

decemmaculatus. 328. C. thorace ſubſpinoſo quadrimaculato, elytris bidentatis ferrugineis flavo cinereoque maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 17.
Habitat in America.

braſilianus. 329. C. thorace ſpinoſo ferrugineo, elytris acuminatis teſtaceis: lineolis tribus glabris flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 16. *mant inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 18.
Habitat in Braſilia, *annulato minor.*

cayennenſis. 330. C. thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis cinereo, fuſco flavoque variis: angulo baſeos compreſſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 19.
Habitat in Cayenna, *parvus, cinereus.*

Druryi. 331. C. thorace ſubſpinoſo, elytris truncatis bidentatis ferrugineis cinereo faſciatis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 20.
Habitat in America *meridionali.*

undulatus. 332. C. cinereus, thorace ſpinoſo, elytris bidentatis: faſciis duabus undatis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 21.
Habitat - - - -

ruricola. 333. C. fuſcus, thorace ſpinoſo ferrugineo, elytris bidentatis pallidioribus antennis, longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 22.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

gargani-cus. 334. C. thorace ſpinoſo, elytris bidentatis teſtaceis: macula pallida, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 226 *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 4.
Habitat in Marilandia.

Lamed. 46. C. thorace ſpinoſo pubeſcente, elytris faſtigiatis lividis: taenia obſcura longitudinali ſinuata, antennis brevibus. *Fn. ſuec.* 649.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 226. *n.* 6. Stenocorus niger &c.
Habitat in Europa.

cyaneus. 335. C. cyaneus, thorace ſpinoſo, elytris baſi flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 2.
Forſter nov. inſ. 1. *p.* 40. *n.* 40. Cerambyx palliatus.
Fabr. ſyſt. entom. p. 182. *n.* 2. Calopus blandus.

meridia-nus. 47. C. thorace ſubſpinoſo, elytris faſtigiatis fuſcis anterius teſtaceis, pectore nitente. *Fn. ſuec.* 648. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 1.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 398. *n.* 7. Leptura meridiana.
Degeer inſ. 5. *p.* 305. Leptura fuſca cinerea.
Schaeff ic. t. 3. *f.* 13. *t.* 79. *f.* 7. *t.* 82. *f.* 4. *t.* 279. *f.* 3.
Raj. inſ. p. 96. *n.* 1.
Habitat in Europa *boreali, etiam in* Calabria, *mas teſtaceus, femina nigricans, larva ſubterranea, pedibus longiſſimis.*

quadrio-culatus. 336. C. thorace ſubſpinoſo: punctis ſeptem nigris, corpore teſtaceo, elytris apice dentatis: lineis longitudinalibus curvatis fuſcis, antennis longis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 289. *t.* 1. *f.* 2.
Habitat - - - - magnitudine meridiani; an hujus tribus?

ramphy-geus. 61. C. thorace mutico ſubcylindrico bipunctato, corpore livido, elytris maculis duabus flavis apice bidentatis.
Habitat in America, *feſtivi magnitudine; an hujus tribus?*

zona-rius. 63. C. thorace mutico cylindrico rugoſo, antennis longioribus, elytris obtuſis fuſcis: faſcia lineari albida. *Muſ. Lud. Ulr.* 75.*
Marcgr. braſ. 254. Quici.
Habitat in America, *an ad hanc tribum?*

irrora-tus. 62. C. thorace mutico cylindrico inaequali, elytris apice bidentatis albo irroratis, antennis longioribus aculeatis.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 3.

Habitat

Habitat in Americae *meridionali oppoſitis inſulis, inquiſitoris magnitudine.*

glabratus. 337. C. thorace mutico cinereo: linea glabra fuſca, elytris bidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 11.
Habitat in inſula S. Crucis, Oceani americani.

ſuaveolens. 305. C. thorace ſpinoſo caeruleſcenti aureo, corpore viridi, elytris cyaneis, antennis mediocribus pedibusque nigris, abdomine tibiisque ferrugineis, poſterioribus longioribus compreſſis. *Mant. p.* 532.
Habitat in Jamaica *et* Carolina.

ſcabricornis. 338. C. ferrugineus thorace ſubcylindrico, antennis nitidis, intus denticulatis ſcabris. *Fueſſli Verz. ſchw. Inſ. p.* 13. *n.* 241. *f.* 3. a. b.
Scop. ent. carn. n. 174.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 210. *n.* 6.
Habitat in Europa.

aſper. 339. C. ater, aſper, rigidus, thorace biſpinoſo, elytris in medio tuberculatis. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 44. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat in Italia.

brevis. 340. C. nigricans, thorace ſpinoſo, femoribus rotundatis brevibus, tarſis anterioribus lobatis perhirſutis. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 45. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat in Surinamo.

halodendri. 341. C. ater, punctis excavatis, thorace albido villoſo, elytris margine maculaque baſeos rubris. *Pallas it.* 2. *app. n.* 62.
Habitat in Sibiriae robinia halodendro, C. *Kaehleri affinis, an hujus tribus?*

badius. 342. C. badius, thorace elytrisque ſtriatis. *Lepech. it.* 1. *t.* 16. *f.* 3.
Habitat in Sibiria, *an ex hac tribu?*

ruber. 343. C. elytris rubris: apicum macula oblonga nigra, thorace nigro: maculis duabus rubris. *Lepech. it.* 1. *t.* 16. *f.* 3.
Habitat in Sibiriae *glycyrrhiza echinata.*

fimbriatus. 344. C. ater, margine albo, thorace biſpinoſo. *Lepech. it.* 2. *p.* 198. *t.* 10. *f.* 8.
Habitat in montis Ural *larice; an huc ſpectat?*

taeniatus. 345. C. thorace ſpinoſo, elytris nigricantibus: faſciis duabus albidis, antennis corpore duplo longioribus. *Lepech. it.* 2. *p.* 299. *t.* 11. *f.* 32.
Habitat in Sibiriae *petrarum fiſſuris.*

aculeatus. 346. C. nigricans antennis longiſſimis: ſpinis tribus introrſum armatis. *Rozier journ. de phyſ.* 1. *p.* 26. *t.* 1. *f.* C.
Habitat in America.

arenarius. 347. C. niger apterus, capitis thoracisque linea media longitudinali, elytrorum margine albo, antennis brevibus. *Scop. ent. carn. n.* 168.
Poda muſ. graec. p. 34. Cerambyx pedeſtris.
Habitat in Carniolia.

timidus. 348. C. niger, elytris flaveſcentibus: maculis binis atris. *Scop. ent. carn. n.* 171. *ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 99. *n.* 67.
Habitat in Carniolia, *e longinquo hoſtem fugiens, et ſub umbella ſe recipiens:*

adſperſus. 349. C. elytris nigro maculatis punctatisque, antennis brevibus. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 95. *n.* 55.
Habitat in Carniolia, *triſti affinis, ſed minor.*

ovalis. 350. C. ovatus fuſcus, elytris integris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 206. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

cruentatus. 351. C. griſeus, thorace ſpinoſo, elytris baſi unidentatis: maculis ſex ferrugineis, antennis longis aculeatis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 107. *n.* 8.
Habitat in India, *rubo affinis, an hujus tribus?*

ſinenſis. 352. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris ad latera albo-maculatis, antennis longis cinereo-maculatis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 109. *n.* 10.
Habitat in Sina, *tres lineas ultra pollicem longus.*

tigrinus. 353. C. ex fuſco griſeus, thorace ſpinoſo, elytris maculis punctisque fuſcis ſparſis, antennis longioribus. *Degeer inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 15. *t.* 14. *f.* 6.
Habitat in Penſylvania, 11 *lineas longus.*

penſylvanicus. 354. C. thorace ſubſpinoſo, elytris truncatis ex flavo griſeis: faſciis undulatis punctatis fuſcis, antennis longioribus maculatis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 16. *t.* 14. *f.* 7.
Habitat in Penſylvania, *dimidium pollicem longus.*

hirſutus. 355. C. fuſcus, thorace ſpinoſo, elytris hirſutis ſtriato-punctatis, antennis mediocribus maculatis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 115. *n.* 17. *t.* 14. *f.* 8.
Habitat in Surinamo, 4 *lineas longus.*

gibbus. 356. C. fuſcus cinereo-maculatus, thorace rugoſo ſubſpinoſo, elytris gibbis punctis nigris hiſpidis, antennis mediocribus. *Degeer inſ.* 5. *p.* 116. *n.* 18. *t.* 14. *f.* 9.
Habitat in Surinamo, *hirſuto brevior, at latior et craſſior.*

hirtipes. 357. C. fuſcus, thorace mutico cylindrico, elytris apice truncatis bidentatis, plantis anterioribus hirſutis, antennis longioribus: media macula alba. *Degeer inſ.* 5. *p.* 116. *n.* 19. *t.* 14. *f.* 10.
Habitat in India, 8½ *lineas longus.*

virideſcens. 358. C. ex flavo viridis, thorace mutico cylindrico: faſciis tribus longitudinalibus flavis, antennis longioribus nigro cinereoque maculatis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 76. *n.* 13.
Habitat in Europa, *mediae magnitudinis.*

hieroglyphicus. 359. C. ſubtus canus, capite thoraceque lanuginoſis: area nigra, elytris nigris glabris: ſutura utrinque ramoſa punctisque quinque ex caeruleſcente albidis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 59.
Habitat in Sibiriae *borealis ſilvis.*

perforatus. 360. C. ſupra pulvere albidus, ſubtus lanugine flaveſcens, elytris punctis quinque dorſalibus mediis nigerrimis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 60.
Habitat cum hieroglyphico, cui proxime affinis.
Elytrorum *puncta quaſi perforata.*

ferruginoſus. 361. C. nigricans, elytris ferrugineis, antennis introrſum ſpinoſis. *Rozier journ. de phyſ. p.* 27. *t.* 1. *f.* D.
Habitat in America.

carbonarius. 362. C. niger opacus, antennis brevibus. *Scop. ent. carn. p.* 55. *n.* 178.
Habitat in Carniolia; *an propria ſpecies?*

lunulatus. 363. C. ex fuſco obſcure rufeſcens, thorace ſubcylindrico mutico, elytris rubeſcentibus: lunulis quatuor fuſcis apice dentatis. *Drury inſ.* 1. *t.* 37. *f.* 4.
Habitat in Jamaica.
Elytrorum *ſutura prope thoracem cor fuſcum refert.*

364. C.

minimus. 364. C. minutiſſimus. *Seeligm. av.* 4. *t.* 108. *f.* 4.
Habitat - - - - cutem penetrans.

vittatus. 378. C. thorace ſpinoſo pubeſcente, elytris ſubfaſtigiatis teſtaceis, ſutura vittaque fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 25. *n.* 540.
Habitat in Europa.

quadriguttatus. 379. C. pallide teſtaceus, thorace ſubſpinoſo, elytris biſpinoſis: maculis duabus flavis, femoribus clavatis muticis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. *n.* 3. 3. 16. *t.* 8. *f.* 7.
Habitat in Honduras Americae, *quadrimaculato duplo minor, ſubdepreſſus.*

CALOPUS. *Antennae* filiformes.

Palpi quatuor; anteriores clavati, poſteriores filiformes.

Thorax gibbus.

Elytra linearia.

ſerraticornis. 1. C. fuſcus, antennis compreſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 634. *n.* 65. *Fn. ſuec.* 665. Cerambyx ſerraticornis, thorace mutico ſubovali, corpore lurido fuſco, antennis compreſſis antice ſerratis mediocribus.
Degeer inſ. 5. *p.* 79. *n.* 6.
Habitat in Europa, *boreali, ſtatura oleri, elongatus, cylindricus.*

hiſpicornis. 2. C. ſubfuſcus, antennarum articulis poſterius ſpina minutiſſima armatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 634. *n.* 66. Cerambyx thorace mutico ſubrotundo, corpore ſubfuſco, elytris faſtigiatis bidentatis, antennis mediocribus poſtice dentatis.
Habitat in America, *cerambyci ruſtico ſimilis, at duplo major; an hujus generis?*

pygmaeus. 3. C. minutiſſimus fuſcus, antennis ſerratis piloſis.
Degeer inſ. 5. *p.* 80. *n.* 17. *t.* 4. *f.* 5. Cerambyx pygmaeus.
Habitat in Suecia, *pulicis magnitudine.*

205.

Species 338-364 incerti adhuc loci.

205. LEPTURA. *Antennae* ſetaceae.
Palpi quatuor filiformes.
Elytra apicem verſus attenuata.
Thorax teretiuſculus.

* *labio integro*, Donaciae Fabricii.

aquatica. 1. L. aurata, femoribus poſterioribus clavatis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 245. *n.* 1. *mant inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 637. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 677.* *Scop. ent. carn.* 147. Leptura deaurata, antennis nigris, femoribus poſticis dentatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 140. *n.* 80. *t.* 4. *f.* 14. 15. Leptura aquatica ſpinoſa.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 229. *n.* 12.
Raj. inſ. p. 100. *n.* 1.
Friſch inſ. 12. *p.* 33. *t.* 6. *f.* 2.
Habitat in plantis aquaticis, nymphaeis, caricibus, phellandrio, *cujus radici intra globum brunneum adhaeret pupa.*
Femora *poſteriora rarius mutica.*

ſimplex. 17. L. aurata, femoribus ſimplicibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 245. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 2.
Degeer inſ. 5. *p.* 142. *n.* 19? Leptura aquatica mutica.
Habitat in Anglia *et* Germania.

faſciata. 18. L. deaurata, elytris faſcia longitudinali purpurea. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 100. *n.* 3.
Degeer inſ. 5. *p.* *n.* 20. Leptura aquatica faſciata.
Habitat in Europae *aquis*, *femoribus poſterioribus nunc muticis nunc dentatis.*

holoſericea. 19. L. viridi-nitens, antennis pedibusque ex atro fuſcis, femoribus poſterioribus dentatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 100. *n.* 4.
Habitat in Marchiae *pratis humidis.*

paluſtris. 20. L. ex nigricante violacea, antennis pedibusque ſpadiceis, femoribus poſterioribus dentatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 100. *n.* 5.
Habitat in Pomeraniae *paludibus.*

cinerea. 21. L. cinerea cupreo irrorata, pedibus poſterioribus muticis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 100. *n.* 6.
Habitat in Pomerania.

violacea. 58. L. ex atro ſubaenea, elytris obſcure violaceis, abdomine ſanguineo. *Pall. it.* 2. *n* 64.
Habitat in Sibiria, *magnitudine aquaticae.*

bicolor. 84. L. aurea, thorace ſupra elytrisque viridibus, his ſtriato-punctatis hinc inde impreſſis, femoribus clavatis: poſterioribus dentatis. *Muſ. Lesk. p.* 27. *n.* 589.
Habitat in Europa.

craſſipes. 85. L. viridi-aenea ſubtus cinereo-aenea, elytris ſtriato-punctatis transverſe lineolis ſubſtriatis, ore antennis pedibusque rufis, femoribus craſſis: poſterioribus muticis. *Muſ. Lesk. p.* 27. *n.* 590.
Habitat in Europa.

fuſca. 86. L. fuſca, elytris punctato-ſtriatis, ore, antennis pedibusque rufis, femoribus poſterioribus dente valido armatis. *Muſ. Lesk. p.* 27. *n.* 591.
Habitat in Europa.

aenea. 87. L. rufo-aenea, ſubtus cinereo-aenea, elytris punctato-ſtriatis: rugis crenatis, femoribus poſterioribus dentatis. *Muſ. Lesk. p.* 27. *n.* 592.
Habitat in Europa.

nitida. 88. L. nitida viridi-aurea, elytris punctato-ſtriatis: rugis crenatis vittaque lata purpureo-aenea, abdomine antennis pedibusque auratis, femoribus poſterioribus dentatis. *Muſ. Lesk. p.* 27. *n.* 593.
Habitat in Europa.

vulgaris. 89. L. viridi-argentea, elytris punctato-ſtriatis: rugis crenatis vittaque lata communi viridi-purpurea, capite, abdomine pedibusque cinereo-argenteis, femoribus poſterioribus muticis. *Muſ. Lesk. p.* 27. *n.* 594.
Habitat in Europa.

caerulea. 90. L. caerulea, elytris punctato-ſtriatis: rugis crenatis, antennis aeneis, femoribus poſterioribus dentatis. *Muſ. Lesk. p.* 27. *n.* 595.
Habitat in Europa.

** *labio bifido,* Lepturae Fabricii.

† *thorace antrorſum oblonginſculo anguſtiore, elytris apice truncatis.*

unipunctata. 22. L. nigra, elytris rufis: puncto medio nigro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 1.
Habitat Dresdae, *ſtatura bipunctatae.*

haſtata. 23. L. atra, elytris rubris: apice ſuturaque media nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 2. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 5. *f.* 11.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 226. *n.* 6. Stenocorus niger &c.
Habitat in Europa *magis auſtrali, melanurae affinis; mas minor, abdomine rufeſcente.*

carbonaria. 91. L. nigra, elytris teſtaceis apice fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 28. *n.* 612.
Habitat in Europa, *an hujus familiae?*

nigella. 92. L. nigra, elytris teſtaceis, tibiis anticis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 28. *n.* 614.
Habitat in Europa, *an hujus familiae?*

erythropus. 93. L. nigra, pedibus rubris, femorum baſi tibiarum apice plantisque nigris. *Muſ. Lesk. p.* 28. *n.* 606.
Habitat in Europa.

quinquemaculata. 94. L. nigra, antennis nigro annulatis, pedibus elytrisque teſtaceis: his maculis quinque fuſcisque tribus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 28. *n.* 600.
Habitat in Europa.

fuſca. 95. L. fuſca aureo pubeſcens, antennarum baſi teſtacea, femoribus tibiisque anticis teſtaceis: illis ſupra faſciis, quatuor poſterioribus baſi teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 28. *n.* 617.
Habitat in Europa.

bipunctata. 24. L. nigra villoſa, elytris lividis: ſutura puncto medio apiceque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 245. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 3.
Habitat in Sibiria, *melanurae valde affinis, elytris apice rotundatis.*

melanura. 2. L. nigra, elytris rubeſcentibus lividisve: ſutura apiceque nigris. *Fn. ſuec.* 678.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 245. *n.* 2. *mant. inſ* 1. *p.* 158. *n.* 4.
Gadd diſſ. 27. Leptura thorace nigro nitido, elytris obſolete ſordideque flaveſcentibus.

Degeer

Degeer inſ. 5. *p.* 137. *n.* 14. Leptura variabilis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 226. *n.* 7. *t.* 4. *f.* 1.
Raj. inſ. p. 97. *n.* 6.
Petiv. gaz. t. 30. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 4.
β) Leptura minor. *Fabr. mant.* 1. *p.* 158.
Habitat frequens in Europae *floribus, mas elytris apice nigris, femina unicoloribus, β) duplo minor.*

livida. 26. L. nigra, elytris teſtaceis immaculatis, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 246. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 5.
Herbſt apud Rueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 23.
β) Leptura major. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 158.
Habitat in Germaniae *floribus, β) duplo major.*

rubra. 3. L. nigra, thorace, elytris tibiisque purpureis. *Fn. ſuec.* 500. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 246. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 6.
Degeer inſ. 5. *p.* 132. *n.* 7.
Friſch inſ. 12. *t.* 3. *ic.* 6. *f.* 6.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 30.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 2.
Habitat in Europae *floribus.*

emarginata. 27. L. atra, elytris purpureis apice emarginatis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 6.
Habitat in Cayenna, *rubra major, immaculata.*

villica. 28. L. ferruginea, antennis, elytris pectoreque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ* 1. *p.* 246. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 8.
Habitat in Anglia.

ſanguinolenta. 4. L. nigra, elytris ſanguineis. *Fn. ſuec.* 679.* *Scop. ent. carn.* 150. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 246. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 7.
Scop. ent. carn. p. 47. *n.* 151? Leptura dubia.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 9.

teſtacea. 5. L. nigra, elytris teſtaceis, tibiis rufis, thorace poſterius rotundato. *Fn. ſuec.* 680.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 246. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 10.
Degeer inſ. 5. *p.* 135. *n.* 11.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 3.
Habitat in Europa *boreali; an mas rubrae, cui ſaepe copula juncta?*

reveſtita. 6. L. teſtacea, elytris pectore antennisque atris.
Habitat in Germania, *ſtatura teſtaceae.* Schreber.

pubeſcens. 29. L. nigra cinereo-villoſa: coſta alarum baſi teſtacea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 11.
Habitat in Suecia, *teſtaceae affinis.*

virens. 7. L. ſericeo-vireſcens, antennis fuſco viridique variis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 247. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 12.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 638. *n.* 7. *Fn. ſuec.* 682.* Leptura viridi-flava, antennis luteo viridique variis.
Degeer inſ. 5. *p.* 131. *n.* 6. Leptura flavo-viridis.
Habitat in Europa *boreali.*

atra. 30. L. corpore toto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 247. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 13.
Poda muſ. gr. p. 28. Leptura aethiops.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 228. *n.* 10. Stenocorus totus niger.
Habitat in Europa *magis auſtrali, pedibus interdum teſtaceis.*

humeralis. 31. L. nigra, humeris abdomineque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 14.
Habitat in Germania, *ſtatura quadriguttatae, at duplo fere major.*

ſuturalis. 32. L. cinerea, elytris teſtaceis: ſutura nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 15.
Habitat Halae Saxonum, *atra paulo major.*

ſcutellata. 33. L. nigra, ſcutello albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 247. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 16.
Habitat in Italia, *atra major.*

femorata. 34. L. nigricans, femoribus baſi rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 17.
Scop. ent. carn. p. 47. *n.* 155? Leptura ruficrus.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura et magnitudine nigrae.*

ruficornis. 35. L. nigra, antennis pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 18.
Habitat in Italia, *femoribus interdum apice nigris.*

marginata. 36. L. nigra, elytrorum margine tibiisque poſterioribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147 *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 19.
Habitat in Norwegia, *ſtatura nigrae.*

8. L.

ſericea. 8. L. viridi-caerulea, elytris ſubfaſtigiatis. *Fn. ſuec.* 683.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 249. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 32.
Schaeff. ic. t. 84. *f.* 1.
Habitat in Europa *boreali.*

quadrimaculata. 9. L. nigra, elytris lividis: maculis quatuor nigris. *Fn. ſuec.* 684. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 25.
Schaeff. elem. t. 118. *f.* 2.
ic. t. 1. *f.* 7.
Habitat in Europae *plantis.*

interrogationis. 10. L. nigra, elytris lividis: faſcia longitudinali arcuata maculisque quatuor nigris. *Fn. ſuec.* 685.
Uddm. diſſ. 35. *t.* 1. *f.* 2. Leptura nigra, elytris fuſco-flavis: maculis octo nigris.
Habitat in Europa.

ſexmaculata. 11. L. nigra, coleoptris teſtaceis: maculis ſex nigris margine connexis. *Fn. ſuec.* 686.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 26.
Degeer inſ. 5. *p.* 133. *n.* 9. Leptura teſtaceo maculata.
Raj. inſ. p. 81. *n.* 18.
Habitat in Europae *plantis.*

12maculata. 37. L. nigra, elytris flavis: maculis ſex nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 27.
Habitat in Sibiria, *ſtatura ſexmaculatae, at paulo major.*

quadrifaſciata. 12. L. nigra, elytris teſtaceis: faſciis quatuor nigris. *Fn. ſuec.* 687.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 29.
Degeer inſ. 5. *p.* 132. *n.* 8. *t.* 4. *f.* 11. Leptura octomaculata.
Scop. ent. carn. n. 172. Cerambyx faſciatus.
Schaeff. ic. t. 59. *f.* 6.
Habitat in Europa, *attenuatae affinis, an femina?*

attenuata. 13. L. elytris attenuatis flavis: faſciis quatuor nigris, pedibus teſtaceis. *Fn. ſuec.* 688.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 28.
Scop. ann. hiſt. nat 5. *p.* 99. *n.* 66. Prionus attenuatus.
Müll. zool. dan. prodr. p. 93. *n.* 1046? Leptura faſciata.
Schaeff ic. t. 39. *f.* 6.
Habitat in Europa.
Femora *poſteriora apice nigra.*

dubia. 38. L. nigra ſubvilloſa, elytris teſtaceis nigro-punctatis, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 249. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 30.
Habitat in Sibiria, *attenuatae nimis affinis.*

ſexguttata. 39. L. nigra, elytris maculis tribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 249. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 31.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 102. *n.* 13. *t.* 26. *f.* 25.
Habitat in Germania.

nigra. 14. L. elytris attenuatis, corpore nigro nitido, abdomine rufo. *Fn. ſuec.* 689.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 247. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 20. *Degeer inſ.* 5. *p.* 144. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 227. *n.* 9. Stenocorus niger nitidus, abdomine fuſco-rubente.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 7.
Habitat in Europae *floribus.*

aduſta. 40. L. aureo-pubeſcens, capite elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 21.
Habitat Halae Saxonum, *nigra paulo minor, pedibus rubris.*

4guttata. 41. L. fuſca, elytris nigris, punctis duobus baſeos ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 22.
Habitat Halae Saxonum, *magnitudine et ſtatura nigrae.*

roſtrata. 42. L. obſcure aenea, pedibus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 23.
Habitat in Africae *ammi majori, nigra minor.*

ſimilis. 43. L. nigra, elytris ſpadiceis: apice faſciaque ſuturali nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 101. *n.* 2. *t.* 26. *f.* 22.
Habitat rurior Berolini, *melanurae perquam ſimilis.*

armata. 44. L. thorace nigro ſpinoſo, antennis pedibusque ferrugineis, elytris flavis: punctis duobus, macula cordata, faſciisque tribus nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 101. *n.* 11. *t.* 26. *f.* 24.
Habitat Berolini, *attenuatae affinis, antennarum articulis apice, capite, tarſis, et poſterioribus femoribus tibiisque nigris, pedum poſteriorum apice in altero ſexu lobato.*

45. L.

Huic tribui adſcribendae quoque videntur 4 ſpecies a Schaeffero delineatae, affinis ic. t. 101. *f.* 5. *figurata ic. t.* 151. *f.* 7. *clavata ic. t.* 103. *f.* 6. *et t.* 108. *f.* 1. *et aeneo-punctulata. ic. t.* 201. *f.* 6.

ceramby-ciformis. 45. L. nigra, elytris flavis: faſciis tribus nigris; prima ex punctis transverſim poſitis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 154. *n.* 290.
Scop. ent. carn. n. 154. Leptura quadrimaculata.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 102. *n.* 16. *t.* 26. *f.* 26.
Habitat in Ungaria *et* Auſtria, 4½ *lineas longa.*

ruſſica. 46. L. nigra albido-villoſa, elytris flaveſcentibus: maculis quinque lineaque media nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 102. *n.* 17. *t.* 26. *f.* 27.
Habitat in Ruſſia.

laevis. 47. L. nigra, ſubtus villoſo-ſericea, antennis ex luteo fuſcis, pedibus anterioribus ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 103. *n.* 18.
Habitat in Pomerania, *nigra dimidio minor.*

ſolſtitialis. 48. L. nigra, antennis baſi ferrugineis, pedibus elytrisque luteis: his margine nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 103. *n.* 19.
Habitat Berolini, *vix* 3 *lineas longa.*

ſplendida. 49. L. nigra flavo-villoſa, elytris apice glabris, pedibus fulvis, antennis fuſcis, baſi ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 103. *n.* 20.
Habitat in Marchia, 2½ *lineas longa, ad mecydalin accedens.*

quadrinotata. 50. L. nigra flavicanti-ſubtus albido-villoſa, antennis baſi fuſcis, femoribus baſi ferrugineis, elytris punctatis: maculis duabus aurantiis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 171. *n.* 22. *t.* 45. *f.* 13.
Habitat Berolini.

plumipes. 51. L. fuſca punctata, femoribus ſubclavatis, pedibus poſtremis longiſſimis: tibiis apice flocculoſis. *Pall. ſpic. zool.* 9. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 2. 2.*
Habitat - - - melanura minor, gracilima.
Tarſi *ſparſa lanugine villoſi; floccus in apice tibiarum poſtremarum e villis nigris ſericeis in ſeptem verſus per longitudinem diſpoſitis conſtat.*

rufipes. 52. L. nigra, pedibus rufis: femoribus baſi nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 298.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 7.
Habitat in rhamni cathartici, corni ſanguineae, crataegi oxyacanthae *floribus*, Majo *frequens.*

octomaculata. 53. L. nigra, elytris teſtaceis: maculis ſex apicibusque nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 299.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 9.
Habitat in Saxonia.

Schalleri. 54. L. fuſca, elytrorum baſi maculis quatuor rufis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 299.
Schaeff. ic. t. 182. *f.* 4.
Habitat, rarior, in rhamni cathartici, pruni ſpinoſae *floribus.*

uſtulata. 55. L. nigra thorace elytrisque teſtaceis, apice nigris, pedibus teſtaceis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 298.
Habitat, rarior, in floribus Halenſibus, *Junio conſpicua, cerambycis praeuſti ſtatura et magnitudine.*

pumila. 56. L. fuſca, pedibus anterioribus teſtaceis: femoribus ſuperne nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 299.
Habitat Halae Saxonum, *in floribus, cerambycis praeuſti magnitudine.*

pariſina. 56. L. tota nigra, femorum antennarumque baſi rufeſcente. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 16. *n.* 28.
Habitat Lutetiis, *melanura duplo minor, oblonga, anguſta.*

bipuſtulata. 57. L. elytris nigris ſtriato-punctatis: maculis duabus teſtaceis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 17. *n.* 29.
Habitat Upſaliae, *magnitudine melanurae; an priſmae tribus?*

Scopolii. 58. L. abdominis thoracisque margine poſteriore rubro, elytris teſtaceis pellucidis attenuatis: apice et margine infra medium nigro. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 100. *n.* 72.
Habitat in Carniolia.

verna. 59. L. nigra, tibiis anterioribus fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 94. *n.* 1055.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 9.
Habitat in Dania.

nigripes. 60. L. nigra, elytris obſcure flavo-teſtaceis, pedibus nigris. *Degeer inſ.* 5. *p.* 136. *n.* 12.
Habitat - - - 7 lineas longa.

maculoſa. 61. L. nigra, elytris teſtaceo-lividis, antennis flavo-maculatis *Degeer inſ.* 5. *p.* 139. *n.* 16.
Habitat - - - 4 lineas longa.

lunulata. 96. L. nigra, thorace poſterius faſcia anguſta flava, elytris lunulis duabus ferrugineis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 18.
Habitat ad caput bonae ſpei, *melanurae facie, at paulo major.*

bicolor. 97. L. pallide ferruginea, oculis, elytris, alis et ano ſupra nigris. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 19.
Habitat in America *ſeptentrionali, attenuatae ſimillima, at paulo minor.*

vittata. 98. L. pallide teſtacea, antennis fuſco-annulatis, elytris nigris punctatis: vittis quatuor flavis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 20.
Habitat in America *ſeptentrionali, facie et magnitudine ſexmaculatae.*

†† *thorace ſubgloboſo nec anterius attenuato, elytris apice obtuſis nec truncatis.*

virginea. 15. L. thorace globoſo nigro, elytris violaceis, abdomine ruſo. *Fn ſuec.* 690. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 249. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 34.
Degeer inſ. 5. *p.* 144. *n.* 23. Leptura violacea.
Gadd diſſ. 26. Leptura nigra, elytris caeruleſcentibus, toto abdomine rubro.
Schaeff. ic. t. 58. *f.* 8.
Habitat in Europa *boreali.*

collaris. 16. L. thorace globoſo abdomineque rubris, elytris nigris. *Fn. ſuec.* 691. *Scop. ent. carn.* 159. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 249. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 33.
Degeer inſ. 5. *p.* 143. *n.* 22. Leptura ruficollis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 228. *n.* 11. Stenocorus niger, thorace rubro.
Schaeff. ic. t. 58. *f.* 9.
Habitat in Europa.

decempunctata. 62. L. atra, thorace ſubgloboſo, elytris decempunctatis. *Lepechin it.* 2. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat in monte Ural.

varia. 63. L. villoſa cana, thorace ſubgloboſo, elytris nigris: punctis octo et faſciis interruptis quatuor albis. *Lepech. it.* 2. *t.* 10. *f.* 4.
Habitat in monte Ural.

viridis. 64. L. viridiuſcula, thorace ſubovato: lineolis duabus longitudinalibus obſcurioribus, dorſo nigro. *Lepech. it.* 2. *t.* 10. *f.* 11.
Habitat in Sibiria.

linearis. 25. L. thorace ovato, corpore cyaneo lineari, antennis longioribus. *Muſ. Lud. Ulr.* 77.*
Habitat in India, *femoribus nunc clavatis, nunc linearibus.*

maſſilienſis. 65. L. nigra, thorace ſubgloboſo, elytris faſciis ſubtribus albis introrſum fractis. *Syſt. nat.* XII. *add. p.* 1067. *n.* 8.
Habitat in Luſitania, *et* Maſſilia, *facie cerambycis ruſtici, ſed triplo minor; an cerambyx?*

piloſa. 66. L. nigra cinereo-pubeſcens, thorace globoſo, elytris faſtigiatis. *Forſt. nov. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 44.
Habitat in Hiſpania *ad* calpen freti Gaditani, *magnitudine circiter cerambycis myſtici.*

nitens. 67. L. thorace globoſo et abdomine nigris flaveſcenti-tomentoſis nitentibus, elytris atris: faſciis quatuor latis tranſverſis flavis, pedibus ferrugineis. *Forſt. nov. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 45.
Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine melanurae.*

bilineata. 68. L. fuſco-nigricans, thorace lineis binis, elytris punctis ſparſis flaveſcentibus. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 102. *n.* 76.
Habitat in Carniolia, *habitu cerambycis cardui, nonne cerambyx?*

caerulea. 69. L. caerulea, tibiis anterioribus rufis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 102. *n.* 78.
Habitat in Carniolia.

ſqualida. 70. L. nigra, elytris baſi et margine interiori teſtaceis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 102. *n.* 79.
Habitat in Carniolia, *antennis brevibus.*

bipartita. 71. L. nigra, thorace ferrugineo: linea nigra longitudinali, elytris macula communi ferruginea. *Schranck. Beytr z. Naturg. p.* 68. §. 15.
Habitat in Germania *ſuperiori.*

ferruginea. 72. L. nigra, elytris ferrugineis, extrorſum late nigris. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 68. §. 14. *t.* 3. *f.* 14.
Habitat in Germania.

Lamda. 73. L. nigro, elytris faſciis tribus albis. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 67. §. 13. *t.* 3. *f.* 13.
Habitat in Germania.

aurea. 74. L. viridi-aurea, thorace ſpinoſo, elytris faſciis binis longitudinalibus nigris, femoribus rufis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 145. *n.* 1.
Habitat - - - - 8½ *lineas longa.*

Genii. 75. L. nigra, elytris fuſco-teſtaceis apice nigris, pedibus flavis. *Deger inſ.* 5. *p.* 139. *n.* 17.
Schaeff. icon. t. 39. *f.* 5.
Habitat in Europa, *tabaci colore*, 3½ *lineas longa.*

maculata. 76. L. nigra, maculis villoſo-flavis, thorace globoſo, antennis corpore dimidio brevioribus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 211. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

naevia. 77. L. nigra villoſo-flava, elytris maculis duabus glabris nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 211. *n.* 8.
Habitat in Gallia

punctulata. 78. L. nigricans, capite thoraceque rubro nigro-punctato. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 212. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

ſtrigoſa. 79. L. villoſo flava, elytris lineis tribus tranſverſis nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 216. *n.* 14.
Habitat in Gallia.

gallica. 80. L. caerulea, tibiis rufis, thorace ſubgloboſo. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 217. *n.* 16.
Habitat in Gallia.

craſſipes. 81. L. atra, femoribus craſſis rufis. *Geoffr. inſ. par.* 5. *p.* 219. *n.* 20.
Habitat in Gallia.

bimaculata. 82. L. rufa, thorace cylindrico, elytris punctatis: macula et ſtriga undulata albis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 95. *n.* 1073.
Schaeff. ic. t. 158. *f.* 1.
Habitat in Europa.

villoſa. 83. L. nigra villoſa, thorace cylindrico: linea longitudinali pallida. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 95. *n.* 1072.
Habitat in Dania.*

206. NE-

---

* *Specierum 64-83 locus in hoc genere dubius.*

206. NECYDALIS.

Antennae ſetaceae vel filiformes.
Palpi quatuor filiformes.
Elytra alis minora, breviora vel anguſtiora.
Cauda ſimplex.

* *antennis ſetaceis, elytris ala et abdomine brevioribus,* Lepturae Fabricii.

major. 1. N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis brevioribus. *Fn. ſuec.* 838.*
Degeer inſ. 5. *p.* 148. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1. Necydalis ichneumonea.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 250. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 35. Leptura abbreviata.
Schaeff. monogr. 1753. *f.* 1. 2. Muſca Cerambyx major.
elem. t. 13. *f.* 2.
ic. t. 10. *f.* 10. 11.
Habitat in Europa.

variegata. 12. N. abdomine atro: faſciis fulvis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 250. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 36. Leptura variegata.
Habitat in nova Hollandia.

minor. 2. N. elytris teſtaceis: apice lineola alba, antennis longioribus. *Fn. ſuec.* 837.* *Scop. ent. carn.* 179.
It. oeland. 74. Necydalis elytris flavis lineola alba.
Degeer inſ. 5. *p.* 151. *n.* 2. Necydalis ceramboides.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 250. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 37. Leptura dimidiata.
Schaeff. monogr. 1753. *f.* 6. 7. Muſca Cerambyx minor.
icon. t. 95. *f.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 51.
Habitat in Europa, *inprimis boreali.*

umbellatarum. 3. N. elytris teſtaceis immaculatis, antennis longis.
Schreb. inſ. 4. Necydalis elytris apice nigris.
Scop. ent. carn. 180. Necydalis minima.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 250. *n.* 28. Leptura umbellatarum.
Schaeff. ic. t. 95. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 1.
Habitat in Germaniae *umbellatis.*

** *antennis filiformibus, elytris ſubulatis longitudine abdominis.*

viridiſſima. 13. N. thorace teretiuſculo, corpore viridi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 263. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 650. *n.* 23. *Fn. ſuec.* 717. Cantharis viridiſſima.
Degeer inſ. 5. *p.* 15. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 13. Cantharis viridi-aenea nitida.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 177. *n.* 14. Cicindela viridi-caerulea.
Habitat in Europae *hortis frequens.*

caeruleſcens. 14. N. thorace teretiuſculo, corpore caeruleo ſubopaco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 263. *n.* 2. *mant inſ.* 1. *p* 170. *n.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 650. *n.* 22. Cantharis caerulea.
Degeer inſ. 4. *p.* 76. *n.* 8. Telephorus villoſus violaceo-caeruleus.
Habitat in Europa *boreali.*

ſanguinicollis. 15. N. thorace teretiuſculo rufo, corpore fuſco. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p* 170. *n.* 3.
Habitat Halae Saxonum, *magnitudine et ſtatura caeruleſcentis.*

ruficollis. 16. N. thorace teretiuſculo abdomineque rufis, capite elytrisque viridi-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 263. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 4.
Habitat in Italia, *ſtatura et magnitudine caeruleſcentis.*

caerulea. 4. N. caerulea, femoribus poſterioribus clavatis arcuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 264. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 11.
Forſt. nov. inſ. 1. *p.* 47. *n.* 47. Necydalis ceramboides.
Scop. ent. carn. 145. Cantharis nobilis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 342. *n.* 3. Cantharis viridi-caerulea.
Sulz. hiſt. inſ. 48. *t.* 6. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 94. *f.* 7.
Habitat in Europa *magis auſtrali et* Oriente, *pedibus interdum ſimplicibus.*

triſtis. 17. N. nigra, thorace teretiuſculo femorumque baſi rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 5.
Habitat in terra van Diemen, *ſtatura atrae.*

atra. 5. N. nigra, femoribus omnibus clavatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 263. *mant. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 6.

Habitat

Habitat in Europa *auſtrali, femoribus in altero ſexu ſimplicibus.* Aſcanius.

humeralis. 18. N. elytris nigris baſi flavis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 263. *n.* 5. *mant. inſ.* I. *p.* 170. *n.* 7.
Forſt. nov. inſ. ſp. I. *p.* 48. *n.* 48. Necydalis (muralis) elytris ſubulatis fuſca, humeris flavis, pedibus ſimplicibus.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 342. *n.* 2. Cantharis nigra &c.
Habitat in Anglia.

uſtulata. 19. N. nigra, elytris baſi ſuturaque lata teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 170. *n.* 8. *Schranck inſ. auſtr. n.* 319. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 109. *n.* 8.
Habitat in Germaniae *plantis, ſtatura humeralis.*
Femina *major, thorace fulvo.*

melanura. 20. N. nigra, thorace elytriſque teſtaceis: his apice nigris. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 170. *n.* 9.
Habitat in Hiſpaniae *plantis, ſtatura et magnitudine ruficollis.*

rufa. 6. N. nigra, femoribus omnibus clavatis, elytris antenniſque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 263. *n.* 6. *mant. inſ.* I. *p.* 171. *n.* 10.
Geoff. inſ. par. 2. *p.* 220. *n.* 22. Leptura nigra &c.
Schaeff. ic. t. 94. *f.* 8.
Habitat in Europa.

glaucescens. 7. N. elytris glaucis, corpore nigro, abdominis inciſuris albis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 171. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 642. *n.* 7. Necydalis elytris glauco flaveſcentibus, femoribus clavatis.
Syſt. nat. X. *p.* 399. *n.* 17. Leptura necydalea.
Schaeff. ic. t. 94. *f.* 6.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

flaveſcens. 8. N. elytris teſtaceis, corpore nigro, femoribus poſterioribus clavatis arcuatis.
Scop. ent. carn. 145. Cantharis femorata.
Schaeff. ic. t. 85. *f.* 7.
Habitat in Europa; *an mera n. podagrariae varietas?*

podagrariae. 9. N. elytris teſtaceis, corpore nigro, femoribus poſterioribus clavatis baſi teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 264. *n.* 8. *mant. inſ.* I. *p.* 171. *n.* 12.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 343. *n.* 4. Cantharis nigra &c.

Habitat

Habitat in aegopodio podagraria, *elytrorum apice nigro, antennarum baſi, palpis, et pedibus quatuor anterioribus teſtaceis.* Schreber.

ſimplex. 10. N. elytris teſtaceis, pedibus ſimplicibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 264. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 14.
Scop. ent. carn. 144. Cantharis phthyſica.
Habitat in Europa, *an forſan n. podagrariae varietas?*

brevicornis. 11. N. elytris minutiſſimis, capite thoraceque fuſcis: linea longitudinali flava, antennis breviſſimis craſſiuſculis.
Habitat in Guinea, *majoris magnitudine, elongata, elytris ex rufo fuſcis, pedibus teſtaceis.*

ſtriata. 21. N. vireſcens, elytris lineis quatuor elevatis. *Herbſt apud Fueſſli arch.* 5. *p.* 109. *n.* 5.
Habitat Berolini.

melanocephala. 22. N. elytris teſtaceis, capite epigaſtrio alisque nigris, antennis fuſcis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 300.
Habitat Halae Saxonum *in umbellatis.*

glauca. 23. N. nigra, thorace elytrisque cyaneis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 109. *n.* 6.
Habitat rarior Berolini, 5 *lineas longa.*

collaris. 24. N. atra, thorace bipunctato teſtaceo, pedibus ſimplicibus. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 46. *n.* 46.
Habitat in America *ſeptentrionali, caeurleae magnitudine.*

exuſta. 25. N. fuſca, elytris ſubulatis teſtaceis margine exuſtis, pedibus ſimplicibus. *Muſ. Lesk. p.* 31. *n.* 664.
Habitat in Europa.

clavipes. 26. N. nigra, elytris ſubulatis teſtaceis margine exteriore fuſcis, femoribus poſterioribus clavatis arcuatis. *Muſ. Lesk. p.* 31. *n.* 665.
Habitat in Europa.

207. **LAMPYRIS.** *Antennae* filiformes.
Palpi quatuor.
Elytra flexilia.
Thorax planus, ſemiorbiculatus, caput ſubtus occultans cingensque.
Abdominis latera plicato-papilloſa.
Femina aptera plerisque, larvae phytiphagae ſimilis.

* *palpis ſubclavatis.*

noctiluca. 1. L. oblonga fuſca, clypeo cinereo. *Fn. ſuec.* 699. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 251. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 1.
Degeer inſ. 4. *p.* 31. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 19. 20. Lampyris noctiluca communis.
Leche nov. ſp. 23. *n.* 47. Cantharis mas coleopterus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 167. *t.* 2. *f.* 7.
Habitat in Europae *borealis juniperetis graminoſis, etiam in* Calabria.

coruſca. 2. L. obſcure nigra, clypeo utrinque lunula roſea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 251. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 644. *n.* 2. *Uddm. diſſ.* 47. Lampyris oblongiuſcula fuſca, clypeo utrinque intra marginem fulvo.
Habitat in America *boreali.*

ſplendidula. 3. L. oblonga fuſca, clypeo apice hyalino. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 251. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 644. *n.* 3. Lampyris oblongiuſcula fuſca, clypeo ſupra oculos feneſtrato.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 166. *n.* 1. Lampyris femina aptera.
Scop. ent. carn. n. 118. Caſſida noctiluca.
Poda inſ. 39. Cantharis noctilcua.
Raj. inſ. p. 78. *n.* 15.
Guen. de Montbeill. nov. act. Divion. 1782. *ſem.* 2.
Columu. ephr. 1. 38. *t.* 36.
Aldr. inſ. 492.
Mouff. inſ. p. 109. *f.* 1. *et* 2.

Jonſt.

Jonſt. inſ. t. 14. *f.* 2.
Bradl. nat. t. 26. *f.* 3. A. B.
Schaeff. elem. t. 74.
Habitat in Europae *ſylvaticis, an a noctiluca ſatis diſtincta, tempeſtate inprimis pluvia lucem ſpargens, femina majorem, gravida maximam, in aëre vitali adhuc majorem.*

obſcura. 19. L. nigra, clypeo utrinque macula rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 251. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 4.
Habitat in terra del Fuego.

Pyralis. 4. L. clypeo rufo medio nigro, elytris nigris: marginibus abdomineque albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 251. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 644. *n.* 4. *Muſ. Lud. Ulr.* 78.* Lampyris oblongiuſcula fuſca, elytris margine rufeſcentibus, clypeo intra marginem purpuraſcente.
Degeer inſ. 4. *p.* 52. *n.* 7. *t.* 17. *f.* 7. Lampyris oblonga.
Habitat in America *meridionali.*

cincta. 20. L. fuſca, thorace elytrorum margine omni abdominisque apice fulvis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 6.
Habitat in Pulicander, *pyralidi proxime affinis.*

marginata. 5. L. oblonga nigra, thoracis elytrorumque margine omni, ſcutello abdominisque poſteriore flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 252. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 7.
Habitat in America *meridionali, magnitudine noctilucae.*

Heſpera. 6. L. ovata, elytris fuſcis: macula marginali triangulari flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 252. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p* 161. *n.* 10.
Degeer inſ. 4. *p.* 48. *n.* 1. *t.* 17. *f.* 1. Lampyris ſurinamenſis.
Habitat in America *meridionali.* Rolander.

ignita. 7. L. ovata, elytris fuſcis: macula marginali ovata lutea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 252. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 11.
Degeer inſ. 4. *p.* 49. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 2. Lampyris ovata.
Habitat in America *meridionali, fuſca, ſubtus flava, alis nigris.* Rolander.

lucida. 8. L. oblonga, elytris fuſcis: margine exteriore luteo, abdomine flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 253. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 12.
Degeer inſ. 4. *p.* 51. *n.* 5. *t.* 17. *f.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 22.

 Habitat

Habitat in America *meridionali, noctilucae ſimilis, ſed pallidior, capite antenniſque nigris.*

nitidula. 21. L. oblonga fuſca, thorace flaveſcente: macula media nigra, abdomine apice maculis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 253. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 13.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

phoſphorea. 9. L. oblonga ſubteſtacea, abdomine atro: poſterius flaviſſimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 253. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 14.
Degeer inſ. 4. *p.* 51. *n.* 6. *t.* 17. *f.* 6. Lampyris oblonga &c.
Habitat in America *meridionali, antennis nigris.* Rolander.

japonica. 22. L. flava, ſegmento abdominis antepenultimo nigro. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 79. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 16.
Habitat in Japonia, *Majo et Junio copioſiſſima, veſperi lucem egregiam e veſiculis binis caudalibus aëre repletis ſpargens, oculis, antennis alisque nigris.*

compreſſa. 23. L. teſtacea, antennis pedibusque compreſſis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4 *p.* 80.
Habitat in India, *oblonga, linearis, glabra, abdomine caeruleſcente, capite, pectore, pedibus antennisque nigris.*

capenſis. 24. L. livida, thorace flaveſcente, abdomine poſterius flaviſſimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 253. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 16.
Habitat ad caput bonae ſpei.

auſtralis. 25. L. flavicans, capite elytrisque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 253. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 17.
Habitat in nova Hollandia.

mauritanica. 10. L. elytris lividis, corpore flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 254 *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 18.
Habitat in Africae *plantis, ſplendidula duplo, femina triplo major.*

depreſſa. 26. L. fuſca, clypei elytrorumque margine dilatato plano. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 254. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 19.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 171. *n.* 2. *t.* 46. *f.* 7.
Habitat in Coromandel, *magna.*

italica. 11. L. elytris fuſcis, thorace transverſo rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 253. *n.* 16.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 645. *n.* 11. Lampyris elytris fuſcis, clypeo antice transverſo rufo medio nigro.

Degeer

Degeer inſ. 4. *p.* 53. *n.* 9. *t.* 17. *f.* 9. 10. Lampyris oblonga &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 3.
Habitat in Italiae *et* Helvetiae *arboribus, congeneribus minor, fuſca, abdominis ſegmentis 2 ultimis flavis, pectore pedibusque luteis; femina nigra.*

chinenſis. 12. L. elytris teſtaceis apice nigris. *Osb. it.* 224.*
Habitat in Aſia.

minuta. 13. L. teſtacea, abdomine alisque nigricantibus.
Habitat in Europa, *vix pediculo major, ex ovali oblonga.*

pectinata. 27. L. atra, clypei lateribus baſi exteriore, elytrorum abdominisque apicibus albis, antennis pectinatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 252. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 8.
Degeer inſ. 4. *p.* 57. *n.* 11. *t.* 17. *f.* 13. Lampyris atra &c.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 649. *n.* 17. Cantharis pectinata.
Habitat in America *meridionali.*

flabellicornis. 28. L. nigra, clypeo ante marginem, elytris lineola marginali baſeos abdomineque apice albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 252. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 9.
Habitat in Braſilia, *magna.*

piloſa. 29. L. oblonga nigra, thorace ſanguineo: lineis duabus longitudinalibus nigris, antennarum articulis tribus extimis pectinatis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 49. *n.* 49.
Habitat in America *ſeptentrionali, noctilucae fere magnitudine; an ex hac tribu?*

** *palpis ſubfiliformibus*, Pyrochroae Fabricii.

faſciata. 30. L. atra, thoracis margine flaveſcente, elytris faſcia lata alba. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 9.
Habitat in Cayenna, *ſtatura reticulatae.*

reticulata. 31. L. atra, thoracis margine flavo, elytris flavis: faſcia apiceque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 255. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 8.
Habitat in America *boreali.*

bicolor. 16. L. ſanguinea, elytris poſterius violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 255. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 7.
Amoen. acad. 6. *p.* 395. *n.* 21. Cantharis bicolor.
Habitat in Africa, *antennis compreſſis.*

puſilla. 32. L. atra, antennarum apicibus elytriſque ſanguineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 6.
Degeer inſ. 4. *p.* 36. *n.* 3. Lampyris nigro-rubra.
Habitat in Norwegia, *ſanguinea duplo major.*

nigripes. 33. L. ſanguinea, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 5.
Habitat in Siam, *ſtatura et magnitudine ſanguineae.*

ſanguinea. 17. L. nigra, thoracis lateribus elytriſque ſanguineis. *Fn. ſuec.* 704.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 254. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 4.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 168. *n.* 3. Lampyris, elytris rubris.
Degeer inſ. 4. *p.* 452. *t.* 2. *f.* 1. Lampyris ſanguinea.
Scop. ent. carn. 119. Caſſida ſanguinea.
Raj. inſ. p. 101. *n.* 4.
Friſch inſ. 12. *p.* 40. *n.* 3. *t.* 7. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 7. *f.* 1.
Habitat in Europae *lapidoſis.*

pectinicornis. 34. L. atra, thorace elytriſque teſtaceis, antennis pectinatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 650. *n.* 20. *Fn. ſuec.* 715. Cantharis pectinicornis.
Habitat in Germania, *coccinea major.*

rubens. 35. L. nigra, capite, thorace elytriſque rubris, antennis pectinatis.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 301. *Schranck inſ. auſtr. p.* 174. *n.* 324. Pyrochroa Satrapa.
Habitat Halae Saxonum, *Majo et Junio conſpicua, ſtatura coccineae, at dimidio minor.*

flabellata. 36. L. coccinea, antennis elytriſque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 2.
Habitat in America, *ſtatura et magnitudine coccineae, antennis ſerratis.*

coccinea. 18. L. nigra, thorace elytriſque ſanguineis immaculatis. *Fn. ſuec.* 705.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 254. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 1.
Degeer inſ. 4. *p.* 47. *n.* 4. Lampyris villoſa.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 338. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 4. Pyrochroa.
Schaeff. ic. t. 90. *f.* 4.

Habitat

Habitat in Europae *ſepibus, capite aliquando rufo, elytris interdum ſtriatis.*

Aurora. 37. L. nigra, thorace rubro cancellato, elytris ſpadiceis: lineis quatuor elevatis; interſtitiis ſeriatim punctatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 105. *n.* 4.
Habitat in Pomerania.

nitens. 38. L. oblonga, elytris fuſceſcentibus: macula marginali oblonga fuſca, abdomine ſubtus rufo, poſterius flavo: ſegmento unico nigro. *Degeer inſ.* 4. *p.* 50. *n.* 3. *t.* 17. *f.* 3.
Habitat in Surinamo, 4½ *lineas longa.*

maculata. 39. L. ovata teſtacea, thorace faſcia elytriſque macula nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 50. *n.* 4. *t.* 17. *f.* 4.
Habitat - - - ſex lineas longa.

penſylvanica. 40. L. oblonga, elytris pallide ex griſeo teſtaceis, thorace intra marginem nigro: maculis binis rufis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 52. *n.* 8. *t.* 17. *f.* 8.
Brown jam. p. 431. *t.* 44. *f.* 9. a. b. Pyralis minor ſubcinerea longa, alis et oculis nigricantibus?
Habitat in Penſylvania.

*** *palpis articulo ultimo craſſiori truncato;* Lyci Fabricii.

latiſſima. 14. L. flava, elytris macula marginali poſteriusque nigris, margine laterali maximo dilatato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 255. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 1.
Habitat in Sierra Leon Africae, *ſtatura et magnitudine ſilphae cujusdam minoris, antrorſum anguſta, retrorſum latiſſima, antennis ſerratis.*

palliata. 41. L. elytris coriaceis latiſſimis teſtaceis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 255. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 2.
Habitat ad caput bonae ſpei.

roſtrata. 16. L. nigra, thoracis lateribus elytriſque dilatatis flavis anterius poſteriusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 255. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 646. *n.* 15. *Muſ. Lud. Ulr.* 78. Lampyris elytris teſtaceis antice poſticeque nigris.
Degeer inſ. 7. *p.* 622. *n.* 19. *t.* 46. *f.* 11.
Habitat in Africae *plantis.*

proboſcidea. 42. L. nigra, thoracis lateribus elytrisque flavis, poſterius nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 255. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 4.
Habitat in Africa *aequinoctiali, roſtratae proxime affinis.*

ſerraticornis. 43. L. nigra, thorace elytrisque rufeſcentibus, elytris apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 256. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 5.
Habitat in nova Hollandia.

atra. 44. L. atra, thorace orbiculato elytrisque rubris, dorſi macula impreſſa nigra. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 626.
Habitat in Europa.

HORIA. *Antennae* moniliformes.
Palpi quatuor extrorſum craſſiores.
Labium lineare, apice rotundatum.

teſtacea. 1. H. rufa, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 1.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 256. *n.* 1. Lymexylon teſtaceum.
Habitat Tranquebariae.
Mari *femora poſteriora incraſſata, ſubtus canaliculata dentata.*

dermeſtoides. 2. H. teſtacea, oculis, alis pectoreque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 650. *n.* 25. *Fn. ſuec.* 702.* Cantharis teſtacea, oculis alis pectoreque nigris, antennis longitudine thoracis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 256. *n.* 2. Lymexylon dermeſtoides.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *p.* 145. *n.* 5. *t.* 30. *f.* 4 Lytta francofurtana.
Habitat in Europa *media.*

CUCUJUS. *Antennae* filiformes.
Palpi quatuor aequales: articulo ultimo truncato, craſſiori.
Labium breve, bifidum: laciniis linearibus, diſtantibus.
Corpus depreſſum.

monilis. 1. C. ſupra niger, thorace quadrato mutico margine, elytris macula ferruginea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 9.
Habitat in Germania, *antennis moniliformibus ad boriam accedens, vix hujus generis.*

muticus. 2. C. thorace mutico nigro: puncto utrinque impreſſo, elytris ſtriatis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 8.
Habitat in Germania, *niger.*

teſtaceus. 3. C. teſtaceus, thorace ſubquadrato mutico, femoribus compreſſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 7.
Habitat ſub betulae *cortice.*

dubius. 4. C. thorace denticulato rufo, elytris nigris, antennis filiformibus longitudine corporis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 5.
Habitat in America *boreali.*

clavipes. 5. C. ruber, thorace ſulcato, femoribus clavatis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 4.
Habitat in America *boreali.*

caeruleus. 6. C. niger, thorace ſulcato, elytris ſtriatis caeruleis, abdomine rufo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 3.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 2. *p.* 6. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat in Germania, *depreſſo major.*

ſulcatus. 7. C. niger, thorace ſulcato, elytris crenato-ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 2.
Habitat in Croatiae *ligno putreſcente, elongatus, mediae magnitudinis.*

depreſſus. 8. C. thorace denticulato elytrisque rufis, pedibus ſimplicibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 1.

 Syſt.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 647. *n.* 1. Cantharis (ſanguinolenta) ſupra rubra, elytris bimarginatis.
Friſch inſ. 13. *t.* 24. 3. *t.* 7. *f.* 1.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 2. *p.* 4. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1-4.
Habitat in Germania *et* Ruſſia, *lampyridi ſanguineae affinis.*

quadratus. 9. C. niger, thorace quadrato poſterius dentato, medio tuberculato, margine externo rugoſo, anterius elevato, antennis fuſcis, pedibus ſimplicibus elytrisque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 629. b.
Habitat in Europa.

rufus. 10. C. rufeſcens, mandibulis validis, antennis, palpis pedibusque nigris, capite gibboſo, elytris molliuſculis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 21.
Habitat in Sumatra.

maculatus. 11. C. ſordide flavus, thorace quadrangulo inaequali, mandibulis validis, pedibus, elytrorumque maculis ſubquadratis nigris. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 22. *t.* 8. *f.* 8.
Habitat in Noveboraco, *congenerum maximus, ſubdepreſſus.*

208. CANTHARIS.

Antennae filiformes.
Thorax (plerisque) marginatus, capite brevior.
Elytra flexilia.
Abdominis latera plicato-papilloſa.

* *palpis quatuor ſecuriformibus.*

virideſcens. 1. C. thorace teſtaceo: macula nigra, elytris viridibus, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magna, capite nigro, pectore fuſco, abdomine teſtaceo.*

fuſca. 2. C. thorace rubro: macula nigra, elytris fuſcis. *Fn. ſuec.* 700.* *It. oel.* 38. *Scop. ent. carn.* 120. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 1.
Raj.

Cantharides *declaratae aliis victitant inſectis, ſola lymexyli tribus, tum larva, tum imago, ligno recenti.*

Raj. inſ. p. 84. *n.* 29. *et p.* 101. *n.* 2. Cantharis ſepiarius major, elytris nigricantibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 170. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 8. Cicindela elytris nigricantibus &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 60. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 12. Telephorus fuſcus.
Poda inſ. 40. *n.* 4.
Friſch inſ. 12. 3. *t.* 6. *f.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 33.
Schaeff. elem. t. 123. *f.* 1. 2.
ic. t. 16. *f.* 10. *et t.* 26. *f.* 9-12.
Habitat frequens in Europae *ſepibus, rapaciſſima, in propriam ſpeciem ſaeviens.*

marginella. 73. C. teſtacea, abdomine nigro marginato capite poſterius pectore oculisque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 631.
Habitat in Europa.

media. 74. C. fuſca, thorace, capite, antennarum baſi, abdominis margine et apice pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 632.
Habitat in Europa.

haematoſtoma. 75. C. nigra, ore abdomineque rufo. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 633.
Habitat in Europa.

punctata. 76. C. livida, oculis truncoque fuſcis, abdominis ſegmentis utrinque puncto fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 638.
Habitat in Europa.

dichroa. 77. C. nigra, fronte, thorace, abdomine pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 639.
Habitat in Europa.

multicolor. 78. C. capite nigro, fronte thoraceque luteis, elytris fuſcis, abdomine pedibusque lividis. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 640.
Habitat in Europa.

livens. 79. C. thoracis macula nigra poſterius triloba, utrinque punctis duobus impreſſis fuſcis, capite poſterius nigro, elytris fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 642.
Habitat extra Europam.

diſtincta. 80. C. nigra, maxillis thoracis abdominisque marginibus externis lividis. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 643.
Habitat in Europa.

exuſta. 81. C. fuſca, capite thoraceque nigris, elytris teſtaceis apice exuſtis, antennis pedibusque luteis. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 644.
Habitat in Europa.

lividá. 3. C. tota teſtacea. *Fn. ſuec.* 701.* *Scop. ent. carn.* 122. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258. *n.* 2. *mant. inſ. p.* 167. *n.* 2.
Raj. inſ. p. 84. *n.* 28. Cantharis ſepiarius major e ruſo flavicans.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 171. *n.* 2. Cicindela thorace rubro immaculato &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 70. *n.* 2. Thelephorus flavus.
Habitat in Europa *et boreali* America.

rufa. 4. C. tota rufa, epigaſtrio aliſque nigris. *Fn. ſuec.* 703.*
Habitat in Europa.

obſcura. 5. C. thoracis marginibus rubris, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 706. *Act. nidroſ.* 3. *p.* 396. *t.* 6. *f.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258 *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 16. *f.* 8.
Habitat in Europa, *thoracis margine aliquando fuſceſcente, pedibus interdum rubris, fuſcae ſimilis, at duplo minor.*

limbata. 20. C. fronte elytrorumque marginibus rufis, corpore nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 5.
Habitat in Jamaica, *mediae magnitudinis.*

lateralis. 6. C. thorace rubro, corpore fuſco, elytris margine exteriori flaveſcentibus. *Fn. ſuec.* 707.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 6.
Habitat in Europa *boreali.*

ſmaragdula. 22. C. thorace flavo: macula viridi, elytris viridibus nitidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 6.
Habitat in Braſilia, *mediae magnitudinis.*

biguttata. 11. C. thorace medio atro, elytris abbreviatis nigris apice flavis. *Fn. ſuec.* 712.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 261. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 176. *n.* 11. Cicindela fuſca, elytris apice flavis, thorace fuſco.
Degeer inſ. 4. *p.* 77. *n.* 10. Thelephorus niger, femoribus flavis, elytris apice luteis.
Habitat in Europae *nemoribus, hortis.*

minima. 12. C. thorace rufo: macula nigra, corpore fuſco, elytris apice flavis. *Fn. ſuec.* 713.* *Scop. ent. carn.* 128. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 260. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 22. *Leſk. it. p.* 47. *t.* A. *f.* 14.

Fn ſuec. 598.* Necydalis elytris apice puncto flavo.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 176. *n.* 10. *et. p.* 372. *t.* 7. *f.* 2. Necydalis elytris puncto flavo.
Habitat in Europae *hortis.*

cardiacae. 13. C. thorace ſubmarginato, corpore atro, antennis pectinatis, elytris apice puncto ſanguineo. *Fn. ſuec.* 720.*
Habitat in Europae *leonuro cardiaca.*

albicans. 14. C. thorace orbiculato, margine luteo, corpore nigro, fronte flava.
Habitat in Germania, *ſtatura c. cardiacae, magnitudine pediculi, tibiis anterioribus anterius flavis.* Forskåhl.

teſtacea. 15. C. thorace flavo: macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusque lividis. *Fn. ſuec.* 714.* *Scop. ent carn.* 123. *Fabr ſp. inſ.* 1. *p.* 261. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 23.
Fn. ſuec. 593. Cantharis nigra, elytris lividis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 173. *n.* 6. b. Cicindela nigra, thoracis margine flavo *&c.*
Degeer inſ. 4. *p.* 71. *n.* 4. Thelephorus niger, thorace ruſeſcente &c.
Schaeff. ic. t. 52. *f.* 8.
Habitat in Europae *hortis.*

atra. 16. C. corpore toto atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 8.
Habitat in Europa *boreali.*

marginata. 23. C. nigra, thoracis elytrorumque marginibus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 9.
Habitat in America.

bimaculata. 25. C. thorace ferrugineo: macula nigra, elytris teſtaceis: macula apicis nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 10.
Habitat in America *ſeptentrionali, nigra.*

pallipes. 28. C. atra, elytris pallidis apice fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 11.
Habitat in Germania, *ſtatura atrae.*

pallida. 29. C. atra, elytris pedibusque pallide teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 12.
Habitat Kilonii, *parva.*

30. C.

ruficollis. 30. C. atra, thorace abdomineque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 259. *n.* II. *mant. inſ.* I. *p.* 168. *n.* 13.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 6.
Habitat in Anglia.

flavipes. 31. C. teſtacea, capite thoracis macula media elytrisque dimidiato nigris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 259. *n.* 12. *mant. inſ.* I. *p.* 168. *n.* 14.
Habitat in Sina, *magna.*

melanocephala. 32. C. teſtacea, capite elytrorum apicibus tibiisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 260. *n.* 13. *mant. inſ.* I. *p.* 168. *n.* 15.
Habitat in Coromandel, *magna.*

bipunctata. 33. C. thorace punctis duobus nigris, elytris teſtaceis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 260. *n.* 14. *mant. inſ.* I. *p.* 168. *n.* 16.
Habitat Lipſiae.

angulata. 34. C. teſtacea, thorace angulato ſpinoſo, elytris apice cyaneis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 168. *n.* 17.
Habitat in oceani auſtralis inſula Amſterdam, *ſtatura et magnitudine melanurae.*

nigra. 35. C. pubeſcens, corpore nigro. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 168. *n.* 20.
Scop. ent. carn. 131. Cantharis piloſa.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 564. *n.* 28. *Fn. ſuec.* 439. Dermeſtes (niger) oblongus piloſus niger, elytris molliuſculis.
Fabr. ſp. inſ. I. *p.* 71. *n.* 5. Anobium nigrum.
Habitat frequens in Europae *floribus.*

pulicaria. 36. C. thorace rufo: macula nigra, elytris atris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 260. *n.* 17. *mant. inſ.* I. *p.* 168. *n.* 21.
Habitat in Germania, *atra.*

caneſcens. 37. C. thorace luteo, epigaſtrio elytrisque obſcure cinereis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* I. *p.* 302.
Habitat gregaria Halae Saxonum, *in betulis, quercubus, Majo et Junio conſpicua, fuſcae affinis.*

coccinea. 38. C. thorace rubro: macula nigra, corpore nigro, elytris ſanguineis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* I. *p.* 303.
Habitat rarior Halae Saxonum, *bipuſtulatae affinis.*

39. C.

bicolor. 39. C. lutea, elytris dimidiato-caeruleis. *Thunb. nov. inſ. ſp. 4. p. 81.*
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaberrima, ſtatura et magnitudine melanurae.*

bilineata. 40. C. thorace flavo: macula punctisque quatuor fuſcis, elytris flavis: linea fuſca. *Thunb. nov. inſ. ſp. 4. p. 81.*
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine teſtaceae.*

trilineata. 41. C. thorace flavo: maculis duabus nigris, elytris flavis: linea ſuturaque nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp. 4. p. 82.*
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine teſtaceae.*

Altica. 42. C. thorace rufo, elytris violaceis immaculatis. *Thunb. nov. inſ. ſp. 4. p. 82.*
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine et ſtatura pulicariae, glaberrima, violacea, pedibus rufeſcentibus.*

oculata. 43. C. thorace flavo: punctis duobus nigris, elytris corporeque cyaneis. *Thunb. nov. inſ. ſp. 4. p. 83.*
Habitat - - - bipuſtulata paulo minor, capite pedibusque flavis, elytris interdum violaceis.

collaris. 44. C. thorace ſanguineo: macula nigra, elytris cyaneis. *Thunb. nov. inſ. ſp. 4. p. 83.*
Habitat - - - ptini mollis magnitudine, nigra.

cuprea. 45. C. ſubtus cyanea, ſupra aenea. *Thunb. nov. inſ. ſp. 4. p. 83.*
Habitat - - - ptini mollis magnitudine, nitida, piloſa.

argentea. 46. C. thorace plano elytrisque viridibus, abdomine ſericeo-argenteo. *Thunb. nov. inſ. ſp. 4. p. 84.*
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine et facie fuſcae, capite nigro, ano pedibusque luteis, tarſis fuſcis.*

janthina. 47. C. thorace flavo: macula punctisque quatuor fuſcis, elytris viridibus. *Thunb. nov. inſ. ſp. 4. p. 84.*
β) Cantharis antennis flavis: extremis tribus articulis fuſcis.
γ) Cantharis thoracis macula fuſca, poſterius bifida, punctum nigrum includente.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine et facie fuſcae, pectore oculisque nigris, capite, antennis, abdomine pedibusque flavis.*

americana. 48. C. thorace flavo: macula nigra, elytris flavis: macula apicis trientali oblonga nigra. *Forſt. nov. inſ. ſp. 1. p. 50. n. 50.*
Habitat in Noveboraco, *fuſcae magnitudine, nigra, antennis fuſcis.*

ruſipes. 49. C. capite thoraceque rubris immaculatis, pedibus fulvis: poſterioribus apice nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 107. *n.* 2.
Habitat Berolini, *fuſcae affinis, ſed minor.*

beroli-nenſis. 50. C. nigra, antennis baſi elytriſque flaveſcentibus: his apice nigris, pedibus ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 108. *n.* 10.
Habitat Berolini, *lividae affinis, ſed minor.*

fulva. 51. C. fulva, capite, elytris et antennis dimidiato nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 108. *n.* 11.
Habitat Berolini, *fuſcae ſimilis, ſed quadruplo minor.*

ſerrata. 18. C. flaveſcens, elytris ſtriatis: faſciis tribus nigris, antennis ſerratis.
Habitat in America, *antennis nigris, longitudine corporis; an hujus generis?*

tropica. 19. C. thorace lateribus rubro, elytris nigris: faſcia alba, antennis pectinatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 80.* *Gron. zooph.* 515. *t.* 14. *f.* 7.
Habitat in America *auſtrali, an hujus generis?*

ſonchi. 52. C. atra, elytris fimbria lineaque longitudinali intermedia albis. *Lepechin it.* 1. *p.* 264.
Habitat in Sibiriae *ſoncho; an hujus tribus?*

caſpica. 53. C. viridis, elytris maculis duabus apicis flavis rhombeis. *Lepechin it.* 1. *t.* 16. *f.* 11.
Habitat ad mare caſpium, *parva; an huc referenda?*

flaveola. 54. C. ſubtus flava, capite antenniſque nigris, thorace ferrugineo: maculis duabus fuſcis, elytris ex luteo fuſcis apice flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 171. *n.* 12.
Habitat Berolini, *biguttatae affinis.*

violacea. 21. C. violacea, thorace teretiuſculo, antennis pectinatis, femoribus anterioribus craſſiſſimis dentatis.
Habitat in Guinea, *dermeſtis magnitudine, ano pedibuſque ferrugineis.*

vireſcens. 24. C. thorace teretiuſculo, corpore vireſcenti-fuſco, femoribus poſterioribus clavatis.
Habitat in Europa, *antennis nigris, elytris trilineatis.*

lepturoides. 55. C. lutea, thorae convexo, elytrorum apice corporeque nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 81.

Habitat ad caput bonae ſpei, *melanurae affinis, magnitudine lividae.*

nigripes. 56. C. lutea, thorace rotundato, abdomine, pedibus elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 260. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 18.

Habitat in Europa *boreali, etiam* Calabria, *melanurae proxime affinis, an ſatis a lepturoide diſtincta?*

melanura. 27. C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice nigris. *Fn. ſuec.* 719.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 260. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 19.

Raj. inſ. p. 84. *n.* 27. Cantharis ſepiarius, elytrorum apicibus nigris.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 173. *n.* 5. Cicindela rubra &c.

Schaeff. ic. t. 16. *f.* 14.

Habitat in Europae *hortis.*

Hiſtrio. 82. C. nigra, thorace, antennarum baſi, abdominis ſegmentorum baſi poſteriori pedibusque luteis, thoracis macula fuſca. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 645.

Habitat in Europa.

picea. 83. C. picea, thorace poſterius utrinque puncto rubro, antennarum baſi pedibusque luteis, femoribus baſi atris. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 646.

Habitat in Europa.

chalybea. 84. C. nigro-violacea pubeſcens. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 648.

Habitat in Europa.

tricolor. 85. C. nigra, elytris dimidio nigris, apicem verſus albis, ſummo apice geniculisque luteis. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 649.

Habitat in Europa.

** *palpis filiformibus: articulo ultimo ſetaceo,* Malachii.

aenea. 7. C. corpore viridi-aeneo, elytris extrorſum undique rubris. *Fn. ſuec.* 708.* *Scop. ent. carn. n.* 126. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 261. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 1.

Degeer inſ. 4. *p.* 73. *n.* 6. *t.* 2. *f.* 16. 17. Thelephorus aeneus.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 174. *n.* 7. Cicindela viridi-aenea, elytris extrorſum rubris.

Raj.

Raj. inſ. p. 77. *n.* 12.
Schaeff. monogr. 1754. *t.* 2. *f.* 10. 11.
icon. t. 18. *f.* 12. 13.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 5.
Habitat in Europae *plantis, tentaculis duobus obtuſis ſanguineis baſi connatis ad baſin abdominis aliisque duobus ad apicem thoracis exſerendis inſtructa, aliquando minor, elytris totis ſanguineis.*

bipuſtulata. 8. C. aeneo-viridis, elytris apice rubris. *It. oel.* 127. *Fn. ſuec.* 709.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 262. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 2. *Scop. ent. carn. n.* 127.
Raj. inſ. p. 101. *n.* 7. Cantharis vix $\frac{3}{8}$ unciae longa.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 175. *n.* 8. Cicindela aeneo-viridis, elytris apice rubris.
Degeer inſ. 4. *p.* 75. *n.* 7. Thelephorus viridi-aeneus nitidus.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 10. 11. *t.* 19. *f.* 14.
Habitat in Europa *frequens.*

haemorrhoidalis. 86. C. nigra, thorace elytrorumque apicibus rubris. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 660.
Habitat in Europa.

viridis. 57. C. aeneo-viridis, ore flaveſcente. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 3.
Habitat in Scania, *ſtatura et magnitudine bipuſtulatae.*

ſanguinolenta. 58. C. nigro-aenea, thoracis margine elytrisque ſanguineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 4.
Habitat Kilonii, *ſtatura aeneae, ſed duplo minor.*

cyanea. 59. C. cyanea, thorace abdomineque rubris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 169. *n.* 5.
Habitat in Hiſpaniae *umbellatis, ſtatura ſanguinolentae.*

pedicularia. 9. C. atra, elytris apice rubris. *Fn. ſuec.* 710.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 262. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 6.
Habitat in Europae *hortis, pediculo paulo major.*

nemoralis. 60. C. nigra, thorace margine, elytrisque apice rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 262. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 7.
Habitat Kilonii *in nemoribus.*

10. C.

An ad primam tribum referendi Thelephori Schaefferi *biſaſciatus ic. t.* 105. *f.* 9. a. 9. b. *et bipunctatus ic. t.* 41. *f.* 15. 16.

faſciata. 10. C. thorace ſubrotundo vireſcente, elytris nigris: faſciis duabus rubris. *Fn. ſuec.* 711.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 262. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 8.
Raj. inſ. p. 102. *n.* 22. Cantharis valde exigua.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 177. *n.* 12. Cicindela elytris nigris: faſciis duabus rubris.
Degeer inſ. 4. *p.* 76. *n.* 9.
Schaeff. ic. t. 189. *f.* 3.
Habitat in Europae *muſcis.*

equeſtris. 61. C. viridi-aenea, elytris rubris: faſcia viridi-aenea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 500. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 9.
Habitat in Italia, *ſtatura et magnitudine faſciatae.*

ochropus. 62. C. nigra, antennarum baſi tibiisque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 10.
Habitat Halae Saxonum, *parva nitida.*

chryſomeloides. 63. C. thorace rubro immarginato, elytris cyaneis laevibus, antennis pedibusque nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 17. *n.* 30.
Habitat Lutetiis, *magnitudine pediculi majoris, tacta ſub pectore caput et corpus contrahens et libera celerrime fugiens.*

caeruleocephala. 64. C. thorace rubro, immarginato, elytris fuſcis, capite anterius rubro, poſterius ex caeruleo nigro. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 18. *n.* 31.
Habitat circa Holmiam, *magnitudine teſtaceae, laterali ſimilis, ſed anguſtior et minor.*

ſuecica. 65. C. thorace flavo immarginato: punctis duobus nigris, elytris flaveſcentibus apice nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 18. *n.* 32.
Habitat in Suecia, *melanurae affinis, lividae magnitudine, ſtatura lepturae; an cum* 63 *et* 64 *hujus tribus?*

Herbſtii. 66. C. elytris rubris: macula nigricante. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 108. *n.* 4.
Habitat Berolini, *faſciatae magnitudine.*

erythromelas. 67. C. nigra, thoracis margine elytrisque rubris, ſegmentis abdominis tribus margine fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch.* 5. *p.* 108. *n.* 5.
Habitat Berolini, 3 *fere lineas longa.*

*** *palpis anterioribus porrectis: articulo penultimo appendice magna ovata fiſſa aucto, ultimo arcuato acuto*, Lymexyla.

abbreviata. 68. C. nigra, thoracis linea dorſali, elytris breviſſimis fornicatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 1.
Habitat in Sierra Leon Africae, *ſpeciebus hujus tribus major, elongata.*

proboſcidea. 69. C. nigra, elytris teſtaceis apice nigris, palpis hamato-irregularibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 256. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 2.
Habitat in Germaniae *lignis.*

barbata. 70. C. fuſca, antennis tibiisque piceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 3.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 322. *t.* 1. *f.* 7. Mordella (barbata) fuſca, palpis enſiformibus trilobis: lobis lateralibus latiſſimis.
Schaeff. ic. t. 279. *f.* 7. a. b.
Habitat in Germaniae *lignis, proboſcideae affinis, tomento aureo fugaci nitens.*

navalis. 26. C. thorace teretiuſculo, corpore luteo, elytris margine apiceque nigris. *Fn. ſuec.* 718.* *It. wgoth.* 153. *t.* 2.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 256. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 4.
Friſch inſ. 13. *p.* 24. *t.* 20.
Schaeff. ic. t. 59. *f.* 1.
Habitat in ligno querno, *quod deſtruit.*

ſaxonica. 71. C. nigro, elytris baſi, abdomine apice pedibusque flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 165. *n.* 5.
Habitat in Saxoniae *ligno, ſtatura et magnitudine navalis.*

morio. 72. C. nigra, pedibus anterioribus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 6.
Habitat in Saxoniae *lignis, ſaxonica duplo major.*

SERROPALPUS. *Antennae* ſetaceae.

Palpi quatuor inaequales; anteriores longiores profunde ſerrati: articulis quatuor; ultimo maximo, truncato, compreſſo apice patelliformi; poſteriores ſubclavati.

Thorax marginatus, anterius caput excipiens: angulo utrinque prominente.

Caput deflexum.

Pedes foſſorii.

ſtriatus. 1. S. corpore fuſco, elytris ſtriatis. *Hellenius nov. act. Stockh.* 1786. 4. *p.* 273. *t.* 8. *f.* 3-5.
Habitat in inſulae Runſalae *aedificiis ligneis vetuſtis, autumno veſpere ad parietes conſpicuus, elatere aterrimo vix major.*

laevigatus. 2. S. corpore atro, elytris laevibus. *Hellenius act. Stockh.* 1786. 4. *p.* 280.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 656. *n.* 37. *Fn. ſuec.* 742.* Elater (bupreſtoides) thorace caput recipiente, antennis pectinatis, corpore toto nigro.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 175. *n.* 55. Elater (bupreſtoides) cylindricus niger immaculatus, capite retracto.
Habitat in Europa.

209. ELATER. *Antennae* filiformes.

Palpi quatuor ſecuriformes.

Corpus dorſo impoſitum exſiliens mucrone pectoris e foramine abdominis reſiliente.

flabellicornis. 1. El. fuſcus, antennarum faſciculo flabelliformi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 651. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 1.
Drury inſ. 3. *t.* 47. *f.* 1.

Habitat in India, *inter maximos hujus generis, antennis brevibus, a tertio inde articulo ingenti ex* 8 *lamellis conflato flabello ornatis.*

faſcicularis. 37. El. thorace murino, elytris pallidis fuſco-undatis, antennarum faſciculo flabellicorni. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 2.
Habitat in America, *aeneo paulo major, murinus, antennis nigris.*

ſpecioſus. 2. El. albus, lineis punctis maculisque nigris.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 265. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 3. Elater albus nigro-maculatus.
Habitat in India, *noctiluco major.* Brünniche.

luridus. 39. El. cinereo-tomentoſus, elytris ſubſtriatis, plantis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 265. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 4.
Habitat in Coromandel, *magnus.*

oculatus. 3. El. thorace ocellis binis atris: iridibus albis, corpore nigricante. *Muſ. Lud. Ulr.* 81.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 265. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 5. Elater thorace ocellis duobus atris, corpore nigro albo-maculato.
Degeer inſ. 4. *p.* 159. *n.* 1. *t.* 17. *f.* 28. Elater niger, thorace maculis binis ovatis villoſis aterrimis.
Petiv. gaz. t. 10. *f.* 4. Scarabaeus elaſticus major, capite bimaculato.
Act. angl. 246. *p.* 396. *n.* 13. *et* 271. *p.* 842. *n.* 32.
Habitat in America *meridionali.*

luſcus. 40. El. thorace ocellis binis atris, corpore nigro immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 265. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 6.
Habitat in America.

caecus. 41. El. ater, thorace maculis duabus ocellaribus, elytris ſtrigis duabus arcuatis punctoque poſteriore ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 265. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 7.
Habitat in Africa.

noctilucus. 4. El. thoracis lateribus macula flava glabra. *Muſ. Lud. Ulr.* 82.* *Gron. zooph.* 474.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 265. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 8.
Degeer inſ. 4. *p.* 160. *n.* 2. *t.* 18. *f.* 1. Elater fuſcus, thoracis lateribus macula flava glabra convexa nitida.
Brown jam. 432. *t.* 44. *f.* 10. Elater major fuſcus phoſphoricus.

Sloan.

Sloan. jam. 2. *p.* 206. *t.* 237. *f.* 1. Scarabaeus *medius* fuſcus &c.
Mouff. inſ. 112. Cocujus.
Habitat in America *meridionali, thoracis ocellis lampyridum et fulgorarum more, noctu, ut fertur, pro arbitrio lucem tantam ſpargens, ut lecturo ſufficiat; abdomen diffractum intus lucet.*

phoſphoreus. 5. El. fuſcus, thorace poſterius maculis duabus flavis glabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 266. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 9.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 110. *n.* 1. *t.* 27. *f.* 2.
Degeer inſ. 4. *p.* 161. *n.* 3. *t.* 18. *f.* 2. Elater fuſco-caſtaneus.
Habitat in America *meridionali, noctiluco affinis, at duplo minor, quamvis europaeis ſpeciebus multo major; thoracis maculis noctu pariter lucentibus.*

ignitus. 42. El. fuſcus, thorace nigro: margine flavo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *phoſphoreo minor.*

fuſcipes. 43. El. ater, antennis pedibusque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 266. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 11.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 110. *n.* 3. *t.* 27. *f.* 4.
β) Elater elytris crenato-ſtriatis. *Muſ. Leſk. p.* 31. *n.* 684.
Habitat in India, *β*) *in* Europa.

rubiginoſus. 44. El. nigricans griſeo maculatus, thoracis limbo elytrorumque macula magna pallidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 12.
Habitat in Sierra Leon Africae, *magnus.*

porcatus. 6. El. viridi-aeneus, elytris ſulcatis: ſulcis villoſo-albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 266. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 15.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 652. *n.* 6. Elater fuſcus elytris nigris porcatis: ſulcis elevatis glabris.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 7.
Drury inſ. 3. *t.* 47. *f.* 6.
Habitat in America *meridionali, europaeis ſpeciebus major, pectoris ſutura atra nitida.*

ligneus. 7. El. ferrugineus, elytris mucronatis, antennis nigris. *Amoen. acad.* 6. *p.* 395. *n.* 24. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 266. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 13.
Gron. zooph. 477? Elater teſtaceus, thorace antice truncato, elytris poſtice acuminatis.
Habitat in America *meridionali.*

ſulcatus. 45. El. villoſo-albidus, elytris ſtriis tribus elevatis glabris atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 266. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 16.
Habitat in America *meridionali.*

virens. 46. El. villoſo-viridis, antennis ſerratis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 17.
Habitat in inſulis Americae *oppoſitis, ſtatura porcati.*

ſtriatus. 8. El. niger opacus, elytris ſtriatis: ſtriis ſubpubeſcentibus, ano villoſo.
Gron. zooph. 475. Elater vireſcens, elytris atris ſulcis albis ſtriatis, ano barbato.
Habitat Surinami, *magnitudine fere oculati.*

bipuſtulatus. 9. El. niger nitidus, elytris puncto baſeos nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 243. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 59.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 136. *n.* 15. Elater niger, elytrorum baſi maculis rubris.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 27. *f.* 8.
Habitat in Germaniae *graminoſis, mediae magnitudinis.*

brunneus. 10. El. thorace rufo medio nigro, elytris corporeque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 721. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 271. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 38.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 112. *n.* 17. *t.* 27. *f.* 6.
Habitat in Europae *hortis.*

ſyriacus. 11. El. thorace rufo, elytris faſcia duplici alba, corpore nigro. *Muſ. Lud. Ulr.* 83.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 269. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 26.
Habitat in Oriente. Haſſelquiſt.

cruciatus. 12. El. thorace nigro lateribus ferrugineo, coleoptris flavis: cruce margineque nigris. *Fn. ſuec.* 722.* *Gadd ſat.* 27. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 268. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 25.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 133. *n.* 6.
Degeer inſ. 4. *p.* 149. *n.* 9.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 10.
Habitat in Europae *graminoſis.*

linearis. 13. El. thorace rufo medio fuſco, elytris teſtaceis linearibus. *Fn. ſuec.* 723.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 269. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 29.
Fn. ſuec. 1. *n.* 582. Elater thorace rubro, elytris griſeis.
Uddm. diſſ. 46. Elater canthariformis niger, ano rufo, elytris ex rufo pallide fuſcis ſtriatis.

Degeer

Degeer inſ. 4. *p.* 154. *n.* 17.
Pontopp. atl. dan. t. 16.
Habitat in Europa *boreali.*

ruficollis. 14. El. niger, thorace poſterius rubro nitido. *Fn. ſuec.* 724.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 270. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 37.
Fn. ſuec. 576. Elater niger, thorace rubro.
Scop. ent. carn. 290. Elater gramineus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 132. *n.* 5.
Degeer inſ. 4. *p.* 153. *n.* 16.
Raj. inſ. p. 92. *n.* 8.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 3.
Habitat in Europae *graminoſis.*

lineatus. 15. El. niger, elytris obſcure lividis fuſco ſublineatis.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis, antennis ſubferrugineis.*

meſomelas. 16. El. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore elytrisque nigris. *Fn. ſuec.* 725.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 35.
Habitat in Europa *boreali, lineato paulo major, larva hexapus filiformis duriuſcula, caudae ſcuto corneo lateribus dentato, ſubtus tuberculo conico pediformi tubuloſo, in ligno putreſcente.*

thoracicus. 47. El. niger, thorace toto rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 36.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 132. *n.* 5. Elater niger, thorace rufo.
Habitat prope Hemly Anglorum, *ruficolli affinis.*

aterrimus. 17. El. thorace atro nitido, elytris ſtriatis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 18.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 653. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 726.* *Uddm. diſſ.* 45. Elater ater, thorace opaco punctato, elytris ſtriatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 136. *n.* 13. Elater totus niger nitidus.
Habitat in Europa *boreali.*

caſtaneus. 18. El. thorace teſtaceo pubeſcente, elytris flavis apice nigris, corpore atro. *Fn. ſuec.* 727.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 269. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 27.
Degeer inſ. 4. *p.* 153. *n.* 15. Elater flavo-pectinicornis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 132. *n.* 4.
Raj. inſ. p. 192. *n.* 6.

 Liſt.

Liſt. loqu. 387.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 9. *et t.* 31. *f.* 4.
Habitat in Europae *campis*.

vireſcens. 48. El. thorace viridi: ſulco medio, elytris flavis mucronatis: apice macula vireſcenti-nigra oblonga. *Schranck Schr. der berl. Naturf. Fr.* 2. *p.* 317.
Scop. ent. carn. n. 286. *Schranck inſ. auſtr. n.* 237. Elater caſtaneus.
Poda muſ. p. 41. *n.* 1. Elater pectinicornis.
Habitat in Auſtria *et* Carniolia, *viridi-aeneus*.

livens. 19. El. niger, thorace glaberrimo rubro, elytris teſtaceis. *Fn. ſuec.* 728.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 269. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 28.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 8.
Habitat in Europa *boreali*.

ferrugineus. 20. El. thorace elytriſque ferrugineis, corpore thoraciſque margine poſteriore nigris. *Fn. ſuec.* 729.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 266. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 14.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 130. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 4. Elater thorace elytriſque rubris.
Schaeff. ic. t. 19. *f.* 1.
Habitat in Europa.

haematodes. 48. El. niger, thorace pubeſcente fulvo, elytris ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 271. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 39.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 9. Elater ſanguineus.
β) Elater thorace nigro. *Schaeff. ic. t.* 2. *f.* 6.
Habitat in Germania *et* Calabria.

ſanguineus. 21. El. ater, elytris ſanguineis. *Fn. ſuec.* 731. *Scop. ent. carn.* 287. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 271. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 40.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 131. *n.* 2. *Degeer inſ.* 4. *p.* 151. *n.* 13. Elater niger, elytris rubris.
Schaeff. el. t. 60. *f.* 2.
ic. t. 31. *f.* 7.
Bergſtr. nomencl. t. 10. *f.* 10.
Habitat in Europae *graminoſis, elytrorum ſummo apice nigro*.

balteatus. 22. El. niger, elytris anterius dimidiato rufis. *Fn. ſuec.* 732. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 271. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 41.
Degeer inſ. 4. *p.* 152. *n.* 14.

Raj. inſ. p. 78. *n.* 23.
Schaeff. ic. t. 77. *f.* 2.
Habitat in Europae *arvis.*

elongatus. 49. El. ater, elytris teſtaceis apice nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 42.
Habitat in Auſtria, *balteato proxime affinis.*

melanocephalus. 50. El. ſanguineus, capite, thoracis linea dorſali elytrorumque apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n* 43. *Thunberg nov. inſ. ſp.* 3.
Habitat in Coromandel *et ad* caput bonae ſpei, *balteato paulo minor, ceterum ejusdem ſtaturae.*

marginatus. 23. El. thorace ſubfuſco, elytris teſtaceis: margine undique nigro. *Fn. ſuec.* 733.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 34.
Act. nidroſ. 3. *p.* 16. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat in Europa *boreali.*

ſputator. 24. El. thorace fuſco nitido, elytris teſtaceis, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 734.* *Scop. ent. carn.* 285. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 44.
Degeer inſ. 4. *p.* 151. *n.* 11. Elater fuſcus flavipes.
Schaeff. ic. t. 19. *f.* 11.
Habitat in Europa *boreali.*

piloſus. 51. El. fuſcus cinereo-ſubvilloſus, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 45. *Lesk. it.* 1. *p.* 11. *n.* 1. *t.* A. *f.* 1.
Habitat in Luſatiae *montibus, parvus.*

pallipes. 52. El. fuſcus, elytris ſtriatis, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 46.
Habitat Tranquebariae *parvus.*

ſuecicus. 53. El. niger, elytris lineatis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 47.
Habitat in Sueciae *graminoſis.*

minutus. 34. El. thorace atro nitido, elytris nigris. *Fn. ſuec.* 744.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 48.
Habitat in Europa *plantis, parvus, niger, immaculatus.*

limbatus. 54. El. thorace atro nitido, elytris teſtaceis limbo nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 49. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 64.
Habitat Kilonii *et ad* caput bonae ſpei.

advena. 55. El. ater, elytris ſtriatis pedibusque obſcure cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 50.
Habitat prope Biſertam Hiſpaniae, *parvus.*

marginellus. 56. El. thorace nigro: margine ferrugineo, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 372. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 51.
Habitat in Germania, *limbato ſimillimus, at paulo major.*

obſcurus. 25. El. piceus thorace elytrisque obſcure nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 269. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 30.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 655. *n.* 25. *Fn. ſuec.* 735. Elater thorace fuſco obſcuro, elytris obſcure teſtaceis.
Habitat frequens in Europae *borealis plantis.*

flavipes. 57. El. thorace obſcure nigro, elytris ſtriatis fuſcis, pedibus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 31.
Habitat in inſulis Americae *oppoſitis.*

filiformis. 58. El. ex cinereo fuſcus immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 32.
Habitat in Italia, *filiformis, obſcuro duplo minor.*

triſtis. 26. El. thorace atro nitido, elytris baſi margineque exteriori lividis. *Fn. ſuec.* 736.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 33.
Schaeff. ic. t. 194. *f.* 1.
Habitat in Europae *ligno putreſcente.*

faſciatus. 27. El. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus: faſcia alba undulata. *Fn. ſuec.* 737.* *Scop. ent. carn.* 281. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 21.
Habitat in Europae *hortis.*

murinus. 28. El. thorace obſcure cinereo, elytris cinereo nebuloſis, plantis rufis. *Fn. ſuec.* 738.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 19.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 135. *n.* 10. Elater niger, elytris villoſo-murinis.
Degeer inſ. 4. *p.* 150. *n.* 10. Elater rufipes.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 6.
Habitat in Europa.

teſſellatus. 29. El. thorace obſcure aeneo, elytris aeneis: maculis pallidioribus confertis, unguibus rubris. *Fn. ſuec.* 739.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 20.
Geoffr.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 135. *n.* 9. Elater niger villoſo-undatus.
Degeer inſ. 4. *p.* 148. *n.* 7. Elater rufo-unguiculatus.
Scop. ent. carn. 282. Elater thoracicus.
Gadd Sat. 80. Elater niger, pilis minimis flavo-aeneis junctim intermixtis.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 7.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 111. *n.* 7. *t.* 22. *f.* 5.
Habitat in Europae *hortis, ſcutello pallido.*

germanus. 30. El. thorace elytrisque atro-caeruleis, corpore toto pedibusque nigris. *Fn. ſuec.* 730.*
Scop. ent. carn. 279. *Schranck inſ. auſtr. p.* 183. *n.* 340? Elater nitens.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 8. Elater latus.
Habitat in Europa, *an mera aenei varietas?*

aeneus. 31. El. thorace elytrisque aeneis, antennis nigris ſimplicibus. *Fn. ſuec.* 740.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 22.
Fn. ſuec. 578. Elater viridi-aeneus, pedibus fulvis.
Degeer inſ. 4. *p.* 149. *n.* 8. Elater aeneus rufipes.
Act. Nidroſ. 3. *t.* 4. *f.* 6.
β) Elater fuſcus latior. *Muſ. Lesk. p.* 31. *n.* 681.
Habitat in Europae *nemoribus.*

pectinicornis. 32. El. thorace elytrisque aeneis, antennis maris pectinatis. *Fn. ſuec.* 741. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 268. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 23. *Scop. ent. carn.* 278.
Fn. ſuec. 575. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 133. *n.* 7. Elater fuſco-aeneus.
Degeer inſ. 4. *p.* 145. *n.* 2. *t.* 5. *f.* 3. Elater aeneo-pectinicornis.
Raj. inſ. p. 92. *n.* 7.
Liſt. angl. p. 387. *n.* 19.
Poda inſ. t. 1. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 36.
Schaeff. el. t. 11. *f.* 1. *et t.* 60. *f.* 3. *ic. t.* 2. *f.* 4.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 11.
Habitat in Europae *nemoribus.*

cupreus. 59. El. cupreus, elytris dimidiato flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 268. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 24.
Schaeff. ic. 1. *t.* 38. *f.* 2.

Habitat

Habitat in Anglia, *antennis nigris pectinatis, rarius ſimplicibus.*

niger. 33. El. thorace laevi, elytris pedibus corporeque nigris. *Fn. ſuec.* 743.*
Fn. ſuec. 577. Elater totus nigro-fuſcus.
Liſt. mut. t. 17. *f.* 14.
Raj. inſ. p. 92. *n.* 1. 2. 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 134. *n.* 8.
Schaeff. ic. t. 174. *f.* 4.
β) Elater nigricans. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 33.
Habitat in Europa, β) *dimidio minor.*

nitidulus. 60. El. ater, elytris ſtriatis: maculis duabus, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 52.
Habitat in Cayenna, *pulchello triplo minor.*

pulchellus. 35. El. capite thoraceque atris, elytris nigris, maculis flavicantibus, pedibus flavis. *Fn. ſuec.* 745.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 53.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 112. *n.* 22. *t.* 27. *f.* 7. *b.*
Habitat in Europa *boreali.*

ſexguttatus. 61. El. laevis ater, elytris punctis tribus albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 65. *f.* 75. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 54.
Habitat ad caput bonae ſpei, *minimus, nitidus.*

tetraſtichon. 36. El. niger luteo-maculatus, elytris maculis confluentibus; abdomine quadrifariam punctato.
Habitat in Africa, *mediae magnitudinis.*

dermeſtoides. 38. El. ſubvilloſus cinereus, elytris ſtriatis, capite retracto. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 56.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 656. *n.* 38. *n.* 38. Elater ſubpubeſcens ſubfuſcus, antennis ſubclavatis.
Habitat in Suecia, *dermeſtis facie, parvus.*

notatus. 62. El. thorace rufo nigro bimaculato, elytris baſi rufis, apice nigris: maculis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 273. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 57.
Habitat in Coromandel, *parvus, ſtatura pulchelli.*

feſtivus. 63. El. thorace ferrugineo, elytris atris: faſciis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 273. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 58.
Thunb. nov. inſ. ſp. 3. *p.* 64. *f.* 74.
Habitat in Africa, *magnitudine balteati.*

deuſtus. 64. El. teſtaceus, linea thoracis elytrorumque poſterius ramoſa nigra. *Thunb. nov. inſ. ſpec* 3. *p.* 64.
Habitat in Zeylona, *melanocephalo duplo minor, tenuiſſime pubeſcens.*

clavicornis. 65. El. viridis, antennis clavatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 65.
Habitat in India, *pecticorni major, glaberrimus, nitens, an hujus generis?*

uſtulatus. 66. El. niger, elytris teſtaceis poſterius fuſceſcentibus, antennis pedibusque caſtaneis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 303.
Schaeff. ic. t. 199. *f.* 8.
Habitat - - - - *magnitudine caſtanei, facie balteati.*

giganteus. 67. El. depreſſus, elytris viridi-aeneis: macula flava, pectore abdomineque flavis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 304. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in America *bupreſtis facie.*

indicus. 68. El. niger, thorace convexo punctato: margine fulvo, medio ſinuato, elytris atris punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 110. *n.* 2. *t.* 27. *f.* 3.
Habitat in America, *phoſphoreo minor, et anguſtior.*

carbonarius. 69. El. ater atro-farinoſus: punctis minutiſſimis albis interjectis, antennis ſerratis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 184. *n.* 343.
Herbſt Beſch. der berl. Naturf. *Fr.* 4. *t.* 7. *f.* 1. Elater punctatus.
Habitat in Germania.

undulatus. 70. El. niger flavo-undulatus pubeſcenti-nitens. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 111. *n.* 8.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 7.
Habitat in Germania.

caeruleus. 71. El. chalybeus, antennis nigris ſimplicibus, pedibus ex atro fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 111. *n.* 10.
Habitat Berolini, *aeneo proxime affinis.*

ſanguinolentus. 72. El. ater, elytris ſanguineis: margine interiori macula magna ovata atra communi. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 69. §. 16. *t.* 3. *f.* 15. *inſ. auſtr. p.* 184. *n.* 341. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 112. *n.* 24. *t.* 27. *f.* 9.
Habitat in Germania, *an mera ſanguinei varietas?*

73. El.

purpureus. 73. El. niger, thorace atro: vellere raro purpureo, elytris purpureis: lineis duabus elevatis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 187. *n.* 350.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 113. *n.* 25. *t.* 27. *f.* 10.
Habitat in Auſtria, *ſanguineo affinis, at magis depreſſus.*

quercinus. 74. El. fuſcus, capite thoraceque granulatis: villis flavis undulatis, elytris faſcia flavo-villoſa. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 113. *n.* 26. *t.* 27. *f.* 11.
Habitat in Ungaria *et* Germania, *in quercu.*

erythropus. 75. El. niger, elytris flavicanti-villoſis, punctato-ſtriatis, pedibus antennarumque articulis margine ſpadiceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 113. *n.* 28. *t.* 27. *f.* 12.
Habitat Berolini.

hirtus. 76. El. nitenti-niger pubeſcens, thorace punctato, elytris ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 30.
Habitat Berolini, *magnitudine erythropodis, at paulo latior.*

vulgaris. 77. El. niger, elytris fuſcis punctato-ſtriatis: ſutura nigra, pedibus pallidis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 114 *n.* 32.
Habitat Berolini.

griſeus. 78. El. obſcure griſeus, thorace convexo, elytris punctato-ſtriatis, ſubtus nigris, antennis pedibusque fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 34.
Habitat Berolini.

cinereus. 79. El. niger pubeſcenti-canus, thorace convexo, tarſis ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 35.
Habitat Berolini, *magnitudine et ſtatura griſei.*

equiſeti. 80. El. niger, thorace convexo, elytris ſtriatis, pedibus flaveſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 36.
Habitat Berolini, 3 *lineas longus, ſtatura cinerei.*

pulverulentus. 81. El. niger vireſcenti-aureo irroratus, elytris ſtriatis, tibiis intus criſpo-piloſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 172. *n.* 38. *t.* 48. *f.* 1.
Habitat in America, *inter maximos hujus generis.*

ſocialis. 82. El. fuſcus, antennis elytrorumque marginibus ferrugineis. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 9.
Habitat in Luſitania, *magnitudine pectinicornis.*

83. El.

ſerraticornis. 83. El. fuſcus, abdomine ſupra pedibusque fulvis. *Scop. ent. carn. n.* 280.
Habitat in Carniolia.

montanus. 84. El. villoſulus niger nitens, antennis baſi tibiisque fulvis. *Scop. ent. carn. n.* 283.
Fueſſli Verz. ſchw. Inſ. p. 17. *n.* 334.
Habitat in Carnioliae *et* Helvetiae *montibus.*

degener. 85. El. niger aureo punctatus variegatus, thorace poſterius dentato. *Scop. ent. carn. n.* 292.
Habitat in Carniolia.

ſubfuſcus. 86. El. niger, elytris fuſcis, abdomine rubro. *Müll. zool. dan. prodr p.* 59. *n.* 538.
Müll. Fn. Fridrichsd. p. 17. *n.* 169.
Habitat in Dania.

ſeelandicus. 87. El. ex purpureo aeneus griſeo-villoſus, elytris ſtriato-punctatis nebuloſis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 61. *n.* 550. *Fn. Fridrichsd. p.* 17. *n.* 170.
Habitat in Seelandia Daniae.

ſexmaculatus. 88. El. niger griſeo-villoſus, thoracis margine elytrisque teſtaceis: maculis ſex ſubfuſcis glabris. *Müll. Fn. Fridricbsd. p.* 17. *n.* 171. *zool. dan. prodr. p.* 60. *n.* 544.
Habitat in Dania.

obtuſus. 89. El. corpore obtuſo ſubtus nigro, thorace nigro, elytris fuſcis griſeo-villoſis, antennis rufis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 147. *n.* 5. *t.* 5. *f.* 19.
Müll. Fn. Fridrichsd. p. 17. *n.* 172. *zool. dan. prodr. p.* 60. *n.* 540. Elater badius.
Habitat in Europa *boreali.*

pullus. 90. El. niger nitidus pubeſcens, elytris punctatis, pedibus brunneis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 59. *n.* 537.
Habitat in Dania.

chryſomelinus. 91. El. niger, thorace rubro ſulcato, elytris tarſisque flavis. *Müll. zool. dan. prodr p.* 60. *n.* 539.
Habitat in Dania.

lugubris. 92. El. ſupra ater, opacus, ſubtus niger. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 60. *n.* 545.
Habitat in Dania.

Mülleri. 93. El. rufus pubeſcens, pedibus luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 61. *n.* 551.
Habitat in Dania.

tubercula-tus. 94. El. niger opacus, thorace bituberculato, elytris laeviſſime ſtriatis, punctis ferrugineis. *Pontopp. hiſt. nat. Dan. p.* 208. *n.* 13. *t.* 16.
Habitat in Dania, *magnitudine pectinicornis.*

gracilis. 95. El. teſtaceus, capite thoraceque linea longitudinali, macula laterali atra, elytris laeviſſimis, margine atro. *Gron. muſ.* 1. *p.* 153. *n.* 478.
Habitat in America.

guineen-ſis. 96. El. viridi-aeneus, thorace ſubpubeſcente, antennis nigris, elytris ſtriatis. *Gron. muſ.* 2. *p.* 153. *n.* 476.
Habitat in Guinea.

fimbria-tus. 97. El. niger, thoracis margine rubro, elytris ad ſuturam lineis duabus longitudinalibus flavis interruptis. *Lepechin it.* 1. *p.* 311. *t.* 16. *f.* 12.
Habitat in deſerto Sibiriae Uralenſi.

auratus. 98. El. viridi-aureus, pedibus nigris. *Drury inſ.* 2. *p.* 65. *t.* 35. *f.* 3.
Habitat in Sina.

hiſtrio. 99. El. niger, elytris flavis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 131. *n.* 3. Elater nigro-flavus.
Habitat in Gallia.

vittatus. 100. El. niger, elytris fuſcis: faſcia longitudinali fulva.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 135. *n.* 11. Elater bicolor.
Raj. inſ. p. 78. *n.* 13.
Habitat in Gallia.

fuſcatus. 101. El. niger, elytris fuſcis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 136. *n.* 12. Elater bicolor.
Habitat in Gallia.

diſcolor. 102. El. niger pedibus rufis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 136. *n.* 14. Elater rufipes.
Habitat in Gallia.

mela-nophthal-mos. 103. El. rufus, oculis nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 144. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 18.
Habitat in Suecia, *pollicem longus.*

major. 104. El. nigro-fuſcus nitidus, pedibus fuſco-caſtaneis, abdomine ſupra rubente. *Degeer inſ.* 4. *p.* 146. *n.* 3.
Habitat in Europa, *magnus.*

minor. 105. El. elongatus capite thoraceque nigris, elytris antennis pedibusque fuſcis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 147. *n.* 4.
Habitat in Europa, *inter minores.*

inaequalis. 106. El. niger: maculis villoſis griſeis, elytris ſcabris, thorace cavitatibus impreſſis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 148. *n.* 6.
Habitat in Europae *arboribus, magnus.*

undatus. 107. El. griſeo-marinus villoſus, elytris faſciis tribus undulatis tranſverſis nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 155. *n.* 18. *t.* 5. *f.* 26.
Habitat in Europa, 7 *lineas longus.*

maculoſus. 108. El. capite nigro, thorace rufo: maculis tribus oblongis nigris, elytris fuſceſcentibus. *Degeer inſ.* 4. *p.* 158. *n.* 19.
Habitat in Europa, *minor.*

nitidus. 109. El. nigro-viridi-aeneus nitidus, pedibus nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 159. *n.* 21.
Habitat in Europa, *puſillus.*

piceus. 110. El. totus ater nitidus, elytris laeviſſimis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 162. *n.* 4. *t.* 18. *f.* 3.
Habitat in Penſylvania, *pollicem longus.*

lividus. 111. El. pallide fuſco-rufeſcens antennis rufis, pedibus flavo-teſtaceis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 162. *n.* 5. *t.* 18. *f.* 4.
Habitat in Penſylvania, *dimidium pollicem longus.*

ochropus. 112. El. nigro-fuſcus, pedibus antennisque flavo-teſtaceis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 163. *n.* 6. *t.* 18. *f.* 5.
Habitat Surinami, 4½ *lineas longus.*

maculatus. 113. El. obſcure teſtaceus, thorace anterius nigro, elytris maculis binis irregularibus nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 163. *n.* 7. *t.* 18. *f.* 6.
Habitat Surinami, 3 *modo lineas longus.*

ſegetis. 114. El. niger, antennis tarſisque fuſcis, elytris lineis longitudinalibus nigris fuciſque. *Bjerkand act. Holm.* 1779. 4. *n.* 4. *p.* 254. *t.* 10. *f.* 1.-3.
Habitat in Sueciae *ſegetis radicibus, agros larva devaſtante, praeſertim ſiccos, tardam ſubeunte metamorphoſin.*

dubius. 115. El. viridi-aeneus, thorace pedibusque nigris. *Mayer Abh. boehm. Geſ. 4. p. 183.*
Habitat in Bohemiae *pratis, grani oryzae magnitudine, an propria ſpecies?*

punctatus. 116. El. elongatus fuſcus, thorace punctato, elytris crenato-ſtriatis, ore pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p. 31. n. 671.*
Habitat in Europa.

dichrous. 117. El. niger, thorace linea longitudinali, elytris baſi ſulcatis apicem verſus complanatis, tibiis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p. 31. n. 673.*
Habitat in Europa.

pubeſcens. 118. El. piceus pubeſcens, elytris ſtriatis, plantis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p. 31. n. 674.*
Habitat in Europa.

villoſus. 119. El. fuſcus cinereo-villoſus, elytris laeviſſime ſtriatis, antennis pedibusque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p. 31. n. 682.*
Habitat in Europa.

crenatus. 120. El. niger, elytris crenato-ſtriatis punctatisque, pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p. 31. n. 683.*
Habitat in Europa.

ambiguus. 121. El. niger, elytris rufo-teſtaceis ſtriatis, plantis teſtaceis. *Muſ. Lesk. p. 32. n. 688.*
Habitat - - - - -

lineolatus. 122. El. niger, thoracis linea longitudinali, elytris crenato-ſtriatis. *Muſ. Lesk. p. 32. n. 689.*
Habitat in Europa.

longicornis. 123. El. niger, elytris obſolete ſtriatis, antennis longis. *Muſ. Lesk. p. 32. n. 690.*
Habitat in Europa.

concolor. 124. El. fuſcus, thorace punctato, elytris leviſſime ſtriatis, antennis pedibusque rufo-fuſcis. *Muſ. Lesk. p. 32. n. 691.*
Habitat in Europa.

variabilis. 125. El. fuſcus flavo-villoſus, pedibus rufis, elytris leviſſime ſtriatis: maculis fuſcis incerta directione lucis inconſpicuis. *Muſ. Lesk. p. 32. n. 693.*
Habitat in Europa.

rubigineus. 126. El. ferrugineus, thorace fuſco punctato, elytris crenato-ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 694.
Habitat in Europa.

villoſus. 127. El. fuſco-ferrugineus griſeo-villoſus, thorace pectoreque fuſcis, elytris leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 695.
Habitat in Europa.

tricolor. 128. El. ferrugineus, capite thoraceque fuſco, hujus marginibus externis, elytris punctato-ſtriatis, antennis pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 696.
Habitat in Europa.

haemopterus. 129. El. niger, elytris ſanguineis: ſuturae macula communi oblonga picea. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 697.
Habitat in Europa.

craſſipes. 130. El. niger, elytris leviſſime ſtriatis, femoribus craſſis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 699.
Habitat in Europa.

acupunctatus. 131. El. teſtaceus, thoracis dorſo fuſceſcente, elytris ſtriatis: ſtriis punctis diſtinctis impreſſis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 701.

gibbus. 132. El. fuſcus griſeo-villoſus, elytris leviſſime ſtriatis thoraceque gibbis, antennis pedibusque fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 698.
Habitat in Europa.

pubes. 133. El. ater pubeſcens, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 702. 703.
Habitat in Europa.

cineraſcens. 134. El. teſtaceus cinereo-villoſus, thorace fuſceſcente, pedibus rufis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 704.
Habitat in Europa.

bicolor. 135. El. fuſco-ferrugineus, capite thoraceque fuſcis, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 705.
Habitat in Europa.

quadriſulcus. 136. El. niger, elytris obſolete ſtriatis, baſi ſulcis quatuor impreſſis, antennis longis tibiis plantisque anticis fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 706.
Habitat in Europa.

ſtrigoſus. 137. El. teſtaceo-fuſcus, elytris ſtriatis, pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 708.
β) Elater elytris fuſceſcentibus verſus apicem, elytris totis teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 707.
Habitat in Europa.

ſuturalis. 138. El. fuſcus, thoracis margine ferrugineo, elytris teſtaceis: ſutura fuſca. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 711.
Habitat in Europa.

dentatus. 139. El. thorace atro: macula utrinque dentibusque rubris, elytris teſtaceis: marginibus externis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 713.
Habitat in Europa.

capucinus. 140. El. niger, elytris pedibus anticis tibiisque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 718.
β) Elater elytris apice fuſceſcentibus, pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 714.
Habitat in Europa.

gibboſus. 141. El. taſtaceus, thorace gibboſo obſcuro, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 720.
Habitat in Europa.

ſoricinus. 142. El. murinus, thorace gibbo, elytris teſtaceis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 721.
Habitat in Europa.

rufipes. 143. El. niger, elytris ſtriatis, tibiis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 723.
β) Elater elytris tibiisque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 722.
Habitat in Europa.

funereus. 144. El. teſtaceus, elytris ſtriatis, capite fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 724.
Habitat in Europa.

chalybeus. 145. El. nigro-aeneus nitidus, femorum anticorum baſi tibiisque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 725.
Habitat in Europa.

obſcurus. 146. El. ferrugineus, capite thoraceque fuſcis, hoc poſterius, elytris pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 726.
Habitat in Europa.

fuliginoſus. 147. El. piceus ſubpubeſcens, antennis, pedibus elytriſque teſtaceis: his margine fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 728.
Habitat in Europa.

puſillus. 148. El. brunneus, antennarum articulis tribus ultimis lamellatis, elytris leviſſime ſtriatis pubeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 730.
Habitat in Europa, *ſtatura dermeſtoidis, magnitudine pediculi.*

Limbellus. 149. El. thorace ſordide flavo: diſco fuſco, elytris ſtriatis nigrofuſcis: margine omni flaveſcente. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 23.
Habitat ad caput bonae ſpei, *inter minores.*

210. CICINDELA.

Antennae ſetaceae.
Palpi ſex filiformes: poſteriores piloſi.
Mandibula prominens, multidentata.
Oculi prominuli.
Thorax rotundato-marginatus.

* *labio tridentato.*

longicollis. 15. C. cyanea, thorace elongato cylindrico, femoribus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 1.
Habitat in Siam, *magna, elongata.*

groſſa. 16. C. nigra, elytris acuminatis: maculis tribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 2.
Habitat in Coromandel, *maxima.*

cyanea. 17. C. cyanea nitida, ore teſtaceo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 285. *n.* 3.
Habitat in India, *ſubtus nitidior, antennis fuſcis.*

bicolor. 18. C. viridis nitida, elytris obſcure cyaneis immaculatis, abdominis margine teſtaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 283. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 4.
Habitat in Italia, *magnitudine et ſtatura campeſtris.*

campe-ſtris. 1. C. viridis, elytris punctis quinque albis. *Fn. ſuec.* 746.* *Scop. ent. carn.* 181. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 283. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 5.
Degeer inſ. 4. *p.* 113. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 1. Cicindela viridis nitida.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 153. *n.* 27. Bupreſtis inauratus ſupra viridis &c.
Mouff. inſ. 145. *f. infim.* Cantharis quarta.
Jonſt. inſ. t. 15. Cantharis Mouffeti minor quarta.
Liſt. loq. 386. *mut. t.* 17. *f.* 12. Scarabaeus viridis &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 37.
Schaeff. ic. t. 34. *f.* 8 9. *et t.* 228. *f.* 3.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 15. *n.* 8–11. *t.* 2. *f.* 8–11.
Habitat in Europae *campis arenoſis.*

hybrida. 2. C. ſubpurpuraſcens, elytris faſcia lunulisque duabus albis. *Fn. ſuec.* 747.* *Scop. ent. carn.* 183. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 283. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 6.
Degeer inſ. 4. *p.* 115. *n.* 3. *t.* 4. *f.* 8. Cicindela maculata.
Schaeff. elem. t. 43.
icon. t. 35. *f.* 10.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 26. *t.* 4. *f.* 5.
Habitat in Europae *ſabuloſis.*

capenſis. 3. C. ſubaenea, elytris albis: linea fuſca triramoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 84.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 285. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 14.
Degeer inſ. 7. *t.* 47. *f.* 3.
Voet. coleopt. t. 40. *f.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 11.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 27. *f.* 14?
Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* Calabria.

germanica. 4. C. cuprea, elytris viridibus puncto lunulaque apicum albis. *Scop. ent. carn.* 182. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 285. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 15.
Schreb. inſ. 10. *n.* 5. Cicindela obſcurior viridis, elytris punctis quatuor lineolaque albis.

Geoffr.

Cicindelae *in locis petroſis, aridis, praeſertim arenoſis, habitant, inſectorum aliorum, larvarum quoque, etiam hirſutarum tigrides: larva mollis, alba, longa, hexapus, in foraminibus cylindricis ſub terra latet, famelia prodiens inſectis praetereuntibus inhians, mandibula forcipata arripiens, et in foveam trahens, in qua etiam declaratur.*

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 155. *n.* 29. Bupreſtis inauratus ſupra fuſco-viridis, coleoptris punctis ſex albis.
Poda inſ. 42. *n.* 3.
Gron. zooph. 167.
Habitat in Germaniae *arenoſis, campeſtri ſimillima, ſed triplo minor, colore viridi, nigro et caeruleo varians.*

tuberculata. 19. C. thorace fuſco bituberculato, elytris fuſco viridique variis: margine tridentato albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 285. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 16.
Habitat in nova Seelandia.

unipunctata. 20. C. ſubpurpuraſcens, labio elytrisque puncto albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 285. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 17.
Habitat in America.

ſexpunctata. 21. C. viridi-aenea, elytrorum diſco obſcuriore: punctis tribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 285. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 18.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *t.* 46. *f.* 1.
Habitat ad littus Malabaricum.

quadrilineata. 22. C. viridi-aenea, elytris obſcuris: margine lineaque media albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 285. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 19.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 27. *f.* 15.
Habitat in India, *magnitudine ſexpunctatae.*

biramoſa. 23. C. obſcure aenea, elytrorum margine biramoſo albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 286. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 20.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 26. *f.* 40. Cicindela (tridentata) purpuraſcenti-aenea, elytris linea marginali tridentata.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 115. *n.* 7. *t.* 27. *f.* 16.
Habitat in India.

ſexguttata. 24. C. viridis nitida, elytris punctis tribus marginalibus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 286. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 21.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 27. *f.* 17.
Habitat in Virginia, *labio ſuperiori flavo.*

Catena. 25. C. viridi-aenea, elytris albidis: punctis ſex viridibus concatenatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 286. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 22.
Thunb. nov. inſ. ſp. 2. *t.* 1. *f.* 41-43. Cicindela viridi-aenea, elytris linea flava triramoſa.
Habitat in India.

marginata. 26. C. viridis, elytris margine faſcia undata punctisque duobus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 286. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 23.
Habitat in Virginia.

octoguttata. 27. C. obſcura, elytris punctis quatuor diſci lunulisque duabus marginalibus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 24.
Habitat in America, *parva.*

trifaſciata. 28. C. obſcura, elytris ſtrigis tribus albis: ſecunda flexuoſa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 286. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 25.
Habitat in America, *parva, ſubtus aenea nitida.*

virginata. 5. C. nitida, ore antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 286. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 27.
Habitat in Virginia, *carolinae ſimilis, violacea.*

carolina. 6. C. viridis nitida, elytrorum apicibus, ore, antennis pedibusque flavis. *Amoen. ac.* 6. *p.* 395. *n.* 23. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 286. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 26.
Gron. zooph. 576.*
Degeer inſ. 4. *p.* 120. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 24.
Habitat in Carolina.

cayennenſis. 29. C. ſupra fuſca, ſubtus cyanea, ano tibiisque poſterioribus teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 28.
Habitat in Cayenna, *magnitudine carolinae.*

aequinoctialis. 7. C. flava, elytris faſciis duabus nigris latis. *Amoen. ac.* 6. *p.* 395. *n.* 6. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 287. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 29.
Habitat in Surinamo.

ſylvatica. 8. C. nigra, elytris faſcia undata punctisque duobus albis. *Fn. ſuec.* 748.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 284. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 7.
Fn. ſuec. 1. *n.* 549. Cicindela atra, coleoptris maculis ſex faſciaque albis.
Degeer inſ. 4. *p.* 114. *t.* 4. *f.* 7. Cicindela ſupra nigra, ſubtus viridis nitida &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 155. *n.* 28. Bupreſtis inauratus ſupra fuſco-viridis &c.
Petiv. gazoph. t. 50. *f.* 5.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 27. *f.* 13.
Habitat in Europae pinetis.

littoralis. 30. C. obſcure aenea, elytris nigricantibus: punctis ſex albidis; baſeos lunato medio transverſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 8.
Habitat ad Barbariae *littora, ſtatura ſylvaticae.*

triſtis. 31. C. nigra, elytris macula media flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 284 *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 9.
Habitat - - -

interrupta. 32. C. elytris fuſcis: puncto baſeos faſciis tribus interruptis lineolaque apicis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 284. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 10.
Habitat in Sierra Leon Africae.

lunulata. 33. C. nigra, elytris lunulis duabus maculisque duabus albis: anteriore transverſa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 284. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine et ſtatura hybridae.*

lurida. 34. C. obſcura, elytris punctis duobus lunulisque tribus albis: intermedia flexuoſa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 284. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 12.
Habitat ad caput bonae ſpei.

flexuoſa. 35. C. obſcura elytris punctis quatuor lunulisque tribus albis: intermedia flexuoſa. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 13.
Habitat ad Hiſpaniae *littora, luridae proxime affinis.*

maura. 9. C. nigra, elytris punctis ſex albis: tertio et quarto parallelo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 287. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 30.
Habitat in Oriente, *ſtatura campeſtris, fronte alba.*

japonica. 36. C. violacea, elytris baſi, apice faſciaque cupreis: punctis duobus faſciaque luteis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 25. *f.* 39.
Habitat in Japonia, *magnitudine ſylvaticae, ſubtus e cyaneo et violaceo nitens.*

ſexnotata. 37. C. capite vireſcente, thorace rubro, elytris teſtaceis: maculis ſex nigris. *Lepech. it.* 2. *p.* 203. *t.* 10. *f.* 12.
Habitat in Sibiriae *fluviorum arena.*

auſtriaca. 38. C. viridis, pectore abdominisque baſi ſubtus rubro-aeneis, elytris margine aureo tenuiſſimo: punctis aliquot albis. *Schrauck Beytr. zur Naturg. p.* 69. §. 17.
Habitat in Auſtria.

litterata. 39. C. metallica albo-villoſa, elytris cupreis: punctis caeruleis ſtriisque argenteis litteras aequantibus. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 55. *t.* 6. *f.* 12.
Fueſſli Verz. ſchw. Inſ. p. 17. *n.* 338. Cicindela arenaria.
Habitat in Helvetiae *arena.*

danica. 40. C. nigra ſupra fuſco-aenea, elytris ſtriis lateralibus remotis: dorſo ſpeculifero. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 80. *n.* 865.
Müll. Fn. Fridrichsd. p. 18. *n.* 178. Cicindela orichalcica, dorſo ſpeculifero.
Habitat in Dania.

punctata. 41. C. nigra, ſupra ſubaenea, elytris ſtriatis: punctis impreſſis quatuor, pedibus flavo-fuſcis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 80. *n.* 867.
Müll. Fn. Fridrichsd. p. 18. *n.* 179.
Habitat in Dania.

ſinenſis. 42. C. ſubtus caeruleo-violacea nitida, elytris viridibus: maculis nigris punctisque quatuor albis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 119. *n.* 1. *t.* 17. *f.* 23.
Habitat in Sina.

caerulea. 43. C. caerulea nitens, ore albo. *Pall. it.* 2. *app. n.* 65.
Habitat in deſertis arenoſis auſtralibus ad Irtim Sibiriae *poſitis, fugaciſſima.*

gracilis. 44. C. nigro-aenea, elytris punctis duobus marginalibus albis: diſco poſterius rubente. *Pall. it.* 2. *app. n.* 66.
Habitat in Sibiriae *arena ad* Sohulbam *ſita, congeneribus gracilior, pedibus longiſſimis tenuiſſimis.*

ferruginea. 49. C. ferruginea, pedibus, elytris, capite thoraceque teſtaceis, hoc utroque poſterius, elytrorum faſcia undata ſuturaque viridibus. *Muſ. Lesk. p.* 34. *n.* 762.
Habitat in Europae *aquis, coccinellae ſtatura, capite poſterius bilobo, labio albo, maxillis nigris, thorace anterius exciſo, ſcutello nullo, elytro utroque ſtriis punctatis* 15, *baſi maculis* 3 *margine antico contiguis.*

** *labio rotundato acuminato integro,* Elaphri Fabricii.

atrata. 45. C. tota atra opaca. *Pall. it.* 1. *app. n.* 42.
Habitat in Sibiriae *lacu* Inderienſi, *magnitudine et forma germanicae; an ex hac tribu?*

lateola. 46. C. elytris ex fuſco viridi-aureis: margine laterali undique late lacteo. *Pall. it. 2. app. n.* 41.
Habitat in lacu Sibiriae Inderienſi; *an huic tribui accenſenda?*

riparia. 10. C. viridi-aenea, elytris punctis latis excavatis. *Fn. ſuec.* 741.* *It. oel.* 38. 121. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 287. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 1.
Degeer inſ. 4. *p.* 117. *n.* 4. *t.* 4. *f.* 9. Cicindela viridi-aenea maculis rotundis excavatis griſeo-viridibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 156. *n.* 30. Bupreſtis viridi-aeneus &c.
Liſt. loqu. 385. Scarabaeus parvus inauratus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 13.
Schaeff. ic. t. 86. *f.* 4.
Habitat in Europae *humentibus, colore ſaepius varians.*

flavipes. 11. C. obſcure aenea, elytris ſubnebuloſis, pedibus luteis. *Fn. ſuec.* 750.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 287. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 287. *n.* 2.
Degeer inſ. 4. *p.* 119. *n.* 6. Cicindela flavipes.
Habitat in Europae *borealis ripis, elytris punctatis.*

rupeſtris. 12. C. nigra, coleoptris punctis duobus faſciaque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ. p.* 287. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 3.
Habitat in Sueciae *rupibus, frequentius ſub lichenibus, pediculi majoris magnitudine.*

quadrimaculata. 13. C. nigra, elytris fuſcis: maculis duabus pallidis, tibiis rufis. *Fn. ſuec.* 751.*
Habitat in Europa.

aquatica. 14. C. aenea nitida, capite ſtriato. *Fn. ſuec.* 752.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 288. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 4.
Schreb. inſ. 6. Cicindela puſilla.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 157. *n.* 31. Bupreſtis fuſco-aeneus.
Liſt. mut. t. 31. *f.* 13.
Habitat ad Europae *aquas, frequens.*

ſemipunctata. 47. C. aenea nitida, elytris punctatis, dorſo glaberrimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 288. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 5.
Degeer inſ. 4. *p.* 118. *n.* 5. Cicindela ſtriata.
Habitat Halae Saxonum *et* Berolini.

biguttata. 48. C. aenea, elytris nitidis apice flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 288. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 6.
Habitat ad Norwegiae *aquas.*

211. BUPRESTIS. *Antennae* filiformes, ſerratae, longitudine thoracis.
Palpi quatuor filiformes: articulo ultimo obtuſo truncato.
Caput dimidium intra thoracem retractum.

unidentata. 31. B. elytris unidentatis aeneis: margine aureo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 273. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 1.
Habitat - - -

bicolor. 32. B. elytris acuminatis viridi-aeneis: macula flava, pectore abdomineque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 273. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 2.
Habitat in America *meridionali.*

gigantea. 1. B. elytris bidentatis rugoſis, thorace laevi, corpore inaurato. *Muſ. Lud. Ulr.* 85.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 273. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 3.
Degeer inſ. 4. *p.* 134. *n.* 1. Bupreſtis gigantea.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 108. *n.* 84. Mordella gigantea.
Sloan. jam. 2. *p.* 210. *t.* 236. *f.* 1. 2. Cantharis maxima, elytris cuprei coloris ſulcatis.
Grew muſ. 165. *t.* 13. Cerambyx Indiae orientalis maximus.
Petiv. gaz. t. 147. *t.* 16. 17.
Merian. ſurin. t. 50. *f. infim.*
Seb. muſ. 3. *t.* 84. *f.* 12.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 38.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 1.
Habitat in America *et* Aſia.

vittata. 33. B. elytris bidentatis punctatis: lineis elevatis quatuor, viridi-aenea: vitta lata aurea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 14.
Habitat in India.

faſtuoſa. 34. B. elytris truncatis bidentatis punctato-ſtriatis viridibus, dorſo aureo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 5.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

35. B.

Larvae *bupreſtis in ligno nidulantur.*

punctatiſſima. 35. B. elytris bidentatis cupreis: punctis violaceis numeroſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 6.
Habitat in Sierra Leon Africae.

berolinenſis. 36. B. elytris bidentatis viridi nigroque variis, ano tridentato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 7.
Herbſt Beſchr. der berl. Naturf. Fr. 4. *t.* 7. *f.* 5. *et apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *t.* 28. *f.* 5.
Pall. ic. inſ. roſſ. 2. *t.* D. *f.* 10.
Habitat in Germania, *ſtatura et magnitudine obſcurae.*

coruſca. 37. B. aenea nitidiſſima, elytris bidentatis apice abdomineque aureis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 8.
Habitat in Jamaica, *vittata minor, antennis cyaneis.*

decora. 38. B. elytris truncatis bidentatis viridibus: vitta caeruleſcente marginibusque aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 7: *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 9.
Habitat in America.

lurida. 39. B. obſcura, elytris bidentatis, ano tridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 10.
Habitat in America.

obſcura. 40. B. obſcure aenea: punctis elevatis obſcurioribus, elytris bidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 11.
Habitat in America *boreali, parva, ſubtus nitida, cuprea.*

punctata. 41. B. aenea, capite abdomineque teſtaceo-maculatis, elytris ſubbidentatis ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 12.
Habitat in Barbaria, *mediae magnitudinis.*

faſciata. 42. B. elytris bidentatis viridi-aeneis apice cyaneis: faſciis duabus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 13.
Habitat in America *boreali, magnitudine punctatae, viridi-aenea, antennis nigris.*

rauca. 43. B. obſcure aenea immaculata, elytris bidentatis ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 14.
Habitat in Barbaria, *parva.*

ſtriata. 44. B. elytris truncatis ſubbidentatis cupreis: lineis elevatis quatuor. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 15.
Habitat in Penſylvania.

45. B.

rutilans. 45. B. elytris tridentatis viridibus nigro-maculatis: margine aureo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 16.
Jacquin miſcell. auſtr. 2. *t.* 23. *f.* 2. Bupreſtis faſtuoſa.
Habitat in Auſtria.

octogut-tata. 2. B. elytris faſtigiatis muticis: maculis quatuor albis, corpore caeruleo. *Fn. ſuec.* 753. *it. ſcan.* 23. *Uddm. diſſ.* 42.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 278. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 48. Bupreſtis elytris integris: maculis quatuor albis, corpore caeruleo.
Degeer inſ. 4. *p.* 132. *n.* 5. *t.* 4. *f.* 20. Bupreſtis albo-punctata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 126. *n.* 2. Cucujus viridi-aeneus: punctis quatuor impreſſis.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 1. *et. t.* 204. *f.* 4.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 7. a. b.
β) Bupreſtis ſexpunctata? *Lepech. it.* 2. *t.* 10. *f.* 10.
Habitat in Europae *nemoribus, β*) *in arena fluviorum* Sibiriae.

ignita. 3. B. elytris ſerratis, thorace impreſſo, corpore inaurato, tibiis teretibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 86.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 274. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 17. Bupreſtis elytris dentatis, thorace impreſſo, corpore inaurato.
Grew muſ. 166. *t.* 13. Beetle.
Kaempf. jap. 1. *p.* 132. *t.* 10. *f.* 7.
Pet. gaz. t. 20. *f.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 14.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 3.
Habitat in America *auſtrali*, India *et* Sina.

lineata. 46. B. elytris truncatis ſubtridentatis nigro-aeneis: vittis duabus fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 275. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 18.
Habitat in America *meridionali.*

ocellata. 47. B. viridi-nitens, elytris tridentatis: maculis duabus aureis ocellarique flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 275. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 19.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 15.
Habitat in America *auſtrali et* India.

aeroſa. 48. B. elytris tridentatis, corpore aeneo immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 275. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 20.
Habitat in Coromandel, *minor.*

49. B.

maculata. 49. B. elytris tridentatis cyaneis flavo-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 275. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 21.
Habitat in Sibiria, *mediae magnitudinis, ſubtus aenea, capite cyaneo.*

maculoſa. 50. B. elytris truncatis ſtriatis dentatis nigris: maculis quatuor flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 22.
Deger inſ. 4. *p.* 137. *n.* 6. *et Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 118. *n.* 8. *t.* 28. *f.* 8. Bupreſtis flavo-punctata.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis; capite et abdomine aeneo-nigro; pedibus et thorace nigris, hujus margine flavo.*

ſtricta. 4. B. elytris ſerratis ſulcatis, tibiis angulatis, abdomine glabro. *Muſ. Lud. Ulr.* 87.*
Habitat in America *auſtrali, et* India.

ſternicornis. 5. B. elytris ſerrato-tridentatis, thorace punctato, ſterno porrecto, corpore inaurato. *Muſ. Lud. Ulr.* 88.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 275. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 23. Bupreſtis elytris ſerrato-tridentatis viridibus: punctis cinereis impreſſis, ſterno porrecto conico.
Grew muſ. 167. *t.* 13. Carabus orientalis craſſus.
Mouff. inſ. 160. *f. inf.*
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *t.* 46. *f.* 2.
Habitat in India *et* America.

Chryſis. 51. B. elytris ſerrato-tridentatis caſtaneis, ſterno conico porrecto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 275. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 24.
Degeer inſ. 4. *p.* 136. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 25. Bupreſtis viridi aurata. &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 2.
Schroet. Abh. t. 2. *f.* 3. Bupeſtris ſplendida.
Habitat in India, Sina, *an ſatis diſtincta a ſternicorni?*

violacea. 52. B. elytris, truncato-quadridentatis violaceis, corpore elongato cyaneo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 25.
Habitat in Sierra Leon Africae, *immaculata.*

aegyptiaca. 53. B. elytris ſerratis ſulcatis, corpore depreſſo obſcuro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 276. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 26.
Habitat in Aegypto.

mariana. 6. B. elytris ſerratis longitudinaliter rugoſis: maculis duabus impreſſis, thorace ſulcato *Muſ. Lud. Ulr.* 89.* *Fn. ſuec.*

ſuec. 754.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 276. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 27.
Fn. ſuec. 557. Bupreſtis aeneo-nitida ſupra cinerea, coleoptris apice attenuatis.
Degeer inſ. 4. *p.* 128. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 18. Bupreſtis nitida ſupra fuſco-aenea, ſubtus rubro-cuprea &c.
Pet. gaz. t. 2. *f.* 2. Cantharis marianus.
Schaeff. ic. t. 49. *f.* 1.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 4.
Habitat in Europa, *et boreali* America.

farinoſa. 54. B. elytris ſerratis viridibus: ſulco abbreviato ſuturali impreſſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 276. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 28.
Habitat in nova Hollandia.

fulminans. 55. B. aeneo nitidiſſima, elytris ſerratis apice aureis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 29.
Habitat in India *magna.*

cyanipes. 56. B. elytris ſerratis ſtriatis viridi-aeneis, thorace plano caeruleo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 30.
Habitat in America *meridionali, marianae magnitudine.*

modeſta. 57. B. elytris ſerratis corpore obſcurioribus: maculis tribus impreſſis aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 276. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 31.
Habitat in Braſilia, *farinoſae magnitudine.*

blanda. 58. B. elytris attenuatis ſerratis ſulcatis viridi-aeneis: ſulcis cupreis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 276. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 32.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

aurata. 59. B. aurea, elytris ſerratis, thorace aeneo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 33.
Habitat in America, *magna.*

tripunctata. 60. B. elytris ſerratis ſtriatis cupreis punctis tribus impreſſis aureis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 39.
Habitat in America *meridionali, ſtatura blandae.*

elegans. 61. B. aenea nitida, elytris ſerratis, thoracis lineis duabus elytrorumque unica aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 35.
Habitat ad caput bonae ſpei.

7. B.

chryſoſtigma. 7. B. elytris ſerratis longitudinaliter ſulcatis: maculis duabus aureis impreſſis, thorace punctato. *Fn. ſuec.* 755.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 39.
Fn. ſuec. 1. *n.* 556. Bupreſtis fuſco-aenea, elytris maculis aeneis impreſſis.
Degeer inſ. 4. *p.* 129. *n.* 3. Bupreſtis fuſca.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 135. *n.* 1. Cucujus aureus.
Sulz hiſt. inſ. t. 6. *f.* 39.
Schaeff. elem. t. 31. *f.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 6.
Habitat in Europa.

dorſata. 62. B. obſcure aenea, elytris ſerratis, abdominis dorſo aureo, ano bidentato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 38.
Habitat in America *meridionali, chryſoſtigmate minor.*

impreſſa. 63. B. elytris ſerratis laevibus aeneis: punctis tribus impreſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 40.
Habitat in America *auſtrali et* India, *modeſtae affinis, at duplo minor.*

ornata. 64. B. elytris ſerratis obſcuris albo-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 41.
Habitat in Penſylvania.

taeniata. 65. B. cinereo-villoſa, elytris ſerratis nigris: faſciis duabus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 42.
Habitat in Europa *magis auſtrali, parva, antennis nigris.*

cayennenſis. 66. B. viridi-aenea, elytris ſerratis atris: faſciis tribus lineolaque apicis viridibus, capite thoraceque fuſco maculatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 43.
Habitat in Cayenna, *parva, antennis nigris.*

cylindrica. 67. B. elytris ſerratis ſtriatis, thorace villoſo, corpore cylindrico nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 44.
Habitat in Oriente.

ſcabra. 68. B. elytris integris, fronte ſulcata, corpore ſcabro aureo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 45.
Habitat in America *auſtrali et* India.

Trochilus. 69. B. aurea nitidiſſima, dorſo elytris integris pedibusque viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 278. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 46.
Habitat in Auſtria.

decaſtigma. 70. B. elytris integris elevato-ſtriatis fuſcis: punctis quinque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 47.
Habitat in Auſtria, *ſtatura chryſoſtigmatis.*

ruſtica. 8. B. elytris ſtriatis faſtigiatis, thorace punctato. *Fn. ſuec.* 756.*
Fn. ſuec. 1. *n.* 555. Bupreſtis viridi-aenea immaculata.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 279. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 57.
Bupreſtis elytris emarginatis ſtriatis obſcure aeneis.
Degeer inſ. 4. *p.* 130. *n.* 4. *t.* 4. *f.* 10. Bupreſtis violacea.
Scop. ent. carn. n. 188. Mordella ruſtica.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 126. *n.* 3. Cucujus viridi-auratus oblongus.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 1.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 174. *n.* 28.
Habitat in Europae *nemoribus.*

canaliculata. 71. B. obſcura, elytris integris, abdomine ſubtus canaliculato: ano quadridentato. *Fabr. mant. inſ.* 1 *p.* 181. *n.* 58.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *magnitudine ruſticae.*

acuminata. 72. B. elytris integris attenuato-acuminatis obſcuris, corpore cupreo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 59.
Pall. ic. inſ. roſſ. 2. *t.* D. *f.* 10.
Habitat in Ruſſia *meridionali*, *ſtatura ruſticae.*

plebeja. 73. B. elytris emarginatis cupreis fuſco maculatis. *Fabr. ſp. inſ. p.* 280. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 182 *n.* 60.
Habitat in India.

tranquebarica. 74. B. nigra obſcura, elytris integerrimis, thorace macula baſeos utrinque impreſſa. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 61.
Habitat Tranquebariae, *ſtatura ruſticae.*

lugubris. 75. B. elytris integris obſcuris nigro-ſcabris, corpore ſubtus cupreo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 62.
Pall. ic. inſ. roſſ. 2. *t.* D. *f.* 11. Bupreſtis oxyptera.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 14.
Habitat in Auſtria *et* Ungaria.
Feminae *aculus brevis ſerratus ani.*

carioſa. 76. B. atra, elytris integris: atomis albis, thorace varioloſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 63. *Pall. it.* 3. *app. p.* 708. *n.* 52. *ic. inſ. roſſ.* 2. *t.* D. *f.* 6.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali*, *ſtatura B. tenebrionis*, *at duplo major.*

77. B.

undata. 77. B. viridi-aenea, elytris integris apice obſcuris: ſtrigis undatis albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 64.
Habitat in Germania, *B. rubi major.*

auſtriaca. 9. B. elytris ſtriatis aeneis bidentatis, capite thoraceque viridibus, abdomine violaceo.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 279. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 53. Bupreſtis elytris integris ſulcatis aeneis, capite thoraceque viridibus.
Scop. ent. carn. n. 187. Mordella gigantea.
Habitat Idriae, *magnitudine ruſticae.*

ſibirica. 78. B. elytris integerrimis atris: vittis duabus cinereo-tomentoſis impreſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 279. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 54.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 11.
Habitat in Sibiria, *mediae magnitudinis, latiuſcula, ſcabra, ſubtus cinereo-villoſa.*

ſplendens. 79. B. elytris integris viridibus: margine omni aureo lineisque tribus elevatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 279. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 55.
Habitat in Sina.

fuſca. 80. B. ſubtus aenea, elytris integris obſcure fuſcis, abdomine punctis lateralibus fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 279. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 56.
Habitat ad caput bonae ſpei, *fuſca, magnitudine et ſtatura ſplendentis.*

aurulenta. 10. B. elytris faſtigiatis bidentatis viridibus margine corporeque auratis, thorace ſubpunctato.
Habitat in Carolina, *oblonga, anguſta.*

Tenebrionis. 11. B. atra, elytris integris lineato-punctatis, thorace varioloſo dilatato. *Fn. ſuec.* 761.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 65.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 16.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 15.
Habitat in Europa, Africa.

faſcicularis. 12. B. elytris integerrimis ſtriatis: punctis faſciculato-villoſis, corpore inaurato hirſuto. *Muſ. Lud. Ulr.* 90.* *Gron. zooph.* 493.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 278. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 49.

Seb. muſ. 2. *p.* 22. *t.* 20. *f.* 5. Scarabaeus amboinenſis.
Pet. gaz. 4. *t.* 13. *f.* 5. Scarabaeus viridis aureus, pupillis pilis albis obtuſis undique hirtus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 4.
Degeer inſ. p. 7. *t.* 47. *f.* 6.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei, *rarius nigra, faſciculis pilorum nunc flavis, nunc fulvis.*

variolaris. 81. B. elytris integris obſcuris: punctis impreſſis numeroſis, thorace carinato. *Pall. it.* 1. *p.* 464. *n.* 37. *ic. inſ. roſſ.* 2. *t.* D. *f.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 278. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 50.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 10.
Habitat in Ruſſiae *onopordo et echinopode, ſcabra, nigra, ſubtus hirta, magnitudine et ſtatura faſcicularis.*

Onopordi. 82. B. elytris integris cupreis: ſulcis punctisque numeroſis albo-villoſis, thorace ſcabro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 51.
Habitat in Hiſpaniae *onopordo; aenea, nitida, albo-villoſa, faſciculari paulo minor.*

hirta. 13. B. hirta, elytris integerrimis, pedibus ferrugineis. *Muſ. Lud. Ulr.* 91.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 278. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 52.
Habitat in Africa, *colore varians.*

rubi. 14. B. cylindrica nigra, elytris faſciis cinereis undulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 66.
Habitat in Europae *magis auſtralis rubo, cichoreo.*

deaurata. 83. B. ſupra obſcure viridis, elytrorum margine aureo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 67.
Habitat Halae Saxonum, *mediae magnitudinis, cuprea, antennis nigris.*

nitidula. 15. B. elytris integerrimis, thorace marginato utrinque depreſſo, corpore viridi nitido. *Fn. ſuec.* 757.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 58. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 57.
Schaeff. ic. t. 50. *f.* 7.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 20.
Habitat in Europa *boreali.*

laeta. 84. B. elytris integris viridibus, capite thoraceque aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 59. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 88.
Habitat Halae Saxonum, *an varietas nitidulae?*

ſalicis. 85. B. viridis nitens, elytris integerrimis aureis baſi viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 89.
Schrank inſ. auſtr. p. 195. *n.* 365. Bupreſtis elegantulus.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 12.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *t.* 46. *f.* 5. a. b.
Habitat in Germaniae *ſalice.*

cyanea. 86. B. elytris integerrimis rugoſis, corpore cyaneo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 91.
Habitat Halae Saxonum *et* Berolini.

diſcoidea. 87. B. aenea villoſa, elytris integris: diſco teſtaceo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 90.
Habitat in Barbariae *umbellatis, parva.*

bimaculata. 16. B. elytris integerrimis ſtriatis: macula rubra, corpore fuſco-viridi. *Muſ. Lud. Ulr.* 92.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 68.
Sulz. hiſt. inſ. p. 17. *t.* 6. *f.* 15.
Habitat in India.

quadrimaculata. 88. B. viridis, thorace poſterius, elytriſque integris maculis duabus aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 69.
Habitat in India.

novemmaculata. 17. B. elytris integerrimis: maculis tribus longitudinalibus, fronte thoraciſque lateribus luteis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 282. *n.* 62. Bupreſtis elytris integerrimis nigris, maculis tribus flavis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 16. *f.* 17?
Habitat in Barbaria, Calabria, *nigra, oblonga, mediae magnitudinis.*

triſtis. 18. B. elytris integerrimis marginatis, corpore cupreo, abdominis punctis decem nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 93.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 70.
Habitat in America *auſtrali et* India.

aenea. 19. B. elytris emarginatis: punctis excavatis cicatricantibus apice ſtriatis. *Fn. ſuec.* 758.*
Habitat in Europa.

cuprea. 20. B. elytris integerrimis, thoracis lateribus ſcabris, ſcutello tuberculari, corpore cupreo laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 94.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 71.
Habitat in America.

nobilis. 21. B. elytris integerrimis: ſtrigis duabus undatis inauratis, corpore fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 72.
Habitat in America *auſtrali et* India.

barbarica. 89. B. ſupra aenea, ſubtus cuprea, elytris integerrimis ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 73.
Habitat in Barbaria, *parva.*

umbellatarum. 90. B. elytris integerrimis laevibus, corpore obſcure cupreo immaculato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 74.
Habitat in Barbariae *umbellatis, ſtatura et magnitudine quadripunctatae.*

quadripunctata. 22. B. elytris integerrimis punctatis, thorace punctis quatuor impreſſis, corpore obſcuro. *Fn. ſuec.* 759. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 281. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 75.
Degeer inſ. 4. *p.* 134. *n.* 8. Bupreſtis ſubviridi-nigra, thorace punctis quatuor impreſſis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 17.
Habitat in Europae *floribus, frequens in caltha paluſtri.*

cruciata. 91. B. coleoptris integerrimis aureis: punctis duobus cruceque poſteriore nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 281. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 76.
Habitat in nova Hollandia.

manca. 23. B. aurata, thoracis lineis duabus, elytrisque fuſcis. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 10.
Fabr. ſyſt. ent. p. 222. *n.* 37. Bupreſtis biſtriata.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 281. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 77. Bupreſtis elytris integris obſcuris, thorace aureo: ſtriis duabus nigris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 127. *n.* 4. Cucnjus aeneus &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 18.
Habitat in Gallia *et* Germania.

pygmaea. 92. B. elytris integris cyaneis, capite thoraceque aeneis nitidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 78.
Habitat in Barbariae *umbellatis, ſtatura et magnitudine minutae.*

24. B.

minuta. 24. B. elytris integerrimis transverſe rugoſis, thorace ſubtrilobo laevi, corpore ovato nigro. *Fn. ſuec.* 760.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 281. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 79.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 128. *n.* 6. Cucujus fuſco-cupreus triangularis &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 19.
Habitat in Europa.

meditabunda. 93. B. elytris integerrimis fuſco-nitidis, capite thoraceque cupreis, corpore aeneo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 80.
Habitat in America *boreali, ſtatura viridis, at paulo major.*

viridis. 25. B. elytris integerrimis ſublinearibus punctatis, thorace deflexo, corpore viridi elongato. *Fn. ſuec.* 762.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 281. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 81.
Degeer inſ. 4. *p.* 133. *n.* 6. *t.* 5. *f.* 1. Bupreſtis viridis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 127. *n.* 5. Cucujus viridi-cupreus oblongus.
Scop. ent. carn. 190. Mordella ſerraticornis.
Schaeff. ic. t. 76. *f.* 9.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 21.
Habitat in Europae *betula alba, foliorum margines exedens, corpore obſcuriori et cupreo varians.*

biguttata. 94. B. elytris integerrimis linearibus viridibus: puncto albo, abdomine cyaneo: punctis tribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 281. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 82.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 22.
Habitat in Angliae *plantis.*

atra. 26. B. elytris integerrimis ſublinearibus punctatis, thorace deflexo, corpore atro elongato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 83.
Habitat in Germania, *viridi proxime affinis.* Schreber.

elata. 95. B. elytris integerrimis linearibus, corpore elongato aureo nitido. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 84.
Herbſt Schr. der berl. Naturf. Fr. 1. *p.* 99. *n.* 12? Bupreſtis elongata.
Habitat Berolini *et* Halae Saxonum, *ſtatura atrae, at minor.*

ruficollis. 96. B. nigra, elytris integerrimis linearibus, thorace cupreo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 85.
Habitat in America, *parva, ſtatura elatae.*

feſtiva. 27. B. elytris integerrimis: maculis ſex caeruleis, corpore elongato viridiſſimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 86.
Habitat in Africa, *viridis magnitudine.*

linearis. 28. B. lineari oblonga murino - aenea, thorace poſteriore trilobo.
Habitat in America. Rolander.

granularis. 29. B. aeneo - nebuloſa, antennis clavatis. *Fn. ſuec.* 763.*
Habitat in Europa, *an hujus generis?*

depreſſa. 30. B. elytris ſubſerratis aeneo - ferrugineis nervoſo - punctatis, thorace depreſſo. *Mant.* 2. *p.* 533.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 277. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 37. Bupreſtis (porcata) elytris ſerratis porcatis, thorace angulato, corpore fuſco nitido.
Habitat in Oriente.

calcarata. 97. B. elytris bidentatis ſubſtriatis, tibiis intermediis dentatis, corpore cupreo. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 310.
Herbſt Schrif. der berl. Naturf. Fr. 1. *p.* 91. *n.* 2. Bupreſtis aeruginoſa.
Schaeff. ic. t. 35. *f.* 7.
elem. t. 31. *f.* 11.
Habitat in Germania, *ſtatura et magnitudine ruſticae, rarior; elytrorum ſtriis quatuor, thoracis unica media ex atro caerulea.*

fuliginoſa. 98. B. elytris integerrimis ſublinearibus glabris piloſis, thorace deflexo, corpore fuliginoſo. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 51. *n.* 51.
Habitat in Anglia, *lecta in floribus crataegi oxyacanthae, magnitudine cantharidis teſtaceae, antennis moniliformibus, an hujus generis?*

haemorrhoidalis. 99. B. aeneo - nitens, elytris ſubtridentatis novemſulcatis, abdominis annulo ultimo maculis duabus fulvis. *Herbſt Schr. der berl. Naturf. Fr.* 1. *p.* 97. *et apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *t.* 28. *f.* 12.
Habitat Berolini *in ſepibus, octoguttatae affinis.*

quercus. 100. B. viridi-nitens, thorace orbiculato: puncto impreſſo, elytris truncatis coſtatis. *Herbſt Schr. der berl. Naturf. Fr.* 1. *p.* 90. *n.* 1. *et apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *t.* 28. *f.* 13.
Schaeff. ic. t. 35. *f.* 6?

Habitat in Germaniae *ligno querno, pollicem fere longa, pedibus caeruleis, antennis nigricantibus.*

hirſuta. 101. B. atra, villoſa, elytris faſciculis ſparſis villoſis flavis, marginalibus rubris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. t. 46. f. 4.*
Habitat in America, *faſciculari affinis.*

11maculata. 102. B. cylindrica nigra nitens, frontis macula, thoracis quatuor, elytrorum tribus flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. t. 28. f. 23.*
Habitat in Ungaria.

ſexmaculata. 103. B. cylindrica nigra nitens, capite thoraceque immaculatis, elytrorum maculis tribus flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 121. n. 24.*
Habitat in Ungaria, *an vere diſtincta ab* 11*maculata?*

varicornis. 104. B. nigricans villoſa, thorace utrinque lobato, elytris acutis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 59. n. 530.*
Habitat in Dania.

acuta. 105. B. nigra, elytris punctatis pone acuminatis, thorace laevi. *Degeer inſ. 4. p. 133. n. 7.*
Habitat in Europa, 4 *modo lineas longa.*

naevia. 106. B. atra, thorace albo nigroque vario. *Lepechin it. 1. p. 232. t. 17. f. 7.*
Habitat in Ruſſiae *regno, ruſticae affinis.*

picta. 107. B. aenea nitens, elytris violaceo-nigris: maculis ſymmetricis flaveſcentibus. *Pall. it. 2. app. n. 46.*
Habitat in regionibus Uralenſibus *magis auſtralibus, octoguttatae fere magnitudine.*

inaurata. 108. B. viridi aurea nitidiſſima, elytris obtuſis integerrimis decemſtriatis aeneis. *Pall. it. 2. app. n. 45.*
Habitat rarior in regionibus auſtralibus, fluviis Ural *et* Volgae *finitimis, ignitae magnitudine, ſed latior.*

tatarica. 109. B. nigra, ſubtus aenea, elytris laevibus aureis: vitta marginali lineaque margini parallela impreſſis tomentoſis. *Pall. it. 1. app. n. 10.*
Habitat in Tataria, *marianae magnitudine, at brevior, craſſior, et congeneribus magis obtuſa.*

virginica. 110. B. thorace lato fuſco: punctis cupreis, elytris ſerratis atris: maculis cupreis ſuturaque metallica. *Drury inſ. 1. p. 66. t. 30. f. 3.*
Habitat in Virginia.

nana. 111. B. nigra nitida, elytris caeruleo violaceis nitidiſſimis. *Degeer inſ. 4. p. 137. n. 4. t. 17. f. 27.*
Habitat in Surinamo, *pulice vix major.*

marginata. 112. B. elytris integerrimis nigris: margine flavo. *Müll. Fn. Fridrichsd. p. 18. n. 182.*
Habitat in Dania; *an diſtincta ſpecies?*

nigra. 113. B. thorace elytrisque nigris; abdomine ſubtus albo-tomentoſo. *Müll. Fn. Fridrichsd. p. 18. n. 183.*
Habitat in Dania.

roſacea. 114. B. thorace pone marginato, elytris marginatis apice rotundatis, abdomine ſupra aeneo fuſco.
Scop. ent. carn. n. 190. Mordella roſacea.
Habitat in Carnioliae *floribus.*

ungarica. 115. B. viridiſſima, ſubtus fronte et thoracis lateribus rubroaureis.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. p. 104. *n.* 85. Mordella hungarica.
Habitat in Ungaria, *ruſtica paulo minor, elytris apice rotundatis.*

nebuloſa. 116. B. ſupra nigra, ſubtus albicans, elytris integerrimis ſtriis tenuiſſimis punctatisque albidis nebuloſis.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. p. 104. *n.* 86. Mordella nebuloſa.
Habitat in Ungaria, *pedibus nigris.*

bruttia. 117. B. nigra albido punctata, thorace varioloſo dilatato albidiore: maculis quinque nitidis nigris.
Petagn. inſ. Calabr. p. 22. *n.* 108. *f.* XX.
Habitat in Calabriae lentiſco

Stephanelli. 118 B. viridi-aurea nitens, thorace lineis duabus fuſcis, elytris integris. *Petagn. inſ. Calabr. p. 23 n.* 110.
Habitat in Calabriae *monte* tre pizzi, *minor.*

rugoſa. 119. B. aenea punctata, thorace ſcabro: ſulco obliquo utrinque impreſſo, elytris ſtriatis ſulcis apice truncatis: rugis impreſſis interruptis. *Muſ. Lesk. p. 34. n.* 739.
Habitat - - - -

coccinea. 120. B. fuſco-aenea punctata, thorace ſulcato, elytris integris coccineis: rugis quatuor nigris, internis ad ſuturam ramoſis. *Muſ. Lesk. p.* 34. *n.* 744.
Habitat extra Europam, *thoracis ſulcis ſtriis villoſis griſeis repletis, elytris ſpatio rugis interjecto punctis concatenatis duplici ſerie ſtriatis.*

HYDROPHILUS. *Antennae* clavatae: clava perfoliata.
Palpi quatuor filiformes.
Pedes poſteriores villoſi, natatorii, ſubmutici.

piceus. 1. H. niger, ſterno canaliculato poſterius ſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 288. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 1.
Degeer inſ. 4. *p.* 371. *n.* 1. *t.* 14. *f.* 1. 2. Hydrophilus ruficornis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 182. *n.* 1. *t.* 3. *f.* 1. Hydrophilus niger, elytris ſulcatis, antennis fuſcis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 764.* *Scop. ent. carn.* 293. Dytiſcus antennis perfoliatis, corpore laevi, ſterno carinato poſtice ſpinoſo.
Herbſt Beſch. der naturf. Berl. Fr. 4. *t.* 7. *f.* 2. Dytiſcus haſtatus.
Lyonn. Leſſ. t. 1. *f.* 15-17.
Friſch inſ. 2. *t.* 6.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 8.
Schaeff. el. t. 71.
ic. t. 33. *f.* 1. 2.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 6. *f.* 3. *et t.* 8. *f.* 1. *et t.* 9. *f.* 1.
Habitat in Europa, *nido eminenter mucronato natante.*

olivaceus. 6. H. olivaceus, ſterno canaliculato poſterius ſpinoſo, coleoptris emarginatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 289. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 2.
Habitat in Coromandel, *piceo paulo minor.*

caraboides. 2. H. niger nitidus, elytris ſubſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 289. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 3.
Degeer inſ. 4. p. 516. *n.* 2. Hydrophilus nigricornis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 183. *n.* 2. Hydrophilus niger, elytrorum punctis per ſtrias digeſtis, antennis nigris.

Syſt.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 765.* Dytiſcus antennis perfoliatis, corpore glabro, ſtriis aliquot recurvis.
Raj. inſ. p. 95. *n.* 7. Hydrocantharus niger ſubrotundus.
Friſch inſ. 13. *p.* 24. *t.* 21.
Roeſ. inſ. 2. *aquat.* 1. *t.* 4. *f.* 1. 2.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 41.
Schaeff. ic. t. 53. *f.* 10.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 5. *f.* 8. 9. *et* (*larv. pupp.*) *t.* 7. *f.* 8. 9.
Habitat in Europa.

lateralis. 7. H. niger nitidus, thoracis elytrorumque marginibus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 289. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 4.
Habitat in inſulis Americae *oppoſitis.*

ſcarabacoides. 3. H. niger, elytris ſtriatis, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 289. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 3. Dytiſcus ovalis convexus ater laeviſſimus, antennis filiformibus triarticulatis.
Syſt. nat. X. *n.* 56. Scarabaeus (aquaticus) muticus piceus, elytris ſtriatis, antennis flaveſcentibus filiformibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 85. Scarabaeus piceus.
Habitat in Europa, *palpis, non antennis, filiformibus.*

picipes. 8. H. niger, pedibus piceis, elytris laevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 6.
Habitat in Germania, *utrum hujus, an inſequentis mox generis?*

orbicularis. 9. H. ſubrotundus corpore glabro atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 290. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 7.
Habitat in Germania.

collaris. 10. H. niger, ore thoracis lateribus lineisque elytrorum ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ. p.* 290. *n.* 7. *mant. inſ. p.* 188. *n.* 8.
Habitat in America.

fuſcipes. 4. H. thorace atro: margine griſeo, elytris fuſcis: margine punctoque poſteriore albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 290. *n.* 10. *mant.* 1. *p.* 189. *n.* 12.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 766. Dytiſcus antennis perfoliatis, elytris ſtriatis margine lividis, pedibus fuſcis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 184. *n.* 4. Hydrophilus.
Habitat Upſaliae, *elytrorum punctis interdum obſoletis.*

5. H.

luridus. 5. H. elytris ſtriatis, corpore cinereo-fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 290. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 9.
Degeer inſ. 4. *p.* 378. *n.* 4. *t.* 15. *f.* 1. 2. Hydrophilus fuſcus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 665. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 767.* Dytiſcus antennis perfoliatis luridus, elytris punctis tribus fuſceſcentibus, thorace lateribus flavicante.
Habitat in Europa.

minutus. 11. H. ovatus niger elytris pedibusque griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 290. *n.* 9. *mant inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 10.
Forſt. nov. inſ. ſp. 53. *n.* 53. Dytiſcus dermeſtoides.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 85. *n.* 27 ? Scarabaeus totus rufo-niger, maculis nigrioribus.
Habitat in Europa, *veſperi ſonorus, thorace interdum griſeo.*

griſeus. 12. H. ſupra cinereus, ſubtus fuſcus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 11.
Habitat in Saxonia, *ſtatura et magnitudine minuti.*

tricolor. 13. H. niger, elytris piceis margine nigris et apice ochroleucis, pedibus ſpadiceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 122. *n.* 6. *t.* 28. *f.* A. b.
Habitat Berolini, *lineam longus.*

cordiger. 14. H. niger, thoracisque margine elytrisque ferrugineis: his macula communi cordata nigra. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 122. *n.* 7. *t.* 28. *f.* A. a. b.
Habitat Berolini, *vix lineam longus, pedibus piceis.*

rufus. 15. H. rufus, elytris laeviſſimis obſcurioribus: margine exteriore albido anterius bidentato. *Scop. ent. carn. n.* 298.
Habitat in Carniolia.

obſcurus. 16. H. lividus, abdomine nigro, elytris nitidis confertim punctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 69. *n.* 657.
Habitat in Dania, *an vere diſtinctus a lurido?*

puſillus. 17. H. niger, elytris laeviſſimis, antennis tarſisque fuſcis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 69. *n.* 658.
Habitat in Dania.

Pilula. 18. H. ater, ſupra nitidus confertim punctatus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 69. *n.* 659.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 184. *n.* 3. Hydrophilus punctatus.
Habitat in Europa.

19. H.

niger. 19. H. niger nitidus, elytris punctis diſtantibus leviſſime ſtriatis, antennis plantisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 769.
Habitat in Europa, *ſtatura caraboidis, at quadruplo minor.*

ater. 20. H. ater glaber, antennis tibiisque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 774.
Habitat in Europa.

212. DYTISCUS. *Antennae* ſetaceae. *Palpi* ſex filiformes. *Pedes* poſteriores villoſi, natatorii, ſubmutici.

latiſſimus. 6. D. niger, elytrorum marginibus dilatatis: linea flava. *Fn. ſuec.* 768.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 290. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 1.
Müll. zool. dan. prodr. p. 69. *n.* 663. Dytiſcus ampliſſimus.
Degeer inſ. 4. *p.* 390. *n.* 1. Dytiſcus nigro-fuſcus.
Friſch inſ. 2. *t.* 7. *f.* 1. 2. Scarabaeus aquaticus magnus niger, margine luteo.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 19.
Schaeff. ic. t. 217. *f.* 1. 2.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 5. *f.* 1. 2. *et t.* 9. *f.* 3.
Habitat in Europa *boreali, in propriam ſpeciem ſaeviens, mas glaber, femina ſulcata.*

coſtalis. 1. D. niger, capitis faſcia, thoracis margine elytrorumque ſtria coſtali ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 291. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 2.
Habitat in Surinamo. Femina *obſcurior.*

marginalis. 7. D. niger, thoracis marginibus omnibus elytrorumque exteriori flavis. *Fn. ſuec.* 769. *Scop. ent. carn.* 294. *Geoffr. inſ.*

Hydrophili *et* Dytiſci *in aquis et humidis habitant, egregie natant, dorſo impoſiti circumgyrando exſiliunt, in umbra quieſcunt, noctu volitant, diutius in ſicco ſervati difficilius ſubmergi poſſunt; maribus pedum anteriorum plantae hemiſphaericae, feminis elytra ſaepius ſulcata, priores dermeſtidi, poſteriores carabis affines; ceterum ſexus diſcerni, ſpecies determinari difficulter poſſunt: larvae ſubaquaticae voraciſſimi aquatilium crocodili, piſces ipſos occidunt innumeros, uti Baruthi* 1762. *teſte Schrebero neue Samml.* 1763. 3. *p.* 680. *de ſemiſtriato, alias de latiſſimo compertum eſt.*

inſ. par. 1. *p.* 186. *n.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 291. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 3.
Degeer inſ. 4. *p.* 391. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 2. Dytiſcus nigro fuſcus nitidus.
Mouff. inſ. 164. Hydrocantharis.
Raj. inſ. p. 93. *n.* 1. Hydrocantharis noſtras.
Aldr. inſ. 707.
Liſt. mut. t. 5. *f.* 2.
Roeſ. inſ. 2. *aq.* 1. *t.* 1. *f.* 9. 11.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 42.
Schaeff. ic. t. 8. *f.* 8.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 1. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. *et t.* 6. *f.* 1. 2. *et* (*larv. pupp.*) *t.* 7. *f.* 4. 5. β) 1. *t.* 7. *f.* 1.
Habitat in Europa.

ſemiſtriatus. 8. D. fuſcus, elytris ſulcis dimidiatis decem villoſis. *Fn. ſuec.* 772.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 187. *n.* 3. *t.* 3. *f.* 2.
Fn. ſuec. 1. *n.* 568. Dytiſcus ſupra fuſcus, ſubtus ater.
Raj. inſ. p. 94. *n.* 2. Hydrocantharis elytris ſtriatis ſive canaliculatis.
Friſch inſ. 2. *t.* 7. *f.* 4.
Bradl. nat. t. 26. *f.* 2.
Roeſ. inſ. 2. *aq.* 1. *t.* 1. *f.* 10.
Degeer inſ. 4. *p.* 391. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 8. *f.* 7.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 2. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 2.
Fn. ſuec. 1. *n.* 567. Dytiſcus elytris ſtriis 20 dimidiatis.
Habitat in Europa, *enſe recurvo, acuto, recondito inſtructus, ova oblonga, magna, alba pariens, marginalis, ut videtur, femina.*

punctulatus. 9. D. niger, clypeo thoracis elytrorumque margine exteriori albis, elytris ſtriis tribus punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 292. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 4.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 185. *n.* 1. Dytiſcus margine coleoptrorum thoracisque flavo.
Degeer inſ. 4. *p.* 396. *n.* 3. Dytiſcus laterali-marginatus.
Müll. zool. dan. prodr. p. 70. *n.* 664. Dytiſcus virens.
Roeſ. inſ. 2. *aq.* 1. *t.* 2.
Friſch inſ. 13. *t.* 1. *f.* 7.
Schaeff. elem. t. 7.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 31. *n.* 45. *t.* 6. *f.* 4. 5. *t.* 8. *f.* 4. *et t.* 9. *f.* 2.
β) *Bergſtr. nomencl.* 1. *t.* 8. *f.* 6. 7.

Habitat

Habitat in Germaniae *rivulis ſilvaticis.*
Femina *elytrorum ſulcis decem dimidiatis.*

limbatus. 3. D. niger, thoracis elytrorumque margine exteriori flavo, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 292. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 5.
Habitat in Sina, *et* India, *abdomine atro: punctis utrinque* 3 *ferrugineis.*

ruficollis. 4. D. niger, fronte thoraceque fulvis, elytris ſtriga baſeos margineque exteriori teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 6.
Habitat in Siam, *ſulcati magnitudine.*

ſtriatus. 9. D. fuſcus, elytris transverſim ſubtiliſſime ſtriatis. *Fn. ſuec.* 770.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 9.
Degeer inſ. 4. *p.* 399. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 16. Dytiſcus transverſe ſtriatus.
Habitat in Europa.

fuſcus. 10. D. fuſcus, elytris transverſe ſubſtriatis.
Habitat in Europa; *an ſpecie diſtinctus a ſtriato?*

Lanio. 5. D. niger, ore verticis punctis duobus thoracisque marginibus rufis, elytris fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 10.
Habitat in Madera.

cicurius. 24. D. ater laevis, ore verticis puncto thoracisque margine rufis, elytris flavo-ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine ſtriati.*

vittatus. 25. D. ater laevis, elytris vitta marginali flava: macula baſeos atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 12.
Habitat in India.

cinereus. 11. D. cinereus, elytrorum margine thoracisque medietate flavis. *Fn. ſuec.* 771. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 188. *n.* 4. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 13.
Degeer inſ. 4. *p.* 397. *n.* 14. Dytiſcus faſciatus.
Liſt. mut. t. 5. *f.* 1.
Petiv. gaz. t. 70. *f.* 3.
Act. Nidroſ. 425. *t.* 70. *f.* 3.
Huffn. inſ. 2. *t.* 12.

Roeſ.

Roeſ. inſ. 2. aq. 1. *t.* 3. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 90. *f.* 7.
Habitat in Europa *frequentiſſimus.*

griſeus. 26. D. cinereus, elytris faſcia dentata nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 14.
Habitat in India, *cinereo paulo major.*

ſticticus. 12. D. pallens, elytris griſeis: puncto oblongo laterali impreſſo nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 294. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 15.
Habitat in Africa.

decempunctatus. 27. D. ater glaber, elytris punctis albis quinque. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 294. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 16.
Habitat in nova Hollandia.

ſulcatus. 13. D. elytris ſulcis decem longitudinalibus villoſis. *Fn. ſuec.* 773.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 189. *n.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 292. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 7.
Raj. inſ. p. 94. *n.* 3. *et* 10. Hydrocantharis minor, corpore rotundo plano.
Bradl. mut. t. 26. *f.* 2. A.
Friſch inſ. 13. *p.* 13. *t.* 7.
Roeſ. inſ. 2. *aq.* 1. *t.* 3. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 3.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 5. *f.* 3–5. *et t.* 7. *f.* 6. 7.
Habitat in Europa *et* America, *maris elytris glabris.*

faſciatus. 28. D. elytris flavis: faſciis duabus punctoque apicis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 8.
Habitat in India.

erythrocephalus. 14. D. ovato-oblongus niger, capite pedibusque rufis. *Fn. ſuec.* 774.* *Degeer inſ.* 4. *p.* 404. *n.* 12. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 295. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 31.
Habitat in Europa.

planus. 29. D. ovato-oblongus planus niger, tibiis ſolis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 501. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 32.
Habitat in Dania, *ſtatura erythrocephali.*

varius. 30. D. thorace rufo, elytris cinereo nigroque ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 295. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 33.
Habitat in Patagonia.

notatus. 31. D. fuſcus, thorace flavo: punctis quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 34. *Bergſtr. nomencl.* 1. *t.* 5. *f.* 10.
Habitat in Germania, *ſtatura paluſtris, thorace interdum rufo, aut punctis faſciave abbreviata nigris vario.*

depreſſus. 32. D. thorace ferrugineo: punctis duobus baſeos nigris, elytris fuſcis ferrugineo-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 35.
Habitat in Suecia.

dorſalis. 33. D. capite thoracis margine elytrorumque puncto baſeos diſtincto margineque inaequali ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 36.
Habitat Kilonii, *ſexpuſtulato affinis, at major.*

ſexpuſtulatus. 34. D. ater, capite ferrugineo, elytris maculis tribus rufis: baſeos majore. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 37.
Habitat in Succiae *aquis ſtagnantibus.*

maculatus. 15. D. niger, thorace nigro: faſcia pallida elytris albo nigroque variis. *Fn. ſuec.* 777.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 38. *Uddm. diſſ.* 43.
Habitat in Europa.

ferrugineus. 16. D. ferrugineus totus.
Habitat in Europa, *cimicis magnitudine.* Aſcanius.

bipuſtulatus. 17. D. ater laevis, capite poſterius punctis duobus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 294. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 17. *Degeer inſ.* 4. *p.* 401. *n.* 8? Dytiſcus ater. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 189. *n.* 6? Dytiſcus totus niger laevis. *Schaeff. ic. t.* 8. *f.* 9.
Habitat in Europa *boreali.*

cinctus. 35. D. capite thoraceque flavis, elytris nigris: margine omni albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 294. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 18.
Habitat in America.

bipunctatus. 36. D. ater, thorace flavo: punctis duobus nigris, elytris flavo fuſcoque variis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 19.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

37. D.

feneſtratus. 37. D. ſubtus ferrugineus, ſupra niger, elytris punctis duobus feneſtratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 294. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 20.
Habitat Hamburgi, *ſtatura bipuſtulati.*

Hübneri. 38. D. laevis ater, ore thoracisque margine ferrugineis, elytris linea marginali flava. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 21.
Habitat in Germania, *magnitudine et ſtatura tranſverſalis.*

ſtagnalis. 39. D. laevis niger, thorace anterius ferrugineo, elytris fuſcis flavo-lineatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 22.
Habitat in Germania, *ſtatura et magnitudine tranſverſalis.*

transverſalis. 40. D. ater, thorace anterius ferrugineo, elytrorum margine ſtrigaque baſeos abbreviata flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 294. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 23.
Müll. zool. dan. prodr. p. 71. *n.* 668. Dytiſcus niger, thorace utrinque faſciaque antica, elytris margine lineaque tranſverſa baſeos flava.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat in Europa.

Hermanni. 41. D. gibbus capite thorace elytrorumque baſi ferrugineis, elytris truncatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 295. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 24.
Fabr. ſyſt. ent. p. 232. *n.* 14. Dytiſcus gibbus, elytris faſcia undata baſeos ferruginea.
β) *Herbſt Beſch. der berl. naturf.* Fr. 4. *t.* 7. *f.* 3. Dytiſcus tardus.
γ) *Schranck enum. inſ. auſtr. n.* 379. Dytiſcus undulatus.
Habitat in Alſatiae *aquis ſtagnantibus.*

abbreviatus. 42. D. niger, elytris ſtriga abbreviata baſeos punctisque duobus flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 25.
Habitat Kilonii, *ſtatura tranſverſalis, at duplo minor.*

gibbus. 43. D. gibbus ferrugineus, elytris nigris apice acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 295. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 26.
Habitat Kilonii *in aquis ſtagnantibus.*

haemorrhoidalis. 44. D. niger, thorace elytrorumque baſi apiceque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 27.
Habitat Kilonii, *magnitudine uliginoſi.*

ovatus. 18. D. ovatus fuſcus, capite thoraceque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 2282. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 39.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 191. *n.* 10. Dytiſcus ovatus fuſcus, capite thoraceque rubicundis.
Degeer inſ. 4. *p.* 402. *n.* 9. *t.* 14. *f.* 17-19. Dytiſcus ſphaericus.
Habitat in Europae *aquis ſtagnantibus*, *conſueto interdum duplo major*, *margine elytrorum albo-maculato.*

picipes. 45. D. niger, thorace anterius ferrugineo, elytris flavo-lineatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 40.
Habitat in Germania, *parvus.*

lituratus. 46. D. niger, elytris baſi lituraque apicis pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 41.
Habitat in Italia, *parvus.*

chryſomelinus. 47. D. ſupra cinereus ſubtus niger. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 42.
Habitat in Germania, *parvus.*

ſignatus. 48. D. niger, capite thoraceque rufis: ſignaturis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 43.
Habitat in Patagonia.

halenſis. 49. D. ater, thorace rufo: baſeos medio nigro: puncto rufo, elytris cinereis nigro ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 44.
Habitat in Germania, *parvus*, *planus.*

paluſtris. 19. D. niger laeviſſimus, elytris lituris duabus lateralibus albidis. *Fn. ſuec.* 775.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 38.
Habitat in Europa, *thorace ferrugineo.*

uliginoſus. 20. D. ater nitidus, antennis pedibus elytrorumque latere exteriore ferrugineis. *Fn. ſuec.* 776.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 295. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 28.
Habitat in Europa.

irroratus. 50. D. teſtaceus nigro irroratus, capite pectoreque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 295. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 29.
Habitat in America.

bimaculatus. 21. D. teſtaceus, elytris macula nigricante.
Habitat in Gallia, *magnitudine ſeminis oryzae*, *elytris ſubſtriatis.* Gouan.

granularis. 22. D. niger, elytris lineis duabus flaveſcentibus, pedibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 45.
Scop. ent. carn. n. 297. Dytiſcus minimus.
Habitat in Europae *borealis aquis ſtagnantibus, pulicis magnitudine.*

confluens. 51. D. niger, capite thoraceque ferrugineis, elytris pallidis: lineis quatuor diſci nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 46.
Habitat Kilonii, *parvus.*

obliquus. 52. D. ferrugineus, elytris maculis quinque obliquis fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 47.
Habitat Kilonii, *ſtatura granularis.*

impreſſus. 53. D. oblongus flaveſcens, elytris cinereis: punctis impreſſis ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 48.
Schall. Abh. der hall. naturf. Fr. 1. *p.* 312. Dytiſcus impreſſo-punctatus.
Habitat in Europa.

lineatus. 54. D. ferrugineus, coleoptris fuſcis: lineis flaveſcentibus *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 297. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 49.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 32. *n.* 8. 9. *t.* 6. *f.* 8. 9.
Habitat in Alſatiae *aquis ſtagnantibus.*

inaequalis. 55. D. ferrugineus, elytris nigris: lateribus inaequaliter ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 297. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 50.
Habitat in Sueciae *aquis ſtagnantibus.*

minutus. 23. D. elytris fuſcis baſi lateribusque pallidis, thorace flavo immaculato, corpore ovato. *Fn. ſuec.* 778.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 297. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 51. Dytiſcus flaveſcens, elytris fuſcis, margine flavo maculato.
Degeer inſ. 4. *p.* 404. *n.* 18. *t.* 16. *f.* 9. Dytiſcus ruficollis.
Habitat in Europa.

craſſicornis. 56. D. fuſcus, capite thoraceque flavis, antennis medio incraſſatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 52.
Müll. zool. dan. prodr. n. 779. Dytiſcus craſſicornis.
Geoff. inſ. par. 1. *p.* 193. *n.* 15.
Degeer inſ. 4. *p.* 402. *n.* 10. Dytiſcus clavicornis.
Habitat in Europa *magis boreali, parvus.*

piƈtus. 57. D. ferrugineus, thorace ferrugineo, elytris pallidis, ſutura maculaque laterali nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 53.
Habitat in Germania, *minutus.*

puſillus. 58. D. ater, thorace elytrisque margine albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 297. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 54.
Habitat in Italia, *vix pediculi magnitudine.*

ovalis. 59. D. elytris fuſcis pallido-lineatis, thorace ferrugineo, abdomine atro. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 19. *n.* 33.
Habitat Upſaliae, *magnitudine nitidulae aquaticae, ovato major.*

intricatus. 60. D. flavicans, ſupra nigro-virens intricatus, elytris excavato-ſtriatis: margine apice thoraceque flavis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 311.
Müll. Naturf. 7. *p.* 99. Dytiſcus ſemiſulcatus.
Habitat Halae Saxonum *in ſtagnis, ſtatura et magnitudine punctulati.*

verſicolor. 61. D. fulvus, elytris maculis oblongis nigris. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 313.
Habitat Halae Saxonum *in ſtagnis, ovatus, magnitudine chryſomelae nemorum.*

Schalleri. 62. D. niger, capite thorace pedibusque ferrugineis, elytris fuſcis: margine extimo rufo. *Schall. Abh. der. hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 313.
Habitat Halae Saxonum.

laminatus. 63. D. fulvus, elytris ſtratis nigro-punctatis, laminis duabus ad baſin abdominis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 314.
Habitat rarior Halae Saxonum, *magnitudine chryſomelae nemorum.*

aciculatus. 64. D. thoracis elytrorumque margine maculisque tribus abdominis flavis, elytris ſtriis excavatis decuſſantibus abruptis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 123. *n.* 4.
Habitat in India, *limbato affinis.*

fuſculus. 65. D. ater, elytris fuſcis laevibus, pedibus obſcure teſtaceis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 203. *n.* 382.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 190.
Habitat in Auſtria *ſuperiore.*

66. D.

oculatus. 66. D. capite cinereo: margine poſteriori maculisque duabus trigonis frontis nigris, elytris piceis: margine omni flavo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 125. *n.* 13.
Habitat Berolini, *in paludibus*, 5 *fere lineas longus.*

ornatus. 67. D. niger, ſubtus piceus, ore, maculis elytrorum, et duabus inter oculos rotundis, thorace et antennis ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 125. *n.* 15. *t.* 28. *f.* B.
Habitat Berolini, 4 *lineas longus.*

unilineatus. 68. D. niger, elytrorum margine fiſſo lineaque dimidia flaveſcentibus. *Schranck inſ. auſtr. p.* 204. *n.* 384.
Habitat in Germania.

diſpar. 69. D. niger, laevis, ore flavo, elytris variegatis thoraceque piceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 126. *n.* 18.
Habitat Berolini, $1\frac{1}{2}$–3 *lineas longus.*

ſordidus. 70. D. niger, antennis ferrugineis apice nigris, pedibus piceis, elytris atris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 126. *n.* 19.
Habitat Berolini, 2 *lineas longus.*

inſularius. 71. D. ſubtus ſpadiceus, capite thoraceque luteis, elytris nigris punctatis cancellatis: margine fulvo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 127. *n.* 20.
Habitat in Pomerania, *vix* 2 *lineas longus.*

aquaticus. 72. D. ſpadiceus, oculis, elytris thorace et ventre nigris, thoracis faſcia media et margine ſpadiceis, elytrorum margine obſolete ferrugineo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 127. *n.* 21.
Habitat Berolini, *ultra* 2 *lineas longus.*

parvulus. 73. D. ſubtus piceus, capite thoraceque fulvis, elytris nigris: margine ſtriisque duabus dimidiatis flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 127. *n.* 22.
Habitat Berolini, *vix* $1\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

piceolus. 74. D. ſubtus niger, capite thoraceque ſpadiceis, elytris piceis: margine obſolete fulvo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 127. *n.* 23.
Habitat Berolini, $3\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

ſimplex. 75. D. niger, capite, thoracis elytrorumque margine, antennis pedibusque piceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 127. *n.* 24.
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine undulati.*

capricornis. 76. D. luteſcens, ventre oculisque nigris, antennarum articulis mediis multo latioribus, elytris fuſcis punctato-excavatis. *Fueſſli apud Herbſt arch. inſ.* 5. *p.* 128. *n.* 25. *t.* 28. *f.* C. *et* b. c.
Habitat Berolini, 2 *lineas longus.*

varioloſus. 77. D. flaveſcens, ſubtus ex fuſco luteus oculis nigris, elytris ex viridi luteſcentibus, variegatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 128. *n.* 26.
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine capricornis.*

orbicularis. 78. D. niger, laevis, antennis pedibusque ferrugineis, thorace elytrisque ex luteo fuſcis pellucidis: maculis obſoletis nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 128. *n.* 27.
Habitat Berolini, *vix lineam longus.*

pedicularius. 79. D. laevis, ſubtus thorace elytrisque fuſcis, capite nigro, pedibus piceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 128. *n.* 28.
Habitat Berolini, ½ *lineam longus.*

marginellus. 80. D. niger, thoracis margine flavo, elytris flaveſcentibus ſeriatim punctatis: maculis obſoletis nigricantibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 129. *n.* 29.
Habitat Berolini, 1 – 1½ *lineam longus.*

ſeminulum. 81. D. niger laevis, elytris pellucidis ſpadiceis: apice rubro, pedibus ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 129. *n.* 30.
Habitat Berolini, *vix ultra lineam longus.*

oblongus. 82. D. obſolete niger, capite, antennis pedibusque ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 129. *n.* 31.
Habitat Berolini, *fuſculo affinis,* 2 *lineas longus.*

Zeylanicus. 83. D. niger, thorace elytrorumque margine flavo, ſterno mutilo. *Gron. muſ.* 2. *p.* 164. *n.* 552.
Habitat in Zeylon.

Gronovii. 84. D. niger laevis, antennis ferrugineis, capite poſterius maculis binis rubris. *Gron. muſ.* 2. *p.* 164. *n.* 555.
Habitat - - - *an diverſus a bipuſtulato?*

Scopolii. 85. D. niger, thoracis margine lineaque media transverſa rufis, elytris teſtaceis ſubpellucidis; poſterius faſcia abrupta punctisque plurimis atris. *Scop. ent. carn.* *n.* 295.
Habitat in Carniolia.

glaber. 86. D. fuſcus, elytris glabris, ventre pedibusque ferrugineis. *Forſt. nov. inſ. ſp. 1. p. 55. n. 55.*
Habitat in Angliae *aquis ſtagnantibus, ſtriato affinis.*

nebuloſus. 87. D. lividus nigro-nebuloſus, antennis pedibusque ferrugineis ventre atro: margine ferrugineo. *Forſt. nov. inſ. ſp. 1. p. 56. n. 56.*
Habitat in Angliae *aquis ſtagnantibus, magnitudine uliginoſi.*

exſoletus. 88. D. lividus, antennis, capite, thorace, abdomine pedibusque pallidis. *Forſt. nov. inſ. ſp. 1. p. 57. n. 57.*
Habitat in Angliae *aqua ſtagnante inter lemnum, cimicis fere magnitudine.*

danicus. 89. D. niger, margine thoracis extimo elytrorumque flavo. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 669.*
Habitat in Dania.

Mülleri. 90. D. elytris acuminatis glabris apice bipunctatis. *Müll. Fn. Fridrichsd. p. 20. n. 194. zool. dan. prodr. p. 71. n. 670.*
Habitat in Dania.

lacuſtris. 91. D. flavicans, thoracis margine flavo, elytris ſparſim punctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 671.*
Habitat in Dania.

piceus. 92. D. niger, corpore ſubtus et thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 673.*
Habitat in Dania.

foetidus. 93. D. ferrugineus, ſupra niger, margine thoracis elytrorumque extimo flavo. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 674.*
Habitat in Dania.

Comma. 94. D. flavicans, ſupra nigro-aeneus, elytrorum margine exteriore lineolaque luteſcente. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 676.*
Habitat in Dania.

quadripunctatus. 95. D. ferrugineus, elytris nigris: faſcia, macula punctisque quatuor albis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 677.*
Habitat in Dania.

biocellatus. 96. D. rufus, elytris aeneis: maculis albis longitudinaliter diſpoſitis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 72. n. 768.*
Habitat in Dania.

erythromelas. 97. D. niger, antennis tarſisque rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 770.
Habitat in Dania.

roridus. 98. D. flavus, thorace macula media, elytris nigro irroratis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 771.
Habitat in Dania.

rubripes. 99. D. nigro-aeneus nitidus, antennis, pedibus, elytrorum apice punctisque duobus ferrugineis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 772.
Habitat in Dania.

quadricolor. 100. D. ovatus rufus, thoracis medio nigro, elytris fuſcis: margine inferiore punctoque baſeos flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 780.
Habitat in Dania.

cimicoides. 101. D. virens, elytris vireſcentibus: margine inferiore maculisque albis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 781.
Habitat in Dania.

velox. 102. D. ovatus rufus, elytris ſtriis octo fuſcis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 783.
Habitat in Dania.

nanus. 103. D. niger, thorace anterius flavo, elytris ſulco abrupto, pedibus piceis. *Müll. zool. dan. prodr.* 73. *n.* 784.
Habitat in Dania.

rufifrons. 104. D. niger, thorace utrinque, elytris baſi lateribusque flavis, capite pedibusque rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 785.
Habitat in Dania.

tricolor. 105. D. rufus, elytris luteis: diſco macula communi nigra ſinuata. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 73. *n.* 786.
Habitat in Dania.

exilis. 106. D. ovatus niger, antennis baſi pedibusque ferrugineis, elytris laevibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 788.
Habitat in Dania.

quadripuſtulatus. 107. D. niger, elytris maculis quatuor flavis, pedibus rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 789.
Habitat in Dania.

108. D.

flavicans. 108. D. ater, ſupra flavicans, thorace poſterius, elytris ſtriis maculisque nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 74. *n.* 790.
Habitat in Dania.

naevius. 109. D. fulvus, maculis ſparſis nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 189. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

fimbriatus. 110. D. fuſcus, elytris anterius et exterius flavis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 190. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

rufipes. 111. D. ovatus ater, pedibus antennaramque baſi ferrugineis, elytris punctatis ſubpubeſcentibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 782.
Fn. ſuec. 1. *n.* 568. 2. *p.* 216. *n.* 772. b.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 190. *n.* 9?
Habitat in Europa.

gibbus. 112. D. flavicans, capite thoraceque virente, elytris obſcure laevibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 778.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 191. *n.* 11.
Habitat in Europa.

quadrimaculatus. 113. D. niger, thorace flavo, elytris laevibus: maculis limboque luteis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 192. *n.* 13.
Habitat in Gallia.

uniſtriatus. 114. D. niger, elytris maculis et limbo luteis: ſtria unica. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 192. *n.* 14.
Habitat in Gallia.

bilineatus. 115. D. elytris fuſcis, corpore ſubtus fulvo, thorace fulvo: linea duplici nigra. *Degeer inſ.* 4. *p.* 400. *n.* 6.
Habitat in Europa, 7 *lineas longus.*

ſeminiger. 116. D. corpore ſubtus toto nigro, thorace elytrisque obſcure fuſcis: margine rufo. *Degeer inſ.* 4. *p.* 401. *n.* 7.
Habitat in Europa, 7 *lineas longus.*

nubilus. 117. D. niger, ſupra maculis ſtriisque griſeis, pedibus rufo fuſcis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 403. *n.* 11.
Habitat in Europa, *minutus.*

hyalinus. 118. D. vireſcens, elytris hyalinis: maculis lateralibus albidis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 406. *n.* 14. *t.* 15. *f.* 21-23.
Habitat in Europa, $2\frac{1}{2}$ *lineas longus, velociſſime natans.*

virefcens. 119. D. teſtaceus ſupra vireſcens, thoracis elytrorumque marginibus externis flavis, his longitudinaliter ſtriatis, pedibus poſterioribus craſſioribus. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 778.
Habitat in Europa.

teſtaceus. 120. D. teſtaceus, thoracis margine anteriori et poſteriori fuſcis, medio, elytrorum linea ſuturali atomisque marginalibus lividis. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 783.
Habitat in Europa.

niger. 121. D. niger, thoracis margine antico externis latiore, elytrorum marginibus lividis longitudinaliter ferrugineo punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 784.
Habitat in Europa.

carbonarius. 122. D. oblongo-ovatus niger, antennis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 788.
Habitat in Europa.

bilobus. 123. D. oblongo-ovatus niger, ore, verticis macula biloba, thorace, elytrorum linea ſuturali baſi marginibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 789.
Habitat in Europa, *thoracis diſco macula transverſa nigra picto.*

ferrugineus. 124. D. ferrugineus, capite thoracisque margine poſteriori nigris, illo anterius, maculis inter oculos duabus, thorace elytrorum linea ſuturali marginibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 790.
Habitat in Europa.

flavus. 125. D. flavus, ore, punctis inter oculos duobus, thoracis elytrorumque marginibus externis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 791.
Habitat in Europa.

tricolor. 126. D. ferrugineus, capite thorace elytrisque teſtaceo-fuſcis, maculis inter oculos duabus ferrugineis, ore, thoracis elytrorumque marginibus pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 792.
Habitat in Europa.

denigratus. 127. D. niger, ore, punctis inter oculos duobus et abdomine luteis: ſegmentis utrinque macula nigra, elytris fuſcis: atomis marginibusque externis lividis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 793.
Habitat in Europa.

128. D.

unipunctatus. 128. D. ater, antennis ferrugineis, elytris pone medium utrinque puncto teſtaceo. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 795.
Habitat in Europa.

biguttatus. 129. D. niger, pedibus, abdominis apice, antennis, ore, punctis inter oculos duobus, thorace elytrisque teſtaceis, his fuſco maculatis, thoracis medio guttis duabus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 796.
Habitat in Europa.

octomaculatus. 130. D. lividus, thorace viridi-livido, elytris fuſco-lividis: ſingulis maculis quatuor connatis ſtriisque brevibus pone medium lividis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 802.
Habitat in Europa.

lividus. 131. D. lividus, capite anguſto, thorace anterius anguſtiore, elytris punctis fuſcis in ſtrias ſeriatis. *Muſ. Lesk. p.* 37. *n.* 805.
Habitat in Europa.

quadrilineatus. 132. D. niger, elytris profunde punctatis fuſceſcentibus: lineis quatuor marginibusque externis flaveſcentibus ramoſis, pedibus ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 37. *n.* 809.
Habitat in Europa.

denticulatus. 133. D. piceus, ore antennisque ferrugineis, elytris glabris: baſeos faſcia bidentata, maculis tribus, et margine externo, thorace anterius pedibusque pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 37. *n.* 810.
Habitat in Europa.

213. CARABUS. *Antennae* filiformes.

Palpi ſex: articulo ultimo obtuſo, truncato.

Thorax obcordatus, apice truncatus, marginatus.

Elytra marginata.

* *majores.*

maxilloſus. 44. C. apterus ater, mandibulis exſertis longitudine capitis, thorace poſterius producto bilobo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 298. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 194. *n,* 1.

Thunb.

Thunb. nov. inſ. ſp. 4. *p.* 69. Carabus apterus ater, thorace poſtice producto bilobo unicolore.
Voet coleoptr. t. 39. *f.* 47. 48.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 47. *f.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei, *congenerum maximus.*

thoracicus. 45. C. apterus ater, thorace poſterius producto bilobo: lateribus elytrorumque marginibus albo-villoſis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 69. *f.* 82. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 2. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *t.* 47. *f.* 2.
Habitat ad caput bonae ſpei, *maxilloſo proxime affinis.*

coriaceus. 1. C. apterus ater opacus, elytris connatis: punctis intricatis ſubrugoſis. *Scop. ent. carn.* 265. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 298. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 141. *n.* 1. Bupreſtis ater, elytris rugoſis.
Sulz. hiſt. inſ. 1. *t.* 6. *f.* 44.
Poda inſ. 45.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Degeer inſ. 4. *p.* 9. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 36. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 38. *f.* 43.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 7.
Habitat in Germaniae *ſilvis, inter maximos europaeos.*

varioloſus. 46. C. apterus ater, elytris punctis varioloſis impreſſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 4.
Habitat in Tranſylvania, *magnus.*

granulatus. 2. C. apterus nigricans, elytris aeneis ſtriatis: interjectis punctis elevatis longitudinalibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 301. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 25.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 668. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 780. Carabus apterus, elytris longitudinaliter convexe punctatis.
Fn. ſuec. 511. Carabus ater &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 82. *n.* 2. Carabus ſubapterus &c.
Geoffr. inſ. par. 1, *p.* 143. *n.* 3. Bupreſtis niger &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 6.
Voet coleoptr. t. 37. *f.* 31.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 4. 5.
β) Carabus niger, elytris ſubvireſcentibus convexe punctatis ſtriatisque. *Fn. ſuec.* 512.

γ) Ca-

γ) Carabus purpuraſcenti - niger, elytris convexe punctatis ſtriatisque. *Fn. ſuec.* 513.
Huſn. inſ. 2. *t.* 3.
Habitat in Europae arvis.

hortenſis. 3. C. apterus niger, elytris laevibus, punctis aeneis excavatis triplici ſerie, margine cyaneo. *Fn. ſuec.* 783. *Stroem. act. Nidroſ.* 3. *p.* 401. *t.* 6. *f.* 7. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 16.
Degeer inſ. 4. *p.* 90. *n.* 5. *t.* 3. *f.* 1. Carabus ſtriatus.
Raj. inſ. p. 96. *n.* 2. *Liſt. mut. t.* 8. *f.* 4. Cerambyx purpurea punctata.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 37. *f.* 33.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 4. 5.
Habitat in Europae *hortis et ſilvis, elytrorum punctis interdum concoloribus.*

taedatus. 47. C. apterus niger, elytris ſublaevibus fuſcis: punctis excavatis triplici ſerie. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 17.
Habitat in America *boreali, ſtatura et magnitudine hortenſis.*

arvenſis. 48. C. apterus nigro-cupreus, elytris ſtriatis: punctis excavatis triplici ſerie. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 18.
Habitat in Germania, *ſtatura taedati, at paulo minor.*

calidus. 49. C. apterus niger, elytris crenato-ſtriatis punctisque aureis excavatis triplici ſerie. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 19.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

retuſus. 50. C. apterus, elytris ſtriatis vireſcentibus: punctis aeneis excavatis triplici ſerie, baſi retuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 20.
Habitat ad Patagoniae *littora.*

Maderae. 51. C. apterus ater, elytris baſi retuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 301. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 21.
Habitat in inſula Madera.

convexus. 52. C. apterus convexus ater laevis, thorace poſterius emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 301. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 22.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 2.
Habitat in Germaniae *ſilvis.*

leucophthalmos. 4. C. elytris laevibus: ſtriis obſoletis octo. *Fn. ſuec.* 784.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 304. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 41.
Carabus elatus ater, elytris ſtriatis, thorace canaliculato.
Degeer inſ. 4. *p.* 96. *n.* 13. Carabus niger ſtriatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 146. *n.* 7. Bupreſtis ater, elytro ſingulo ſtriis 8 laevibus, pedibus nigris.
Liſt. ſcar. angl. p. 390. *n.* 23. Scarabaeus ex toto niger.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 2.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 9. *n.* 13. *t.* 1. *f.* 13.
β) Carabus niger. *Schall. Abh. der. hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 315.
Habitat in Europae *quiſquiliis frequens, magnitudine varius, thorace, quam in congeneribus, minore.*

attelaboides. 53. C. apterus ater, thorace anguſtiori, capite poſterius attenuato, elytris ſulcatis truncatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 305. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 42.
Habitat in Coromandel, *magnitudine leucophthalmi.*

trilineatus. 54. C. apterus ater thorace poſterius anguſtato: marginibus albis, elytris albidis: ſutura lineaque atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 305. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 43. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 71. *f.* 85. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *t.* 47. *f.* 6.
Habitat in Coromandel, *et ad* caput bonae ſpei, *prioribus minor.*

cicindeloides. 289. C. apterus ater, thorace poſterius anguſtato, elytris ovatis planis ferrugineis villoſis: margine albo. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. *n.* 3. 24.
Habitat ad caput bonae ſpei, *trilineato affinis, at paulo major, cicindelae facie.*

clathratus. 5. C. apterus nigricans, elytris aeneis porcatis interjectis punctis excavatis longitudinalibus. *Fn. ſuec.* 782.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 302. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 26.
Carabus apterus nigricans, elytris aeneis ſtriatis interjectis punctis excavatis cupreis.
Habitat in Europa.

porcatus. 55. C. apterus ater, elytris ſtriatis apice granulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 302. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 27.
Habitat in nova Hollandia.

reflexus. 56. C. apterus ater, thoracis margine rotundato reflexo, elytris ſulcatis: maculis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 302. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 28.
Habitat in Coromandel.

57. C.

anguldtus. 57. C. apterus hirtus ater, thorace canaliculato, coleoptris ſulcatis: faſciis duabus flavis interruptis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 302. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 29.
Habitat in Coromandel, *reflexo affinis.*

nitens. 6. C. apterus, elytris porcatis: ſtriis paſſim interruptis ſulcisque ſcabriuſculis inauratis. *Fn. ſuec.* 185.* *It. oel.* 96. *Scop. ent. carn.* 262.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 302. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 30. Carabus apterus, elytris porcatis ſcabris viridibus: margine aureo.
Degeer inſ. 4. *p.* 91. *n.* 6. Carabus aureus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 38. *f.* 41.
Habitat in Europae *ſilvis.*

auratus. 7. C. apterus, elytris porcatis: ſtriis ſulcisque laevibus inauratis. *Fn. ſuec.* 780.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 301. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 23. Carabus apterus, elytris auratis ſulcatis, antennis pedibusque rufis.
Degeer inſ. 4. *p.* 104. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 20. Carabus ſulcatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 142. *n.* 2. *t.* 2. *f.* 5. Bupreſtis viridis &c.
Raj. inſ. p. 96. *n.* 6. Cerambyx dorſo in longas regulas diviſo, omnium pulcherrimus.
Schaeff. ic. t. 202. *f.* 4.
Voet coleopt. 1. *t.* 36. *f.* 21.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 8. 9.
Habitat in Europae *locis ſuffocatis, ſilvis.*

ſuturalis. 58. C. apterus, elytris ſtriatis viridibus: ſutura aurea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 301. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 24.
Habitat in Terra del fuego.

violaceus. 8. C. alatus, elytris laeviuſculis nigris: margine aureo, thorace ſubviolaceo. *Fn. ſuec.* 787.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 299. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 5. Carabus alatus niger, thorace elytrorumque marginibus violaceis.
Degeer inſ. 4. *p.* 89. *n.* 3. Carabus apterus aeneo-niger nitidus.
Raj. inſ. p. 96. *n.* 1. Scarabaeus major e purpura nigricans.
Liſt. ſcar. angl. p. 389. *n.* 22. Scarabaeus maximus e viola nigricans.

Friſch inſ. 13. *t.* 23. Scarabaeus terreſtris nigricans.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 1. *et t.* 88. *f.* 1.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 16. *n.* 14. *t.* 2. *f.* 14. *et t.* 10. *f.* 6.
Habitat in Europae *ſilvis paſſim.*

purpuraſcens. 59. C. apterus ater, thoracis elytrorumque margine violaceo, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 6.
Habitat in Germania, *magnus, violaceo affinis.*

cyaneus. 60. C. apterus niger violaceo-nitens, elytris punctis intricatis rugoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 299. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 7.
Fn. ſuec. 780. Carabus (intricatus) violaceo-niger, elytris intricatis elevato-ſtriatis punctatisque.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 144. *n.* 4. Bupreſtis nigro-violaceus, elytris denſe ſtriatis.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 7.
Voet coleoptr. t. 37. *f.* 30.
Habitat in Europa *boreali, rarior.*

hiſpanus. 61. C. apterus niger, thorace cyaneo, elytris rugoſis aureis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 8.
Habitat in Hiſpania, *ſtatura cyanei.*

cephalotes. 9. C. apterus, elytris atris laevibus, thorace exſerto oblongo. *Fn. ſuec.* 788.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 304. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 39. Carabus apterus ater laeviſſimus, thorace orbiculato convexo.
Friſch inſ. 13. *p.* 25. *t.* 22. Scarabaeus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 17. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 33. *f.* 2.
Habitat in Europa *boreali.*

laevigatus. 62. C. alatus depreſſus ater, thoracis angulis poſterius rotundatis, thorace elytrisque laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 304. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 40.
Habitat in Coromandel, *majuſculus, congeneribus magis planus.*

10. C.

Carabi *larvae ſaepe intra ligna putrida, muſcas, terram &c. degunt, imagines vero inſectorum, inprimis larvarum leones ſunt, curſu feſtinantes.*

decem-guttatus. 10. C. apterus ater, thorace anguſtato, coleoptris novemſulcatis: punctis decem albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 96.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 299. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 9.
Forſk. Fn. arab. p. 77. *n.* 4? Carabus ſerrator.
Habitat in Africa, *maximus.*

ſexguttatus. 63. C. apterus thorace poſterius angulato, elytris laevibus atris: punctis duobus griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 10.
Thunb. nov. inſ. ſp. 4. *p.* 70. *f.* 84. Carabus apterus ater, thorace maculis duabus, elytris quatuor tomentoſo-albis.
Habitat in Surate.

ſexmaculatus. 64. C. apterus ater, thorace poſterius anguſtato: margine albo, elytris ſubſtriatis: maculis tribus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 11.
Habitat in Barbaria, *ſexguttato fere duplo major.*

quadriguttatus. 65. C. apterus, thorace poſterius attenuato, elytris ſulcatis: maculis duabus griſeis remotis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 12.
Habitat ad caput bonae ſpei.

tabidus. 66. C. apterus ater, thorace poſterius anguſtato, elytris rugoſo-ſulcatss. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 13.
Habitat ad caput bonae ſpei.

variegatus. 67. C. apterus ater, elytris planis laevibus: margine ſinuato punctisque diſci albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 501. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 14.
Forſk. ic. anim. t. 24. *f.* A. Cicindela.
Habitat in Oriente, *mediae magnitudinis.*

gemmatus. 68. C. apterus niger, elytris ſtriatis: punctis aeneis bilobis excavatis triplici ſerie. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 15.
Habitat Hamburgi, *ſtatura hortenſis.*

inquiſitor. 11. C. alatus, elytris ſtriatis viridi-aeneis: punctis triplici ordine. *Fn. ſuec.* 789.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 303. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 31.
Roland. act. Stokh. 1750. *p.* 292. *t.* 7. *f.* 3. Carabus alatus viridi-aeneus, concave punctatus ſtriatusque, pedibus antennisque nigris.

Degeer inſ. 4. *p.* 94. *n.* 9. Carabus alatus, elytris ſtriatis margine aeneis &c.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 145. *n.* 6. Bupreſtis elytris latis, ſingulo ſtriis ſedecim.

Voet coleoptr. t. 38. *f.* 39.

Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 3.

Habitat in Europae *locis ſuffocatis, elytris rarius totis nigris.*

ſcrutator. 69. C. alatus, elytris ſtriatis viridibus: punctis triplici ſerie, thorace cyaneo: margine reflexo aurato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 303. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 32.

Habitat in Virginia.

reticulatus. 70. C. alatus niger, elytris reticulatis viridi-aeneis, thoracis margine vireſcente. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 33.

Habitat in Europa, *ſtatura et magnitudine inquiſitoris.*

ſycophanta. 12. C. aureo-nitens, thorace caeruleo, elytris aureo-viridibus ſtriatis, thorace ſubatro. *Muſ. Lud. Ulr.* 95.* *Fn. ſuec.* 790.*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 303. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 34. Carabus alatus violaceo-nitens, elytris ſtriatis aureis.

Degeer inſ. 4. *p.* 105. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 19.

Poda inſ. 46.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 144. *n.* 5.

Reaum. inſ. 2. *t.* 37. *f.* 18.

Rob. jun. t. 20. *f.* 2.

Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 1.

Schaeff. elem. t. 2. *f.* 1.

icon. t. 66. *f.* 6.

Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 1. 2.

Voet coleoptr. t. 37. *f.* 32.

β) Carabus punctato-ſulcatus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 357. *n.* 12. *t.* 7. *f.* 14.

Habitat in Europa, *maximus europaeorum.*

Larva *nigra, noctu larvas phalaenarum devaſtat.*

indagator. 71. C. apterus ater, thoracis margine rotundato, elytris laeviſſimis: punctis aeneis triplici ſerie. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 35.

Habitat in Barbaria, *ſycophantae propior, quam hortenſi.*

roſtratus. 72. C. apterus, elytris laevibus nigris, thorace anguſtiore, capite anguſtiſſimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 304. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 36.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 577. *n.* 20. *Fn. ſuec.* 123. Tenebrio roſtratus.

Habitat

Habitat in Europa *boreali, etiam in* Calabria *elytris deflexis ad tenebriones accedens.*

elevatus. 73. C. apterus, thoracis margine rotundato deflexo, elytris violaceis, corpore atro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 37.
Habitat in America *meridionali, magnitudine et ſtatura roſtrati.*

unicolor. 74. C. apterus, thoracis margine rotundato reflexo, corpore atro, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 38.
Habitat in America *meridionali, elevato proxime affinis.*

fimbriatus. 75. C. apterus ater, thorace ſimplici: lateribus elytrorumque marginibus albo-tomentoſis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 70. *f.* 83. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *t.* 47. *f.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei, *laevis, magnitudine thoracici.*

alacer. 76. C. apterus ater immaculatus, thorace poſterius rotundato ſulcato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 70.
Habitat ad caput bonae ſpei, *fimbriato proxime affinis.*

ſpinoſus. 77. C. apterus ater, elytris octo-ſulcatis punctato-rugoſis, poſterius ſpinoſis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 70.
Voet coleoptr. 1. *t.* 38. *f.* 44. 45.
Habitat ad caput bonae ſpei, *leucophthalmi magnitudine, glaber.*

lunulatus. 78. C. apterus ater, thorace lunato, elytris ſtriatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 72. *f.* 86.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaber, magnitudine violacei, at latior et magis depreſſus.*

difformis. 79. C. apterus ater, thorace tranſverſo poſterius truncato, elytris ſtriatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 72.
Habitat in interioribus regionibus pone caput bonae ſpei *ſitis, ſtatura et magnitudine hortenſis.*

dorſalis. 80. C. ater, antennis elytrisque rubris: margine nigro. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 73.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaber, magnitudine fere leucophthalmi.*

obtuſus. 81. C. thorace elytrisque fuſcis, capite antennis pedibusque rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 74.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine fere cephalotis, crepitanti ſimilis.*

adſperſus. 82. C. apterus, ſupra viridi-aeneus obſcurus, ſubtus niger, elytris punctis excavatis aureis quadruplici ordine ſulcisque elevatis.
Degeer inſ. 4. p. n. 1. t. 3. f. 12. Carabus aeneo-punctatus *Voet coleoptr. 1. t. 37. f. 35.*
Habitat in Europae *ſilvis, ſub ceſpite; elytris interdum nigris.*

Herbſtii. 83. C. elytris tranſverſim undulatis: punctorum aureorum ordine triplici. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. p. 131. n. 15.*
Habitat in Germania, *inquiſitori ſimillimus, ſed major, pollicem longus, nunc vireſcens, nunc niger.*

pomeranus. 84. C. cupreus ſubtus niger, elytris decuſſatim ſtriatis: punctorum elevatorum ſerie triplici. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. p. 132. n. 16.*
Habitat in Pomerania, *granulato affinis, 9 fere lineas longus.*

cylindricus. 85. C. ater cylindricus, thorace anguſtato, medio ſulcato, elytris novemſulcatis: margine exteriori punctato. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. p. 132. n. 17. t. 29. f. 3.*
Habitat - - - - ultra 9 lineas longus.

problematicus. 86. C. apterus niger caeruleo-nitens, elytris obſolete ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. p. 177. n. 67. t. 47. f. 5.*
Habitat in Auſtria, *cyaneo intricatoque affinis, at brevior et latior.*

nemoralis. 87. C. niger, elytris aeneis: lineolis intricatis ſubrugoſis punctisque excavatis triplici ſerie. *Müll. zool. dan. prodr. p. 75. n. 809. Fn. Fridrichsd. p. 21. n. 211.*
Habitat in Dania; *an vere diſtincta ſpecies?*

rubicundus. 88. C. apterus, ſubtus niger, thorace violaceo, elytris rubicundis: ſutura atque marginibus albis. *Lepech. it. 2. p. 195. t. 10. f. 1.*
Habitat in Ruſſiae *fiſſuris montium.*

catenulatus. 89. C. elytris porcatis: punctorum elevatorum triplici ſerie tribus ſtriis elevatis ſcabriuſculis decuſſata. *Scop. ent. carn. n. 264.*
Habitat in Carniolia *et* Helvetia.

atomarius. 228. C. apterus ater glaber, elytris ſublaevibus: punctis minutiſſimis ſparſis confluentibus, marginibusque ſubviolaceis. *Muſ. Lesk. p. 37. n. 818.*
Habitat in Europa.

miliarius. 229. C. apterus ater, elytris marginibus externis violaceo-aeneis punctisque elevatis ſparſis. *Muſ. Lesk. p.* 37. *n.* 819.
Habitat in Europa.

rugoſus. 230. C. apterus ater, elytris rugoſis: rugis alternis confuſe fractis. *Muſ. Lesk. p.* 37. *n.* 820.
Habitat in Europa.

aeruginoſus. 231. C. apterus ater, elytris confertim ſtriatis: punctorum impreſſorum viridium ſerie triplici. *Muſ. Lesk. p.* 37. *n.* 823.

cyprius. 232. C. apterus niger, capite, thorace elytrisque cupreis: his rugis quatuor ſingulis triplici punctorum elevatorum ſerie diſcretis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 824.
Habitat in Europa.

** *minores.*

afer. 90. C. niger, antennis pedibusque rufeſcentibus, elytris laevibus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 73.
Habitat ad caput bonae ſpei *ſub lapidibus montium, magnitudine vulgaris, ſubtus piceus, oblongus.*

capenſis. 91. C. ferrugineus, thorace elytrorumque ſutura linea longitudinali nigra. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 75. *f.* 88.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura marginati, ſed paulo minor, glaber, abdomine nunc nigro, nunc ferrugineo.*

faſciatus. 92. C. ferrugineus faſcia elytrorum nigra. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 75. *f.* 89.
Habitat ad caput bonae ſpei, *quadrimaculato affinis.*

ſtriatulus. 93. C. niger, thoracis baſi utrinque puncto impreſſo, elytris ſtriatis medio glabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 305. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 44.
Habitat ad Patagoniae *littora.*

caliginoſus. 94. C. ater, thorace quadrato laevi, antennis piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 305. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 45.
Habitat in America, *capitis punctis duobus impreſſis.*

arenarius. 95. C. pallidus, elytris maculis duabus dorſalibus atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 305. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 46.
Habitat in Cambriae *arena mobili.*

ſabuloſus. 96. C. pallidus, capite coleoptrorumque macula dorſali nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 47.
Habitat in Saxoniae *ſabuletis, arenario affinis.*

ruficornis. 97. C. ater, elytris ſulcatis laevibus, antennis pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 305. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 48.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 146. *n.* 8. Bupreſtis niger &c.
Liſt. ſcarab. angl. p. 390. *n.* 24. Scarabaeus niger, pedibus corniculisque croceis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 78. *n.* 843. Carabus curſor.
Habitat in Europae *ſilvis, frequens.*

bicolor. 98. C. ſupra niger, ſubtus ferrugineus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 306. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 49.
Habitat in America *boreali.*

flavicornis. 99. C. niger, thoracis margine antennis pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 50.
Habitat Halae Saxonum, *mediae magnitudinis.*

bupreſtoides. 13. C. niger, capite recepto, antennis palpisque ferrugineis, pedibus piceis.
Habitat in Europa *auſtrali, mediae magnitudinis.*

faſtigiatus. 14. C. ferrugineus, abdomine elytrisque faſtigiatis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 97.*
Habitat ad caput bonae ſpei. Tulbagh.

lividus. 15. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris nigris: lateribus lividis. *Fn. ſuec.* 791.*
Habitat in Europa.

marginatus. 16. C. niger, elytris margine tibiisque teſtaceis. *Fn. ſuec.* 804. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 310. *n.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 84.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 162. *n.* 41. Bupreſtis viridis, pedibus elytrorumque margine exteriori pallidis.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Habitat in Europa, *aliquando viridis.*

cinctus. 100. C. fuſcus, capite thoraceque viridi-aeneis, elytrorum margine pedibusque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 510. *n.* 62. *mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 85.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 7.
Habitat in Coromandel, *marginato major.*

101. C.

pallipes. 101. C. ater, thoracis rotundati coleoptrorumque limbo et pedibus pallidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 86.
Habitat in America, *marginato minor.*

limbatus. 102. C. ſupra ferrugineus, thorace macula, elytris faſciis undatis viridi-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 310. *n.* 63. *mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 87.
Herbſt Beſch. der berl. naturf. Geſ. 4. *t.* 7. *f.* 4.
Habitat in Germania *ſub lapidibus.*

nitidulus. 103. C. niger, elytrorum margine aeneo nitido. *Fabr. mant. inſ* 1. *p.* 202. *n.* 88.
Habitat in Camtſchatca, *ſtatura et magnitudine cuprei.*

complanatus. 17. C. pallidus, elytris faſciis duabus undulatis nigricantibus.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 306. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 57.
Carabus thorace orbiculato, rufus, elytris faſciis duabus nigris.
Habitat in inſula S. Dominici.

pilicornis. 104. C. thorace rotundato, elytris ſtriatis punctisque impreſſis, antennis piloſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 65. *Lesk. it. p.* 18. *t.* A. *f.* 7.
Habitat in Anglia, *nunc niger, nunc aeneus.*

ſpinibarbis. 105. C. cyaneus, thorace orbiculato, ore antennis tibiisque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 64.
Habitat in Anglia.

ſexpuſtulatus. 106. C. rufus, elytris nigris: punctis ſex rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 63.
Habitat in America *meridionali.*

bimaculatus. 107. C. niger, faſcia communi flava interrupta, antennis pedibusque teſtaceis. *Mant. p.* 532.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 307. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 62.
Carabus niger, capite elytrisque truncatis puncto baſeos faſciaque media ferrugineis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 34. *f.* 10. 11.
Habitat in India, *thorace mox flavo, mox nigro, mox maculato.*

crepitans. 18. C. thorace capite pedibusque ferrugineis, elytris nigris.
Fn. ſuec. 272. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 61.

Degeer inſ. 4. *p.* 103. *n.* 22. *t.* 3. *f.* 18. Carabus alatus ferrugineus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 151. *n.* 19. Bupreſtis capite, thorace pedibusque rubris &c.
Rol. act. Stockh. 1750. *p.* 292. *t.* 7. *f.* 2. Cicindela capite, thorace pedibusque rufis &c.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 13.
Voet coleoptr. 1. *t.* 36. *f.* 26.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 9.
Habitat in Europae *nemoribus, perſequentes carabos majores crepitu ventris pellens.*

fumans. 108. C. ferrugineus, elytris nigro-cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 60.
Habitat in America, *crepitanti affinis, at triplo major.*

lateralis. 109. C. niger, thorace elytrorumque margine ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 59.
Habitat Kilonii, *ſtatura et magnitudine americani.*

americanus. 19. C. niger, thorace pedibus antennisque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 306. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 58.
Degeer inſ. 4. *p.* 107. *n.* 3. *t.* 17. *f.* 21.
Habitat in America, *crepitanti ſimilis, ſed quadruplo major.*

ſpinipes. 20. C. piceus, thorace linea excavata longitudinali, manibus ſpinoſis. *Fn. ſuec.* 793. *Scop. ent. carn.* 267.
Habitat in Europa, *ſuper tritici ſpicas frequens.*

cyanocephalus. 21. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque cyaneis. *Fn. ſuec.* 794.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 310. *n.* 65. *mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 90.
Fn. ſuec. 525. Carabus capite elytrisque caeruleis, thorace rubro.
Degeer inſ. 4. *p.* 100. *n.* 17. *t.* 3. *f.* 17. Carabus alatus, capite elytrisque viridi-caeruleis &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 149. *n.* 40. Bupreſtis capite elytrisque caeruleis, thorace rubro.
Raj. inſ. p. 89. *n.* 1. Cantharis elytris et capite caeruleis, ſcopulis croceis.
Schaeff. ic. t. 10. *f.* 14.
Habitat in Europae *ſilvis.*

ruficollis. 110. C. thorace obcordato ferrugineo, elytris truncatis ſtriatis viridibus, capite plano atro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 91.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

111. C.

amethyſtinus. 111. C. cyaneus, capite thoraceque aeneis nitidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 92.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine cyanocephali.*

flexuoſus. 112. C. niger, elytris ferrugineis: macula media ſinuata punctoque apicis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 311. *n.* 66. *mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 93.
Habitat in India.

melanocephalus. 22. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris. *Fn. ſuec.* 795.*
Fn. ſuec. 1. *n.* 526. Carabus capite elytrisque atris, thorace rubro.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 310. *n.* 64. *mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 89. Carabus niger, thorace pedibusque ferrugineis.
Voet coleoptr. 1. *t.* 35. *f.* 15.
β) *Fn. ſuec.* 524. Carabus niger, thorace antennis pedibusque ferrugineis.
Degeer inſ. 4. *p.* 93. *n.* 8. Carabus apterus niger nitidus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 162. *n.* 42. Bupreſtis nigro &c.
Habitat in Europae *locis ſuffocatis.*

vaporariorum. 23. C. thorace fuſco, pedibus antennis elytrisque anterius et apice ferrugineis. *Fn. ſuec.* 796.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 76. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 110.
Fn. ſuec. 1. *n.* 529. Carabus ater, elytris antice griſeis.
Müll. prodr. zool. dan. p. 78. *n.* 850. Carabus nigricans, antennis, thorace, pedibus elytrisque antice ferrugineis.
Voet coleoptr. 1. *t.* 35. *f.* 18.
Habitat in Europa, *frequens, meridiano quadruplo major.*

latus. 24. C. niger, elytris ſtriatis crenatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 521.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 308. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 73.
Degeer inſ. 4. *p.* 101. *n.* 18. Carabus alatus niger nitidus &c.
Schaeff. ic. t. 194. *f.* 7.
Habitat in Europa *frequens.*

abdominalis. 113. C. niger, antennis, abdominis diſco pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 74.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine lati.*

Lineola. 114. C. thorace ſubaequali ferrugineus, elytris lineola nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1, *p.* 309. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 75.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

ferrugineus. 25. C. ferrugineus, thorace glaberrimo. *Fn. ſuec.* 798.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 309. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 76. Carabus ferrugineus elytris ſtriatis obſcurioribus.
Degeer inſ. 4. *p.* 101. *n.* 19. Carabus alatus flavo-griſeus nitidus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 162. *n.* 43. Bupreſtis ferrugineo-lividus &c.
Herbſt apud Rueſſli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 6. c.
Habitat in Europae *arvis.*

pallens. 115. C. pallidus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 309. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 77.
Habitat Dresdae, *an ſatis diſtinctus a ferrugineo?*

dorſiger. 116. C. ferrugineus abdomine coleoptrorumque lunula lata nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 78.
Habitat in Barbaria, *ſtatura pallentis.*

germanus. 26. C. cyaneus, capite, pedibus elytrisque teſtaceis, elytris apice violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 102.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 13.
Habitat in Germania, *interdum niger.*

vulgaris. 27. C. nigro-aeneus, antennis pedibusque nigris. *Fn. ſuec.* 799.* *Scop. ent. carn.* 268. *Fabr. ſp. inſ.* 1, *p.* 308. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 70.
Degeer inſ. 4. *p.* 97. *n.* 14. Carabus alatus ſupra viridiaeneus nitidus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 158. Bupreſtis fuſco-aeneus.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 2.
Habitat in Europae *ſilvis frequens.*

azureus. 117. C. cyaneus, antennis pedibusque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 308. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 71.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in Lipſiae *collibus arenoſis.*

erythrocephalus. 118. C. niger, capite rufo, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 72.
Habitat Kilonii, *mediae magnitudinis.*

caeruleſcens. 28. C. nigro-caeruleus, antennis baſi rubris. *Fn. ſuec.* 800.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 308. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 66. Carabus nigro-caeruleſcens, elytris ſtriatis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 76. *n.* 817. Carabus virens.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 3. 4.
Habitat in Europae *hortis, viis.*

lepidus. 119. C. viridi-aeneus, thorace quadrato poſterius utrinque biſtriato, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 67.
Lesk. it. 1. *p.* 17. *n.* 8. *t. A. f.* 6.
Habitat in Luſatiae *arenoſis, magnitudine et ſtatura caeruleſcentis.*

cupreus. 29. C. cupreus, antennis baſi rubris. *Fn. ſuec.* 801.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 308. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 68.
Degeer inſ. 4. *p.* 97. *n.* 13. *t.* 3. *f.* 15. Carabus alatus ſupra viridi-aeneus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 161. *n.* 40. Bupreſtis totus viridi cupreus, antennis nigris.
Habitat in Europae *ſilvis.*

Carnifex. 120. C. alatus viridi-aeneus, antennis pedibusque rufis, thorace anguſtato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 308. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 69.
Habitat in Terra del fuego.

piceus. 30. C. niger, pedibus antennisque piceis. *Fn. ſuec.* 802.*
Fabr. ſp. inſ 1. *p.* 306. *n* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 51.
Carabus thorace obcordato, antennis tibiisque piceis, elytris ſtriatis.
Gron. zooph. 501. Carabus apterus niger.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 9.
Habitat in Europa *boreali.*

holoſericeus. 121. C. holoſericeo-niger, capite aeneo nitido. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 52.
Habitat Kilonii, *ſtatura picei.*

femoralis. 122. C. capite thoraceque aeneis, elytris ſtriatis obſcurioribus, femoribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 306. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 53.
Habitat in Sierra Leon Africae.

madidus. 123. C. niger, thorace poſterius utrinque impreſſo, femoribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 306. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 54.
Habitat in Anglia.

binotatus. 124. C. ater, capite punctis duobus frontalibus rubris, antennis baſi flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 55.
Habitat Kilonii, *ſtatura et magnitudine ruficornis.*

interruptus. 125. C. ater, thorace poſterius rotundato abdomineque remotis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 306. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 56.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 4. a.
Habitat in Oriente, *an forte tenebrio?*

velox. 31. C. nigricans, pedibus tibiisque pallidis. *Fn. ſuec.* 803.* *It. gotl.* 207.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 312. *n.* 72. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 103. Carabus nigricans, antennis pedibusque pallidis, elytris obtuſiſſimis.
Habitat in Europae *arena volatili, agiliſſimus.*

rufeſcens. 126. C. ferrugineus, thorace rotundato, vertice anoque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 73. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 104.
Habitat in Anglia.

viridanus. 127. C. viridi-aeneus, elytris ferrugineis: macula communi nigro-aenea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 105.
Habitat in Germaniae *quisquiliis, ſtatura c. vaporariorum, thorace interdum nigro.*

bipuſtulatus. 128. C. thorace orbiculato elytrisque nigris: maculis duabus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 74. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 106.
Habitat in Anglia.

aequinoctialis. 129. C. flavus, thorace cordato, elytris fuſcis: maculis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 75. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 107.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 8. d.
Habitat in Africa *aequinoctiali, parvus.*

lunatus. 130. C. niger, capite thoraceque viridi-aeneis, elytris flavis: maculis tribus nigris. *Fabr. ſyſt. ent. p.* 247. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 108.
Habitat in - - -

praſinus. 131. C. niger, capite thoraceque viridi-aeneis, elytris macula magna communi poſteriore nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 109.
Thunb. nov. inſ. ſp. 4. *p.* 74. *f.* 87. Carabus thorace capiteque cyaneis, elytris rubris: poſtice macula communi fuſca.
Habitat Hafniae *et ad* caput bonae ſpei, *ſtatura c. vaporariorum, at paulo major.*

multipunctatus. 32. C. ſubaeneus; elytris punctis vagis plurimis impreſſis. *Fn. ſuec.* 805.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 309. *n.* 58. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 79.
Habitat in Europae *ſabuloſis.*

hafnienſis. 132. C. niger, elytris ſtriatis: punctis dorſalibus plurimis impreſſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 80.
Habitat Hafniae, *mediae magnitudinis.*

aeneus. 133. C. ferrugineus, thorace elytrisque aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 309. *n.* 59. *mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 81.
Habitat in Lipſiae *hortis.*

nigricornis. 134. C. niger, thorace cupreo elytris ſtriatis viridibus, pedibus piceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 82.
Habitat in Dania, *ſtatura ſexpunctati, at paulo major.*

bipunctatus. 33. C. ſubaeneus, elytris punctis duobus impreſſis. *Fn. ſuec.* 806.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 313. *n.* 86. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 121. Carabus aeneus, antennis nigris, tibiis pallidis.
Habitat in Europae *quiſquiliis.*

anguſtatus. 135. C. thorace cylindrico cyaneo, elytris teſtaceis apice nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 122.
Habitat in Germania, *parvus, an hujus generis?*

quadripuſtulatus. 34. C. capite ferrugineo, thorace atro, elytris maculis duabus flavis. *Fn. ſuec.* 811.*
Habitat in Europa.

ſexpunctatus. 35. C. ſubaeneus, elytris punctis longitudinalibus ſex impreſſis. *Fn. ſuec.* 807.*
Fn. ſuec. 1. *n.* 519. Carabus nitens, capite thoraceque cyaneo, elytris purpureis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 309. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 83. Carabus capite thoraceque viridibus, elytris cupreis.
Degeer inſ. 4. *p.* 99. *n.* 16. Carabus alatus, capite thoraceque viridi-aureis &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 149. *n.* 14. Bupreſtis nitens, capite thoraceque viridibus &c.
Goed. inſ. 2. *p.* 126. *t.* 31.
Schaeff. ic. t. 66. *f.* 4.
Voet coleoptr. 1. *t.* 33. *f.* 4.
Habitat in Europa *et boreali* America.

36. C.

meridianus. 36. C. niger, elytris anterius pedibusque teſtáceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 77. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 111.
Habitat in Europa, *parvus.*

Comma. 136. C. niger, thorace fuſco, elytris griſeis: macula lineari nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 78. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 112.
Habitat in America.

teſtaceus. 37. C. pallide teſtaceus, elytris glabris. *Fn. ſuec.* 812.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 313. *n.* 84. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 119.
Carabus capite thoraceque ferrugineis, elytris teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 153. *n.* 25. Bupreſtis teſtaceus, capite nigro.
Habitat in Europa.

abbreviatus. 137. C. thorace rotundato rufo, elytris abbreviatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 85. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 20.
Habitat in Norwegiae *rupibus.*

uſtulatus. 38. C. thorace nigro, elytris obſcuris pallido-bifaſciatis. *Fn. ſuec.* 810. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 81. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 115.
Fn. ſuec. 528. Carabus niger, coleoptris pone faſcia ferruginea; lateribus macula ferruginea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 151. *n.* 20.
Voet coleoptr. 1. *t.* 34. *f.* 7.
Habitat in Europae *quisquiliis, maculis interdum magnis obſoletis rubro-pallidis varius.*

kilonienſis. 138. C. thorace rotundato nigro, coleoptris pallidis: macula magna dorſali nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 116.
Habitat Kilonii, *parvus.*

Crux major. 39. C. thorace capiteque nigro-rubeſcente, coleoptris ferrugineis: cruce nigra. *Fn. ſuec.* 808.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 311. *n.* 67. *mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 94.
Carabus thorace orbiculato rubro, coleoptris truncatis rubris, cruce nigra.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 150. *n.* 18.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 13.
Habitat in Europae *ſilvis.*

vittatus. 139. C. thorace marginato rufo, elytris atris: vitta alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 311. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 95.
Habitat in America *boreali.*

140. C.

turcicus. 140. C. thorace orbiculato rufo, elytris nigris: lunula baſeos pallida. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 96.
Habitat - - - *ſtatura et magnitudine vittati.*

haemorrhoidalis. 141. C. thorace ſuborbiculato, elytris nigris apice rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 97.
Habitat Dresdae, *rufus.*

picipes. 142. C. ater nitidus, thorace rotundato, elytris fuſcis, pedibus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 98.
Habitat in Suecia, *parvus, oblongus, agilis.*

agilis. 143. C. rufus, thorace rotundato, elytris abdomineque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 99.
Habitat Upſaliae, *ſtatura vittati.*

Crux minor. 40. C. thorace luteo glabro, elytris poſterius nigris: maculis duabus flavis. *Fn. ſuec.* 809.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 311. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 100. Carabus thorace orbiculato rufo, coleoptris apice nigris, macula rufa.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 8. *et t.* 41. *f.* 13.
Habitat in Europa, *praeſertim* Anglia.

Andreae. 144. C. thorace orbiculato nigro nitido, elytris pallidis: faſcia media nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 311. *n.* 70. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 101.
Habitat in Italia, *ſtatura c. crucis minoris.*

quadrimaculatus. 41. C. thorace ferrugineo glabro, elytris obtuſiſſimis fuſcis: maculis duabus albis. *Fn. ſuec.* 813.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 79. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 113.
Fn. ſuec. 1. *n.* 532. Carabus niger, thorace ferrugineo, elytrorum maculis 4 lividis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 152. *n.* 24. Bupreſtis niger, thorace plano ferrugineo &c.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Habitat in Europae *quisquiliis.*

quadriguttatus. 145. C. thorace rotundato atro, elytris nigris: punctis quatuor albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 80. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 114.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 9. c.
Habitat in Anglia.

atricapillus. 42. C. flavus, capite nigro, elytris obtuſiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 82. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 117. Carabus thorace rotundato rufo, elytris obtuſis teſtaceis, capite atro.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 10. f?
Habitat in Europa *boreali.*

biguttatus. 146. C. capite rotundato aeneo, elytris nigris: macula apicis pallida. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 83. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 118. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 76.
Habitat in Norwegia, *ſub arborum corticibus, in* Suecia, *et ad* caput bonae ſpei, *pediculo duplo major.*

truncatellus. 43. C. niger, ſupra aeneus, elytris apice ſubtruncatis. *Fn. ſuec.* 814.*
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 206. *n.* 123. Carabus thorace rotundato, ſupra obſcure aeneus, ſubtus ater.
Habitat in Europae *quisquiliis, parvus.*

Thunbergii. 147. C. elytris teſtaceis: macula communi violacea, capite thoraceque nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 20. *n.* 34.
Habitat Upſaliae, *caeruleſcentis magnitudine, c. vaporariorum affinis.*

upſalienſis. 148. C. elytris viridibus ſtriatis, thorace plano aeneo punctato. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 20. *n.* 35.
Habitat Upſaliae, *vulgaris magnitudine, cupreo affinis, at thorace punctato diſtinctus.*

ſericeus. 149. C. ater, capite thorace et elytris viridi-nitentibus, antennis pedibusque rufis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 58. *n.* 58.
Habitat in America *ſeptentrionali, ſpinipede paulo major.*

lineatus. 150. C. thorace ferrugineo, pedibus elytrisque griſeis: ſuturae linea communi alteraque media nigra, tarſis nigris. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 59. *n.* 59.
Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine crucis minoris.*

marchicus. 151. C. ſubtus niger, capite thoraceque caeſiis, palpis antennisque fuſcis baſi ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 137. *n.* 38.
Habitat Berolini, *germano affinis.*

Schranckii. 152. C. viridi-aeneus, abdomine nigro, pedibus antennisque pallide rufis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 213. *n.* 401.
Habitat in Germania, 5 *lineas longus.*

indicus. 153. C. niger, antennis apice griſeis, thorace linea impreſſa, elytris ſeptemſulcatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 138. *n.* 40. *t.* 29. *f.* 11.
Habitat in India, 9 *lineas longus.*

ſplendidus. 154. C. fuſcus, capite thoraceque viridi-aeneis, pedibus pallidis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 138. *n.* 41.
Habitat in India, *cincto proxime affinis, an ſatis diſtinctus?*

marginellus. 155. C. piceus, pedibus ſpinuloſis, antennis thoracisque margine flaveſcentibus, elytris octoſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 138. *n.* 42.
Habitat in India, *anguſtus*, 7½ *lineas longus.*

Friſchii. 156. C. niger, thoracis ſulco unico medio, elytrorum octo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 138. *n.* 43.
Habitat Berolini, 8-9 *lineas longus, oculis albis.*

varius. 157. C. ſupra nigro-aeneus ſubtus niger, corpore ovato brevi, thorace convexo, elytris laevibus, antennis baſi rufis. *Degeer inſ.* 4. *p.* *n.* 15.
Habitat in Europa, 3 *circiter lineas longus.*

Herbſtii. 158. C. niger, antennis thoracisque glaberrimi margine anteriori ferrugineis, pedibus piceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 138. *n.* 45.
Habitat Berolini.

Mülleri. 159. C. aeneo-niger, elytris punctato-ſtriatis: punctis tribus impreſſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 139. *n.* 46.
Müll. zool. dan. prodr. n. 842. Carabus ſexpunctatus.
Habitat in Europa, 3 *lineas longus.*

obſcurus. 160. C. niger, ſubtus badius, elytris fuſcis: ſtriis 8 punctatis, antennis pedibusque luteis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 139. *n.* 47. *t.* 29. *f.* 12. g.
Müll. zool. dan. prodr. n. 819.
Habitat in Europa.

Pelidnus. 161. C. niger, thorace orbiculato, elytris ſordide luteis octoſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 139. *n.* 48.
Habitat Berolini.

hungaricus. 162. C. ex fuſco rufus, elytris ſtriatis, thorace rotundato. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 108. *n.* 103. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 139. *n.* 49.
Habitat in Hungaria *et* Germania, *vix ultra* 2 *lineas longus.*

aterrimus. 163. C. totus ater nitidus, thorace rotundato, elytris obſolete ſtriatis: punctis quatuor ad ſuturam excavatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ* 6. *p.* 140. *n.* 50. *t.* 29. *f.* 13.
Habitat Berolini, *ſtatura multipunctati, at major, ſex lineas longus.*

terricola. 164. C. niger, ſubtus fuſcus, elytris caeruleis: ſtriis novem punctatis; extima crenata. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 140. *n.* 51. *t.* 29. *f.* 14.
Habitat Berolini, 7-8 *lineas longus.*

platys. 165. C. totus niger, thorace ſubmarginato, elytris glabris obſolete ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 140. *n.* 52.
Habitat Berolini, *lato proxime affinis, at latior.*

Aethiops. 166. C. totus niger nitidus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 141. *n.* 53.
Habitat Berolini, *vulgari affinis, an propria ſpecies?* 5-6 *lineas longus.*

Virgo. 167. C. niger, antennis pedibusque fuſcis, thorace poſterius ſinuato, elytris obſolete ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 141. *n.* 54.
Habitat Berolini, *vulgari ſimilis*, 3 *lineas longus.*

glaber. 168. C. niger nitidus, elytris fuſcis ſtriatis, ore palpis pedibusque piceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 141. *n.* 55.
Habitat Berolini, *vulgari affinis, ſed anguſtior.*

globoſus. 169. C. niger, thorace hemiſphaerico, elytris punctato-ſtriatis, ore palpisque ferrugineis, antennis baſi fulvis ſubmoniliformibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 142. *n.* 58. *t.* 29. *f.* 17. k.
Habitat Berolini, *vix ſesquilineam longus, an hujus generis?*

chalcos. 170. C. aeneus ſubtus niger, antennis baſi ferrugineis, thorace punctato, elytris punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 142. *n.* 59.
Habitat Berolini, $2\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

micros. 171. C. badius, elytris punctato-ſtriatis, oculis nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 142. *n.* 60.
Habitat Berolini 2 *lineas longus.*

lampros. 172. C. nitens glaberrimus aeneo-niger, ſubtus niger, elytris punctato-ſtriatis, antennis griſeis, pedibus fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 143. *n.* 61.
Habitat Berolini, *ad ripas humidas, chalco affinis, at minor,* 1½ *lineas longus.*

pyropus. 173. C. ater nitens, thoracis margine elevato, antennis pedibusque piceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 143. *n.* 62.
Habitat Berolini, *ſtatura lati,* 4 *lineas longus.*

mixtus. 174. C. luteus, capite nigro, elytris poſterius nigro irroratis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 143. *n.* 63.
Habitat Berolini, 2 *lineas longus.*

Geerii. 175. C. ſupra niger, ſubtus flavus, elytris maculis binis, pedibus antennisque fulvis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 102. *n.* 20.
Müll. zool. dan. prodr. p. 78. *n.* 840? Carabus bimaculatus.
Habitat in Europa.

didymus. 176. C. ex nigro caeruleus, elytris flavis: macula didyma fuſca. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 849.
Habitat in Dania.

minimus. 177. C. thorace ſubnigro, elytris ſtriatis pedibus antennisque fuſcis. *Müll. Fn. Fridrichsd. p.* 21. *n.* 212. *zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 833.
Habitat in Dania, *herbariis quoque infeſtus, vix pediculi magnitudine.*

flavus. 178. C. flavus, elytris ſtriatis, capite, thorace maculaque apicis elytrorum viridi. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 846.
Habitat in Dania.

feneſtratus. 179. C. niger, elytris fuſcis: maculis obliquis flavis feneſtratis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 812.
Habitat in Dania.

inflexus. 180. C. niger, tibiis tarſisque piceis, elytris punctorum impreſſorum ſerie flexuoſa. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 814.
Habitat in Dania.

fulvipes. 181. C. niger, elytris aeneis, pedibus antennisque fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 816.
Habitat in Dania.

nigricans. 182. C. ater, elytris, antennis, palpis pedibusque piceis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 819.
Habitat in Dania.

celer. 183. C. piceus, capite thorace elytriſque ſtriatis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 823. *act. nidroſ.* 4. *p.* 32.
Habitat in Scandinavia.

caeruleus. 184. C. niger, elytris cyaneis, antennis palpis pedibusque fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 827.
Habitat in Dania.

ſimilis. 185. C. niger, thorace poſterius utrinque excavato, elytrorum ſtriis ſubpunctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 828.
Habitat in Dania.

aeſtivus. 186. C. flavus, capite ferrugineo, thorace elytriſque nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 832.
Habitat in Dania.

flexilis. 187. C. flavicans, capite nigro, elytris lividis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 837. *act. nidroſ.* 4. *p.* 30.
Habitat in Scandinavia.

laevis. 188. C. aeneus, capite thoraceque viridi, elytris cupreis, pedibus piceis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 841.
Habitat in Dania.

vernalis. 189. C. niger, antennis palpis pedibusque flavis, elytris ſtriato-punctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 847.

pullus. 190. C. niger, elytris ſtriatis, pedibus piceis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 848.
Habitat in Dania.

ater. 191. C. ater, elytris ſtriatis, unguibus ſubferrugineis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 851.
Habitat in Dania.

diſcolor. 192. C. ater, ſubtus rufus, elytris mollibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 79. *n.* 857. *act. nidroſ.* 4. *p.* 31.
Habitat in Europa *boreali.*

aurichalceus. 193. C. flaveſcens ſupra aeneus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 79. *n.* 859.
Habitat in Dania.

fulvicornis. 194. C. niger glaber, elytris ſtriatis, antennis palpis pedibusque fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 77. n. 826.*
Geoff. inſ. par. 1. p. 147. n. 9. Bupreſtis niger.
Degeer inſ. 4. p. 95. n. 10. Carabus niger ruficornis.
Habitat in Europa.

leproſus. 195. C. caeruleus, antennis baſi pedibusque ferrugineis, elytris fuſcis: maculis binis albis.
Pontopp. Naturg. Dinnem. p. 211. t. 16. Carabus quadriguttatus.
Habitat in Dania.

Inderienſis. 196. C. obſcure viridis, ſubtus ater, pedibus teſtaceis, elytris ſtriatis: margine laterali ex griſeo luteſcente. *Pall. it. 1. app. n. 39.*
Habitat circa lacum Sibiriae Inderienſem, *paulo major.*

pictus. 197. C. depreſſus teſtaceus, elytris ſtriatis pedibusque griſeis. *Pallas it. 1. app. n. 40.*
Habitat in Sibiriae *campis aridiſſimis ſub cadaveribus torrefactis.*

elegans. 198. C. thorace lineari elytra aequante, pedibus rufis. *Scop. ent. carn. n. 269.*
Habitat in Carniolia.

metallicus. 199. C. ſupra aeneus nitens, thorace lateribus connivente, antennis baſi fulvis. *Scop. ent. carn. n. 270.*
Habitat in Carniolia.

cordatus. 200. C. thorace inverſe cordato. *Scop. ent. carn. n. 271.*
Habitat in Carniolia *et* Helvetia.

junceus. 201. C. corpore ſublineari, thorace pone anguſtiori. *Scop. ent. carn. n. 272.*
Habitat in Carniolia *et* Helvetia.

Scopolii. 202. C. aeneo-viridis, elytris teſtaceis: margine toto faſciaque fuſcis. *Scop. ent. carn. n. 275.*
Habitat in Carniolia.

ſalicinus. 203. C. niger punctatus, elytris fuſcis ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. n. 276.*
Habitat in Carnioliae *ſalice cuprea.*

arenoſus. 204. C. aeneo-fuſcus, thorace ſubrotundo pone dentato, pedibus rufis. *Scop. ent. carn. n. 277.*
Habitat in Carnioliae *et* Helvetiae *arena.*

lucidus. 205. C. niger nitens, elytris pedibusque teſtaceis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 108. *n.* 104.
Habitat in Hungaria, *parvus.*

octoſtriatus. 206. C. viridis punctatus, elytris octoſtriatis, pedibus pallidis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 147. *n.* 11.. Bupreſtis &c.
Habitat in Gallia.

nitidus. 207. C. viridi-nitens, elytris octoſtriatis: punctis tribus impreſſis, pedibus pallidis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 148. *n.* 12.
Habitat in Gallia.

viridis. 208. C. viridis, elytris octoſtriatis, anterius et margine fulvis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 148. *n.* 13.
Habitat in Gallia.

aerugineus. 209. C. nitens, capite elytrisque viridibus, thorace cupreo: punctis duodecim. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 149. *n.* 15.
Habitat in Gallia.

nobilis. 210. C. niger, thorace atro, elytris rubris: cruce nigra. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 150. *n.* 17.
Habitat in Gallia.

ſtrigoſus. 211. C. niger, thorace ferrugineo, elytris ſtriatis: maculis quatuor lividis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 152. *n.* 22.
Habitat in Gallia, *an vere diverſus a quadrimaculato?*

nigricollis. 212. C. totus niger, elytris ſtriatis: maculis quatuor lividis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 152. *n.* 23.
Habitat in Gallia, *an varietas quadriguttati?*

octomaculatus. 213. C. niger, elytris ſtriatis: maculis octo lividis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 153. *n.* 24.
Habitat in Gallia.

minutulus. 214. C. totus niger laevis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 153. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

variegatus. 215. C. cupreo viridique variegatus: punctis quatuor impreſſis, pedibus pallidis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 157. *n.* 32.
Habitat in Gallia.

tenebrioides. 216. C. ater, thorace lato, elytrorum ſtriis punctatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 159. *n.* 34.
Habitat in Gallia.

laticollis. 217. C. totus viridis, thorace lato. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 159. *n.* 35.
Habitat in Gallia.

lugubris. 218. C. ater opacus, palpis antennisque fulvis, tibiis tarſisque ferrugineis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 820. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 160. *n.* 37. Bupreſtis lugubris.
Habitat in Europa.

pubeſcens. 219. C. niger tomentoſus, elytris ſtriatis, antennis palpis pedibusque fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 825. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 160. *n.* 38. Bupreſtis nigro-ſericeus.
Habitat in Europa.

fuſcipes. 220. C. ater laevis, pedibus antennarumque baſi ferrugineis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 161. *n.* 39.
Habitat in Gallia.

fuſcus. 221. C. fuſcus, elytris ſtriatis, corpore ſubtus rufeſcente, pedibus antennisque ferrugineis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 96. *n.* 11. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 830? Carabus fulvus. *Schaeff. ic. t.* 18. *f.* 7.
Habitat in Europa, *mediae magnitudinis.*

verſicolor. 222. C. aeneus, corpore ovato brevi ſupra nigro-aeneo, ſubtus nigro, thorace convexo, elytris laevibus, antennis baſi rufis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 98. *n.* 15. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 824. Carabus varius.
Habitat in Europa, *parvus.*

ſubſtriatus. 223. C. niger nitidus, elytris ſubſtriatis: punctis quatuor impreſſis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 102. *n.* 21.
Habitat in Europa, *inter minimos hujus generis.*

penſylvanicus. 224. C. rufo-fuſcus, capite obſcuro, elytris ſtriatis, corpore ſubtus, antennis pedibusque teſtaceis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 108. *n.* 4. *t.* 17. *f.* 22.
Habitat in Penſylvania, 7 *lineas longus.*

halenſis. 225. C. niger, elytris ſtriatis verſus thoracem ferrugineis, antennis pedibusque teſtaceis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 317.
Habitat rarior Halae Saxonum *in locis humidis ſub lapidibus, ruficornis magnitudine, ſed magis oblongus.*

Schalleri. 226. C. ater laevis, elytris ſtriis ſubtiliſſimis punctatis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 318.
Habitat Halae Saxonum, *in viis inter agros, cuprei ſtatura et magnitudine.*

triſtis. 227. C. niger, elytris ſtriatis thoraceque ſcabris opacis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 318.
Habitat rarior Halae Saxonum, *in viis campeſtribus, cuprei ſtatura et magnitudine.*

quinque-lineatus. 233. C. ater, thorace lateribus rotundato poſterius truncato: linea dorſali et utrinque lineola baſeos duplici impreſſa, elytris rugoſis, rugarum quinque interiorum apice cum ſexta confluente. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 836.
Habitat in Europa.

tricolor. 234. C. nigro-ferrugineus, capite, antennarum baſi thoraceque nigris, antennis cinereis glabris, elytris depreſſis ſtriatis apice truncatis thoracisque marginibus externis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 837.
Habitat in Europa.

confluens. 235. C. ater, thorace lateribus rotundato, elytris ſtriatis: rugis prima et octava, ſecunda et ſeptima apice unitis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 843.
Habitat in Europa.

holoſericeus. 236. C. ater, capite thoraceque nigris, elytris fuſcis holoſericeis ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 844.
Habitat in Europa.

trichrous. 237. C. niger, antennis pedibusque ferrugineis, elytris leviſſime ſtriatis, capite thoraceque aeneis: hujus linea dorſali et poſterius utrinque lineolis duabus impreſſis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 845.
β) Carabus antennis baſi rubris. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 861.
γ) Carabus ater. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 880.
δ) Carabus niger. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 888.
Habitat in Europa.

pullus. 238. C. nigro-ferrugineus, elytris ſtriatis, antennis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 846.
Habitat in Europa.

quadratus. 239. C. thorace ſubquadrato: linea dorſali et poſterius utrinque lineola impreſſa, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 848. *et* 860.
Habitat in Europa.

plicatus. 240. C. ater, thorace ſuborbiculato poſterius utrinque plicato, elytris rugoſis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 849.
Habitat in Europa.

picatus. 241. C. piceus, elytris atris ſtriatis, thoracis linea dorſali et poſterius utrinque lineolis duabus impreſſis: interna altiore. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 850.
Habitat in Europa.

emarginatus. 242. C. ater, thorace ſubquadrato, poſterius truncato, elytris ſtriatis apice emarginatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 851.
Habitat in Europa.

chalybeus. 243. C. niger, capite thoraceque aeneis, elytris aeneo-nigris ſtriatis: marginibus externis vireſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 852.
Habitat in Europa.

erythroceras. 244. C. niger, thorace ſubquadrato ad latera rotundato, elytris ſtriatis, antennis rufis, pedibus ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 853.
Habitat in Europa.

concolor. 245. C. niger, thorace ſubquadrato, elytris atris leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 854.
β) Carabus niger, elytris leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 866.
Habitat in Europa.

erythropus. 246. C. niger, thorace poſterius quadrato, elytris ſtriatis, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 859.
β) Carabus elytris punctato-ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 875.
Habitat in Europa.

crenatus. 247. C. niger, elytris ſtriatis punctato-crenatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 862.
Habitat in Europa.

diſtinctus. 248. C. ſupra niger, ſubtus ferrugineus, thorace poſterius truncato. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 865.
Habitat in Europa.

249. C.

rubricornis. 249. C. niger, antennis rubris, thorace poſterius truncato: linea dorſali impreſſa. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 868.
Habitat in Europa.

punctulatus. 250. C. niger, elytris punctulorum minimorum ordine notatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 869.
β) Carabus elytrorum punctis ſex impreſſis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 881.
Habitat in Europa.

biſpinoſus. 251. C. niger, thorace poſterius truncato, tibiis anticis craſſis biſpinoſis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 870.
Habitat in Europa.

erythromelas. 252. C. niger, antennis tibiisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 871.
β) Carabus thorace poſterius truncato, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 873.
Habitat in Europa.

glaber. 253. C. niger glaber, thorace poſterius truncato utrinque impreſſo, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 872.
Habitat in Europa.

viridans. 254. C. nigro vireſcens, antennis pedibusque rufis, elytris ſtriatis: rugis planis leviſſime punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 874.
Habitat in Europa.

multicolor. 255. C. niger, capite thoraceque viridibus, elytris viridi-caeruleſcentibus luteſcente-villoſis, ore antennarum baſi pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 876.
Habitat in Europa.

obfuſcatus. 256. C. fuſcus, thorace poſterius truncato, elytris ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 877.
Habitat in Europa.

moeſtus. 257. C. niger, elytris ſtriatis, tibiis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 879.
Habitat in Europa.

diſcolor. 258. C. niger, thorace poſterius truncato: linea dorſali punctisque utrinque impreſſis, elytris ſtriatis margine vireſcentibus, antennis ferrugineis baſi rufis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 882. 883.
Habitat in Europa.

excifus. 259. C. ferrugineus glaber, thorace anterius truncato, poſterius exciſo, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 884.
Habitat in Europa.

limbatus. 260. C. niger, thorace marginato poſterius plicato, elytris ſtriatis, pedibus nigro-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 885.
Habitat in Europa.

truncatulus. 261. C. niger, thorace poſterius truncato, elytris ſtriatis, pedibus fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 886.
Habitat in Europa.

chloromelas. 262. C. niger, ſupra viridis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 887.
Habitat in Europá.

ſinuatus. 263. C. niger, elytris ſtriatis apice ſinuatis, antennis baſi rufis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 889.
Habitat in Europa.

pallidicornis. 264. C. niger, elytris ſtriatis, thorace poſterius truncato: marginibus externis, antennis pedibusque pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 892.
Habitat in Europa.

aurichalceus. 265. C. nigro-aeneus, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 894.
Habitat in Europa.

rotundatus. 266. C. niger, ſupra aeneus, thorace rotundato, elytris ſtriatis, tibiis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 897.
Habitat in Europa.

lituratus. 267. C. piceus, capite, pedibus ſtriatisque elytris teſtaceis: macula ad apicem communi magna thoraceque violaceis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 899.
Habitat in Europa.

truncatus. 268. C. ater thorace poſterius truncato, elytris ſtriatis tibiarum baſi plantisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 901.
β) Carabus piceus, tibiis totis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 903.
γ) *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 910.
Habitat in Europa, *antennis rufis, femoribus fuſcis.*

269. C.

ferrugi-nolus. 269. C. ferrugineus, thorace rotundato, elytris ſtriatis, antennis pedibusque lividis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 904.
β) Carabus capite nigro. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 918.
Habitat in Europa.

denigra-tus. 270. C. niger, thorace rotundato, elytris ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis, femoribus compreſſis ſupra nigris. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 905.
Habitat in Europa.

cylindri-cus. 271. C. teſtaceus cylindricus, capite nigro, thorace orbiculato rufo. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 909.
Habitat in Europa.

genicula-tus. 272. C. niger, thorace ſuborbiculato, elytris pedibusque teſtaceis: geniculis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 911.
Habitat in Europa.

quadrigut-tatus. 273. C. niger, thorace orbiculato, elytris fuſco-caeruleis: guttis quatuor pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 916.
Habitat in Europa.

ſexpun-ctatus. 274. C. nigro-aeneus, thorace rotundato, elytris ſtriatis: punctis ad ſuturam impreſſis aeneis trium parium. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 917.
Habitat in Europa.

porphy-ropus. 275. C. piceus, thorace truncato, elytris ſtriatis, antennis tibiisque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 920.
Habitat in Europa.

fuſcicor-nis. 276. C. niger ſupra aeneus, thorace rotundato punctato, elytris crenato-ſtriatis, antennis fuſcis, pedibus rufis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 921.
Habitat in Europa.

atratus. 277. C. niger, thorace orbiculato, elytris pallidis nigro-variis, antennis pedibusque fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 924.
Habitat in Europa.

triſpino-ſus. 278. C. niger, capite thoraceque orbiculato aeneis, elytris ferrugineo-aeneis ſtriato-punctatis, pedibus rufis: femoribus craſſis, tibiis triſpinoſis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 925.
Habitat in Europa.

moeſtus. 279. C. ferrugineus, thorace rotundato, elytris ſtriatis, capite fuſco, antennis pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 926.
Habitat in Europa.

lepidus. 280. C. ſupra aeneo-viridis, ſubtus caeruleſcens, thorace ſubquadrato poſtice ſtriis quatuor impreſſis, tibiis anticis apice dilatatis. *Lesk. it. p.* 17. *t.* A. *f.* 6.
Habitat in Luſatiae *monte* Keulenberg, 6 *lineas longus, vulgari affinis.*

214. TENEBRIO. *Antennae* moniliformes: articulo ultimo ſubrotundo. *Thorax* plano-convexus, marginatus. *Caput* exſertum. *Elytra* rigidiuſcula.

* *palpis ſex filiformibus: tibiis anterioribus foſſoriis, palmato-dentatis.* Scaritae Fabricii *et* Pallaſii.

complanatus. 13. T. ater, thorace ſubquadrato, elytris laeviſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 1.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

marginatus. 14. T. ater, thorace ſubquadrato, elytris ſulcatis: margine cyaneo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 2.
Habitat in Cayenna, *an varietas depreſſi?*

giganteus. 15. T. ater, mandibulis ſulcatis, elytris laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 314. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 3.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 47. *f.* 4.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſubterraneo proxime affinis, at triplo major.*

ſubterraneus. 16. T. ater, capite anterius ſulcato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 314. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 4.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *p.* 133. *n.* 18. *t.* 29. *f.* 4. a. Carabus interruptus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 4.
Voet coleoptr. t. 33. *f.* 2.

cyaneus. 17. T. cyaneus glaberrimus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 314. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 5.
Habitat in nova Hollandia.

Foſſor. 7. T. piceus. *Fn. ſuec.* 817. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 314. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 6.
Degeer inſ. 4. *p.* 350. *n.* 1. *t.* 30. *f.* 1. 2. Attelabus Foſſor.
Habitat in Europae *collibus arenoſis, quos perforat.*

Curſor. 8. T. fuſcus, thorace oblongo: angulis quinque denticulatis. *Fn. ſuec.* 818.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 314. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 7. Scarites teſtaceus, thorace oblongo, angulis quinque denticulatis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 74. *n.* 798. Tenebrio fuſcus.
Habitat in Europae *collibus arenoſis, pediculi longitudine.*

arabs. 10. T. niger, thorace ſerrato, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 314. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 8.
Habitat in Oriente.

minutus. 12. T. niger, thorace marginato, antennis clavatis pedibusque piceis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 315. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 9. Scarites piceus, antennis clavatis.
Habitat in Sueciae, *duplo major in* Saxoniae *ſabuletis; an hujus generis?*

collaris. 19. T. niger, elytris punctato-ſtriatis et capite fuſcis, antennis pedibusque piceis: anterioribus ſpinoſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 141. *n.* 56. *t.* 29. *f.* 15.
Habitat Berolini, 3 *fere lineas longus.*

bucephalus. 20. T. totus fuſcus punctatus, oculis nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 141. *n.* 57. *t.* 29. *f.* 16. i.
Habitat in India, 3 *lineas longus.*

** *palpis inaequalibus filiformibus,* Scaurus Fabricii.

atratus. 21. T. totus ater glaber. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 320. *n.* 1 *mant. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 1.
Habitat in Aegypto, *elytris connatis, pedibus anterioribus bidentatis.*

*** *palpis quatuor, anterioribus ſubclavatis, poſteribus filiformibus,* Tenebriones Fabricii, Mylarides Pallaſii.

laminatus. 22. T niger, thorace ſubquadrato laevi, elytris ſulcatis, tibiis anterioribus incurvis apice lamina ferruginea acutis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 1.
Habitat in India, *maximus ſui generis.*

1. T.

Gigas. 1. T. ater, elytris ſtriatis, thorace laevi. *Amoen. ac.* 6. *p.* 396. *n.* 26.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 37. *t.* C. *f.* 1. Mylaris gigantea.
Habitat Surinami, *lucani cervi magnitudine, antennis ſubclavatis.*

punctatulus. 23. T. niger, thorace quadrato: marginibus ſubdenticulatis, elytris ſtriato-punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 2.
Habitat in India, *magnus, palpis ſecuriformibus.*

ſerratus. 24. T. ater glaber, elytris ſtriatis, tibiis poſterioribus ſerratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 322. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 3.
Habitat in Sierra Leon Africae.

Molitor. 2. T. totus niger, femoribus anterioribus craſſioribus. *Fn. ſuec.* 875. *Scop. ent. carn.* 259.
Fn. ſuec. 547. Mordella antennarum articulis lentiformibus: ultimo globoſo.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 322. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 4. Tenebrio oblongus piceus, elytris ſtriatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 349. *n.* 6. Tenebrio atra oblonga &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 34. *n.* 3. *t.* 2. *f.* 4. Tenebrio elatus nigro fuſcus &c.
Raj. inſ. 4. (larva) Vermis farinarius.
Friſch inſ 3. *p.* 1. *t.* 1.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 52.
Schaeff. ic t. 66. *f.* 1.
Habitat in farina piſtorum, molendinis, pane ſicco, ſaccharato.
Larva *pallida, glabra, ſegmentis* 13, *mollis, luſciniis gratiſſimus cibus.*

luridus. 26. T. niger, pedibus fuſcis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 211. *n.* 5.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 325. *n.* 9. Helops luridus.
Habitat in Braſilia.

chalybeus. 3. T. violaceus, pedibus antennisque piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 7.
Degeer inſ. 5. *p.* 53. *n.* 4. *t.* 13. *f.* 11. Tenebrio aeneus.
Habitat in Guinea.

mauritanicus. 4. T. niger, ſubtus piceus, thoracis marginibus anterius poſteriusque dente angulatis.
Habitat Algiriae, *chalybeo ſimilis, at quintuplo minor, pedibus antennisque piceis.* Brander.

variegatus. 27. T. oblongus, fuſco cinereoque varius. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 8.
Habitat in Africa *aequinoctiali, fuſcus, pilis griſeis varius.*

abbreviatus. 28. T. ovatus ater, elytris ſtriatis capite tuberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 9.
Habitat in India.

capenſis. 30. T. ovatus niger, elytris ſtriatis, tibiis anterioribus dentato-ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 10.
Habitat ad caput bonae ſpei, *an forſan primae tribus?*

cornutus. 31. T. thoracis bicornis marginibus crenatis angulisque prominulis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 11.
Habitat Smirnae.

ſanguinipes. 32. T. ater, antennis pedibusque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 12.
Habitat in nova Hollandia.

bupreſtoides. 33. T. ater, thorace ovali marginato, elytris connatis laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 13.
Pall. it. 2. *p.* 719. *n.* 44.
Habitat ad caput bonae ſpei, *caraboidi proxime affinis, at major.*

dermeſtoides. 34. T. ater, thorace ovali marginato, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 14.
Habitat Halae Saxonum, *bupreſtoidi affinis.*

culinaris. 5. T. ferrugineus, elytris ſtriatis, clypeo emarginato. *Fn. ſuec.* 816. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 15.
Fn. ſuec. 546. Mordella ferrugineo rufa, thorace antice depreſſo.
Schaeff. ic. t. 66. *f.* 2.
Habitat in Hiſpaniae *arena mobili, in* Sueciae *quiſquiliis, et frumentorum acervis.*

barbarus. 6. T. ater glaberrimus, thorace orbiculato, capitis clypeo anterius margine elevato.

Habitat

Tenebriones et Pimeliae *in locis ſuffocatis, umbroſis, quiſquiliis potiſſimum in terra ipſa, larvae ibidem, in ligno, farina, aliisque cibariis degunt.*

Habitat in Mauritania, *nitidus, carabi mediocris magnitudine, elytris connatis.* Brander.

erraticus. 9. T. niger, antennis thorace ſuborbiculato elytrisque ferrugineis, his apice fuſcis. *Fn. ſuec.* 819.*
Habitat in Europa.

pallens. 10. T. pallide teſtaceus, thorace tranſverſo. *Fn. ſuec.* 820.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 324. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 16.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parvus.*

ferrugineus. 35. T. ferrugineus, elytris ſtriatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 12 *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 17.
Habitat in Africa *aequinoctiali, pallente minor et magis depreſſus.*

villoſus. 36. T. fuſcus cinereo-villoſus, elytris laevibus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 18.
Habitat in Europae *quiſquiliis, parvus.*

caraboides. 25. T. niger, thorace ovali marginato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 19.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 25. *Fn ſuec.* 825. Tenebrio apterus, thorace ovali marginato, coleoptris carinatis.
Fn. ſuec. 595. Tenebrio ater, coleoptris pone rotundatis, maxillis prominentibus.
Degeer inſ. 4. *p.* 97. *n.* 7. *t.* 3. *f.* 13. Carabus coadunatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 64. *n.* 5. Platycerus fuſcus, elytris ſtriatis.
Habitat in Europae *quiſquiliis.*

brunnipes. 37. T. ater glaber nitidus, elytris ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 20.
Habitat Dresdae, *parvus.*

laevigatus. 29. T. oblongus ater, elytris laeviuſculis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 6.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 29. Tenebrio apterus niger laevis, elytris laevibus, thorace lunato ſubtus caeruleus.
Habitat in Africa *aequinoctiali, molitore paulo minor.*

gibboſus. 38. T. ſubovatus totus aeneus, elytris gibboſo-convexis: ſtriis tenuiſſimis crenulatis. *Pall. ic. inſ. Roſſ* 1. *p.* 38. *t.* C. *f.* 2.
Habitat in Braſilia, *pimeliae mortiſagae magnitudine.*

ſpinimanus. 39. T. thorace marginato laevi, elytris laeviſſimis poſterius obtuſis, tibiis primoribus ſpina robuſtiſſima arcuata productis. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 55. *t.* C. *f.* 23.
Habitat in Ruſſia *auſtrali, circa* Boryſthenem, *pimeliae mortiſagae magnitudine, ſed craſſior et magis convexus, aterrimus, nitidus, glaberrimus, durus.*

uncinus. 40. T. apterus niger, thorace marginato ſubaequali, elytris ſtriato-punctatis angulatisque, femoribus anterioribus clavatis maximis biuncinatis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 60. *n.* 60.
Habitat in Hiſpania, *pimeliae mortiſagae magnitudine, ſed gracilior, elytris brevioribus.*

piceus. 41. T. depreſſus niger, ſubtus piceus, elytris ſtriatis. *Schaller Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 319.
Habitat Halae Saxonum *ſub corticibus et in ligno ſaligno putreſcente; an a mauritanico vere diverſus?*

cylindricus. 42. T. aterrimus, thorace punctis elevatis, antennis fuſcis, tarſis ſubtus flavo-piloſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 144. *n.* 3.
Habitat Berolini, *molitori proxime affinis.*

montanus. 43. T. totus ater, elytris opacis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 108. *n.* 102.
Habitat in Hungariae *inferioris montanis.*

triſtis. 44. T. niger ſubopacus, punctis excavatis varioloſus. *Scop. ent. carn. n.* 256.
Habitat in Carniolia.

pomonae. 45. T. ſupra piceus, infra niger, elytris ſtriis elevatis quinis. *Scop. ent. carn. n.* 257.
Habitat in Carnioliae *arboribus pomiferis, larvis binis terniſve reticulo laxo tectis in folio convoluto latentibus.*

capreae. 46. T. niger, thorace punctis impreſſis elytrisque teſtaceis. *Scop. ent. carn. n.* 258.
Habitat in Carnioliae *et* Helvetiae *ſalice caprea.*

flavus. 47. T. flavus, oculis nigris. *Scop. ent. carn. n.* 260.
Habitat in Carnioliae *umbelliferis.*

aeſtivus. 48. T. niger, palpis pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 74. *n.* 795.
Habitat in Dania.

49. T.

ſtriatus. 49. T. niger, abdomine ſubtus denſe ſtriato. *Müll. zool. dan. prodr. p. 74. n. 796.*
Habitat in Dania.

feſtinans. 50. T. totus niger glaber, thorace ferrugineo.
Habitat - - - cicindelae affinis, pediculi magnitudine, femoribus clavatis.

globoſus. 51. T. ater, thorace globoſo: lineis duabus ſcabris elevatis. *Lepech. it. 2. p. 209. t. 11. f. 34.*
Habitat in Sibiria.

incurvatus. 52. T. totus piceus, elytris ſtriatis medio tranſverſaliter impreſſis. *Lepech. it. 2. p. 210. t. 11. f. 25.*
Habitat in Sibiria.

ovatus. 53. T. ovatus nigro-fuſcus, elytris ſtriis octo laevibus. *Geoffr. inſ. par. 1. p. 348. n. 4.*
Habitat in Gallia.

rotundatus. 54. T. niger totus laevis, coleoptris pone rotundatis. *Geoffr. inſ. par. 1. p. 351. n. 8.*
Habitat in Gallia.

ſubvilloſus. 55. T. totus ferrugineus ſubvilloſus. *Geoffr. inſ. par. 1. p. 351. n. 9.*
Habitat in Gallia.

glaber. 56. T. totus ferrugineus laevis. *Geoffr. inſ. par. 1. p. 351. n. 10.*
Habitat in Gallia. *)

lignarius. 57. T. thorace cavitatibus duabus, elytris violaceis vel rufis, antennis pedibusque ferrugineis. *Degeer inſ. 5. p. 38. n. 4. t. 2. f. 15-18.*
Habitat in Europa, *larva ſub cortice pinuum in terra jacentium, quarum librum corrodunt; imago 5 lineas longa; mas minor.*

lardarius. 58. T. oblongus flavo-fulvus, oculis nigris, elytris ſtriis punctatis. *Degeer inſ. 5. p. 45. n. 7 t. 2. f. 25. 26.*
Habitat in Belgis, *larva in veſica ſuilla; imago pulicis magnitudine.*

---

*) *Species 43-55 enumeratae utrum ad tenebriones, an ad pimelias referendae, autoptis definiendum relinquo.*

curvipes. 59. T. ovatus piceus, elytris punctato-ſtriatis, femoribus arcuatis: poſterioribus ſubtus ciliatis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 937.
Habitat in Europa.

bicolor. 60. T. ovatus, elytris ſtriatis, ſupra niger, ſubtus antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 938.
Habitat in Europa.

ater. 61. T. ater, antennis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 939.
Habitat in Europa.

lunatus. 62. T. niger depreſſus, thorace lunato, elytris ſtriatis, pedibus ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 941.
Habitat in Europa.

hiſpidus. 63. T. niger hiſpidus, elytris ſtriatis: baſi macula utrinque rufa, antennis tibiisque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 942.
Habitat in Europa.

glaber. 64. T. ferrugineus, capite thoraceque glabris elytrisque atris: his ſtriatis, ore ferrugineo, pedibus lividis. *Muſ. Lesk. p.* 42. n. 943.
Habitat in Europa.

PIMELIA. *Antennae* filiformes.
Palpi quatuor.
Thorax plano-convexus, marginatus.
Caput exſertum.
Elytra rigidiuſcula. *Alae* (*plurimis*) nullae.

* *antennis apice moniliformibus.*

† *palpis clavatis*, Blaps Fabricii.

Gages. 1. P. nigra, thorace rotundato, elytris mucronatis laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 321. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 14. Tenebrio Gages.
Sulz. hiſt. inſ. p. 64. *t.* 7. *f.* 9.
Habitat in Europa *magis auſtrali, ſimillima mortiſagae, at duplo major.*

ſulcata. 2. P. coleoptris mucronatis ſulcatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 321. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 2.

Forſk.

Forſk. Fn. arab. p. 79. *n.* 10. Tenebrio (polychreſtus) apterus, elytris mucronatis, ſingulis ſtriis novem elevatis.
Habitat in Aegypti *hortis frequens.*
Commendantur contra aurium dolores ſcorpionumque morſum, et coctae a feminis turcis ſaginandi cauſſa comeduntur.

mortiſaga. 3. P. atra, coleoptris mucronatis laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 321. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 15. Tenebrio (mortiſagus) apterus, thorace aequali, coleoptris laevibus mucronatis.
Fn. ſuec. 594. 822.* *Scop. ent. carn.* 252. Tenebrio ater coleoptris acuminatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 346. Tenebrio atra aptera &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 31. *n.* 1. Tenebrio acuminatus.
Mouff. inſ. 139. Blatta foetida.
Raj. inſ. p. 90. *n.* 12.
Liſt. ſcar. angl. p. 388. *n.* 21.
Jonſt. inſ. t. 16.
Aldr. inſ. 499.
Petiv. gazoph. t. 24. *f.* 7.
Friſch inſ. 13. *t.* 25.
Schaeff. elem. t. 24. *f.* 1.
icon. t. 6. *f.* 13. *et t.* 37. *f.* 6.
Habitat in Europae *umbroſis ſuffocatis.*

excavata. 4. P. thorace poſterius angulato; elytris excavato-punctatis acutiuſculis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 322. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 4.
Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 14.
Act. angl. 271. 861. 13.
Habitat in Coromandel.

ſtriata. 5. P. ater, thorace poſterius angulato, elytris obtuſis ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 322. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 5.
Habitat in Coromandel, *ſtatura excavatae.*

crenata. 6. P. griſeo-fuſcus, thorace poſterius angulato, elytris crenato-ſtriatis obtuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 322. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 6.
Habitat in Coromandel, *ſtatura ſtriatae, at duplo minor.*

ſpecioſa. 7. P. ſubovata aenea alata, elytris politiſſimis ſtriatis cupreo viridique lineatis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 39. *t.* C. *f.* 3. Mylaris ſpecioſa.
Habitat in Braſilia, *attelabi ceramboidis magnitudine.*

chryſomeloides. 8. P. ovata ſcaberrima, thorace longitudinaliter rugoſo, elytrorum porcis tribus verrucoſis. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 52.
Habitat in Mauritania, *glandis magnitudine, an forſan ad alteram tribum ablegaunda.*

coſtata. 9. P. ſubgloboſa glabriuſcula opaca, elytris ſingulis coſtis tribus crenulatis: extima carinata.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 52. *t.* C. *f.* 18. Tenebrio coſtatus.
Habitat, rarior, in torridis deſerti caſpici inter fluvios Volgam *et* Ural *intermedii; an forte inſequentis tribus?*

toruloſa. 10. P. ovato ſubgloboſa, elytris tuberculatis undique convexis enerviis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 51. *n.* 17. *t.* C. *f.* 17. Tenebrio toruloſus.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine variabilis.*

agricola. 11. P. rufeſcens, thorace capiteque nigris. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 108. *n.* 101.
Habitat in agro Laibacenſi, *tenebrionis molitoris magnitudine.*

ſabuloſa. 12. P. atra, coleoptris rugoſis pone acuminatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 347. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat in Gallia *et* Helvetia.

octoſtriatus. 13. P. nigra, elytrorum ſtriis octo punctatis per paria diſpoſitis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 348. *n.* 3.
Habitat in Gallia. *)

†† *palpis filiformibus.*

ſtriata. 14. P. atra glabra, elytris ſtriis quatuor ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 316. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 1.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 45. *t.* C. *f.* 11. a. b.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mortiſaga major, nitida.*

unicolor. 15. P. glabra nigra, elytris immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 316. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 2.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 46. *t.* C. *f.* 12. Tenebrio gibbus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 9. Tenebrio gigas.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtriatae affinis, at paulo minor.*

16. P.

*) *Species* 11-13 *an hujus generis ordiniſve ſint, haud certo conſtat.*

gibba. 16. P. atra, thorace globoſo, elytris linea abbreviata elevata carinatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 3.
Habitat in India.

hiſpida. 17. P. atra, corpore muricato hiſpido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 316. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 4.
Forſk. Fn. arab. p. 79. *n.* 8. Tenebrio hiſpidus.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 42. *t.* 6. *f.* 1. Tenebrio ſetoſus.
Habitat rarior in Africa, *mortiſagae magnitudine, ſed brevior et craſſior.*

longipes. 18. P. atra, elytris connatis muricatis, pedibus longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 316. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 5.
Habitat in Aegypto.

cephalotes. 19. P. thoracis margine anteriori et poſteriori ciliato, elytris ſcaberrimis: nervis quatuor lateralibus carinatis ſubſerratis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 16? Tenebrio (groſſus) apterus niger glaber, coleoptris nervoſis: nervis lateralibus ſcabris, thorace emarginato.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 49. *t.* C. *f.* 15. Tenebrio cephalotes.
Habitat in deſertis *aridiſſimis ſalſis auſtralibus* Uralenſibus, *muricata brevior, et ut plurimum minor.*

muricata. 20. P. nigra, coleoptris obtuſis: ſtriis muricatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 316. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 6.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 12. *Muſ. Lud. Ulr.* 100.* *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 48. *t.* C. *f.* 14. Tenebrio muricatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 352? Tenebrio atra aptera rotundata, elytris ſulcis tribus elevatis.
Pet. gaz. 11. *t.* 92. *f.* 14.
Habitat in Europa *auſtrali*, Aegypto, *in deſerto arenoſo* Naryn, *inter fluvios* Volga *et* Ural, *nemorum poſteriorum attritu ad elytra ſtridens, mortiſaga major.*

tuberculata. 21. P. nigra, thorace ſcabro, elytris tuberculato-muricatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 7.
Habitat in Europa *magis auſtrali, ſtatura muricatae, at duplo minor.*

bipunctata. 22. P. atra, thorace globoſo: punctis duobus impreſſis, elytris rugoſis: ſtriis elevatis tribus laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 316. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 8.
Habitat in Italia, *ſtatura muricatae.*

ſcabra. 23. P. atra, elytris ſcabris lineisque elevatis tribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* Barbariae *ruderatis.*

angulata. 24. P. elytris ſpinoſis: linea laterali elevata ſerrata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 10.
Forſk. Fn. arab. p. 80. *n.* 13. Tenebrio ſpinoſus.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 55. *t.* H. *f.* C. 22. Tenebrio aſperrimus.
Habitat Alexandriae *in* Aegypto.

echinata. 25. P. thoracis lateribus ſpinoſis, elytris lineis elevatis tribus echinatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura angulatae.*

dentipes. 26. P. thorace ſcabro, elytris piloſis muricatis, femoribus anterioribus uniſpinoſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 12.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura echinatae, at paulo minor.*

dentata. 27. P. nigra, thorace glabro, elytris fuſcis: lineis elevatis tribus ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 13.
Habitat ad caput bonae ſpei, *pedibus inermibus elongatis.*

porcata. 28. P. thorace laevi nitido, elytris lineis elevatis tribus: interjectis punctis elevatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 14.
Habitat ad caput bonae ſpei, *echinata minor.*

maculata. 29. P. thorace nigro, elytris cinereis fuſco-maculatis: lineis tribus elevatis; ſecunda ſubundata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ſerrata. 30. P. thorace varioloſo, elytris lineis tribus elevatis echinatis: interſtitiis rugoſis, pedibus elongatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 16.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parva, atra.*

minuta. 31. P. thorace laevi obſcuro, elytris cinereis hiſpidis: lineis tribus elevatis laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 17.
Habitat ad caput bonae ſpei, *pedibus cinereis.*

rugoſa. 32. P. thorace ſcabro, elytris rugoſis anterius anguſtioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 18.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 27? Tenebrio apterus niger, elytris rugoſis, abdomine pedibusque caeruleſcentibus, thorace lunato.
Habitat in Aegypto.

gibboſa. 33. P. nigra laevis, thorace orbiculato convexo anterius truncato.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 18. *Fn. ſuec.* 824.* Tenebrio gibbus.
Habitat in Europa *et* Africa.

linearis. 34. P. nigra laevis, pedibus ferrugineis, antennis breviſſimis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 23. Tenebrio linearis.
Habitat in Suecia, *magnitudine culicis; an haec et gibboſa huic generi tribuique adſcribendae, judicent autoptae.*

pubeſcens. 35. P. ovata lanuginoſa opaca, elytris ſingulis coſtis quatuor denticulatis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 53. *t.* C. *f.* 19. Tenebrio pubeſcens.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 22. Tenebrio (angulatus) apterus, thorace teretiuſculo, elytris ſtriis quatuor elevatis: tertia crenata.
Voet coleoptr. 1. *t.* 39. *f.* 52?
Habitat in Aegypto *et torridis deſerti* caſpici *inter fluvios* Volgam *et* Ural *intermedii, rarior, ſupra aterrimus, coſtato magis oblongus.*

ſpinoſa. 36. P. thorace marginato anterius et poſterius ſpinoſo, elytris ſtriis elevatis laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 19.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 24. *Muſ. Lud. Ulr.* 101.* Tenebrio ſpinoſus.
Habitat in Europa *auſtrali*, Oriente.

acuminata. 37. P. thorace marginato: marginibus anterius et poſterius ſpinoſis, elytris laevibus carinatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 20.
Habitat in Europa *magis auſtrali, ſpinoſae proxime affinis, tota atra.*

reflexa. 38. P. thorace marginato: marginibus reflexis, elytris muricatis: linea laterali carinata laevi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 21.

Forſk.

Forſk. Fn. arab. p. 79. *n.* 9. Tenebrio vulgaris.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 41. *t.* C. *f.* 6. Tenebrio pterygodes.
Habitat in Oriente, *frequens in* Aegypto, *auritae affinis, at minor.*

aurita. 39. P. thorace marginato anterius dilatato, elytris utrinque bicarinatis laeviſſimis muticis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 40. *t.* C. *f.* 5. a. b. Tenebrio auritus.
Habitat ad lacum Sibiriae Inderienſem, *tota atra, mortiſaga major et magis oblonga.*

faſciata. 40. P. atra, thorace ſuborbiculato, elytris faſciis duabus abbreviatis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 22.
Habitat in India.

collaris. 41. P. nigra, elytris laevibus uniangulatis, thorace anguſtiore, capite depreſſiuſculo carinato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 319. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 23.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 21. Tenebrio (collaris) apterus niger, elytris laeviuſculis uniangulatis, thorace anguſtiore, capite depreſſiuſculo carinato.
Habitat in Europa *auſtrali, e geniculis oleum flaveſcens exſudans.*

carinata. 42. P. nigra, thorace orbiculato, elytris lineis elevatis tribus laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 319. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 24.
Forſk. Fn. arab. p. 878. *n.* 6. Tenebrio aegypticus.
Habitat in Gallia, Calabria, Aegypto.

lineata. 43. P. thorace rotundato ſcabro, elytris ſtriis tribus punctato-ſcabris poſterius lineolis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 319. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 26.
Habitat in Sibiria, *parva.*

ciliata. 44. P. nigra depreſſa, thorace elytrisque reflexo-marginatis ciliatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 319. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 25.
Habitat ad caput bonae ſpei.

glabra. 45. P. atra, thorace rotundato, elytris glaberrimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 319. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 27.
Forſk. Fn. arab. p. 78. *n.* 7. Tenebrio laevis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 30? Tenebrio (latipes) apterus niger laevis, elytris laevibus thorace ſublunato, ſubtus ater. *Pall.*

Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 44. *t.* C. *f.* 10? Tenthredo hypolithus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 351. *n.* 8? Tenebrio nigra tota laevis, coleoptris pone rotundatis.
Voet coleoptr. 1. *t.* 32. *f.* 5.
Habitat in Africa, Calabria, *et frequens in arenoſis aridis ſub ſaxis latens ad* Volgam.

anguſtata. 46. P. glabra, thorace poſterius anguſtato, elytris acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 320. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 28.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 44. *t.* C. *f.* 9. Tenebrio longicornis?
Habitat in deſerto auſtrali circa Volgam, *ſub lapidibus et in ſtercore vaccino ſicco vere frequens, et in* Aegypto, *carabi mediocris magnitudine.*

orbiculata. 47. P. glabra, thorace orbiculato, elytris acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 320. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 29.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 43. *t.* C. *f.* 8. Tenebrio Nomas.
Barrel. ic. plant. t. 945.
Habitat in Oriente, *in univerſo deſerto* tatarico, *et campis aridis* Sibiriae *auſtralis tota aeſtate frequens, duriſſima.*

didyma. 48. P. thorace late marginato, poſterius bicorni, elytris angulatis ſupra biconvexis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 42. Tenebrio didymus.
Habitat in Mauritania, *mortiſagae fere magnitudine, tota atra, glabra.*

caſpica. 49. P. ex ovato depreſſiuſcula, thorace anterius poſteriusque excavato, elytris utrinque carinatis: faſciis ſcaberrimis laevigatisque alternis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 47. *t.* C. *f.* 13. Tenebrio caſpicus.
Habitat in ripis elatioribus maris caſpii, *praeſertim orientem verſus ſitis, mortiſaga duplo craſſior.*

ſubgloboſa. 50. P. ſubgloboſa, elytris toruloſo-laevigatis: nervis ſubquaternis; extimis carinatis crenulatis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 50. *t.* C. *f.* 16. a. b. Tenebrio ſubgloboſus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 28. Tenebrio (variabilis) apterus niger laevis, elytris elevato-punctatis angulatisque.
Habitat in Gallia *auſtrali, circa* Volgam, *et in* limoſis *torridis deſerti* tatarici *magis auſtralis, lente incedens, interdiu fere immota, gordiis frequenter infeſtata, varicata brevior, et magis globoſa; an vere diſtincta a rugoſa?*

51. P.

ſilphoides. 51. P. thoracis lateribus poſterius acuminatis, anterius exciſis, elytris ſtriis tribus elevatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 26. Tenebrio ſilphoides.
Syſt. nat. X. *p.* 360. *n.* 9. Silpha maura.
Habitat in Mauritania.

tibialis. 52. P. nigra laevis, tibiis anterioribus compreſſis unidentatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 31. Tenebrio tibialis.
Habitat in Africa, Hiſpania, *vix chryſomela major, tota opaca.* Brander.

femoralis. 53. P. nigra laevis, femoribus craſſiuſculis, ſubtus canaliculatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 679. *n.* 32. Tenebrio femoralis.
Habitat in Germania, *chryſomela minor.*

ſtriatula. 54. P. nigra, coleoptris ovato-oblongis ſtriatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 679. *n.* 33. Tenebrio ſtriatulus.
Habitat in Hiſpania.

laticollis. 55. P. ovalis depreſſa aterrima laeviſſima, thorace marginato latiſſimo anterius excavato, poſterius truncato, elytris ſubſtriatis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 56. *t.* H. *f.* C. 21. Tenebrio laticollis.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine glabrae, ſed multo magis depreſſa.* *)

vittata. 85. P. gibba atra, elytris connatis glabris: ſutura et utrinque ſtriis tribus coccineis, pedibus inermibus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 932.
Habitat extra Europam.

** *antennis totis filiformibus.*

† *palpis quatuor filiformibus*, Sepidia Fabricii.

tricuſpidata. 56. P. thorace tricuſpidato, corpore griſeo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 315. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 1.
Forſk. Fn. arab. p. 80. *n.* 12? Tenebrio alexandrinus.
Habitat in Aegypto.

criſtata. 57. P. thorace tricuſpidato criſtato, corpore variegato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 315. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 2.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *t.* C. *f.* 26.
Habitat in Aegypto.

58. P.

*) *De his poſterioribus ſpeciebus, potiſſimum* 52-55, *incertum, cui tribui accenſendae.*

reticulata. 58. P. thoracis lateribus angulatis, elytris reticulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 315. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine tricuſpidatae.*

corrugata. 59. P. atra, thorace laevi nitido, elytris rugoſis: linea elevata unica. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 315. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 4.
Habitat ad caput bonae ſpei, *reticulatae proxime affinis.*

vittata. 60. P. thorace ſubangulato elytris atris: vittis duabus albis lineaque elevata unica. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 315. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 5.
Habitat ad caput bonae ſpei, *reticulata duplo minor.*

† † *palpis anterioribus ſecuriformibus, poſterioribus clavatis,* Helopes Fabricii.

caerulea. 61. P. caeruleſcens, thorace ſuborbiculato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 1. *mant inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 1.
Muſ. Lud. Ulr. 98.*
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 19. Tenebrio apterus caeruleſcens, thorace ſuborbiculato, coleoptris obtuſis.
Liſt. angl. app. 4. *f.* 14.
Pet. gaz. t. 22. *f.* 6.
Habitat in Europa, *magis auſtrali.*

lanipes. 62. P. aurea, elytris ſtriatis acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 2.
Mant. 1. *p.* 533. Tenebrio alatus aeneus, elytris ſubbifido mucronatis, plantis ſubtus hirſutis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 349. *n.* 5. Tenebrio nigro-cuprea &c.
Scop. ent. carn. 255. Tenebrio aeneus.
Habitat in Germaniae *quiſquiliis.*

aeruginoſa. 63. P. viridi-aenea, antennis, elytris pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine lanipedis.*

ſerrata. 64. P. nigra, digitis ferrugineis, palpis porrectis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 675. *n.* 11? Tenebrio (depreſſus) alatus niger, elytris caeruleſcentibus, antennis tibiisque ſanguineis, thorace depreſſo.

Schall.

Schall. Abh. der hall. Geſ. naturf. Fr. 1. *p.* 324. Tenebrio rufibarbis.
Sulz. act. Dresd. 1. Serratula.
Habitat in Anglia *et* Germania.

barbata. 65. P. nigra, palpis porrectis pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 5.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura ſerratae, at duplo minor.*

canaliculata. 66. P. niger thorace canaliculato utrinque impreſſo, elytris ſtriatis, palpis porrectis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 6.
Schall. Abh. der hall. Geſ. naturf. Fr. 1. *p.* 326. Tenebrio dubius.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura ſerratae, alata.*

laevis. 67. P. nigra thorace canaliculato, poſterius attenuato, elytris laevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 7.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura canaliculatae.*

equeſtris. 68. P. atra, elytris faſcia abbreviata aurea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 325. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 8.
Habitat in Braſilia.

maura. 69. P. atra, thorace utrinque rotundato laevi, elytris excavato-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. p. 325. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 9.
Habitat in India, *magna.*

morio. 70. P. atra, thorace quadrato laevi, elytris punctato-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 325. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 10.
Habitat in America *boreali.*

nigrita. 71. P. atra, thoracis marginibus rotundatis, elytris crenato-ſulcatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 325. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 11.
Fabr. ſyſt. ent. p. 256. *n.* 4. Tenebrio atratus.
Habitat in America *meridionali.*

rufipes. 72. P. nigra, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 325. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 12.
Habitat in nova Hollandia.

granulata. 73. P. depreſſa, elytris granulato-ſubſpinoſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p,* 214. *n.* 13.
Habitat ad caput bonae ſpei, *tribulibus minor et latior.*

longipes. 74. P. nigra, elytris ſtriatis, pedibus elongatis: pedibus ſecundi paris barbatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 14.
Habitat in Africa *aequinoctiali, tibiis raro omnibus laevibus.*

atra. 75. P. atra, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 15.
Degeer inſ. 5. *n.* 4. Pyrochroa (nigra) nitida, corpore ovato, thorace convexo, antennis pedibusque fuſcis.
Habitat Lipſiae.

anglica. 76. P. nigra, thorace anterius rotundato, elytris punctato-ſtriatis, antennis apice rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 16.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 318. *n.* 17. Pimelia Morio.
Habitat rarior in Anglia.

indica. 77. P. atra, elytris ſulcato-punctatis, femoribus anterioribus acute dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 17.
Habitat in Coromandel, *ſtatura atrae, ſed paulo minor.*

quiſquilia. 78. P. nigra, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 214 *n.* 18.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 13. *Fn. ſuec.* 821.* Tenebrio niger, ore pedibusque ferrugineis.
Habitat in Europae *quiſquiliis, ſubtus tota ferruginea.*

ruficollis. 79. P. ferruginea, elytris ſtriatis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 19.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura quiſquiliae.*

laevis. 80. P. corpore atro laevi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 20.
Habitat in Europae *quiſquiliis.*

cyanea. 81. P. caerulea, thorace punctato, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 21.
Habitat Hafniae, *tota caerulea immaculata.*

violacea. 82. P. cylindracea ſplendidiſſima caeruleo violaceoque varians, abdomine poſterius rubro, elytris punctato-ſtriatis.
Pall. ic. inſ. roſſ. 1. *p.* 40. *t.* C. *f.* 4. Mylaris violacea.
Habitat in Braſilia, *tenebrione molitore longior et gracilior.* *)

83. P.

*) *de hac et duabus ſequentibus dubium adhuc, an ad hanc tribum ſpectent.*

leucographa. 83. P. ovata, thorace ſcaberrimo difformi, elytris carinatis ſcabris: faſciis longitudinalibus albatis laevibus.
Pall. it. 2. app. p. 719. *n.* 43. Tenebrio leucogrammus.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 54. *t.* C. *f.* 20. Tenebrio leucographus.
Habitat frequens ad fluvium Irtin, *rarior ad fluvios* Ural, Volga, Selenga Ruſſiae *orientalis.*

buparia. 84. P. alata atra glabra, thorace lunato, maxillis validis dentatis longitudine capitis.
Forſter. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 61. *n.* 61. Tenebrio buparius.
Habitat in Hiſpania *ad fretum* Gaditanum, *magnitudine et ſtatura lucani interrupti, habitu tenebrionis foſſoris.*

MANTICORA.

Antennae filiformes: articulis cylindricis.
Palpi quatuor filiformes.
Thorax anterius rotundatus, poſterius apice emarginatus.
Caput porrectum. *Mandibula* exſerta, porrecta.
Elytra connata. *Alae* nullae.

maxilloſa. 1. M. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 320. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 1.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 25. *t.* 1. *f.* 38. Cicindela (gigantea) nigra, elytris coſta longitudinali ſerrata acuta, thorace bilobo.
Degeer inſ. 7. *p.* 623. *n.* 10. *t.* 46. *f.* 14. Carabus (tuberculatus) apterus niger, elytris ſcabris: tuberculis conicis hirſutis, tibiis obſcure ferrugineis.
Habitat ad caput bonae ſpei, *vulgaris carabi majoris magnitudine, celerrime currens et mordens.*

ERODIUS.

Antennae moniliformes.
Palpi quatuor filiformes.
Maxilla cornea, bifida, truncata.
Labium corneum, emarginatum.

teſtudinarius. 1. Er. gibbus ater, elytris connatis ſcabris: lateribus pulverulento-albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus, ſubtus planus.*

2. Er.

gibbus. 2. Er. gibbus ater, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 2.
Forſk. Fn. arab. p. 80. *n.* 11? Tenebrio (cothurnatus) apterus niger, thorace laevi utrinque antice unidentato, elytris tuberculatis, ſtriis duabus elatis.
Habitat in Africae *arena mobili, in* Aegypto *frequens.*

planus. 3. Er. ater, elytris linea elevata unica. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 327. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 3.
Habitat in Aegypto.

minutus. 4. Er. ater, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 327. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 4.
Habitat in Oriente.

LYTTA. *Antennae* filiformes.

Palpi quatuor inaequales: poſteriores clavati.

Thorax ſubrotundus: *Caput* inflexum, gibbum.

Elytra mollia, flexilia.

veſicatoria. 1. L. viridis, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 328. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 679. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 827. *Scop. ent. carn.* 185. Meloë (veſicatorius) alatus viridiſſimus nitens, antennis nigris.
It. ſcan. 186. Cantharis officinarum.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 341. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 5. Cantharis viridi aurata, antennis nigris.
Degeer inſ. 4. *p.* 12. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 9. Cantharis veſicatoria.
Raj. inſ. 1. 341. Cantharis vulgaris officinarum.
Mouff. inſ. 144.
Jonſt. inſ. p. 76. *t.* 7.
Aldrov. inſ. 276.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 55.
Schaeff. elem. t. 33.
icon. t. 47. *f.* 1.
Habitat in Liguſtro, Fraxino, Sambuco, Syringa, Perſiae populo tremula, Tatariae lonicera tatarica, Calabriae *quoque aſperula, officinalis pro veſicatoriis.*

nitidula. 2. L. viridi-aenea, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 328. *n.* 2. *mant. inſ.* I. *p.* 215. *n.* 2.
Habitat in Anglia.

collaris. 3. L. atra, vertice thorace pedibusque ferrugineis, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 215. *n.* 3.
Habitat in Ruſſia *meridionali, magna; mas duplo minor.*

ſyriaca. 4. L. viridi-caerulea, thorace ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 329. *n.* 3. *mant. inſ.* I. *p.* 216. *n.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 680. *n.* 4. *Muſ. Lud. Ulr.* 102. *Gron. zooph.* 620. Meloë alatus viridi-caeruleus, thorace luteo.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 30. *f.* I.
Habitat in Sibiria, India, Oriente, *et frequens in auſtrali* Europa.

feſtiva. 5. L. viridi-aenea nitida, elytris teſtaceis maculis viridi-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 329. *n.* 4. *mant. inſ.* I. *p.* 216. *n.* 5.
Pall. it. 2. *app. p.* 721. *n.* 54. Meloë feſtiva.
Habitat in Sibiria.

marginata. 6. L. atra, elytrorum marginibus cineraſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 329. *n.* 5. *mant. inſ.* I. *p.* 216. *n.* 6.
Forſt. nov. inſ. ſp. I. *p.* 62. *n.* 62. Meloë (cinereus) alatus cinereus, antennis elytrisque atris margine cinereis.
Habitat ad caput bonae ſpei.

atrata. 7. L. corpore atro immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 321. *n.* 7. *mant. inſ.* I. *p.* 216. *n.* 8.
Habitat in Barbaria.

erythrocephala. 8. L. atra, capite teſtaceo, thorace elytrisque cinereo lineatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 329. *n.* 8. *mant. inſ.* I. *p.* 216. *n.* 9.
Pall. it. I. *app. n.* 46.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 103. *n.* 81.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 30. *f.* 2.
Habitat in Europa *auſtrali, et* Ruſſia, *atratae affinis.*

vittata. 9. L. elytris nigris: vitta marginibusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 329. *n.* 6. *mant. inſ.* I. *p.* 216. *n.* 7.
Habitat in America.

10. L.

Lyttae Meloaeque, *larvae et imagines, foliis veſcuntur.*

dubia. 10. L. atra, capitis vertice fulvo, thorace elytrisque immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 329. *n.* 9. *mant. inſ* 1. *p.* 216. *n.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 12. Meloë algiricus.
Habitat in Sibiria, *erythrocephalae proxime affinis.*

afra. 11. L. nigra, thorace rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 330. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 11.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 680. *n.* 10. Meloë alatus niger, thorace rufo.
Habitat in Africa, *atratae affinis.*

indica. 12. L nigra, thorace convexo, elytris laeviſſimis fuſceſcenti-luteis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 145. *n.* 4. *t.* 30. *f.* 3.
Habitat in America, *veſicatoriae affinis.*

ruficollis. 13. L. caerulea, thorace orbiculato rubro, elytris punctatis pubeſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 179. *n.* 6. *t.* 48. *f.* 4.
Habitat in India, *ſyriacae affinis, ſed multo latior.*

quadrimaculata. 14. L. nigra glabra, pectore pubeſcente, elytris ex griſeo luteis: maculis duabus ſubquadratis nigris. *Pall. it.* 2. *app. n.* 48.
Habitat in Sibiria, *ſtatura et magnitudine feneſtratae, et inſtar ejus oleum ſuaveolens ex pedibus exſudans.*

feneſtrata. 15. L. glabra pallide teſtacea, thorace depreſſo, elytris griſeis apice nigris: maculis duabus quadratis hyalinis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 47.
Habitat ad Volgam *inter flores, ſtatura veſicatoriae, mediae magnitudinis.*

clematidis. 16. L. ex chalybeo atra nitida, elytris dilute teſtaceis immaculatis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 51.
Habitat in regionibus a fluvio Irtis *verſus orientem ſitis in clematide, veſicatoriae affinis.*

uralenſis. 17. L. nigra opaca glaberrima. *Pall. it.* 2. *app. n.* 56.
Habitat ad montes Uralenſes, *muſcae domeſticae magnitudine, proſcarabaeo affinis, elytris tamen longioribus, et capite latiore.*

ſibirica. 18. L. atra opaca glaberrima, elytris margine albis, capite rubro, oculis ore antennisque nigris. *Pall. it.* 2. *app. n.* 50.
Habitat gregaria in Sibiriae *lotis et aſtragalis; maris antennarum articulis mediis compreſſis et dente munitis.*

lutea. 19. L. atra lanuginoſa, elytris ventricoſis ſubcompreſſis luteis: punctis ſex nigris. *Pall. it. app. n.* 54.
Habitat ad fluvium Irtis, *major ad fluvium* Ural, *ſyriacae fere magnitudine.*

ocellata. 20. L. nigra lanuginoſa, pedibus teſtaceis, capite thorace elytrisque flaveſcentibus, elytris ocellis ſex medio nigris. *Pall. it. app. n.* 53.
Habitat prope mare caſpium, *ſtatura meloës trifaſciatae, et duplo major, inſtar luteae oleum ex pedibus exſudans.*

pectinata. 21. L. antennis pectinatis, corpore atro, fronte rubra. *Lepechin it.* 2. *p.* 200. *t.* 11. *f.* 26.
Habitat in Sibiria.

cinnabarina. 22. L. nigra, thorace ſupra, elytris et capite utrinque rubris. *Scop. ent. carn. n.* 186.
Habitat in Carniolia.

rufa. 26. L. nigra, capite rufo. *Scop. ann. hiſt. nat. p.* 103. *n.* 82.
Habitat in Carnioliae *calidioris collibus.*

ſubvilloſa. 27. L. flaveſcens ſubvilloſa, elytris attenuatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 343. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

bicolor. 28. L. teſtacea, elytris apice nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 344. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

formicaria. 29. L. fuſca, elytris anterius thoraceque elongato rubris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 344. *n.* 8.
Habitat in Gallia. *)

penſylvanica. 30. L. tota nigra opaca. *Degeer inſ.* 5. *p.* 16. *n.* 1. *t.* 13. *f.* 1.
Habitat in Penſylvania, $4\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

pubeſcens. 31. L. nigra, capite thoraceque pubeſcentibus, elytris flavis: macula poſterius utrinque ferruginea. *Muſ. Lesk. p.* 43. *n.* 949.
Habitat - - -

ferruginea. 32. L. ferruginea, capite thoraceque rufis, elytris fuſcis baſi teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 43. *n.* 949. b.
Habitat in Europa.

215. ME-

*) *Species* 17, 19-29 *utrum huic generi adſcribendae, an ſequenti, dubium.*

215. MELOË.

Antennae moniliformes.
Thorax ſubrotundus.
Elytra mollia, flexilia.
Caput inflexum, gibbum.

* *alis nullis, elytris abbreviatis.*

Proſcarabaeus. 1. M. corpore violaceo. *Fn. ſuec.* 826. *Scop. ent. carn.* 184.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 327. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 1.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 377. *n.* 1. Meloë.
Degeer inſ. 5. *p.* 31. *t.* 1. *f.* 1. Cantharis proſcarabaeus.
Liſter ſcarab. angl. p. 392. *n.* 27. Scarabaeus mollis, e nigra viola nitens.
Mouff. inſ. 162. *f. med.* Proſcarabaeus.
Jonſt. inſ. p. 74. *t.* 1. Proſcarabaei femina.
Clut. hemerob. p. 81. *n.* 73. Vermis majalis.
Goed. inſ. 2. *t.* 42.
Friſch inſ. 6. *t.* 6. *f.* 5.
Hufn. inſ. 2. *t.* 9.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 10. *et* 54.
Schaeff. elem. t. 82.
icon. t. 3. *f.* 5.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 17. *n.* 15. *t.* 2. *f.* 15.
Habitat, vere potiſſimum in Europae *campis apricis arenoſis, ranunculos, veratrum* e. c. *comedens, ova ſuaveolentia pariens, tacta oleum limpidiſſimum flavicans, e geniculis praeſertim pedum exſudans valde diareticum, cum melle vel oleo mixta in rabie canina commendata.*

majalis. 2. M. ſegmentis dorſalibus abdominis rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 327. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 2.
Friſch inſ. 6. *t.* 6. *f.* 4. Proſcarabaeus alter.
Pontopp. atl. dan. 1. *t.* 29.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 6.
Habitat in Europa *auſtrali, proſcarabaeo valde affinis.*

marginata. 3. M. nigra, thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 328. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 3.
Schranck Beytr. z. Naturg. p. 71. *n.* 19. Meloë (hungarus) apterus ater laevis, thoracis baſi elytrorumque margine interiori ferrugineis.
Habitat in Italia *et* Hungaria, *proſcarabaeo duplo minor.*

** *alatae, elytris alas tegentibus.*

† *maxilla bifida,* Mylabrides Fabricii.

faſciata. 4. M. nigra, elytris faſcia media flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 330. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 1.
Habitat in India.

cichorei. 5. M. nigra, elytris flavis: faſciis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 330. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 2.
Syſt. nat XII. 2. *p.* 680. *n.* 5. *Muſ. Lud Ulr.* 103.* Meloë alatus niger, thorace hirſuto, elytris faſciis tribus flavis, antennis clavatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 17. *n.* 2. *t.* 13. *f.* 2. Cantharis cichorei.
Haſſelq. it. p. 410. *n.* 101. Chryſomela cichorei.
Imper. hiſt. nat. 78. Cantharis faſciata.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 11.
Habitat in totius Orientis, *etiam* Sibiriae *et* Calabriae *cichoreis, proſcarabaei magnitudine, in* Sina *officinalis, antennis interdum apice flavis.*

decem-punctatus. 6. M. atra, elytris teſtaceis: punctis quinque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 331. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 680. *n.* 6. Meloë (quadripunctata) alatus niger, elytris flavis: maculis quinque nigris, antennis clavatis.
Habitat in Italia, *m. cichorei ſimilis, at triplo minor, antennarum articulo ultimo clavato.*

capenſis. 7. M. nigra, elytris maculis ſex flavis, prima arcuata, antennis flavis. *Muſ. Lud. Ulr.* 104.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 330. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 4.
Degeer inſ. 7. *t.* 48. *f.* 14.
Habitat ad caput bonae ſpei, *m. cichorei duplo minor.*

chryſo-meloides. 8. M. viridi-caeruleſcens, ſubtus nigro-violacea. *Amoen. ac.* 6. *p.* 396. *n.* 25.
Habitat Surinami, *an hujus generis?*

quadri-punctata. 9. M. atra, elytris teſtaceis: punctis duobus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 6.
Habitat in Ruſſia, *decempunctatae affinis.*

trimacu-lata. 10. M. nigra, coleoptris flavis: faſcia punctoque communi fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 331. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 7.
Habitat in Oriente.

11. M.

algirica. 11. M. nigra, elytris teſtaceis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 330. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 3.
Fabr. ſyſt. ent. app. 828. Mylabris immaculata.
Degeer inſ. 7. *n.* 53. *t.* 40. *f.* 17. Cantharis fulva.
Habitat in India.

teſtacea. 14. M. teſtacea, pectore elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 331. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 8.
Habitat in Sibiria, *congeneribus paulo minor.*

americana. 15. M. nigra, thorace ſemicirculari, elytris faſciis tribus flavis: prima arcuata, reliquis confluentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 145. *n.* 2. *t.* 30. *f.* 5. a.
Habitat in America, *antennarum apice clavato, ochraceo.*

indica. 16. M. nigra, elytris flaveſcentibus poſterius fulvis: puncto, baſeos litura triloba, faſcia media dentata apicisque margine ſemilunari nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 147. *n.* 5. *t.* 30. *f.* 6.
Habitat in India, *congeneribus latior.*

elongata. 17. M. nigra nitida, elytris flavis, caeruleo variis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 147. *n.* 6. *t.* 30. *f.* 7. b.
Habitat - - - ſatis anguſta.

undulata. 18. M. nigra, elytrorum vittis duabus anguſtis undulatis dentatis ſpadiceo-marginatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 179. *n.* 8. *t.* 48. *f.* 3.
Habitat in India.

aurea. 19. M. viridi-aurea, elytris fulvis. *Degeer inſ.* 7. *n.* 54. *t.* 48. *f.* 18.
Habitat - - - 4 lineas longa; an vere diſtincta ſpecies.

arcuata. 20. M. nigra hirſuta, elytris anterius macula arcuata faſciisque binis undatis flavis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 2. *t.* E. *f.* 3. b? Meloë phalerata.
Degeer inſ. 7. *n.* 52. *t.* 48. *f.* 15. Cantharis undato-bifaſciata.
Habitat - - - tres lineas longa, antennis nigris apice clavatis.

bifaſciata. 21. M. nigra hirſuta, elytris anterius macula rotunda, et ad angulum exteriorem altera faſciisque binis transverſis flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 179. *n.* 7. *t.* 48. *f.* 2.
Degeer inſ. 7. *n.* 50. *t.* 48. *f.* 13. Cantharis bifaſciata.
β) *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 2. *t.* E. *f.* 3. a. Meloe plagiata.

Habitat in India, *magna, antennis flavis, elytrorum baſi picea, a* 9½ *lineis ad* 3 *lineas ultra pollicem longa; in β) ad elytrorum angulum exteriorem macula nulla.*

trifaſciata. 22. M. ex vireſcente chalybea ſericea cana, elytris griſeo-pallidis: faſcia communi alteraque ex vireſcente atra. *Pall. it.* 2. *app. n.* 52.

Habitat in vicinia maris caſpii, *magnitudine meloës Schaefferi, ſtatura m. cichorei, antennis apice clavatis.*

atrata. 23. M. aterrima nitens, elytris faſcia flava verſus apicem undulata. *Pall. it.* 2. *app. n.* 55.

Habitat in confiniis maris caſpii, *frequens in gypſophilis et veronicis floreſcentibus, antennis apice clavatis, oleum ex pedibus exſudans.*

necydalea. 24. M. nigra, elytris ruberrimis, abdomine pauliſper brevioribus, apice diſtantibus. *Pall. it.* 2. *app. n.* 49.

Habitat in Ruſſici *imperii provinciis orientalibus, oleum pariter ſuaveolens exſudans.*

chloroptera. 25. M. nigra ſubvilloſa, elytris flavis. *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 344. *n.* 6.

Habitat in Gallia, *extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.*

penſylvanica. 26. M. nigra opaca tota.

Degeer inſ. 5. *p.* 16. *n.* 1. *t.* 13. *f.* 1. Cantharis penſylvanica.

Habitat in Penſylvania. *)

Marci. 13. M. nigra, pedibus ferrugineis, palpis clavatis criſpis.

Habitat Calmariae Suecorum, *an hujus generis?*

melanura. 30. M. elytris flavis: maculis quatuor apiceque nigris, antennis clavatis. *Petagn. inſ. Calabr. p.* 127. *n.* 136. *f.* 13.

Habitat Brancalemi *in* Calabria *in frumenti ſpicis, m. cichorei ſimillima, ſed major.*

ochroptera. 31. M. nigra, elytris croceis baſi nigris: utrinque gutta crocea ante et pone medium, faſcia interrupta apiceque nigris. *Muſ. Lesk. p.* 43. *n.* 952.

Habitat extra Europam.

32. M.

*) *Huic tribui inſerendae videntur ſpecies ab Ill.* Pallas *deſcriptae, et in ic. inſ. Roſſ. delineatae* luxata T. B. *f.* 5. a. b. variabilis *t.* E. *f.* 7. et 14. b. et lolenica *t.* E. *f.* 12. *de ſpeciebus* 13. 22-26 *magis dubium.*

bicolor. 32. M. nigra, elytris flavis: baſi utrinque punctulo, in medio faſcia ad margines externos latiore apiceque nigris. *Muſ. Lesk. p.* 43. *n.* 953.
Habitat extra Europam.

⊢ ⊢ *maxilla integra*, Cerocomata Fabricii.

Schaeffe-ri. 12. M. viridis, antennis pedibusque luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 331. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 1.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 358. *n.* 1. Cerocoma.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 681. *n.* 12. Meloë alatus viridis, pedibus luteis, antennis mari abbreviatis clavatis brevibus irregularibus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 13.
Schaeff. el. t. 37.
ic. t. 53. *f.* 8. 9.
Habitat in Europa *magis auſtrali et* Sibiria, *ſtatura veſicatoriae, ſed dimidio minor.*

Vahlii. 27. M. viridis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 2.
Habitat in Barbariae *umbellatis, ſtatura et magnitudine m. Schaefferi.*

Schrebe-ri. 28. M. viridis, antennis pedibus abdominisque ſegmentis tribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 331. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 3.
Habitat in Europa *magis auſtrali, m. Schaefferi nimis affinis, at duplo major, antennis flavis.*

Gouani. 29. M. atra, elytris apice faſciaque ſanguineis. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1068. *n.* 11.
Habitat in Gallia, *pediculi magnitudine; an hujus ordinis?*

12punctata M. in Apulia. Cyrillo Entomologia neapolitana

216. MORDELLA.

Antennae moniliformes, aut pectinatae.

Palpi quatuor, anteriores clavati, poſteriores filiformes.

Caput deflexum ſub collo, in territa.

Elytra deorſum curva apicem verſus.

Ante femora lamina lata ad baſin abdominis.

* *antennis pectinatis.*

ferruginea. 7. M. rufa, pectore ano pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 332. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 1.
Habitat in India.

naſuta. 8. M. corpore atro immaculato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 66. *f.* 77. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 2.
Habitat in Japonia, *glabra, aculeata quadruplo major.*

pectinata. 9. M. rufa, elytris nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 332. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 3.
Habitat in America.

paradoxa. 1. M. thoracis lateribus elytrisque teſtaceis. *Fn. ſuec.* 831.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 332. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 4.
Habitat rarior in Europae *plantis umbellatis.*

flabellata. 10. M. teſtacea, ore pectore abdominisque dorſo atris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 501. *mant. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 5.
Habitat in Italia, *ferrugineae affinis, at duplo fere minor.*

punctata. 11. M. thorace teſtaceo nigro punctato, elytris nigris: margine teſtaceo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 6.
Habitat in Cayenna, *ſtatura pectinatae, atra, capite teſtaceo.*

** *antennis moniliformibus.*

ſexmaculata. 12. M. atra, thorace ferrugineo, elytris teſtaceis: macula nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 332. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 7.
Habitat in America.

bimacula-ta. 13. M. ferruginea, pectore atro, elytris teſtaceis: macula nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 8.
Habitat in Hungaria, *magna.*

dimidiata. 14. M. atra, elytris baſi flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 332. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 9.
Habitat - - - ſtatura ſexmaculatae, abdomine obtuſo fere truncato.

limbata. 15. M. ferruginea, vertice thoracis diſco elytrisque atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 332. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 10.
Habitat - - - ſtatura ſexmaculatae, antennis ſerratis, pedibus nigris.

aculeata. 2. M. atra, ano ſpina terminato. *Fn. ſuec.* 832. *Scop. ent. carn.* 192.
Fn. ſuec. 534. Mordella oblonga atra, cauda aculeo terminata.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 333. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 11. Mordella ano aculeato, corpore atro immaculato.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 353. *n.* 1. Mordella atra caudata unicolor.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 46.
Schaeff. elem. t. 84.
ic. t. 127. *f.* 7.
β) *Lepech. it.* 2. *t.* 10. *f.* 15.
Habitat frequens in Europae *borealis floribus ſemifloſculoſis, umbellatis, in* Calabriae *thapſia.*

faſciata. 16. M. nigra, ano aculeato, elytris faſciis duabus cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 333. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 12.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 354. *n.* 2. Mordella atra caudata, faſciis villoſo-aureis.
Habitat in Germaniae *et* Europae *magis auſtralis floribus, an varietas aculeatae?*

octopunctata. 17. M. ano aculeato, elytris nigris: punctis quatuor flavis; primo lunato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 333. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 13.
Habitat in America *ſeptentrionali et* Bavaria.

teſtacea. 18. M. atra, elytris teſtaceis: marginibus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 14.
Habitat in Africae *dauco, ſtatura et magnitudine aculeatae, ano aculeato.*

19. M.

abdominalis. 19. M. nigra, thorace abdomineque fulvis, ano aculeato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 333. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 15. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 7. *f.* 15. Mordella bicolor.
Habitat in Germania.

humeralis. 3. M. atra, ore lateribus thoracis pedibusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 333. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 16.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 682. *n.* 3? *Fn. ſuec.* 833.* Mordella atra, lateribus thoracis baſeosque elytrorum flaveſcentibus.
Habitat in Europae *floribus.*

frontalis. 4. M. atra, fronte pedibusque flaveſcentibus. *Fn. ſuec.* 834.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 333. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 17.
Habitat in Europae *borealis floribus.*

thoracica. 5. M. atra, capite thoraceque flavis. *Fn. ſuec.* 835.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 333. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 18.
Habitat in Europae *floribus.*

flava. 6. M. flava, elytrorum apicibus nigris. *Fn. ſuec.* 836.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 334. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 19.
Habitat frequens in Europae *floribus umbellatis.*

tricuſpidata. 20. M. flava, lamina abdominali cyanea, elytrorum punctis tribus nigris thorace poſterius tricuſpidato. *Lepech. it.* 1. *t.* 19. *f.* 8.
Habitat in deſerto Uralenſi.

murina. 21. M. pubeſcens undulata, cinerea thoracis maculis tribus nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 148. *n.* 3.
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine faſciatae.*

ſexpunctata. 22. M. atra nitida, elytrorum punctis tribus albis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 148. *n.* 4.
Habitat in Marchia, *murinae fere major.*

oxyacanthae. 23. M. teſtacea, capite nigro, thorace fuſco. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 63. *n.* 63.
Habitat in Angliae *floribus crataegi oxyacanthae, aculeatae fere magnitudine.*

melanopus. 24. M. nigra, elytris, thorace capite pedibusque teſtaceis. *Forſt. ſp. inſ. nov.* 1. *p.* 64. *n.* 64.
Habitat cum m. oxyacanthae, magnitudine pediculi majoris.

bicolor. 25. M. atra, elytris teſtaceis apice nigris faſciaque nigra in medio. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 65. *n.* 65.

Habitat

Habitat in Anglia, *frequens in floribus crataegi, rumicis, umbellatarum, pediculi magnitudine.*

perlata. 26. M. nigra nitida ſubpiloſa, thoracis margine poſteriore, elytrorumque maculis quatuor perlatis. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 67. *t.* 7. *f.* 14.
Habitat in Rhaetia.

rufipes. 27. M. fuſca, pedibus ferrugineis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 355. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

*** *antennis clavatis.*

clavicornis. 28. M. tota picea. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 66. *n.* 66.
Habitat in Anglia, *curſitans in rhei rhabarbari floribus, thoracicae magnitudine, vel paulo major; utrum hujus, an perinde ac* 1. 7 - 11. *proprii generis?*

217. STAPHYLINUS.

Antennae moniliformes.
Palpi quatuor.
Elytra dimidiata. *Alae* tectae.
Cauda ſimplex, exſerens duas veſiculas oblongas.

* *palpis omnibus filiformibus.*

aureus. 27. St. capite thorace elytriſque villoſo-aureis, abdomine nigro: faſciis cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 1.
Habitat in Siam, *hirti magnitudine.*

hirtus. 1. St. hirſutus niger, thorace abdomineque poſterius nigris. *Fn. ſuec.* 839.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 334. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 2.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 363. *n.* 7. Staphylinus niger villoſus &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 20. *n.* 5. Staphylinus bombylius.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 16.
Schaeff. monogr. 1754. *t.* 2. *f.* 12.
ic. t. 36. *f.* 6.
Habitat in Europae *arenoſis.*

2. St.

murinus. 2. St. pubeſcens cinereus nigro-nebuloſus. *Fn. ſuec.* 840.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 334. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 362. *n.* 6. Staphylinus villoſus e fuſco cinereoque viridi teſſellatus.
Degeer inſ. 4. *p.* 12. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. Staphylinus villoſus.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 11.
Stroem. act. Nidr. 6.
Habitat in cadaveribus, fimo, *elytris ſubtus caeruleis.*
Larva *hexapus, nuda, pallida, capite ſegmentisque tribus anterioribus fuſcis; cauda ſetis duabus articulatis ſubtusque tuberculo pediformi cylindrico tubuloſo.*

olens. 28. St. niger opacus immaculatus, capite thorace latiore. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 4.
Müll. zool. dan. prodr. p. 97. *n.* 1090. *Fn. Fridrichsd. p.* 23. *n.* 28. Staphylinus totus niger, capite thoraceque ſcabriuſculo.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *p.* 149. *n.* 4. Staphylinus unicolor.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 360. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 1. Staphylinus ater extremo antennarum articulo lunulato.
Raj. inſ. p. 109. *n.* 1. Staphylinus major totus niger.
Habitat in Europae *cadaveribus.*

maxilloſus. 3. St. pubeſcens niger, faſciis cinereis, maxillis longitudine capitis. *Fn. ſuec.* 841.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 334. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 5.
Degeer inſ. 4. *p.* 18. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 7. 8. Staphylinus balteatus.
Liſt. loq. 391. Scarabaeus majuſculus niger, forcipibus infeſtis.
Mouff. inſ. 197.
Gron. zooph. 630.
Jonſt. inſ. t. 17. *f.* 1-3.
Bocc. muſ. 2. *t.* 31. *f.* A. A.
Habitat in Europae *ſilvis, victitans rapina.*

oculatus. 29. St. ater nitidus, capite utrinque macula fulva. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 335. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 6.
Habitat in novis Hollandia *et* Seelandia.

30. St.

Staphylini *voraciſſimi, rapina inſectorum victitant, mordaces, humentibus ut plurimum delectantur, veſiculas caudales periculo imminente exſerunt; larvae ſubterraneae: Spec.* 7-9. 21. 30. 96-100. *thorace ſcutiformi, abdomine utrinque pilis hiſpido apice ſetoſo gaudent.*

dilatatus. 30. St. thorace marginato, atro nitidulo, elytris fuſcis, antennis ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 7.
Habitat Halae Saxonum, *erythroptero major.*

bicolor. 96. St. ater, antennis, elytris pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 45. *n.* 997.
β) Staphylinus ater, antennis, elytris pedibusque rufo-teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 45. *n.* 999.
Habitat in Europa.

fuſcus. 97. St. fuſcus, elytris pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 45. *n.* 1000.
Habitat in Europa.

clavatus. 98. St. ater glaber, elytris teſtaceis: marginibus externis fuſcis, antennis clavatis, pedibus fuſco-teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 1001.
Habitat in Europa.

flavus. 99. St. niger, thorace marginibus externis late, anteriore poſteriorique ſummo elytrisque flavis: vitta media margineque externo fuſcis, antennis pedibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 45. *n.* 1004.
Habitat in Europa.

melanophthalmus. 100. St. thorace capiteque rufis, oculis, nucha abdomineque nigris, elytris pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 45. *n.* 1005.
Habitat in Europa.

erythropterus. 4. St. ater, elytris, antennarum baſi pedibusque rufis. *Fn. ſuec.* 842.* *Scop. ent. carn.* 306. *Stroem. act. nidr.* 3. *p.* 404. *t.* 6. *f.* 8. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 335. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 8.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 364. *n.* 9. Staphylinus ater non nitens.
Friſch inſ. 5. *p.* 49. *t.* 25. Scarabaeus rapax elytris brevibus.
Degeer inſ. 4. *p.* 21. *n.* 6.
Schaeff. elem. t. 117.
icon. t. 2. *f.* 2.
β) Staphylinus ater, capitis vertice, thorace, elytris tibiisque ferrugineis, antennis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 968?
Habitat ſaepius in Europae *fimo.*

erythrocephalus. 31. St. ater, capite rufo, elytris violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 335. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 9.
Habitat in nova Hollandia.

pilоſus. 32. St. piloſus niger, abdomine fuſco, elytris ſcabris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *parvus, brevis, craſſus.*

politus. 5. St. niger, thorace elytrisque nitidis. *Fn. ſuec.* 843.* *Scop. ent. carn.* 304. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 335. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 11.
Fn. ſuec 605. Staphylinus niger, thorace aeneo-nitido, elytris atro-caeruleis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 361. *n.* 3. Staphylinus ater &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 22. *n.* 7. Staphylinus niger nitidus &c.
Schaeff. ic. t. 89. *f.* 12.
Habitat in Europae *cadaveribus, recens odorem ambroſiacum ſpargens.*

brunnipes. 33. St. niger, pedibus antennarum baſi apiceque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 12.
Habitat in Anglia, *ſtatura et magnitudine politi.*

nitidus. 34. St. ater nitidus, elytris teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 13.
Habitat Kilonii, *ſtatura et magnitudine politi, an ejus varietas?*

fulgidus. 35. St. ater nitidus, elytris plantisque teſtaceis, capite punctulato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 14.
Habitat Kilonii, *ſtatura politi, at tenuior.*

marginatus. 36. St. ater, thoracis lateribus pedibusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 15. *Act. Nidroſ.* 4. *p.* 332. *n.* 33.

obtuſus. 9. St. teſtaceus, elytris anterius anoque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 17.
Habitat in Germania, Anglia, *pediculi magnitudine, pectore inter femora poſteriora fuſco.*

lignorum. 10. St. fuſcus, elytris ſutura abdomine pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 848.*
Habitat in Europa.

ſilphoides. 11. St. niger, thoracis lateribus pedibusque lividis, elytris lividis: margine maculaque longitudinali nigris.
Habitat in Europa, *obtuſo ſimilis.*

ſubterraneus. 12. St. niger, elytris anterius extrorſum flavis, pedibus nigris. *Fn. ſuec.* 849.*
Habitat in Europa.

flaveſcens. 13. St. ater, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. *Fn. ſuec.* 850.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 16.
Habitat in Europa *boreali.*

biguttatus. 15. St. niger, elytris puncto fulvo. *Fn. ſuec.* 851.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 336. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 20.
Staphylinus niger, elytris puncto albido, oculis prominulis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 371. *n.* 24?
Müll. zool. dan. prodr. p. 99. *n.* 1123?
Habitat ad littora maris baltici.

cicindeloides. 37. St. niger rugoſus, antennis pedibusque teſtaceis: geniculis nigris. *Schaller Abh. der. hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 324.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura et magnitudine biguttati.*

bipuſtulatus. 16. St. niger, elytris puncto ferrugineo. *Fn. ſuec.* 847.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 18.
Habitat in Europa *boreali, antennis extrorſum craſſioribus.*

analis. 38. St. ater nitidus, antennis, elytris, ano pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 19.
Habitat Kilonii, *bipuſtulato major.*

clavicornis. 39. St. niger immaculatus, thorace rotundato laevi, antennis extrorſum craſſioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 25.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 371. *n.* 25?
β) *Scop. ent. carn. n.* 303. Staphylinus clavicornis.
Habitat Kilonii, β) *pedibus rufis ſub* Carnioliae *pyri cortice.*

Canthare llus. 17. St. niger, elytris glaucis apice flavicantibus.
Habitat in Suecia *ad* Hammarby, *cantharidi biguttatae ſimillimus.*

littoreus. 18. St. niger, elytris anterius griſeis, pedibus rufis. *Fn. ſuec.* 852.* *It. gotl.* 173.
Habitat in littoribus.

ſanguineus. 19. St. niger, elytris ſanguineis. *Fn. ſuec.* 853.*
Habitat in Europa.

caraboides. 20. St. flavus immaculatus. *Fn. ſuec.* 854.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 337. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 33.
Fn. ſuec. 613. Staphylinus totus teſtaceus.
Degeer inſ. 4. *p.* 25. *n.* 12. Staphylinus fulvus.
Habitat in Europa *boreali.*

chryſomelinus. 21. St. niger, thorace elytris pedibusque teſtaceis. *Fn. ſuec.* 855.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 685. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 28.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 368. *n.* 18.
Habitat in Europa *boreali.*

fuſcipes. 22. St. niger, elytris pedibusque teſtaceis. *Fn. ſuec.* 857. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 22.
Habitat in Europae *ſtercore.*

hypnorum. 40. St. ater laevis, thoracis lateribus, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 23.
Habitat in Angliae *hypnis.*

nitidulus. 41. St. ater, thoracis marginibus flaveſcentibus, elytris ferrugineis: margine nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 337. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 24.
Habitat in Anglia.

atricapillus. 42. St. thorace rufo, elytris fuſcis: puncto baſeos margineque poſteriore albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 337. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 25.
Habitat in Anglia.

marginellus. 43. St. ater, elytrorum margine laterali et poſteriore ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 337. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 26.
Habitat in Angliae *ſtercore, mediae magnitudinis.*

canaliculatus. 44. St. flavus, capite abdominisque cingulo atris, thorace canaliculato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 29.
Habitat Kilonii, *parvus.*

tricolor. 45. St. ater, antennis thoraceque rufis, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 30.
Habitat in Daniae *boletis, parvus.*

rufipes. 24. St. ater glaber, pedibus rufis. *Fn. ſuec.* 858.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 337. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 31.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 367. *n.* 19. Staphylinus niger &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 24. *n.* 11. *t.* 1. *f.* 14. Staphylinus ovatus glaber &c.
Habitat in Europa, *interdum teſtaceus, aut niger, pedibus teſtaceis.*

46. St.

melanocephalus. 46. St. ferrugineus, capite atro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 32.
Habitat in Suecia, *minutus.*

rugoſus. 47. St. niger, thorace elytrisque rugoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 338. *n.* 24. *mant inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 34.
Habitat in Anglia.

piceus. 25. St. niger, elytris piceis, thorace depreſſo: lineis elevatis tribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 338. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 35.
Habitat in Europa *boreali, pediculi magnitudine, ſed magis oblongus.*

boleti. 26. St. fuſcus, elytris pallidioribus, antennis pedibusque lividis. *Fn. ſuec.* 859.*
Habitat gregarius in boletis abietinis, *quorum fiſtulas tanquam apis ſuas fiſtulas intrat, pulice dimidio minor.*

obſcurus. 48. St. niger opacus obſolete punctatus, antennis baſi fuſcis, verſus apicem incraſſatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 149. *n.* 8.
Habitat Berolini, *magnitudine politi, ſtatura murini.*

tricornis. 49. St. niger, fronte bicuſpidata, thorace poſterius cornuto, elytris rubris: margine ſuperiori et interiori nigricante. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 149. *n.* 9. *t.* 30. *f.* 8. c.
Habitat rarior Berolini, *polito tertia parte minor.*

blattinus. 50. St. ater, thorace lato, elytris pedibusque teſtaceis nitidis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 236. *n.* 447.
Habitat in Auſtria *in terra, habitu blattae lucifugae.*

minor. 51. St. niger glaber, elytris pallide, antennis baſi fuſcis, pedibus luteis. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 97. *n.* 1096.
Habitat in Europa *boreali, ultra* 3 *lineas longus.*

ſaxatilis. 52. St. ater nitidus ſubpubeſcens, elytris pedibus abdominisque apice teſtaceis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 234. *n.* 442.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 365. *n.* 13.
Habitat in Germania *et* Gallia, *in terra ſub lapidibus, minore minor.*

ſimilis. 53. St. niger, pedibus luteis: femorum apice nigro. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 151. *n.* 15.
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine biguttati.*

Domicella. 54. St. niger, thorace elytris pedibusque badiis. *Schranck inſ. auſtr. p. 235. n. 444.*
Habitat in Auſtria *ſuperiori, 2 lineas longus.*

glaberrimus. 55. St. niger nitidus, antennis apicem verſus incraſſatis: articulo primo longiſſimo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. p. 151. n. 17.*
Habitat Berolini, *4 circiter lineas longus.*

buphthalmos. 56. St. niger immaculatus, oculis magnis exſertis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p. 72. §. 21. inſ. auſtr. p. 235. n. 445.*
Habitat in Auſtria *ad hortorum muros.*

ophthalmicus. 57. St. atro-caeruleus punctatus, oculis macula pallida lunulata ſuffuſis. *Scop. ent. carn. n. 300.*
Habitat in Carniolia.

fulvipes. 58. St. atro caeruleus, palpis pedibusque fulvis. *Scop. ent. carn. n. 301.*
Habitat in Carniolia.

braſſicae. 59. St. ferrugineus, capite et corpore nigris, elytris punctatis, antennis extrorſum craſſioribus villoſis. *Scop. ent. carn. n. 309.*
Habitat in Carnioliae *braſſica.*

arnicae. 60. St. niger, thorace antennisque ferrugineis, pedibus teſtaceis. *Scop. ent. carn. n. 310.*
Habitat in Carnioliae *arnica.*

hellebori. 61. St. niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. n. 311.*
Geoffr. inſ. par. 1. p. 366. n. 14?
Habitat in Carnioliae *helleboro, et* Gallia.

foſſor. 62. St. fuſco rufus, elytris apice pedibusque rufis. *Scop. ann. hiſt. nat. 5. p. 109. n. 105.*
Habitat in fungis metallorum Schemnizenſium.

fodinarum. 63. St. caeruleſcens villoſus, tarſis rufis. *Scop. ann. hiſt. nat. 5. p. 109. n. 106.*
Habitat ad ligna cuniculorum Schemnizenſium, *ſtatura foſſoris.*

niger. 64. St. totus niger, capite thoraceque nitido non punctato. *Müll. prodr. zool. dan. p. 98. n. 1109. Fn. Fridrichsd. p. 23. n. 229.*
Habitat in Dania.

curſor. 65. St. niger, thorace depreſſo: litura duplici, elytris pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1095.
Habitat in Dania.

agarici. 66. St. luteus, capite nigro, abdomine rufo. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1097.
Habitat in Daniae *agaricis.*

latus. 67. St. niger, elytrorum ſummo margine poſteriori pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1011.
Habitat in Dania.

penetrans. 68. St. niger, antennis elytris pedibusque caſtaneis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1102.
Habitat in Dania.

vernalis. 69. St. fulvus, elytris anterius, abdomineque poſterius nigris, medio rufo. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 98. *n.* 1103.
Habitat in Dania, *facie chryſomelini, vere potiſſimum conſpicuus.*

marginalis. 70. St. niger, thoracis marginibus, elytris, pedibus abdominisque apice flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 98. *n.* 1107.
Habitat in Dania.

fuſcicornis. 71. St. niger, capite thoraceque nitidis, elytris margine inferiore antennisque lividis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 98. *n.* 1112.
Habitat in Dania.

floreus. 72. St. niger, thorace convexo punctulato, elytris pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1117.
Habitat in Daniae *floribus.*

fracticornis. 73. St. linearis niger, pedibus antennisque fuſcis: infimo articulo atro. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1118.
Habitat in Dania.

formicarius. 74. St. linearis niger, infimo antennarum articulo atro. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1119.
Habitat in Dania, *aliquando rufus, capite et abdomine, aut etiam thorace, aut inſimul elytris nigris.*

punctatus. 75. St. atro-caeruleus, femoribus teſtaceis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1121. *Act. Nidroſ.* 4. *p.* 36.
Habitat in Dania.

ſtriatus. 76. St. ater, thorace punctato ſtriatoque. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1122. *Act. Nidroſ.* 4. *p.* 35.
Habitat in Dania.

ſpinipes. 77. St. niger, pedibus teſtaceis, tibiis ſpinoſis. *Pontopp. Naturg. Dännem. p.* 211. *n.* 9. *t.* 16.
Habitat in Dania.

tataricus. 78. St. totus ater nitidus, thorace cylindrico capite anguſtiore, elytris ſubtiliſſime punctatis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 74.
Habitat ad lacum Tatariae *ſalſum* Inderienſem, *maximus, gracilis, longus, glaberrimus.*

pubeſcens. 79. St. villoſus nigro-fuſcus, nigro viridi griſeoque maculatus, ſubtus argenteus, abdominis apice ſubrotundato. *Degeer inſ.* 4. *p.* 17. *n.* 2.
Habitat in Europa *in terra et fimo*, 6½ *lineas longus.*

chalcocephalus. 80. St. obſcure fuſcus, capite thoraceque aeneis nitidis, tibiis faſciisque rufo-fuſcis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 22. *n.* 8.
Habitat in Europa, *polito paulo minor.*

aeneus. 81. St. glaber aeneo-viridis nitidus, abdomine pedibusque nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 23. *n.* 9.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 367. *n.* 17.
Müll. zool. dan. prodr. p. 98. *n.* 1110.
Habitat in Europa, 4 *lineas longus.*

glaber. 82. St. niger nitens, elytris laevibus pedibusque teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 364. *n.* 10.
Müll. zool. dan. prodr. p. 98. *n.* 1106.
Habitat in Europa.

glaucus. 83. St. atro caeruleſcens, extremo antennarum articulo lunulato. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 361. *n.* 2.
Habitat in Gallia.

macropterus. 84. St. ater, elytris thorace duplo longioribus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 362. *n.* 4.
Habitat in Gallia.

ochrocephalus. 85. St. pubeſcens, capite flavo, thorace elytrisque fuſco nigroque nebuloſis: punctis impreſſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 363. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

86. St.

Cui tribui accenſendae ſpecies 56-92, *incertum.*

punctulatus. 86. St. niger nitens, elytris punctatis pedibusque teſtaceis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 365. *n.* 11.
Habitat in Gallia.

curtulus. 87. St. niger nitens, thorace plano marginato, elytris punctatis pedibusque fuſcis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 365. *n.* 12.
Habitat in Gallia.

ſulcatus. 88. St. niger, thorace marginato ſulcato, pedibus rufis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 730. *n.* 45.
Habitat in Gallia.

limbatus. 89. St. niger, elytris fuſcis: margine flavo. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 368. *n.* 19.
Habitat in Gallia, *flaveſcente multo major.*

maculatus. 90. St. niger, thorace utrinque elytrisque macula flava. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 369. *n.* 20.
Habitat in Gallia.

rubricollis. 91. St. atro-caeruleſcens, thorace rubro. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 370. *n.* 23.
Habitat in Gallia.

cylindricus. 101. St. cylindricus totus ater glaber. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 967.
Habitat in Europa.

dichrous. 102. St. ater, capite thoraceque glabris, elytris fuſco-ferrugineis, antennarum baſi et articulis quinque ultimis plantisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 970.
Habitat in Europa.

picatus. 103. St. ater, capite thoraceque piceis glabris. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 972.
Habitat in Europa.

glaber. 104. St. ater glaber. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 973.
Habitat in Europa.

erythropus. 105. St. ater, antennis pedibus elytrisque rufis: his baſi nigris. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 974.
Habitat in Europa.

cruentatus. 106. St. ater, elytris ſingulis diſco gutta ſanguinea. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 975.
Habitat in Europa.

lugubris. 107. St. niger, antennis, elytris pedibusque fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 976.
β) St. ater, elytris antennis pedibusque fuſco-teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44 *n.* 982.
Habitat in Europa.

biclavatus. 108. St. ater glaber, elytris pedibusque fuſco-teſtaceis, antennis biclavatis: baſi longa clavata atra. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 978.
Habitat in Europa.

rufeſcens. 109. St. capite thoraceque atris punctatis, abdomine nigro, elytris antennis pedibusque fuſco-rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 979.
Habitat in Europa.

cephalotes. 110. St. ater, capite magno, elytris fuſcis, antennis ferrugineis, pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 980.
Habitat in Europa.

brevipes. 111. St. ater, elytris pedibusque teſtaceis, tibiis brevibus. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 981.
Habitat in Europa.

marginellus. 112. St. niger, thoracis abdominisque marginibus, antennarum baſi, elytris pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 982.
Habitat in Europa.

haemorrhoidalis. 113. St. ater, thorace utrinque impreſſo, elytris pedibus, ore anoque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 983.
Habitat in Europa.

craſſipes. 114. St. ater, thorace longo ſubquadrato glabro, elytris fuſcis, antennis pedibusque rufeſcentibus, femoribus anticis craſſis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 986.
Habitat in Europa.

flavicornis. 115. St. ater, punctis elevatis minimis undique obſeſſus, antennis flavis apice fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 990.
Habitat in Europa.

lituratus. 116. St. ater, elytris teſtaceis, baſi macula communi et in medio ad marginem externum utrinque macula fuſca, antennis pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 991.
Habitat in Europa.

117. St.

alatus. 117. St. fuſcus, elytris longis, pedibus rufo-fuſceſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 992.
Habitat in Europa.

** *palpis poſterioribus ſecuriformibus*, Oxypori Fabricii.

rufus. 6. St. rufus, capite elytrorum abdominisque poſterioribus, femoribus baſi nigris. *Fn. ſuec.* 844. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 338. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 1. *Scop. ent. carn.* 307.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 370. *n.* 22. Staphylinus flavus.
Gadd ſat. 80. Staphylinus pallide rufus elytris caeruleſcentibus, capite et apice abdominis nigris.
Degeer inſ. 4. *p.* 24. *n.* 10. *t.* 1. *f.* 11. 12.
Schaeff. ic. t. 35. *f.* 3.
Habitat in Europae *boletis.*

lunulatus. 7. St. rufus, capite abdominis elytrorumque poſticis nigris, femoribus totis rufis. *Fn. ſuec.* 845.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 338. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 2. Oxyporus flavus, elytris nigris baſi apiceque pallidis.
Habitat in Europae *boletis.*

parvus. 92. St. flavus, elytris baſi anoque atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 3.
Habitat Kilonii, *antennis flavis apice fuſceſcentibus.*

thoracicus. 93. St. nigricans, thorace rufo, elytris fuſcis baſi albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 338. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 4.
Habitat Kilonii *in boletis.*

pygmaeus. 94. St. nigricans, thorace elytriſque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 339. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 5.
Habitat Kilonii *in boletis.*

flavipes. 22. St. niger, elytris antennis pedibuſque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 856.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 339. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 6. Oxyporus niger, elytris tibiiſque fuſcis.
Habitat in Europae *boletis.*

abdominalis. 95. St. rufus, abdomine atro nitido. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 501. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 7.
Habitat in Norwegia, *reliquis hujus tribus minor.*

*** *pal-*

*** *palpis anterioribus clavatis:* Paederi Fabricii.

riparius. 9. St. rufus, elytris caeruleis, capite abdominisque apice nigris. *Fn. ſuec.* 846.* *It. gotl.* 173. *Degeer inſ.* 4. *p.* 28. *n.* 14. *t.* 1. *f.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 339. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 1.
Scop. ent. carn. 308. Staphylinus gregarius.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 369. *n.* 21.
Schaeff. ic. t. 71. *f.* 3.
Habitat ad Europae *ripas frequens.*

ruficollis. 96. St. niger, thorace rufo, elytris cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 339. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 48. *f.* 5. a. b.
Habitat in Germania *ſub lapidibus.*

elongatus. 14. St. niger, elytris poſterius pedibus antennisque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 339. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 3. Paederus niger, elytris poſtice pedibusque fulvis.
Habitat in Europa *boreali.*

218. FORFICULA. *Antennae* ſetaceae.
Palpi inaequales, filiformes.
Elytra dimidiata. *Alae* tectae.
Cauda forcipata.

auricularia. 1. F. elytris apice albis, antennis 14articulatis. *Fn. ſuec.* 860. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 375. *n.* 1. *Scop. ent. carn.* 312. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 340. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 1.
Degeer inſ. 3. *p.* 545. *n.* 1. *t.* 25. *f.* 16. Forficula major.
Mouff. inſ. 171. *f. inf.* Forficula auricularia vulgaris.
Petiv. gaz. t. 74. *f.* 5. Forficula vulgaris.
Liſt. ſcar. angl. p. 391. *mut. t.* 31. *f.* A. Scarabaeus ſubrufus, cauda furcata.
Friſch inſ. 8. *p.* 31. *t.* 15. *f.* 1. 2. Vermis auricularius.
Jonſt. inſ. t. 16. *f.* 2.
Merian. inſ. t. 30.
Sulz. inſ. t. 7. *f.* 50.
hiſt. inſ. t. 7. *f.* 17.

Schaeff.

Forficulae *larvae agiles curſitant.*

Schaeff. elem. t. 63.
icon. t. 144. *f.* 3. 4.
Habitat in Europae *fructibus frequens, aures dormientium interdum intrans, ſpiritu frumenti pellenda.*

gigantea. 3. F. pallida ſupra nigro variegata, ano bidentato: forcipe porrecta unidentata. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 1. Forficula bilineata.
Habitat in Europa *magis auſtrali, maxima.*

bipunctata. 4. F. nigra capite poſterius pedibusque rufis, elytris macula alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 340. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 3.
Habitat in Italia, *antennis* 11*articulatis.*

albipes. 5. F. atra, thorace poſterius, elytris baſi alis pedibusque albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 4.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis, mediae magnitudinis.*

minor. 2. F. elytris teſtaceis immaculatis, antennis 10articulatis. *Fn. ſuec.* 861.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 376. *n.* 2. *Fabr. ſp. inſ* 1. *p.* 340. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 5.
Fn. ſuec. 600. Forficula alis elytro concoloribus.
Degeer inſ. 3. *p.* 553. *n.* 2. *t.* 25. *f.* 26. 27.
Schaeff. ic. t. 41. *f.* 12. 13.
Habitat rarior in Europa, *antennarum apice albido.*

flexuoſa. 6. F. forcipe flexuoſa, elytris punctis duobus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 6.
Habitat in Cayenna.

dentata. 7. F. fuſca, antennis 10 articulatis, thoracis marginibus pedibusque pallidis, forcipe baſi dentata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 7.
Habitat in Madera.

parallela. 8. F. nigra, thoracis marginibus elytris pedibusque pallidis, forcipe recta inermi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 8.
Habitat in Madera.

Morio. 9. F. atra, antennis faſcia alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 9.
Habitat in Tahiti.

pallipes. 10. F. forcipe elongata unidentata nigra, pedibus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 10.
Habitat in inſulis promontorii viridis.

livida. 11. F. livida minima, forcipe ad lentem dentata. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 3.

II. HE-

II. HEMIPTERA.

Os roſtrumque inflexum verſus pectus.

Alae hemelytratae: ſuperioribus ſemicoriaceis (per ſuturam rectam minime conniventibus) ſed margine interiore impoſitis.

219. BLATTA. *Caput* inflexum.
Antennae ſetaceae.
Palpi inaequales, filiformes.
Elytra alaeque planae, ſubcoriaceae.
Thorax planiuſculus, orbiculatus, marginatus.
Pedes curſorii.
Cornicula duo ſupra caudam (plurimis)

gigantea. 1. Bl. livida, thoracis clypeo macula quadrata fuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 106. *Gron. zooph.* 633. *t.* 16. *f.* 3.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 77. *f.* 1. 2. *et* 4. *t.* 85. *f.* 17. 18.
Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 2.
Habitat in Aſia *et* America, *diametro ovi gallinacei.*

maderae. 11. Bl. fuſca, thorace elytriſque lividis fuſco variegatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 3.
Habitat in inſula Madera, *ſtatura giganteae, at paulo minor.*

aegyptiaca. 2. Bl. atra, thoracis margine anteriori albo. *Muſ. Lud. Ulr.* 107.* *Gron. zooph.* 637. *t.* 15. *f.* 2.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 342. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 3.
Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 3.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 4.
Habitat in Aegypto, Oriente.

occidentalis. 12. Bl. thorace atro: margine omni pallido punctiſque duobus baſeos fulvis, elytris olivaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 4.
Habitat in America, *aegyptiaca minor.*

ſurinamenſis. 3. Bl. livida, thoracis margine anteriori albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 342. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 5.
Sulz. inſ. t. 8. *f.* 1.
Degeer inſ. 3. *t.* 44. *f.* 8.
Habitat in Surinamo.

americana. 4. Bl. ferruginea, thoracis clypeo poſterius exalbido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 342. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 6.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 381. *n.* 2. Blatta fuſco-flaveſcens.
Degeer inſ. 3. *t.* 44. *f.* 1. 2. 3. Blatta ferruginea.
Raj. inſ. 623. Blatta molendinaria ab inſula Jamaica allata major.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 5.
Merian. ſurin. 1. *t.* 1.
β) Blatta alata. *Herbſt apud Fueſili arch. inſ.* 8. *t.* 49. *f.* 6.
Habitat in America, *cum ſaccharo in* Europam *delata.*

auſtralaſiae. 13. Bl. ferruginea, thorace atro, annulo albo, elytris baſi lineola alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 342. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 7.
Capta frequens in navi ex oceano *auſtrali reduce.*

erythrocephala. 14. Bl. atra, capite pedibusque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 342. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 8.
Habitat - - - - . *magna.*

capenſis. 15. Bl. fuſca, capite pedibusque rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 77. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine americanae, glabra.*

indica. 16. Bl. griſea, thorace atro: margine anteriori albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 10.
Habitat in India.

nivea. 5. Bl. alba, antennis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 11.
Degeer inſ. 3. *t.* 44. *f.* 10.
Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 1.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 8.
Habitat in America *meridionali, magnitudine tabani.*

irrorata. 17. Bl. pallida, thorace elytrisque fuſco irroratis, alis diſco nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 12.

Thunb.

Thunb. nov. inſ. ſp. 4. p. 76? Blatta pallida thorace elytrisque fuſco irroratis, alis baſi nigris.
Habitat ad caput bonae ſpei *et in* nova Hollandia, *giganteae fere magnitudine.*

viridis. 18. Bl. viridis, antennis thoracisque linea laterali flavis, alis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 13.
Habitat in America.

braſilienſis. 19. Bl. pallida, abdomine atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 14.
Degeer inſ. 3. *p.* 538. *n.* 3. *t.* 44. *f.* 5. Blatta abdomen nigrum.
Habitat in Braſilia.

Petiveriana. 20. Bl. nigra, elytris maculis quatuor flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 15.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 578. *n.* 28. Caſſida petiveriana.
Pallas ſpic. zool. 9. *p.* 9. *t.* 1. *f.* 5. Blatta heteroclita.
Petiv. gaz. t. 71. *f.* 1. Cimici affinis niger.
Seb. muſ. 4. *t.* 95. *f.* 21.
Schroet. Abh. 1. *t.* 1. *f.* 7. 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 11. *f.* A. B.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 7.
Habitat in India, *ſtatura caſſidae.*

orientalis. 7. Bl. ferrugineo-fuſca immaculata, elytris abbreviatis: ſulco oblongo impreſſo. *Fn. ſuec.* 862.* *Scop. ent. carn.* 313. *Gron. zooph.* 635. 636. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 380. *t.* 7. *f.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 16. *Kalm it.* 2. *p.* 406.
Degeer inſ. 3. *p.* 530. *n.* 1. *t.* 25. *f.* 1. 2. Blatta culinaris.
Friſch inſ. 5. *t.* 3. Blatta lucifuga ſ. molendinaria.
Mouff. inſ. 138. *f.* 2. 3. Blatta molendinaria.
Raj. inſ. 68. *n.* 1. Blatta prima ſ. mollis Mouffeti.
Columm. ecphr. 1. *p.* 40. *t.* 36. Scarabaeus alter teſtudinatus minor atque alatus.
Jonſt. inſ. t. 13. *f.* A. Grylli.
Sulz. inſ. t. 7. *f.* 47.
hiſt. inſ. t. 8. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 155. *f.* 6. 7.
Sonner. it. t. 12.
Habitat in America, *hoſpitatur in* Oriente *et* Europa, *a* 200 *inde annis in* Bohemia, *a* 1739 *in* Belgio, *et antea*

in Finlandia, *et* Ruſſia, *frequens in farina, pane, aliis cibariis, calceis &c. quae conſumit, lucifuga, velociſſime currens, a tenthredine magna caerulea infeſtatur.*
Femina *aptera larvae ſimilis parit ovum magnitudine dimidia abdominis ſubcylindricum; carina crenulata.*

cincta. 21. Bl. flaveſcens, thoracis elytrorumque marginibus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 17.
Habitat in America, *ſtatura et magnitudine orientalis, corpore fuſco, elytris nunc breviore, nunc longiore, pedibus albidis.*

picta. 22. Bl. atra, elytris vitta ſanguinea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 18.
Habitat in Braſilia.

variegata. 23. Bl. thorace flaveſcente, elytris teſtaceis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 344. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 19.
Habitat in nova Hollandia.

lapponica. 8. Bl. flaveſcens elytris nigro maculatis. *Fn. ſuec.* 863.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 344. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 20.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 381. *n.* 3. Blatta flaveſcens &c.
Degeer inſ. 3. *p.* 533. *n.* 2. *t.* 25. *f.* 8. 9. Blatta nigro-fuſca.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 3.
Schaeff. elem. t. 26. *f.* 2.
icon. t. 88. *f.* 2. 3.
Habitat in Europa, *cibaria conſumens, in auſtralioris tamen humidis ſilvis minus noxia, thorace interdum toto, frequentius margine tantum flaveſcente.*

germanica. 9. Bl. livida, corpore flaveſcente, thorace lineis duabus parallelis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 344. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 21.
Pontopp. atl. dan. 1. *t.* 29. Blatta transfuga.
Habitat in Europa, Braſilia, *inſulis oceani auſtralis, magnitudine lapponicae.*

ruficollis. 24. Bl. thorace ferrugineo, corpore pallido teſtaceo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 22.
Habitat in India, *ſtatura et magnitudine germanicae.*

25. Bl.

Blattae *lucifugae cum larvis ſuis rodunt cibaria, coria, putridaque varia, celeri curſu ſe ſubtrahentes; fumo lithantracis occid: cum gryllis.* Scopoli. *An a Seba delineatae fuſca muſ.* 4. *t.* 85. *f.* 13. 14. *et cinereo-fuſca f.* 15. 16. *propriae ſpecies?*

maculata. 25. Bl. thorace nigro: margine albido, elytris pallidis: macula magna apicis nigra. *Fabr. ſp. inſ. 2. app. p. 501. mant. inſ. 1. p. 226. n. 23.*
Schreber Naturf. 15. *p* 89. *t.* 3. *f.* 17. 18.
Habitat in Germaniae *pinetis et ericetis.*

margina-ta. 26. Bl. nigra thorace rufo albo marginato, elytris nigris: limbo albo. *Fabr. ſp. inſ. 2. app. p. 502. mant. inſ. 1. p. 226. n. 24.*
Schreber Naturf. 15. *p.* 88. *t.* 3. *f.* 16.
Habitat in Italia, *maculata paulo minor.*

oblonga-ta. 10. Bl. oblonga livida, thorace punctis duobus lunulaque nigris. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 345. n. 18. mant. inſ. 1. p. 226. n. 25.*
Degeer inſ. 3. *p.* 541. *n.* 9. *t.* 44. *f.* 11. Blatta oblonga.
Habitat in Surinamo, *forma cantharidis.*

nitidula. 27. Bl. thorace ferrugineo, elytris cyaneis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 345. n. 19. mant. inſ. 1. p. 226. n. 26.*
Habitat in Surinamo, *minuta, nitida.*

fuſca. 28. Bl. fuſca immaculata capite, antennis, pedibus, thoracis hemelytrorumque marginibus ferrugineis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. 77.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine americanae, glabra.*

deuſta. 29. Bl. fuſca immaculata, capitis hemelytrorumque baſibus rufis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 77.
Habitat ad caput bonae ſpei, *germanica paulo major.*

chloro-tica. 30. Bl. polita ex griſeo lutea, elytris ſubpellucidis virenti-venoſis: margine craſſiore opaco praſino; margine extimo baſique luteſcentibus. *Pallas ſpic. zool.* 9. *p.* 11. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine et ſtatura fere orientalis.*

latiſſima. 31. Bl. fuſca punctata, thoracis margine anoque flavis, abdomine ſubtus nigro, tibiis ſpinuloſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 184. *n.* 1. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat in Surinamo.

aterrima. 32. Bl. nigra immaculata, tarſis albis, geniculis fuſcis, tibiis ſpinoſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 185. *n.* 8. *t.* 49. *f.* 9.
Habitat in India.

perſpicillaris. 33. Bl. flaveſcens, thorace medio fulvo: margine hyalino. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 186. *n.* 12. *t.* 49. *f.* 11.
Habitat in Marchia, *an varietas lapponicae, cui perquam affinis?*

aſiatica. 34. Bl. griſea, oblonga elytris aliſque abdomine longioribus apice anguſtatis. *Pallas it.* 3. *p.* 263.
Habitat in Aſia *auſtrali, cum mercibus* Sinarum *in* Sibiriam *delata, germanica major.*

Schaefferi. 35. Bl. nigricans, thorace elytrorumque margine flaveſcente, pedibus luteis: femoribus nigris.
Schaeff. ic. t. 158. *f.* 2.

ſylveſtris. 36. Bl. ſubtus nigra, antennis nigris, thoracis margine elytriſque teſtaceis. *Scop. ent. carn. p.* 104. *n.* 314.
Poda muſ. graec. p. 50.
Habitat in Carniolia.

penſylvanica. 37. Bl. fuſca, thoracis clypeo albido: medio nigro-fuſco, elytris flavo-fuſcis anterius albidis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 537. *n.* 2. *t.* 44. *f.* 4.
Habitat in Penſylvania, *pollicem longa.*

livida. 38. Bl. fuſca, corpore ſubtus pedibuſque fulvo-griſeis, alis longitudine abdominis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 538. *n.* 4. *t.* 44. *f.* 6.
Habitat in Surinamo, 8½ *lineas longa.*

rufa. 39. Bl. oblonga rufa, pedibus teſtaceis, alis abdomine longioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 539. *n.* 5. *t.* 44. *f.* 7.
Habitat in Surinamo, 9 *lineas longa.*

griſea. 40. Bl. oblonga cinereo-griſea: punctis aliquot fuſcis minutiſſimis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 540 *n.* 7. *t.* 44. *f.* 9.
Habitat in Surinamo, 10½ *lineas longa.*

minutiſſima. 41. Bl. ovata nigro-fuſca, antennis brevioribus, thoracis lateribus aliſque hyalinis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 542. *n.* 10. *t.* 44. *f.* 13. 14.
Habitat in Surinamo, *cimicis lectularii magnitudine.*

aptera. 42. Bl. aptera fuſca punctata, abdominis ſegmentis margine poſteriori tibiiſque lividis, alis ferrugineis, tibiis ſpinoſis.
Muſ. Leſk. p. 46. *n.* 5.
Habitat extra Europam.

43. Bl.

punctulata. 43. Bl. fuſca, thorace punctis elevatis impreſſisque variegato, alis albis. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 7.
Habitat extra Europam, *ſtatura et facie orientalis, an varietas?*

ocellata. 44. Bl. brunnea, fronte thoracisque diſco macula rubra: poſteriori ocellis duobus fuſcis varia, abdominis ſegmentis margine anteriore ſupra infraque rubris. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 8.
Habitat extra Europam.

Wanzflüge

PNEUMORA.

Corpus ovatum, inflatum, hyalinum.
Caput inflexum, maxilloſum.
Thorax convexus, ſubtus carinatus.
Elytra deflexa, membranacea.
Pedes curſorii.

immaculata. 1. Pn. elytris immaculatis. *Thunb. act. Stockh.* 1775. 3. *p.* 255. *t.* 7. *f.* 1.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 363. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 286. *n.* 12. Gryllus (papilloſus) viridis, albo maculatus ſcutello carinato utrinque dentato, abdomine veſiculoſo variegato.
Habitat ad caput bonae ſpei, *in ſtoebe cernua, a Septembri ad Novembrem frequens; viridis, elytris aliquando minutiſſime nigro-punctatis, rarius flaveſcens aut rubeſcens, gryllo domeſtico duplo major.*

maculata. 2. Pn. elytris viridibus: maculis quadratis albis. *Thunb. act. Stockh.* 1775. 3. *p.* 256, *t.* 7. *f.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 693. *n.* 4. *Muſ. Lud. Ulr.* 120.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 363. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 13. Gryllus (varioloſus) viridis calloſo-punctatus abdomine veſiculoſo albo variegato.
Habitat ad caput bonae ſpei, *in ſtoebe annua,* Novembri *et Decembri conſpicua, immaculatae magnitudine, tota viridis, albo-maculata.*

ſexguttata. 3. Pn. elytris viridibus: maculis tribus argenteis. *Thunb. act. Stock.* 1775. 3. *p.* 257. *n.* 3. *t.* 7. *f.* 3.

 Fabr.

Pneumorae *quaſi totae membrana cava conſtant, pedes dentatos ad corpus fricando, crepuſculo et nocte ſonum edunt, lucem emicantem petunt.*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 363. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 11. Gryllus (inanis) viridis, elytris maculis duabus albis abdomine veſiculoſo: utrinque maculis tribus albis.
Habitat ad caput bonae ſpei, *Decembri conſpicua, maculata quadruplo major, viridis.*

220. MANTIS.

Caput nutans, maxilloſum, palpis filiformibus inſtructum.

Antennae ſetaceae.

Alae 4 membranaceae, convolutae: inferiores plicatae.

Pedes anteriores compreſſi, ſubtus ſerrato-denticulati, armati ungue ſolitario et digito ſetaceo, laterali, articulato.
poſteriores 4 laeves, greſſorii.

Thorax linearis, elongatus, anguſtatus.

filiformis. 15. M. corpore filiformi aptero. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 1. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 187. *n.* 5. *t.* 51. *f.* 2. 3?
Scop. delic. inſubr. 1. *p.* 60. *t.* 24. *f.* A. 1-3. Plocaria domeſtica?
Habitat in America, India, Italia, *fuſca, pedibus corpore longioribus, antennis nigris.*

Gigas. 1. M. thorace teretiuſculo ſcabro, elytris breviſſimis, pedibus ſpinoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 109.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 345. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 2.
Marcgr. braſ. 251. Arumatia.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 19. *f.* 9. 10.
Bradl. natur. t. 27. *f.* 6.
Petiv. gaz. t. 60. *f.* 2.
Seb. muſ. 4. *t.* 77. *f.* 1. 2.
Habitat in Aſia, *alis maximis.*

cylindrica. 54. M. thorace cylindrico, pedibus anterioribus thoraci anterius annexis, elytris griſeis baſi ſubtusque rufis, alis fuſcis albo guttatis. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 12.

Habitat

Habitat extra Europam, *alarum guttis vagis, feneſtratis, ſpina proſtrata utrinque ad baſin elytrorum abdomen reſpiciente.*

phthiſica. 2. M. thorace teretiuſculo muricato, elytris breviſſimis, pedibus inermibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 110.*
Habitat in America *auſtrali et* India.

ſiccifolia. 3. M. thorace denticulato, femoribus ovatis membranaceis. *Muſ. Lud. Ulr.* 111.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 16.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 17. *f.* 4. 5.
Edw. glean. t. 258.
Merian. ſurin. t. 66.
Seligm. av. 7. *t.* 43.
Habitat in America *auſtrali et* India.

gongylodes. 4. M. thorace ſubciliato, femoribus anterioribus ſpina terminatis; reliquis lobo. *Muſ. Lud. Ulr.* 112.* *Gron. zooph.* 639.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 10.
Amoen. acad. 1. *p.* 504. Gryllus thorace lineari alarum longitudine: margine denticulis ciliato.
Aldr. inſ. t. 13. *f.* 21. Mantis.
Marcgr. braſ. 246. Gaayra.
Act. angl. 301. *t.* 20. *f.* 3.
Seb. muſ. 4. *t.* 68. *f.* 9–12.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 7.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 56.
Aubent. miſc. t. 65. *f.* 2.
Drury inſ. 1. *t.* 56. *f.* 2.
Habitat in Africa *et* Aſia, *capitis vertice ſubulato bifido, antennis rarius pectinatis.*
Larvae *pedes lobis membranaceis alati.*

paupetata. 16. M. thorace lineari ſpinuloſo, femoribus anterioribus ſpina terminatis; reliquis lobo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 11.
Thunb. nov. inſ. ſp. 3. *p.* 61. Mantis thorace apice dilatato ſpinuloſo, femoribus lobo ſimplici terminatis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 51. *f.* 1.
Habitat in India, *gongyloda minor et anguſtior.*

mendica. 17. M. thorace marginato dentato, elytris albo viridique variis: margine albo-punctato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 12.
Habitat Alexandriae.

religioſa. 5. M. thorace laevi ſubcarinato elytrisque viridibus immaculatis. *Scop. ent. carn.* 315.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 1. 2.
Seb. muſ. 4. *t.* 67. *f.* 7. 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 4.
Schaeff. elem. t. 81.
Seligm. av. t. 4.
Habitat in Sibiria, Auſtria, Africa, *tota viridis, an mera varietas oratoriae?*

oratoria. 6. M. thorace laevi, elytris viridibus, alis macula nigra anterius rufeſcentibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 115.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 348. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 21. Mantis thorace laevi, elytris viridibus immaculatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 399. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 4. Mantis.
Mouff. inſ. 118. *f.* 3.
Aldr. inſ. 4. *t.* 3. *f.* 10.
Seb. muſ. 4. *t.* 67. *f.* 9. 10.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 1. 2.
Degeer inſ. 3. *t.* 37. *f.* 2.
Habitat in Oriente *et auſtrali* Europa Francofurtum ad Moenum *uſque.*

irrorata. 7. M. thorace laevi ſubcarinato, elytris viridibus: punctis ferrugineis vagis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 29. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 348. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 20.
Habitat in America *meridionali, precariae ſimilis.*

precaria. 8. M. thorace ſubciliato, elytris vireſcentibus: ocello ferrugineo. *Muſ. Lud. Ulr.* 114.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 349. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 22.
Merian. ſurin. t. 66.
Seb. muſ. 4. *t.* 67. *f.* 3-6.
Degeer inſ. 3. *p.* 406. *n.* 3. *t.* 36. *f.* 4.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 50. *f.* 1.
Habitat in America *et* Africa, *elytrorum ocello anterius dimidiato albo, aut toto interdum albo.*

ſancta. 18. M. viridi-flaveſcens, thorace ſerrulato, elytris viridibus immaculatis, alis ſubhyalinis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 23.
Habitat in Gallia *magis auſtrali, ſtatura oratoriae, at triplo minor.*

monacha. 19. M. teſtacea, thorace laevi, elytris alisque viridi-hyalinis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 24.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura precariae, at duplo minor.*

obſcura. 20. M. obſcure griſea, thorace ſerrulato, elytris macula baſeos, alis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 349. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 25.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura precariae, at minor.*

hyalina. 21. M. thorace ciliato, elytris hyalinis: margine viridi, fronte bidentata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 349. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 26.
Degeer inſ. 3. *p.* 410. *n.* 4. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in America.

feneſtrata. 22. M. thorace laevi, alis hyalinis, elytrorum margine exteriori fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 349. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 27.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura hyalinae.*

bidens. 23. M. thorace ſcabro, elytris viridibus: faſciis nigris, alis fuſcis diſco atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 28.
Habitat in America.

miniſtralis. 24. M. thorace ſcabro crenato longitudine capitis anterius ferrugineo, elytris viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 29.
Habitat in nova Hollandia.

urbana. 25. M. thorace integro, elytris viridibus: puncto faſciaque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 30.
Habitat in America *auſtrali et* India.

ruſtica. 26. M. thorace laevi fuſco, elytris ala brevioribus fuſco-hyalinis, antennis piloſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 31.
Habitat ad Patagoniae *littora, paganae magnitudine.*

An forſan hujus generis inſectum a Queronio fuco adhaerens in mari mediterraneo repertum in act. pariſ. extr. 9. p. 329. ſub nomine puce de mer arpenteuſe deſcriptum et delineatum? repugnat habitatio in mari.

naſuta. 27. M. thorace ſpinoſo ciliatoque, fronte porrecta ſpinoſa emarginata. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 32.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.*

lobata. 28. M. thorace trilobo, capitis fronte cornu bifido, oculis conico-acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 33.
Thunb. nov. inſ. ſp. 3. *p.* 62. *f.* 73. Mantis vireſcens, capitis cornu oculisque conico-acuminatis.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parva.*

pulchra. 29. M. viridis, thorace integro, alis fuſco-hyalinis baſi ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 34.
Habitat Tranquebariae, *parva.*

fauſta. 30. M. linearis cinereo-fuſca immaculata. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 63. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 35.
Habitat ad caput bonae ſpei, *numen tutelare Hottentottorum.*

perſpicua. 31. M. obſcura, elytris alisque hyalinis, alis macula marginali apiceque fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *ſtatura minutae, at paulo major.*

pagana. 32. M. alis reticulatis albis: macula laterali ferruginea, manibus chelatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 37.
Pall. ſpic. zool. 9. *p.* 14. *t.* 1. *f.* 8. Mantis Perla.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 916. *n.* 2. Raphidia (mantiſpa) pedibus anticis thoraci antice annexis, antennis thorace brevioribus.
Scop. ent. carn. 712.
Poda inſ. 101. *t.* 1. *f.* 15.
Habitat in Calabria, Gallia, *et* Germania.

minuta. 33. M. thorace cylindrico flaveſcente, elytris hyalinis: coſta vireſcente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 38.
Habitat in America *meridionali, et circa* Aurelianum.

puſilla. 34. M. thorace cylindrico flaveſcente, elytris alisque hyalinis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 351. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 39.
Pall. ſpic. zool. 9. *p.* 15. *t.* 1. *f.* 9. Mantis puſilla.
Habitat in Africa, *raphidia ophiopſi major.*

9. M.

carolina. 9. M. thorace ſubciliato carinato, elytris albidis fuſco nebuloſis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 396. *n.* 28.*
Habitat in Carolina, *precariae ſimilis, elytris alisque abdomine brevioribus.*

pectini-cornis. 10. M. thorace laevi, elytris viridibus, alis oblique ſtriatis, vertice ſubulato, antennis pectinatis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 396. *n.* 27.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 17.
Drury inſ. 1. *t.* 50. *f.* 1.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 50. *f.* 2.
Habitat in India, *auſtrali* America, Jamaica.

oculata. 35. M. thorace triangulo filiformi, oculis oblongis porrectis acuminato-ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 348. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 18.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis, capite pallido, thorace teſtaceo, elytris alisque albo-hyalinis, pedibus obſcuris.*

ſuperſtitioſa. 36. M. thorace filiformi triangulo anterius ſerrulato, elytris vireſcentibus, alarum coſta tranſverſe ſtriata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 348. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 19.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magna.*

bicornis. 11. M. thorace laevi, capite bipartito ſubulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 116.*
Habitat in America *auſtrali et* India, *pedibus inermibus.*

tricolor. 12. M. thorace lateribus expanſo-lobato, capite cornuto, pedibus anterioribus latiſſimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 117.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 14.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 51. *f.* 4.
Habitat in India, *oculis in cornicula auriformia acuta deſinentibus.*

cancellata. 37. M. thorace utrinque dilatato membranaceo plano. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 15.
Habitat in America *auſtrali et* India.

ſtrumaria. 13. M. thorace utrinque membranaceo dilatato obcordato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 13.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 3.
Merian. ſurin. t. 27.
Seb. muſ. 4. *t.* 69. *f.* 7. 8.
Habitat in America *auſtrali et* India.

14. M

necydaloides. 14. M. thorace ſcabro, elytris ovatis angulatis breviſſimis, alis oblongis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 3. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 345. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 3.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 19.
Degeer inſ. 3. *t.* 36. *f.* 2.
Habitat in Aſia; *mas anguſtior, femina craſſior, thorace laevi.*

atrophica. 38. M. thorace quadriſpinoſo, elytris breviſſimis baſi ariſtato-mucronatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 345. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 4.
Pall. ſpicil. zool. 9. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat in inſula Java, *capite inermi.*

ſpinoſa. 39. M. capite thoraceque ſpinoſis, elytris breviſſimis acutis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 5.
Habitat in India.

biſpinoſa. 40. M. thorace teretiuſculo anterius biſpinoſo, elytris breviſſimis: margine flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 6.
Habitat in America.

jamaicenſis. 41. M. linearis viridis, elytris breviſſimis: margine exteriori flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 7.
Drury inſ. 2. *t.* 49. *f.* 1.
Habitat in Jamaica.

lateralis. 42. M. linearis nigra, elytris breviſſimis gibbis: lateribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 8.
Habitat in Braſilia.

linearis. 43. M. linearis fuſca, elytris breviſſimis baſi ſubſpinoſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 9.
Habitat in India, *antennis filiformibus.*

labiata. 44. M. linearis vireſcens inermis, capitis lateribus viridibus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 61.
Habitat in India.

45. M.

An huc omnes ſpecies a Seba *in theſauri vol.* IV. *delineatae? tridens t.* 68. *f.* 7. 8. *clavata (an varietas gongylodis?) t.* 68. *f.* 11. 12 *parvula t.* 68. *f.* 13-16. *tricornis t.* 69. *f.* 1. 2. *cubitata t.* 69. *f* 3. 4. *octoſetoſa t.* 69. *f.* 5. 6. *aeruginoſa t.* 70. *f.* 7. 8. *rubro-maculata t.* 70. *f.* 9. 10. *plumbea t.* 70. *f.* 13. 14. *nigro-venulata t.* 73. *f.* 6. *paradoxa t.* 73. *f.* 9. 10. *nigro-punctata t.* 75. *f.* 3. 4. *biſubulata t.* 75. *f.* 11. *falcataria t.* 76. *f.* 1-4. *dentata t.* 76. *f.* 5. 6. *pater noſter t.* 76. *f.* 7-12. *ſpuria t.* 76. *f.* 13. 14. *teſſulata t.* 78. *f.* 1-4. *foliata t.* 80. *f.* 13. 14. *Species hujus generis inſecta alia venantur; larva puppaque hexapode agili, illa penitus aptera.*

maculata. 45. M. cinerea, thorace alato ſpinuloſo, pedibus intus nigro-maculatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 61.
Habitat in Japonia, *bipollicaris.*

capenſis. 46. M. cinerea, thorace inermi, capite conico integro. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 62. Mantis naſuta.
Habitat ad caput bonae ſpei *et in* India, *ſeſquipollicaris.*

parva. 47. M. livida laevis, elytris alisque hyalinis; abdominis ſegmentis nigro-marginatis.
Drury inſ. 2. *p.* 75. *t.* 39. *f.* 5.
Habitat in America, *fere ſeſquipollicaris.*

cingulata. 48. M. thorace ſubfuſco, elytris viridibus atro-reticulatis: maculis quatuor nigricantibus, alis nigricantibus nigro-lineatis: margine ex fuſco flaveſcente.
Drury inſ. 2. *p.* 89. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat in Jamaica, *abdomine nigro-cingulato, apice biſpinoſo.*

gigantea. 49. M. fuſceſcens, collo, thorace femoribusque ſerratis.
Drury inſ. 2. *p.* 89. *t.* 50.
Habitat in Italia *ſuperiori, 8 fere pollices longa.*

anguſta. 50. M. vireſcens, cauda bifurca, antennis longitudine corporis filiformibus. *Drury inſ.* 1. *p.* 130. *t.* 50. *f.* 3.
Habitat in inſula Antigua.

ſibirica. 51. M. corpore flavo fuſcoque vario, alis hyalinis: nervulis rufeſcentibus. *Lepech. it.* 1. *p.* 271. *t.* 17. *f.* 8.
Habitat in Sibiriae *helianthemo et umbellatis; an puſillae varietas?*

brachyptera. 52. M. cinerea, thorace dentato, alis abdomine dimidio brevioribus. *Pall. it.* 2. *app. n.* 81.
Habitat in deſertis aridiſſimis, etiam ſalſis, ad Irtin *ſitis, rarior in* Uralenſibus, *oratoria major.*

pennicornis. 53. M. verticis ſpina conica, antennis pennatis linearibus, femoribus poſterioribus lobo terminatis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 81.
Habitat rarior in deſertis, mari caſpio *finitimis, auſtralibus, forma et colore gongylodis.*

abjecta ... M. in Campania. Grillo Entomol. Neapolit.

221. GRYLLUS. *Caput* inflexum, maxilloſum, palpis filiformibus inſtructum.

Antennae ſetaceae vel filiformes.

Alae quatuor, deflexae, convolutae: inferiores plicatae.

Pedes poſteriores ſaltatorii. *Ungues* ubique bini.

* *antennis enſiformibus, capite conico thorace longiori,* Acridae ſive Truxalides Fabricii.

naſutus. 1. Gr. corpore viridi. *Muſ. Lud. Ulr.* 118.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 352. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 1.
Mouff. inſ. 119. Mantis africana.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 4.
Sulz. inſ. t. 8. *f.* 57.
hiſt. inſ. t. 8. *f.* 5.
Drury inſ. 2. *t.* 40. *f.* 1.
Seb. muſ. 4. *t.* 96. *f.* 41.

turritus. *β*) Gryllus capite conico, antennis enſiformibus, alis hyalinis. *Syſt. nat.* X. *p.* 427.
Seb. muſ. 4. *t.* 80. *f.* 1. 2.
t. 96. *f.* 46.
Habitat in omni Africa, *in* Sicilia, Calabria, *ad mare* Caſpium, *ore ad baſin, antennis ad apicem capitis poſitis, thorace non longioribus.*

conicus. 62. Gr. corpore fuſco, elytrorum coſta dimidiata viridi, linea punctorum alborum. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 352. *n.* 2. *mant.* 1. *p.* 231. *n.* 2.
Habitat in nova Hollandia, *naſuto nimis affinis.*

vittatus. 63. Gr. teſtaceus, capite prominulo thorace femoribusque vitta laterali argentea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 3.
Habitat in Sina, *naſuti magnitudine.*

brevicornis. 2. Gr. viridis, capite prominulo, antennis compreſſis longitudine thoracis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 398. *n.* 37.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 352. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 4.
Degeer inſ. 3. *p.* 499. *n.* 16. *t.* 41. *f.* 7. Acrydium enſicorne.
Habitat in America *meridionali.*

64. Gr.

gigan-teus. 64. Gr. viridis, vittis duabus rubeſcentibus, antennis ferrugineis, thorace lineis tribus elevatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 191. *n.* 1. *t.* 52. *f.* 6.
Habitat in America, *naſuto major.*

ungari-cus. 65. Gr. obſcure viridis, pedibus ſpadiceis, thorace lineis tribus elevatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 192. *n.* 2. *t.* 52. *f.* 7.
Habitat in Ungaria.

oxyce-phalus. 66. Gr. capitis apice ſpatulato, elytris abdomine longioribus; ſtriga longitudinali fuſca, alis flaveſcentibus margine hyalinis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 54.
Habitat in deſertis Ruſſiae *auſtralibus, inter glycyrrhizam vagans, Auguſto vulgaris, naſuto perquam ſimilis.*

foliaceus. 67. Gr. alis flaveſcentibus, antennis foliaceis. *Seb. muſ.* 4. *t.* 74. *f.* 9. 10.
Habitat in Aſia.

** *Thorace carinato, antennis filiformibus longiore, palpis aequalibus:* Bullae ſ. Acrydia Fabricii.

unicolor. 3. Gr. unicolor, thorace breviſſimo, antennis ſcutello brevioribus. *Muſ. Lud. Ulr.* 119.*
Habitat in America *auſtrali et* India *flavus aut ruber, varioloſo ſimilis, ſed thorace non criſtato, an hujus tribus?*

afer. 68. Gr. thoracis ſcutello plano acuminato abdominis longitudine. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 1.
Habitat in Sierra Leon, *niger, bipunctati magnitudine.*

carinatus. 6. Gr. thorace cymbiformi laevi, vertice depreſſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 122.*
Habitat in America *auſtrali et* India; *an hujus tribus?*

bipuncta-tus. 7. Gr. fuſceſcens, thoracis ſcutello longitudine abdominis. *Fn. ſuec.* 864.* *Scop. ent. carn.* 316. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 351. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 2.

Fn.

An ſpecies a Seba *muſei vol.* IV. *delineatae, tapetum perſicum t.* 74. *f.* 1. *viridimaculatus t.* 74. *f.* 3. *pallidiſſime virens t.* 74. *f.* 4. *griſeo-rubicundus t.* 74. *f.* 5. *nigro-fuſcus t.* 74. *f.* 6. *nigricans t.* 79. *f.* 5. 6. *albo-maculatus t.* 80. *f.* 3. 4. *coffens t.* 83. *f.* 6. *teſtaceus t.* 83. *f.* 7. *obſcure flavus t.* 83. *f.* 8. *ruſeſcens t.* 83. *f.* 10. *cinereus t.* 83. *f.* 11. *nigro-maculatus t.* 84 *f.* 7. *purpuraſcens t.* 84. *f.* 8. *nigro-ſtriatus t.* 84. *f.* 9. *verſicolor t.* 84. *f.* 10. *ad hanc tribum referendae?*

Fn. ſuec. 1. *n.* 623. Gryllus elytris nullis, thorace in elytron longitudinale extenſo: macula utrinque nigra rhombea.
Geoffr. inſ. par. II. *p.* 394. *n.* 5. Acrydium elytris nullis, thorace producto, abdomine aequali.
Degeer inſ. 1. *p.* 483. *n.* 11. *t.* 23. *f.* 15. Acrydium ſcutellatum.
Raj. inſ. 60. Locuſta minor fuſceſcens, cucullo longo rhomboideo.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 6.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 52. *f.* 1.

ſtriatus. β) Gryllus linea albida a fronte per medium ſcutellum percurrente. *Lepech. it.* 2. *p.* 211. *t.* 10. *f.* 17.
Habitat in Europae *collibus arenoſis apricis.*

ſubulatus. 8. Gr. thoracis ſcutello abdomine longiore. *Fn. ſuec.* 865.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 351. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 3.
Degeer inſ. 3. *p.* 484. *n.* 12. *t.* 23. *f.* 17.
Fn. ſuec. 624. Gryllus elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 395. *n.* 6. Acrydium elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 154. *f.* 9. 10. *t.* 161. *f.* 2. 3.
Habitat in Europa *ad foſſas et aquas ſtagnantes, bipunctato valde affinis, nunc griſeus, nunc fuſcus.*

opacus. 69. Gr. ſpadiceus aut niger, thorace carinato ad latera ſinuato abdominis longitudine. *Herbſt aud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 190. *n.* 3. *t.* 52. *f.* 2.
Habitat Berolini *in foſſis ſabuloſis, ſtatura bipunctati, at minor.*

bifaſciatus. 70. Gr. fuſcus albo-maculatus: faſciis duabus lateralibus ochroleucis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 190. *n.* 4 *t.* 52. *f.* 3.
Habitat Berolini *in arenoſis, ſtatura et magnitudine opaci.*

bimaculatus. 71. Gr. thorace fuſco: utrinque lunula ochroleuca. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 190. *n.* 5. *t.* 52. *f.* 4.
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine ſubulati.*

granulatus. 72. Gr. ex griſeo viridi nigricanteque varius punctis elevatis aſper ad latera complanatus, thorace ſubovali gibbo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 198. *n.* 6. *t.* 52. *f.* 5.

leucoſti-ctos. 219. Gr. fuſcus, thoracis ſcutellique dorſo elevato pallido, ſcutello utrinque baſi macula alba. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 16. b.
Habitat in Europa.

griſeus. 220. Gr. griſeus ſcutello baſi et pone laminam alarum utrinque puncto nigro. *Muſ. Lesk. p.* 47. *n.* 16. c.
Habitat in Europa.

binotatus. 221. Gr. griſeus, ſcutello verſus apicem laminae alarum macula utrinque ferruginea. *Muſ. Lesk. p.* 47. *n.* 16. d.
Habitat in Europa.

*** *antennis ſetaceis, palpis inaequalibus, thorace rotundato cauda, biſeta:* Achetae.

Gryllotalpa. 10. Gr. alis caudatis elytro longioribus, pedibus anterioribus palmatis tomentoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 123.* *Fn. ſuec.* 866. *Scop. ent. carn.* 317. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 387. *n.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 353. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 1.
Degeer inſ. 3. *p.* 517. *n.* 2. Gryllus ſupra fuſcus, ſubtus ferrugineo-flavus &c.
Raj. inſ. 64. *Jonſt. inſ. t.* 12. *f. ult.* Gryllotalpa.
Mouff. inſ. 104.
Aldr. inſ. 571.
Welſch hecaſt. 1. *p.* 39.
Goed. inſ. 1. *t.* 76.
Barthol. act. Hafn. 4. *p.* 5. *f.* 1-6.
Blanck. herb. t. 81. *f.* 10.
Imperat. nat. 921. *f.* 2.
Friſch inſ. 11. *t.* 5.
Seb. muſ. 4. *t.* 89. *f.* 3. 4.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 14. 15.
Catesb. Carol. 1. *t.* 8.
Sulz. inſ. t. 9. *f.* 59.
Schaeff. ic. t. 37. *f.* 1.
Habitat in Europae, *borealis* Americae *et* Aſiae, *ipſius* Javae (*minor tamen*) *cutis*, *hortorum peſtis, fimo equino alliciendа, porcino pellenda.*

monſtroſus. 73. Gr. elytris alisque caudato-convolutis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 353. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 2.
Drury inſ. 2. *t.* 43. *f.* 1.
Habitat in India.

minutus. 11. Gr. flaveſcens, alis caudatis, tibiis poſterioribus triſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 355. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 14.
Degeer inſ. 3. *p.* 524. *n.* 8. *t.* 43. *f.* 8. Gryllus teſtaceus.
Habitat in America *meridionali, ſemipollicaris, ſiatura domeſtici, ſubtus fuſcus.*

domeſticus. 12. Gr. alis caudatis elytro longioribus, pedibus ſimplicibus, corpore glauco. *Fn. ſuec.* 868. *Scop. ent. carn.* 318. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 353. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 389. *n.* 2. Gryllus pedibus anticis ſimplicibus.
Degeer inſ. 3. *p.* 509. *n.* 1. *t.* 24. *f.* 1. 2. Gryllus griſeofuſcus pallidus &c.
Raj. inſ. 63. *Mouff. inſ.* 135. Gryllus domeſticus.
Jonſt. inſ. t. 12.
Hufn. inſ. 11. *f.* 4.
Seb. muſ. 4. *t.* 65. *f.* 24.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 12.
Hoſpitatur hodie in Europae *muris domeſticis, in* Guinea *ſextuplo major, tota nocte, praeſertim pluvia ingruente ſtridens, caloris fornacum amans, ſanie et liquore carnium veſcens, blattis, ut fertur, non cohabitans, pilulis ex arſenico et dauci recente radice farinae tritici immiſtis, aut nympheae radicibus lacti incoctis, ut perhibent, necandus, a campeſtri, ſi inquilinum ſe reddiderit, pellendus.*

aſſimilis. 74. Gr. alis caudatis elytro longioribus, abdomine ſtilis duobus apice fiſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 344. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 4.
Habitat in inſulis Americae *meridionali oppoſitis.*

reticulatus. 75. Gr. niger, elytris ruſo-reticulatis, antennis albo-annulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 354. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 5.
Habitat ad caput bonae ſpei, *antennis corpore duplo longioribus.*

76. Gr.

Grylli, *ſi primum tribum exceperis, quae aliis inſectis victitant, plantis veſcuntur, achetae potiſſimum radicibus tettigoniae et locuſtae foliis; larva et puppa omnium hexapus, agilis, imagini ſimillima, illa aptera; ſub terra ſaepe habitans, haec non raro cum imagine vorans; paucis ſpeciebus elytra aut alae nullae, et tum interdum modo feminis; in paucis ocellus elytrorum vitreus ſtridoris eſt inſtrumentum; japonicae oryzam infeſtant.*

braſilienſis. 76. Gr. fuſcus, alis caudatis elytris longioribus, dorſo pallidiore, cauda adſcendente longitudine corporis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 354. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 6.
Habitat in Braſilia.

orientalis. 77. Gr. alis caudatis elytris longioribus albis, corpore atro, capite pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 354. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 7.
Habitat Tranquebariae.

capenſis. 78. Gr. niger, alis caudatis elytris longioribus, elytris fuſcis baſi flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 354. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 8.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Morio. 79. Gr. alis caudatis elytris longioribus albis apice nigris, corpore atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 354. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 9.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura et magnitudine campeſtris.*

campeſtris. 13. Gr. alis elytro brevioribus, corpore nigro: ſtylo lineari. *Muſ. Lud. Ulr.* 124. *Scop. ent. carn.* 319. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 355. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 10.
Raj. inſ. 63. Gryllus campeſtris Mouffeti.
Friſch inſ. 1. *t.* 1.
Seb. muſ. 4. *t.* 65. *f.* 23. *et t.* 96. *f.* 24.
Schaeff. elem. t. 66.
icon. t. 157. *f.* 2-4.
Habitat in Europa *magis auſtrali, a primo Maji die ad aequinoctium usque ſtridens.*

umbraculatus. 14. Gr. niger, elytris apice albis, umbraculo frontis deflexo.
Habitat in Mauritania, *facie campeſtris, at capite magis ferrugineo, et membrana obovata ante caput deflexa diſtinctus.*

convolutus. 15. Gr. corpore nigro nebuloſo, elytris convolutis albidis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 399. *n.* 38.*
Habitat in Surinamo.

hoſpes. 80. Gr. alis caudatis elytro longioribus albis: coſta fuſca, elytris nigris albo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 355. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 11.
Habitat in America.

Crucis. 81. Gr. fuſcus, alis caudatis elytro longioribus, elytrorum margine flavo nigro-punctato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 12.
Habitat in inſula S. Crucis, *ſtatura campeſtris.*

Allioni. 82. Gr. capite thoraceque flaveſcentibus, elytris aqueis longitudine alae. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 355. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 13.
Habitat in Italia, *parvus.*

gryllodes. 83. Gr. griſeus, thorace depreſſo, abdomine fuſceſcente elytris paulo breviore, alis elytris longioribus reticulatis griſeo-hyalinis. *Pall. ſpic. zool.* 9. *p.* 16. *t.* 1. *f.* 10.
Habitat in Jamaica, *habitu ferme domeſtici, ſed gracilior et longior; an huc ſpectat?*

binotatus. 84. Gr. niger, elytrorum baſi maculis binis flavis, antennis corpore brevioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 338. *n.* 4. *t.* 43. *f.* 4. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *t.* 53. *f.* 1. Acheta bimaculatus.
Habitat in Europa.

pellucens. 85. Gr. albidus, thorace trapeziformi. *Scop. ent. carn.* 324. *delic. inſubr.* 1. *p.* 65. *t.* 24. *f.* E.
Habitat in Carnioliae *et* Italiae *vineis et hortis ſemipollicaris, aeſtate tota fere nocte ſtridens, habitu domeſtici, at duplo major; capite lucido, thoracis maculis tribus fuſcis, elytris flaveſcentibus diſtinctus.*

Gigas. 86. Gr. badius.
Sulz. hiſt. inſ. p. 83. *t.* 8. *f.* 8.
Habitat in America, *domeſtico dimidio major.*

teſſellatus. 87. Gr. ex fuſco teſtaceus, alis albo nigroque teſſellatis.
Drury inſ. 2. *p.* 80. *t.* 42. *f.* 3.
Habitat in inſula S. Johannae.

membranaceus. 88. Gr. pallide teſtaceus, thorace collari flaveſcente, alis ochraceis caudatis. *Drury inſ.* 2. *p.* 81. *t.* 43. *f.* 2.
Habitat - - -

deſertus. 89. Gr. alis caudatis elytro longioribus, corpore nigro. *Pall. it.* 1. *app. n.* 53.
Habitat terreſtris in deſertis auſtralibus Uralenſibus, *domeſtico affinis.*

90. Gr.

ſurinamenſis. 90. Gr. griſeo-fuſcus, thorace plano, elytris macula oblonga nigra, pedibus poſterioribus corpore duplo longioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 519. *n.* 1. *t.* 43. *f.* 1.
Habitat in Surinamo.

muticus. 91. Gr. capite elytrisque badiis, pedibus teſtaceis, cauda feminae mutica. *Degeer inſ.* 3. *p.* 520. *n.* 2. *t.* 43. *f.* 2.
Habitat in Surinamo.

ater. 92. Gr. ex nigro fuſcus, cauda feminae mutica. *Degeer inſ.* 3. *p.* 520. *n.* 3. *t.* 43. *f.* 3.
Habitat in Surinamo.

faſciatus. 93. Gr. fuſcus, thorace elytrisque lineis longitudinalibus fulvis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 522. *n.* 5. *t.* 43. *f.* 5.
Habitat in Penſylvania.

niveus. 94. Gr. albidus, elytris alisque niveis, thorace elongato, antennis femoribusque poſterioribus longiſſimis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 522. *n.* 6. *t.* 43. *f.* 6.
Habitat in Penſylvania.

punctulatus. 95. Gr. ex griſeo fuſcus, elytris hyalinis: puncto fuſco, alis carneis antennisque longiſſimis, thorace elongato. *Degeer inſ.* 3. *p.* 523. *n.* 7. *t.* 43. *f.* 7.
Habitat in Penſylvania.

**** *antennis ſetaceis, palpis inaequalibus, cauda feminis enſifera*, Tettigoniae, Fabricio Locuſtae.

citrifolius. 16. Gr. thorace tetragono angulis ſcabro. *Muſ. Lud. Ulr.* 125. *Gron. zooph.* 657.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 356. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 1. Locuſta thorace tetragono, angulis crenatis.
Degeer inſ. 3. *p.* 437. *n.* 7. *t.* 37. *f.* 3. Locuſta viridis.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 16. *f.* 1.
Habitat in America *auſtrali et* India.

laurifolius. 17. Gr. thorace ſubtetragono laevi trilobo, alis lanceolatis elytro obtuſiore longioribus. *Muſ. Lud. Ulr.* 126.* *Fabr. ſp. inſ.* 4. *p.* 356. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 2.
Degeer inſ. 3 *p.* 445. *n.* 6. *t.* 38. *f.* 2. Locuſta oblongifolia.
Sloan. jam. 2. *p.* 101. *t.* 236. *f.* 1. Locuſta maxima viridis, alis latiſſimis.
Marcgr. braſ. 246. Tucurubi.
Habitat in America, nova Hollandia.

myrtifolius. 18. Gr. thorace ſubtetragono laevi, alis deflexis elytro longioribus, tibiis muticis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 356. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 3. Locuſta thorace ſubtetragono laevi, alis deflexis elytro longioribus, enſe breviſſimo recurvo.
Degeer inſ. 3. *p.* 447. *n.* 8. *t.* 38. *f.* 4. Locuſta viridis, pedibus teſtaceis, thorace tetragono plano, elytris ovatis ala acuminata brevioribus.
Drury inſ. 2. *t.* 41. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, laurifolio quadruplo minor.*

camillifolius. 96. Gr. thorace deflexo, elytris concavis apice rotundatis ala longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 356. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 4.
Degeer inſ. 3. *p.* 438. *n.* 2. *t.* 37. *f.* 5. Locuſta ſiccifolia.
Habitat in America.

thymifolius. 97. Gr. thorace tetragono laevi, elytris ſublinearibus fuſcopunctatis, alis brevioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 357. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 5.
Habitat in nova Hollandia, *nunc viridis, nunc ferrugineus.*

graminifolius. 98. Gr. thorace tetragono, elytris filiformibus fuſcis ala brevioribus, capite acuminato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 357. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 6.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ſpecularis. 99. Gr. thorace deflexo, elytris concavis viridibus: baſi ocello dorſali vitreo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 357. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 7.
Habitat in America.

auſtralis. 100. Gr. vireſcens, thorace rotundato, elytris alis aequalibus, pedibus anterioribus ſpinoſiſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 8.
Habitat in inſula Amſterdam, *ſpinipedi affinis, at major.*

ſpinipes. 101. Gr. thorace rotundato, elytris viridi-hyalinis ala brevioribus, pedibus anterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 357. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 9.
Habitat in Braſilia.

maxilloſus. 102. Gr. viridis, antennis maxilliſque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 357. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 10.
Habitat in inſulis Americae *oppoſitis.*

conocephalus. 19. Gr. thorace rotundato laevi, elytris oblongis ala brevioribus, tibiis muticis, capite conico obtuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 358. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 18.
Habitat in Africa, *viridis, magnitudine domeſtici.* Brünniche.

elongatus. 20. Gr. thorace ſubquadrato laevi, elytris aliſque griſeis corpore longioribus. *Muſ. Lud. Ulr.* 127.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 357. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 11.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 18. *f.* 7.
Habitat in India.

femoratus. 103. Gr. thorace ſcabro griſeo, alis lanceolatis elytro obtuſiore longioribus, femoribus ſubtus membranaceis dentatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 12.
Habitat Tranquebariae, *ſtatura et magnitudine elongati.*

lamelloſus. 21. Gr. thorace ſubquadrato, foliolis ovatis ante femora poſteriora. *Muſ. Lud. Ulr.* 128.*
Habitat in America *auſtrali et* India, *magnus.*

ocellatus. 22. Gr. thorace rotundato, alis ocello notatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 129.* *Gron. zooph.* 649.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 357. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 14.
Seb. muſ. 4. *t.* 73. *f.* 7. 8.
Habitat in America *auſtrali et* India.

lanceolatus. 104. Gr. thorace rotundato laevi, elytris oblongis alae aequalibus, fronte porrecta lanceolata ſubtus unidentata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 357. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 15.
Habitat in Sierra Leon Africae.

pallens. 105. Gr. albidus, thorace laevi, alis lanceolatis elytris longioribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 16.
Habitat in Cayenna, *parvus, tener.*

acuminatus. 23. Gr. thorace rotundato, vertice ſubulato, alis vireſcentibus longitudine corporis. *Muſ. Lud. Ulr.* 130.* *Gron. zooph.* 650.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 358. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 17.
Degeer inſ. 3. *p.* 443. *n.* 4. *t.* 37. *f.* 8. Locuſta acuminata.
Sloan. jam. 2. *p.* 202. *t.* 236. *f.* 3.
Sulz. hiſt. inſ. t. 9. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali.*

triops. 24. Gr. thorace rotundato, vertice acuminato, ſubtus puncto ocellari nigro, alis viridibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 131.*

 Fabr.

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 358. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 19. Locuſta vertice acuminato ſubtus puncto ocellari nigro, elytris alae aequalibus.

Habitat in America *auſtrali et* India, *abdomine brevi, enſem non ſuperante.*

rugoſus. 25. Gr. thorace rotundato rugoſo criſtato, capite acuminato, femoribus poſterioribus ſubtus repandis. *Muſ. Lud. Ulr.* 132.*

Habitat in America *auſtrali et* India, *criſta compreſſa crenata verſus apicem thoracis.*

coronatus. 26. Gr. thorace ſpinis erectis coronato, elytris varioloſo-concavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 358. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 20.

Degeer inſ. 3. *p.* 448. *n.* 9. *t.* 38. *f.* 5. Locuſta coronata.

Habitat in America *auſtrali et* India, *antennis corpore triplo longioribus, enſe lanceolato longo.*

aquilinus. 27. Gr. thorace rotundato ſubverrucoſo, alis latiſſimis: nervis quindecim. *Muſ. Lud. Ulr.* 133.*

Habitat in America *auſtrali et* India, *magnus, elytris lanceolatis, tibiis quadrifariam ſpinoſis.*

melanopterus. 28. Gr. thorace rotundato laevi, elytris abdomine dimidio brevioribus, alis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 134.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 358. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 21.

Habitat in America *auſtrali et* India, *elytris ovatis.*

faſtigiatus. 29. Gr. thorace rotundato laevi, elytris ovatis, alis truncatis, ſpinis tibiarum filiformibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 135.*

Habitat in America *auſtrali et* India.

coriaceus. 30. Gr. thorace rotundato laevi, elytris coriaceis, alis pallidis, antennis longiſſimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 136.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 358. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 22.

Habitat in America *auſtrali et* India, *magnus, colore flavo corii, femoribus teretibus.*

albifrons. 106. Gr. thorace poſterius rotundato laevi, elytris cinereo nigroque variis, capite pallido, enſe apice ſerrato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 359. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 23.

Habitat in inſula Madera.

107. Gr.

falx. 107. Gr. fuſcus, thorace laevi poſterius rotundato, capite pallido, enſe falcato atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 359. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 24.
Habitat in inſula Madera.

griſeus. 108. Gr. fuſcus, thorace poſterius carinato rotundato, enſe falcato atro baſi utrinque pallido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 359. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 25.
Habitat in Italia, *antennis flaveſcentibus longitudine corporis, pedibus vireſcentibus, elytris fuſco cinereoque variis.*

viridiſſimus. 31. Gr. thorace rotundato, alis viridibus immaculatis, antennis longiſſimis. *Fn. ſuec.* 869.* *Scop. ent. carn.* 320. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 359. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 26.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 397. *n.* 2. *t.* 8. *f.* 3. Locuſta cauda enſifera recta.
Degeer inſ. 3. *p.* 428. Locuſta viridis cantatrix.
Liſt. goed. 301. *t.* 121. Agrigoneus.
Goed. inſ. 2. *p.* 165. *t.* 40.
Zinann. obſ. t. 7. *f.* 7.
Robert. ic. t. 27.
Friſch inſ. 12. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 10. 11.
Schaeff. elem. t. 79.
icon. t. 139. *f.* 3-5.
Habitat in Europae *arboribus, graminoſis, agris hordeaceis, ſub canicula noctu ſtridulus, totus viridis.*

cinerarius. 32. Gr. antennis longiſſimis, elytris deflexis verticalibus. *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 31.*
Habitat in Braſilia.

verrucivorus. 34. Gr. thorace ſubquadrato laevi, alis viridibus fuſco-maculatis, antennis ſetaceis longitudine corporis. *Fn. ſuec.* 870.* *Scop. ent. carn.* 321.
It. wgoth. 253. Gryllus cauda enſifera recta, corpore ſubviridi.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 359. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 27. Locuſta alis viridibus fuſco maculatis, antennis longitudine corporis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 398. *n.* 1. Locuſta cauda enſifera curva.
Degeer inſ. 3. *p.* 430. *n.* 2. *t.* 21. *f.* 1. 2. Locuſta verrucivora.
Raj. inſ. 61. Locuſta viridis major.
Friſch inſ. 12. *t.* 2. *f.* 1. 2. Locuſta major viridis.
Mouff. inſ. 117. *f.* 5.

Rob. ic. t. 27.
Jonſt. inſ. t. 11. *f.* 1-3.
Merian. inſ. t. 176.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 8.
Sulz. inſ. t. 9. *f.* 61.
Schaeff. ic. t. 62. *f.* 5.
Habitat in Europa, *e murino fuſceſcens, a ruſticis Suecis manuum verrucis admotus, quas praemordet, et liquorem in vulnus evomendo, ut contabeſcat, efficit.*

varius. 109. Gr thorace viridi flavo lineato, fronte acuminata, antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 360. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 28.
Degeer inſ. 3. *p.* 433. *n.* 3. Locuſta thalaſſina.
Goed. inſ. 2. *p.* 142. *t.* 40.
Friſch inſ. 12. *t.* 2. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 9.
Habitat in Lipſiae *hortis, viridiſſimo affinis, at quadruplo minor.*

brachypterus. 110. Gr. griſeo-fuſcus, elytris alisque corpore dimidio brevioribus. *Fn. ſuec.* 868. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 360. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 29.
Degeer inſ. 3. *p.* 434. *n.* 4. *t.* 22. *f.* 2. 3. Locuſta brachyptera.
Habitat in Europae *borealis graminoſis, enſe elongato recurvo.*

Papus. 34. Gr. apterus, thorace ſpinoſo, femoribus punctatis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 322. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 360. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 30.
Degeer inſ. 3. *p.* 453. *n.* 13. *t.* 39. *f.* 5. Locuſta Papa ſpinoſa.
Pet. gazoph. t. 13. *f.* 7. Locuſta talpa capenſis pedibus longis.
Kundm. promtuar. 118. *n.* A. 184.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 6. *f.* 3.
Habitat in Aethiopia, *ſcutello magno rotundato ſpinis ciliato, femoribus poſterioribus ſubtus quadridentatis.*

ſpinuloſus. 59. Gr. thorace ſpinis muricato cinctoque, corpore aptero. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 361. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 31.
Edw. glean. 2. *p.* 161. *t.* 285. *f.* 3-5.
Habitat in America *auſtrali et* India, *enſe recurvo, abdomine nigro: maculis teſtaceis.*

111. Gr.

Onos, 111. Gr. thorace laevi nigro: lateribus griſeis, corpore aptero. *Pall. ſpic. zool.* 9. *p.* 18. *t.* 2. *f.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 361. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 32.
Petiv. gazoph. t. 39. *f.* 9? Locuſta echinata impennis e Chuſan.
Habitat in Sibiria, *enſe longitudine abdominis.*

ephippiger. 112. Gr. thorace poſterius elevato, elytris breviſſimis fornicatis. *Fiubig Schr. der naturf. berl. Geſ.* 5. *t.* 3. *f.* 6-8. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 33.
Habitat in Europae *magis auſtralis pratis, magnus.*

dubius. 113. Gr. thorace laevi poſterius rotundato, elytris breviſſimis apice capiteque albidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 34.
Habitat in Italia, *ſtatura ephippigeri.*

Laxmanni. 114. Gr. thorace poſterius marginato dentato, enſe recurvo apice deflexo, femina aptera. *Pall. it.* 1. *app. n.* 52. *ſpic. zool.* 9. *p.* 20. *t.* 2. *f.* 2. 3. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 361. *n* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 35.
Habitat in Sibiria.

glaber. 115. Gr. fuſcus, thorace ſubdepreſſo laeviſſimo, elytris medio viridibus fuſco maculatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 193. *n.* 6.
Schaeff. ic. t. 62. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania *verrucivoro affinis.*

indicus. 116. Gr. viridis, fronte obtuſe conica, thorace anterius et poſterius elevato, medio excavato, abdomine aliisque fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 193. *n.* 7. *t.* 53. *f.* 2.
Habitat in India, *ephippigero affinis.*

leucoſtictos. 117. Gr. fuſco-teſtaceus, elytris margine maculisque flavis, femoribus in junctura puncto albiſſimo notatis.
Roeſel inſ. 2. *gryll. p.* 128. *t.* 20. *f.* 8-10.
Habitat in Germania, *femina vireſcens.*

palpatus. 118. Gr. apterus fuſco teſtaceus, palpis anterioribus pedibusque poſterioribus longiſſimis.
Sulz. hiſt. inſ. p. 83. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in Sicilia.

cantans. 119. Gr. thorace rotundato maculato, elytris rotundatis: macula baſeos rotunda hyalina antennis longiſſimis. *Fueſſli inſ. helv. p.* 23. *n.* 439. *f.* 5. a. 5. b.

Müll.

Müll. zool. dan. prodr. p. 101. *n.* 1144? Locuſta viridis.
Habitat in Europa, *viridiſſimo affinis, at paulo minor, elytris brevioribus.*

falcatus. 120. Gr. elytris viridibus ala brevioribus, antennis longiſſimis enſe inflexo ferrugineo quadruplici. *Scop. ent. carn. p.* 108. *n.* 322.
Fueſſli inſ. helv. p. 23. *n.* 440.
Lepechin it. 1. *p.* 79. d.
Poda muſ. graec. p. 52.
Schaeff. ic. t. 138. *f.* 1-3.
Habitat in Germania, Helvetia, Sibiria.

Pedo. 121. Gr. gracilis mollis, pedibus poſterioribus longioribus gracillimis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 51.
Habitat in Sibiria.

flaveſcens. 122. Gr. flaveſcens, elytris rubeſcentibus atro reticulatis, enſe ex flavo atro.
Schaeff. ic. t. 91. *f.* 6.
Habitat in Germania, *ſtatura verrucivori, oculis caeruleis, enſe adſcendente.*

bipuſtulatus. 123. Gr. fuſcus, enſe thoracisque punctis binis atris, elytris ſubflaveſcentibus atro teſſulatis ala brevioribus.
Schaeff. ic. t. 138. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

marginatus. 124. Gr. viridis variegatus, thoracis margine flavo.
Schaeff. ic. t. 236. *f.* 1-4.
Habitat in Germania, *ſtatura verrucivori.*

rubicundus. 125. Gr. capite femoribusque rubicundis atro-ſquamatis.
Schaeff. ic. t. 242. *f.* 5. 6.
β) *Schaeff. ic. t.* 249. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania, *ſtatura verrucivori.*

rufipes. 126. Gr. viridis, enſe femorumque nodulis fuſcis, pedibus rubris.
Schaeff. ic. t. 255. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

luteus. 127. Gr. luteus, alis intime virideſcentibus, enſe aterrimo.
Schaeff. ic. t. 258. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

cinereus. 128. Gr. griſeus, capite thoraceque faſciis duabus nigris, femina aptera.
Degeer inſ. 3. *p.* 436. *n.* 5. Locuſta griſeo-aptera.
Habitat in Suecia, *brachyptero major, antennis longiſſimis.*

cornutus. 129. Gr. viridis, thorace rotundato, capitis vertice cornuto rugoſo, femoribus ſpinoſiſſimis, antennis teſtaceis elytro brevioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 441. *n.* 3. *t.* 37. *f.* 7.
Habitat in Surinamo, 3 *lineas ultra* 2 *pollices longus.*

tuberculatus. 130. Gr. thorace planiuſculo, vertice tuberculato laevi, elytris elongatis anguſtis, antennis teſtaceis longitudine elytrorum. *Degeer inſ.* 3 *p.* 444. *n.* 5. *t.* 38. *f.* 1.
Habitat in Surinamo, *viridis, acuminato minor.*

curvicaudus. 131. Gr. totus viridis, thorace tetragono plano, elytris elongatis ala brevioribus, pedibus poſterioribus longiſſimis. *Degeer inſ.* 3. *p* 446. *n.* 7. *t.* 38. *f.* 3.
Habitat in Penſylvaniae *pratis, laurifolio paulo minor.*

vulturinus. 132. Gr. thorace angulato laevi, femoribus anterioribus muticis, fronte macula abdomineque ſubtus faſcia nigris, antennis corpore triplo longioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 451. *n.* 11. *t.* 39. *f.* 2.
Habitat in Surinamo, *vix* 2 *pollices longus.*

falconarius. 133. Gr. thorace rotundato, femoribus teretibus longis: intermediis muticis, elytris lanceolatis, antennis longiſſimis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 452. *n.* 12. *t.* 39. *f.* 4.
Habitat in Surinamo, *ultra* 2 *pollices longus.*

capitatus. 134. Gr. capite magno, thorace plano laevi: faſciis binis longitudinalibus nigris, elytris longitudine abdominis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 455. *n.* 14. *t.* 40. *f.* 1.
Habitat - - - - *ſeſquipollicaris.*

ſpinifrons. 135. Gr. thorace planiuſculo laevi, vertice ſpinoſo, fronte nigra, corpore rufo fuſco, elytris viridi-purpureis pallidis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 456. *n.* 15. *t.* 40. *f.* 2.
Habitat in Surinamo, *pollicem longus.*

agilis. 136. Gr. griſeo-viridis, abdomine fuſco, thorace planiuſculo, pedibus poſterioribus antennisque longiſſimis, alis elytro longioribus *Degeer inſ.* 3. *p.* 457. *n.* 16. *t.* 40. *f.* 3.
Habitat in Penſylvania, *vix pollicem longus.*

137. Gr.

faſciatus. 137. Gr. viridis, abdomine faſciis ſulphureis fuſcisque, thorace planiuſculo, alis elytro longioribus, pedibus poſterioribus longiſſimis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 458. *n.* 17. *t.* 40. *f.* 4.
Habitat in Penſylvania, 9 *modo lineas longus.* *)

teres. 138. Gr. ex flavo lividus, oculis maximis, alis elytro longioribus, pedibus anterioribus ſpinoſiſſimis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 458. *n.* 18. *t.* 40. *f.* 5.
Habitat in Surinamo, 7 *modo lineas longus.*

muticus. 222. Gr. thorace oblongo-quadrato marginato, femoribus tibiisque bifariam ſpinoſis, enſe laevi adſcendente longitudine fere abdominis. *Muſ. Lesk. p.* 47. *n.* 22.
Habitat extra Europam.

macropterus. 223. Gr. thorace rotundato alis albidis fuſco lineatis elytra pallide immaculata ſuperantibus, abdomine filis quatuor terminato, femoribus poſterioribus ſubtus tibiisque quatuor anterioribus bifariam ſpinoſis. *Muſ. Lesk. p.* 47. *n.* 13. C.
Habitat extra Europam.

nigromaculatus. 224. Gr. thorace rotundato laevi, capite elytrisque pallidis, antennis longiſſimis, alis caeruleo-vireſcentibus: macularum nigrarum undulatarum ordinibus ſeptem tranſverſis. *Muſ. Lesk. p.* 47. *n.* 24.
Habitat extra Europam, *pedibus pallidis, tibiis anterioribus longis ſpinis armatis.*

teſtaceus. 225. Gr. teſtaceus, abdomine elytris longiore ſubtus et thoracis margine externo flavo, enſe adſcendente quadrivalvi. *Muſ. Lesk. p.* 47. *n.* 28.
Habitat in Europa.

fulvicornis. 226. Gr. fuſco cinereoque varius, antennis flaveſcentibus longitudine corporis, thorace plano poſterius ſubcarinato, elytris fuſco-griſeis: punctorum pallidorum ordine obſoleto, enſe adſcendente. *Muſ. Lesk. p.* 48. *n.* 33.
Habitat in Europa.

227. Gr.

*) *An propriae ſpecies huc referendae a* Seba *muſ. vol.* 4. *delineatae? flavus t.* 70. *f.* 11. 12. *teſſulatus t.* 71. *f.* 7. 8. *nigro-notatus t.* 72. *f.* 1 2. *chloropterus t.* 75. *f.* 5. 6. *duplicatus t.* 75. *f.* 7-10. *ſubulatus t.* 78. *f.* 6. *bifurcatus t.* 79. *f.* 13-16. *albo-punctatus t.* 80. *f.* 7. 8. *capite et cauda ſubulatis t.* 83. *f.* 9. *enſiferi conſueti t.* 96. *f.* 39. 40.

longicornis. 227. Gr. thorace rotundato ſupra teſtaceo, capite viridi: fronte acuminata teſtacea antennis longiſſimis, elytris teſtaceis abdomine dimidio brevioribus, enſe adſcendente teſtaceo baſi viridi. *Muſ. Lesk. p.* 48. *n.* 34.
Habitat in Europa.

***** *antennis filiformibus, palpis ſimplicibus, cauda ſimplici*, Locuſtae, Grylli Fabricii.

reticulatus. 4. Gr. thorace cymbiformi poſterius producto acuto, elytris reticulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 362. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 7.
Habitat in Bengala, *magnitudine fere ſerrati.*

ſerripes. 139. Gr. thorace cymbiformi poſterius producto, elytris fuſcis, femoribus poſterioribus ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 8.
Habitat in America *auſtrali et* India, *magnitudine fere ſerrati.*

ſerratus. 5. Gr. thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato, abdomine caeruleo. *Muſ. Lud. Ulr.* 121.* *Gron. zooph.* 142.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 363. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 9. Gryllus thorace cymbiformi carinato ſerrato poſtice producto acuto.
Degeer inſ. 3. *p.* 493. *n.* 10. *t.* 41. *f.* 6. Acrydium ſerratum.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 16. *f.* 2.
Sulz. inſ. t. 8. *f.* 58.
Habitat ad caput bonae ſpei.

turcicus. 140. Gr. cinereus, thorace cymbiformi, elytris baſi faſciaque fuſcis, alis baſi atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 10.
Habitat in India, *parvus.*

Lunus. 9. Gr. thoracis ſegmento criſta ſemiorbiculata, elytris nigris: faſciis albis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 30. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 362. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali, alis nigris immaculatis.*

Elephas. 35. Gr. thorace carinato integro, corpore aptero. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 361. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 1.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* .6 *f.* 2.
Habitat in Africa, *reliquis hujus tribus major et ponderoſior, viridis femoribus muticis, rudimentis alarum duarum.*

ſuccinctus. 36. Gr. thoracis carina margineque poſteriori elytrorumque margine dorſali flavis, gula cornuta. *Amoen. acad.* 6. *p.* 398. *n.* 36. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 362. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 54. *f.* 2.
Habitat in America *auſtrali, et duplo major in* India, *antennis flavis, tibiarum poſteriorum ſpinis luteis apice atris.*

criſtatus. 37. Gr. thorace criſtato, carina quadrifida, alis apice fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 137.* *Amoen. acad.* 1. *p.* 21. *t.* 17. *f.* 4. *Gron. zooph.* 658. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 362. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 3.
Haſſelq. it. 413. Gryllus arabicus.
Olear. muſ. t. 17. *f.* 5. Gryllus ex Aegypto.
Friſch inſ. 9. *t.* 1. *f.* 1.
Seb. muſ. 4. *t.* 72. *f.* 11. 12.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 5.
Edw. glean. t. 312.
Habitat frequens in Arabia, Aegypto, *Arabibus eſculentus.*

Dux. 141. Gr. thorace carinato ſcabro, elytris viridibus, alis rufis fuſco maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 362. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 4.
Drury inſ. 1. *t.* 44.
Habitat in America *meridionali, magnus, vireſcens, capite flaveſcente, antennis nigris.*

aegyptiacus. 142. Gr. thorace criſtato: carina trifida, alis faſcia nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 362. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 5.
Habitat in Aegypto.

morbilloſus. 38. Gr. thorace quadrato rubro verrucoſo, elytris fuſcis albopunctatis, alis rufis. *Muſ. Lud. Ulr.* 141.* *Gron. zooph. p.* 179. *n.* 662. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 364. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 15.
Seb. muſ. 4. *t.* 79. *f.* 7. 8.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 18. *f.* 6.
Seligm. av. 1. *t.* 43.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 54. *f.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei.

punctatus. 143. Gr. thorace verrucoſo, elytris atris flavo punctatis, alis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 364. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 16.

Sulz.

Sulz. hiſt. inſ. t. 9. *f.* 3.
Drury inſ. 2. *t.* 41. *f.* 4.
Habitat in India.

ſquamoſus. 144. Gr. viridis, thorace ſubarticulato: articulis utrinque ſubtricuſpidibus, alis rubris nigro punctatis. *Mant. p.* 533.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 364 *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 17. Gryllus thorace ſubtriarticulato, articulis utrinque ſpinoſis, alis rubris nigro punctatis.
Drury inſ. 1. *t.* 49. *f.* 1.
Habitat in Africa.

miliaris. 39. Gr. thorace ſubquadrato dentato verrucoſo, elytris punctis callolis albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 142.*
Degeer inſ. 3. *p.* 486. *n.* 1. *t.* 40. *f.* 6. Acrydium verrucoſum.
Habitat in America *meridionali, morbilloſo affinis.*

haematopus. 40. Gr. thorace ſubcarinato ſcabro, capite obtuſo, femoribus piloſo ciliatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 143.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 365. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 18.
Degeer inſ. 3. *p.* 490. *n.* 6. *t.* 40. *f.* 10. Acrydium rubripes.
Habitat in America *auſtrali et* India, *elytris cinereis, alis nigro-venoſis.*

flavicornis. 145. Gr. viridis, thorace ſubcarinato, elytris immaculatis, alis baſi rufis, tibiis poſterioribus ſanguineis flavo-ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 19.
Habitat in Sina, *magnus.*

pictus. 146. Gr. elytris viridibus albo punctatis apice rufeſcentibus, corpore caeruleo flavoque variegato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 365. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 20.
Habitat in Cayenna.

migratorius. 41. Gr. thorace ſubcarinato: ſegmento unico capite obtuſo, maxillis atris. *Muſ. Lud. Ulr.* 140.* *Fn. ſuec.* 871. *Scop. ent. carn.* 323.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 265. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 22. Gryllus thorace ſubcarinato, ſegmento unico, mandibulis caeruleis.
Friſch inſ. 9. *t.* 1. *f.* 8. Gryllus migratorius.
Degeer inſ. 3. *p.* 466. *n.* 1. *t.* 23. *f.* 1. Acrydium migratorium.
Seb. muſ. 4. *t.* 65. *f.* 21.
Roeſel inſ. 2. *gryll. t.* 24.
Edw. glean. t. 208.
Seligm. av. 6. *t.* 103.

Habitat in Tataria, *variis annis numeroſiſſimis gregibus in* Europam *migrans, et omnia vegetabilia exedens, ab Aegyptiis vivus prunis injectus, rejectis alis pedibusque eſitatur.*

tataricus. 42. Gr. thorace ſubcarinato: ſegmentis tribus, capite rotundato: maxillis concoloribus. *Muſ. Lud. Ulr.* 139.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 365 *n.* 18 *mant. inſ.* 1. *p.* 237 *n.* 21. Gryllus thorace ſegmentis tribus, fronte impreſſa, mandibulis concoloribus.
Roeſ. inſ. gryll. t. 18. *f.* 8.
Drury inſ. 1. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat in Africa, *elytris praeſertim cineraſcentibus fuſco maculatis, migratorio affinis.*

ruficornis. 147. Gr. thoracis dorſo nigro: carina flava, antennis tibiisque poſterioribus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 23.
Habitat in Sierra Leon Africae, *ſtatura migratorii, at paulo minor.*

Lineola. 148. Gr. thorace ſubcarinato fuſco: linea dorſali rufa, femoribus poſterioribus intus ſanguineis, tibiis caeruleis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 365. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 24.
Habitat in Italia, *magnitudine migratorii.*

variegatus. 43. Gr. thorace lineato flavo, elytris viridibus, alis caeruleis. *Muſ. Lud. Ulr.* 144. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 366. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 25.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 53. *f.* 3.
Habitat in America, *fronte rubra atro maculata, antennis nigris rubro annulatis.*

vocans. 149. Gr. thorace carinato, elytris pallidis: maculis ocellaribus fuſcis, alis baſi ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 366. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 26.
Habitat in nova Hollandia.

luridus. 150. Gr. niger, thorace ſubcarinato, pectoris macula abdominisque cingulis ſanguineis, fronte porrecta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 366. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 23.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magnitudine ſtriduli.*

muſicus. 151. Gr. thorace carinato, elytris anterius nigris faſcia alba, poſterius griſeis nigro variis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 366. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 28.
Habitat in nova Hollandia.

ſcaber. 152. Gr. thorace ſcabro, alis rufis apice cinereis, femoribus poſterioribus ſupra infraque carinatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 366. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 30.
Habitat in Jutlandiae *arenoſis.*

ciſti. 153. Gr. thorace ſcabro: criſta bifida, alis rubris: faſcia nigra: femoribus poſterioribus canaliculatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 29.
Habitat in ciſto halimifolio, *ſtridulo paulo major.*

caerulescens. 44. Gr. thorace ſubcarinato, alis vireſcenti-caeruleis: faſcia nigra. *Muſ. Lud. Ulr.* 145.* *Scop. ent. carn.* 325. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 369. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 43.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 392. *n.* 2. Acrydium elytris nebuloſis, alis caeruleis extimo nigro.
Degeer inſ. 3. *p.* 473. *n.* 3. Acrydium caeruleipenne.
Raj. inſ. 60.
Friſch inſ. 9. *t.* 1. *f.* 3.
Seb. muſ. 4. *t.* 65. *f.* 19.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 21. *f.* 4.
Sulz. inſ. t. 9. *f.* 60.
Schaeff. ic. t. 27. *f.* 6. 7.
Habitat in Sibiria *et* Europa *magis auſtrali.*

ſurinamus. 45. Gr. thorace lineis quatuor flavis, alis caeruleis, elytris viridibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 146. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 367. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 34.
Habitat in America *meridionali, femorum baſi ſanguinea.*

italicus. 46. Gr. fuſcus, thorace carinato, alis rubris, apice hyalinis. *Muſ. Lud. Ulr.* 147.* *Scop. ent. carn.* 327. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 367. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 35.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 21. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 27. *f.* 8. 9.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

thalaſſinus. 154. Gr. thorace laevi viridi, alis hyalinis latere tenuiori viridibus, apice fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 367. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 37.
Habitat in Italia, *capite thoraceque viridi, ore oculisque fuſcis, tibiis ſanguineis.*

germanicus. 155. Gr. teſtaceus, alis ſanguineis apice hyalinis, femoribus poſterioribus nigro punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 367. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 36.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 21. *f.* 7.
Habitat in Germaniae *agris.*

virginianus. 156. Gr. thorace carinato, elytris coſta viridi, alis nigris baſi vireſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 368. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 38.
Habitat in America *boreali.*

ſtridulus. 47. Gr. thorace ſubcarinato, alis rubris extimo nigris. *Fn. ſuec.* 872.* *Scop. ent. carn.* 326. *Fabr. ſ. inſ.* 1. *p.* 366. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 31.
It. oel. 158. Gryllus elytris nebuloſis, alis rubris extimo nigris.
Uddm. diſſ. 50.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 393. *n.* 4. Acrydium elytris nebuloſis, alis rubris externe nigris.
Degeer inſ. 3. *p.* 472. *n.* 2. Acrydium rubripenne.
Friſch inſ. 9. *t.* 1. *f.* 2.
Seb muſ. 4. *t.* 65. *f.* 20.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 21. *f.* 1.
Schaeff. elem. t. 15.
icon. t. 27. *f.* 10. 11.
Habitat in Europae *ſiccis arenoſis, tota die in ſeram noctem ſtridens, niger, aut nigro flavoque varius.*

ferrugineus. 157. Gr. thorace tuberculato, elytris obſcuris immaculatis, alis ferrugineis, capite acuminato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 367. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 33.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

morio. 158. Gr. obſcurus, thorace ſubcarinato, alis atris immaculatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 32.
Habitat in Africa, *ſtridulo affinis, at paulo minor.*

caerulans. 48. Gr. thorace laeviuſculo, elytris pallidis nigro maculatis, alis latere tenuiore caeruleſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 368. *n.* 33. *mant. inſ. p.* 238. *n.* 39.
Habitat in Europae *magis auſtralis campeſtribus.*

carolinus. 49. Gr. thorace ſubcarinato, alis nigris: margine poſteriore flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 368. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 40.
Catesb. carol. 2. *p.* 89. *t.* 89. Locuſtella carolina, elytris fuſcis, alis inferioribus nigris, ad extremitates luteis.
Degeer inſ. 3. *p.* 491. *n.* 7. *t.* 41. *f.* 2. 3. Acrydium carolinum.
Habitat in America *boreali, elytris obſcuris fuſco punctatis.*

50. Gr.

obſcurus. 50. Gr. thorace ſubcarinato, alis diſco rubro faſcia nigra, apice hyalinis. *Muſ. Lud. Ulr.* 144. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 368. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 41.

Degeer inſ. 3. *p.* 492. *n.* 8. *t.* 41. *f.* 4. Acrydium obſcurum.

Seb. muſ 4. *t.* 80. *f.* 15. 16.

Drury inſ. 2. *t.* 41. *f.* 1.

Habitat in Africa, *femoribus interne baſi atris.*

ſibiricus. 51. Gr. thorace ſubcarinato, antennis clavatis, tibiis anterioribus ovato-clavatis craſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 368. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p* 238. *n.* 42.

Pall. it. 1. *app. n.* 48. *ſpicil. zool.* 9. *p.* 29. *t.* 1. *f.* 11. Gryllus clavimanus.

Laxmann nov. comm. Petrop. 14. *t.* 25. *f.* 8.

Habitat in Sibiria, *femina tibiis ſimplicibus.*

cineraſcens. 159. Gr. thorace carinato, elytris margine tenuiore viridibus, alis baſi flaveſcentibus apice cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 369. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 44.

Habitat in Italia, *flavo affinis, at duplo major.*

ſulphureus. 160. Gr. obſcurus thorace carinato, alis flaviſſimis apice nigricantibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 369. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 45.

Habitat in America *boreali, parvus.*

flavus. 52. Gr. thorace carinato, alis flavis, faſcia nigra apice cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 369. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 46.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 702. *n.* 52. Gryllus thorace ſubcarinato, alis diſco flavo, faſcia nigra apice hyalinis.

Scop. delic. inſubr. 1. *p.* 63. *t.* 24. *f.* C. Gryllus alis ſemiluteis: faſcia fuſca, corpore ſubtus fuſco-ferrugineo.

Degeer inſ. 3. *p.* 493. *n.* 9. *t.* 41. *f.* 5? Acrydium nigrofaſciatum.

Petiv. gazoph. 6. *t.* 3. *f.* 6. Locuſta capenſis, alis inferioribus luteis.

Habitat in Europa *magis auſtrali, et* Africa, *tibiis poſterioribus ſanguineis, elytris fuſcis: maculis obſoletis albis.*

inſubricus. 161. Gr. elytris teſtaceis, alis baſi rubris: faſcia fuſca. *Scop. delic. inſubr.* 1. *p.* 64. *t.* 24. *f.* D.

Habitat in Inſubria, *italico minor.*

nitidulus. 162. Gr. viridis, capite lucido luteo. *Scop. delic. inſubr.* 1. *p.* 62. *t.* 24. *f.* B.
Habitat circa Mediolanum, *bipollicaris, ad tettegonias remittendus.*

cyanipes. 163. Gr. fuſcus, linea dorſali flava, tibiis poſterioribus flavis apice cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 370. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 47.
Degeer inſ. 3. *p.* 489. *n.* 4. *t.* 40. *f.* 3. Acrydium flavofaſciatum.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

ruſticus. 164. Gr. griſeus, elytris baſi fuſcis flavo maculatis apice cinereo fuſcoque variis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 370. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 48.
Habitat in Inſulis Americae *meridionali oppoſitis.*

lateralis. 165. Gr. thorace fuſco: margine punctoque utrinque tibiisque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 370. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 49.
Habitat in inſulis Americae *meridionali oppoſitis.*

velox. 166. Gr. fuſcus, thoracis plani margine pedibusque vireſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 50.
Habitat in Sina, *parvus.*

apricarius. 53. Gr. thorace cruciato, antennis longitudine corporis. *Fn. ſuec.* 873.* *It. oel.* 157.
Habitat in Europae *campis ſicciſſimis.*

viridulus. 54. Gr. thorace cruciato, corpore ſupra viridi, elytrorum margine albido. *Fn. ſuec.* 874.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 370. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 51.
It. wgoth. 276. Gryllus capite, thorace elytrisque ſuperne viridibus.
Degeer inſ. 3. *p.* 480. *n.* 7. Acrydium albo marginatum.
Friſch inſ. 9. *t.* 1. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 141. *f.* 2. 3.
Habitat frequens in Europae *arvis ſterilioribus.*

biguttulus. 55. Gr. thorace cruciato, elytris nebuloſis: puncto oblongo albo verſus apices. *Fn. ſuec.* 875. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 370. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 51.
Degeer inſ. 3. *p.* 479. *n.* 6. Acrydium biguttulum.
Schaeff. icon. t. 190. *f.* 1. 2.
Habitat in Europae *magis borealis arvis ſterilioribus, frequens.*

rufus. 56. Gr. thorace cruciato, corpore rufo, elytris griſeis, antennis ſubclavatis acutis. *Fn. ſuec.* 876.* *Scop. ent. carn.* 329. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 371. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 55.
Gryllus fuſcus, abdomine rufo, antennis ſubclavatis. *Schaeff. ic. t.* 136. *f.* 4. 5.
Habitat in Europae *arvis ſterilioribus frequens.*

captivus. 167. Gr. fuſcus thorace cruciato, femoribus tibiisque poſterioribus faſcia alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 371. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 54.
Habitat in nova Hollandia.

danicus. 57. Gr. thorace ſubcarinato femoribusque vireſcentibus, tibiis poſterioribus ſanguineis.
Habitat in Dania, *verrucivori magnitudine.* Brünniche.

groſſus. 58. Gr. femoribus ſanguineis, elytris vireſcenti-ſubrufis, antennis cylindricis. *Fn. ſuec.* 877.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 371. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 53.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 393. *t.* 8. *f.* 2. Acrydium femoribus ſanguineis, alis ſubfuſcis reticulatis.
Degeer inſ. 3. *p.* 477. *n.* 5. *t.* 22. *f.* 4. Acrydium rubripes.
Hollar. inſ. t. 10. *f.* 5. 6.
Friſch inſ. 9. *p.* 5. *t.* 4.
Habitat in Europae *arvis arenoſis frequens.*

pedeſtris. 60. Gr. corpore incarnato aptero. *Fn. ſuec.* 878.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 371. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 56.
Degeer inſ. 3. *p.* 474. *n.* 4. *t.* 239. *f.* 8. 9. Acrydium apterum.
Habitat in Europa, *et ad* Sibiriae *montem* Tſcheremſchan.

perſpicillatus. 61. Gr. alarum rudimentis ocello atro, oculis aureis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 398. *n.* 34. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 371. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 57.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 357. *n.* 11? *mant. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 13? Locuſta (ſpecularis) thorace rotundato, elytris griſeis baſi ocello dorſali vitreo, antennis longiſſimis.
Habitat in America *auſtrali et* India.

annulatus. 168. Gr. thorace planiuſculo, fronte gibboſa, alis caeruleſcenti-nigris intus caeruleis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 195. *n.* 5. *t.* 53. *f.* 4.
Habitat in America, *punctis elevatis ſcaber, ex rubeſcente griſeus, abdominis annulis aliquot vireſcentibus, antennis flavicantibus nigro annulatis.*

triangularis. 169. Gr. ſpadiceus, ſcutello abdominisque ſegmento primo macula triangulari, elytris margine flavis, alis flaveſcentibus.
Roeſel inſ. 2. *gryll. p.* 138. §. 2. *t.* 22. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

verſicolor. 170. Gr. viridi rubro flavoque varius, capite cum antennis elytrorumque margine viridi, thorace elytrisque fuſcis.
Sulz. hiſt. inſ. p. 84. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in Inſubria.

Centurio. 171. Gr. fuſcus atro maculatus, alis ruberrimis: baſi margine ſtriisque tenerrimis undulatis atris.
Drury inſ. 2. *p.* 78. *t.* 41. *f.* 3.

caeruleus. 172. Gr. viridis, alis caeruleis apice cinereis, femoribus viridi-flavis, tibiis nigerrimis.
Drury inſ. 2. *p.* 79. *t.* 42. *f.* 1.
Habitat in Africa.

Miles. 173. Gr. viridis, frontis faſciis thoracisque punctis binis flavis, elytris ſpadiceis, alis alternatim rufeſcentibus et atris.
Drury inſ. 2. *p.* 80. *t.* 42. *f.* 2.
Habitat in America.

lunulatus. 174. Gr. thorace ſubcucullato: lineis tribus elevatis; lateralibus lunulatis.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. p.* 128. §. 5. *t.* 20. *f.* 6. 7.
Scop. ent. carn. p. 110. *n.* 328.
Habitat in Germania.

ſubcarinatus 175. Gr. thorace ſubcarinato virideſcente, alis baſi luteis: apicis macula nigricante. *Lepech. it.* 1. *p.* 256. c. *t.* 47. *f.* 4.
Habitat in Sibiriae *deſertis* Uralenſibus.

176. Gr.

An huc referendi, tanquam propriae ſpecies, a reliquis diſtinctae, Gryllus femoratus Lepech. *it.* 1. *t.* 19. *f.* 1. 2. *t.* 20. *f.* 5. *pluresque a* Seba *Muſ. vol.* 4. *delineati, cyaneus t.* 65. *f.* 18. *ſingularis t.* 65. *f.* 22. *fuſcus t.* 67. *f.* 11. *purpuraſcens t.* 70. *f.* 3. 4. *albo-marginatus t.* 70. *f.* 5 6. *pallide flavus t.* 71. *f.* 1. 2. *taeniolatus t.* 71. *f.* 3. 4. *luteo-fuſcus t.* 71. *f.* 5. 6. *hyalinus t.* 71. *f.* 11. 12. *cinereus t.* 72. *f.* 7. 8. *cinereo-fuſcus t.* 72. *f.* 9. 10. *capito. t.* 75. *f* 1. 2. *fuſco-maculatus t.* 79. *f.* 1. 2. *viridi-purpuraſcens t.* 79. *f.* 9. 10. *olivaceus t.* 79. *f.* 11. 22. *Locuſtella t.* 80. *f.* 5. 6. *cinnabarinus t.* 80. *f.* 9. 10. *capenſis t.* 80. *f.* 11. 12. *exiguus t.* 87. *f.* 19. *aliique anonymi t.* 69. *f.* 9-12. *t.* 96. *f.* 34-38. *depicti, minutus et virens* Hermanni?

fuſcus. 176. Gr. fuſcus, elytris faſciis duabus albis. *Lepechin it.* I. *p.* 314.
Habitat in deſertis Uralenſibus.

Lepechini. 177. Gr. thoracis ſcutello abdominis longitudine: linea albida a fronte per medium ſcutellum decurrente. *Lepechin it.* 2. *t.* 10. *f.* 17.
Habitat in Sibiria.

fuliginoſus. 178. Gr. thoracis dorſo triangulo, elytris ex griſeo fuſceſcentibus, alis fuliginoſis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 77.
Habitat in Sibiriae *campeſtribus, italici magnitudine.*

muricatus. 179. Gr. thorace pentagono, alis flaveſcentibus: arcu fuſco, femoribus poſterioribus exterius muricatis. *Pallas it.* I. *app. n.* 47.
Habitat in deſertis Uralenſibus, *obſcuro major, colore varians.*

miniatus. 180. Gr. thorace ſubcarinato, alis miniatis: apicis arcu nigro. *Pallas it.* I. *app. n.* 49.
Habitat in deſertis auſtralibus ad fluvium Ural, *caeruleſcentis forma et magnitudine.*

variabilis. 181. Gr. thorace ſubcarinato, alis nigro reticulatis: area ad marginem craſſiorem atra apice fuſco-hyalino. *Pallas it.* I. *app. n.* 52.
Habitat in campis per fluvium Samara *irrigatis, magnitudine facieque ſtriduli, alis nunc hyalinis, nunc albicantibus, nunc pallidis, nunc caeruleſcentibus.*

ſalinus. 182. Gr. thorace ſubcarinato, alis faſcia nigra lata, baſi roſeis, apice hyalinis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 78.
Habitat in deſertis ſalſis aridiſſimis ad fluvios Ural *et* Irtiſch *ſitis, facie fere caeruleſcentis.*

tibialis. 183. Gr. elytris nebuloſis, alis caeruleſcentibus fuſco reticulatis, tibiis albidis longius ſpinoſis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 78. b.
Habitat in regionibus auſtralibus Uralenſibus, *facie et magnitudine ſalini.*

barabenſis. 184. Gr. elytris pallidis punctis fuſcis irroratis, alis hyalino-flaveſcentibus: margine et apice venis punctisque fuſcis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 79. 3. *p.* 433.
Habitat in pinetis arenoſis deſerti Barabenſis, *magnitudine tibialis, chenopodii amans.*

numidicus. 185. Gr. thorace carinato, alis minimis ſquameis. *Poiret Journ. de phyſiq.* 1787 *Apr. p.* 242. *t.* 1. *f.* 1.

cruentatus. *β*) Gr. maculis ſanguineis coopertus. *Poiret Journ. de phyſ.* 1787. *Apr. p.* 244.
Habitat in Numidia, *voraciſſimus, glaberrimus, totus viridis, elephante minor, ſed longior, ova glutine coacta in arena ſepeliens.*

cinereus. 186. Gr. fuſco punctatus, thorace ſubcarinato, alis albis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 100. *n.* 1138.
Habitat in Dania.

flaveſcens. 187. Gr. flaveſcens, elytris fuſceſcentibus obſolete maculatis, alis flavo nigroque reticulatis.
Schaeff. ic. t. 228. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

rhomboideus. 188. Gr. elytris cinereis apice albidis: maculis atris rhomboideis.
Schaeff. ic. t. 228. *f.* 6. 7.
Habitat in Germania.

angulatus. 189. Gr. flaveſcens, abdomine fuſco: annulorum ſegmentis obtuſe angulatis.
Schaeff. ic. t. 232. *f.* 2. 3.
Habitat in Germania.

rubicundus. 190. Gr. capite, thorace elytrorumque margine anteriore viridi, elytris lunula media albida, alis cinereis, abdomine poſterius pedibusque rubicundis.
Schaeff. ic. t. 241. *f.* 5. 6.
Habitat in Germania.

pullus. 191. Gr. atro-fuſcus, thorace quadrato: margine flaveſcente.
Schaeff. ic. t. 232. *f.* 6. 7.
Habitat in Germania.

lineatus. 192. Gr. virideſcens, thoracis linea longitudinali elytrorumque ſutura aurantiis.
Schaeff. ic. t. 243. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

ſphaericus. 193. Gr. virideſcens, elytrorum baſi maculis binis albis ſphaericis.
Schaeff. icon. t. 247. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

rubricol- lis. 194. Gr. flavidus, thorace rubro: margine flavo.
Schaeff. ic. t. 247. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

roſaceus. 195. Gr. varius, thorace viridi: margine roſaceo.
Schaeff. ic. t. 252. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

ſimilis. 196. Gr thorace ſubcarinato, alis atris: diſco et margine rubris.
Schaeff. ic. t. 253. *f.* 1. 2.
β) Gryllus alis apice maculatis.
Schaeff. ic. t. 253. *f.* 5. 6.
Habitat in Germania, *ſtridulo affinis, an varietas?*

purpure- us. 197. Gr. alis elytrisque pallidis maculatis, thorace abdominisque annulis tribus anterioribus purpureis.
Schaeff. ic. t. 263. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

flavens. 198. Gr. flaveſcens, thorace lineis duabus longitudinalibus obſcurioribus.
Schaeff. ic. t. 264. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

viridis. 199. Gr. viridis, hinc inde flaveſcens.
Schaeff. icon. t. 265. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania; *an propria ſpecies?*

ſexmacu- latus. 200. Gr. ſubfuſcus, alis flaveſcentibus: maculis ſex fuſcis longitudinaliter poſitis.
Schaeff. ic. t. 265. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania, *parvus.*

maculo- ſus. 201. Gr. elytris maculoſis, alis roſaceis apice cineraſcentibus.
Schaeff. icon. t. 267. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

polyſti- ctos. 202. Gr. fuſceſcens hinc inde pallide punctatus, alis rufeſcentibus: apice anis nigricantibus.
Schaeff. icon. t. 267. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

limbatus. 203. Gr. viridis, elytris apice et margine exteriore rufis.
Degeer inſ. 3. *p.* 481. *n.* 8. Acrydium rufo-marginatum.
Habitat in Europae *pratis, 9 lineas longus.*

pratenſis. 204. Gr. viridis, elytris apice nigris, antennis corporis dimidio longitudine.
Degeer inſ. 3. *p.* 481. *n.* 9. Acrydium nigro-terminatum.
Habitat in Europae *pratis, limbato minor.*

albipes. 205. Gr. thorace criſtato: ſegmento quadruplici, elytris obſcure virentibus, alis violaceis, femoribus poſterioribus albo maculatis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 487. *n.* 2. *t.* 40. *f.* 7.
Habitat in Surinamo, 2½ *pollices longus.*

roſeus. 206. Gr. viridis, antennis flavis, alis dimidiato tibiisque poſterioribus roſeis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 488. *n.* 3. *t.* 41. *f.* 1.
Habitat in Sina, 2½ *pollices longus.*

ſanguinolentus. 207. Gr. capite flavo rubro nigroque maculato, thorace flavo, elytris viridibus, tibiis rubro maculatis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 489. *n.* 5. *t.* 40. *f.* 9.
Habitat - - - *ſeſquipollicaris.*

denticulatus. 208. Gr. viridis thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato, faſciis binis longitudinalibus griſeis.
Degeer inſ. 3. *p.* 495. *n.* 11. *t.* 42. *f.* 2. Acrydium ſerrato-faſciatum.
Habitat in Surinamo, *gracilis,* 2 *pollices longus.*

dentatus. 209. Gr. fuſcus nebuloſus, thorace cymbiformi rugoſo: carina laevi, femoribus poſterioribus denticulatis, capite ovato. *Degeer inſ.* 3. *p.* 496. *n.* 12. *t.* 42. *f.* 3.
Habitat in India, 2½ *pollices longus.*

chloropterus. 210. Gr. fuſcus, alis viridibus, thorace rotundato laevi, femoribus poſterioribus linea flava.
Degeer inſ. 3. *p.* 497. *n.* 13. *t.* 42. *f.* 4. Acrydium flavolineatum.
Habitat in Surinamo, 15 *lineas longus.*

erythropus. 211. Gr. griſeo-fuſcus, femoribus poſterioribus ſubtus rubris, intus flaveſcentibus nigro maculatis, tibiis poſterioribus rubris.
Degeer inſ. 3. *p.* 498. *n.* 14. *t.* 42. *f.* 5. Acrydium Femur rubrum.
Habitat in Penſylvania, *pollicem longus.*

chryſomelas. 212. Gr. viridis, thorace carinato, elytris fuſcis: margine inferiore viridi, alis nigris baſi luteis.
Degeer inſ. 3. *p.* 498. *n.* 15. *t.* 42. *f.* 6. Acrydium viridi faſciatum.
Habitat in Penſylvania, *pollicem longus.*

213. Gr.

varius. 213. Gr. viridi-obſcurus, alis caeruleis, corpore faſciis maculisque flavis, femoribus baſi ſanguineis.
Degeer inſ. 3. *p.* 500. *n.* 17. *t.* 42. *f.* 8. Acrydium variegatum.
Habitat in Surinamo, 9 *lineas longus.*

longipennis. 214. Gr. viridi-flavus, elytris abdomine duplo longioribus capite thoraceque faſciis binis nigris. *Degeer inſ.* 3. *p.* 501. *n.* 18. *t.* 42. *f.* 9.
Habitat in Surinamo, 11 *lineas longus.*

acutus. 215. Gr. thorace nigro: macula flavo-viridi, elytris fuſcis: macula viridi, femoribus poſterioribus faſciis tribus nigris.
Degeer inſ. 3. *p.* 54. *n.* 19. *t.* 42. *f.* 10. Acrydium acuminatum.
Habitat in Surinamo, 9 *lineas longus.*

chalcops. 216. Gr. griſeo-fuſcus, thorace faſciis binis nigris, elytris unica griſea, femoribus poſterioribus intus tibiisque ſanguineis.
Degeer inſ. 3. *p.* 501. *n.* 20. *t.* 42. *f.* 11. Gryllus aeneo-oculatus.
Habitat in Surinamo, 10 *lineas longus.*

ſtictícus. 217. Gr. griſeo-fuſcus, elytris lineis punctatis nigris.
Degeer inſ. 3. *p.* 503. *n.* 21. *t.* 42. *f.* 12.
Habitat in Surinamo, 10 *lineas longus.*

hamatus. 218. Gr. thoracis ſcutello abdomine longiore anterius hamato, antennis longitudine abdominis, alis nigris, elytris nullis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 503. *n.* 22. *t.* 42. *f.* 13.
Habitat in Surinamo.

rugoſus. 228. Gr. apterus, viridis cinereo varius, capite veſiculoſo: fronte rugis duabus dentatis et utrinque ruga minore denticulata, vertice impreſſo: margine elevato dentato, thorace morbilloſo ſpinoſo: criſta elevata compreſſa rugoſo-dentata. *Muſ. Lesk. p.* 48. *n.* 39.
Habitat extra Europam, *interdum cinereus fuſco varius, abdominis ſegmentis ſingulis utrinque macula fuſca notatis, utrinque dentibus* 2, *et praeterea criſta dentata armatis, femoribus tibiisque poſterioribus ſupra infraque dentatis.*

lunaris. 229. Gr. thorace carinato, alis baſi rufis: lunula media margine anteriori maculisque tribus verſus apicem ad marginem

nem poſteriorem fuſcis, tibiis poſterioribus albis nigro-ſpinoſis, griſeo-villoſis. *Muſ. Lesk. p.* 48. *n.* 49.
Habitat - - -

flavipes. 230. Gr. thorace ſupra elytrisque brunneis: margine anteriori viridi-flavis, femoribus poſterioribus ſubtus ſanguineis tibiisque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 50.
Habitat in Europa.

griſeus. 231. Gr. thorace cruciato ſupra fuſco, elytris griſeo-fuſco-nebuloſis, pedibus quatuor anterioribus griſeo-fuſco-maculatis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 51.
Habitat in Europa.

cruciger. 232. Gr. thorace cruciato viridi: cruce alba elytris dorſo viridibus margine inflexo fuſcis apice albis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 52.
Habitat in Europa.

nubilus. 233. Gr. thorace carinato viridi: utrinque linea fracta alba, elytris fuſco nebuloſis ſupra viridibus. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 53.
Habitat in Europa.

virens. 234. Gr. viridis, thorace cruciato, antennis corpore longioribus. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 56.
Habitat in Europa.

venoſus. 235. Gr. thorace cruciato rufo, elytris hyalinis rufo venoſis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 58.
β) Gr. elytrorum maculis ſex fuſcis ſeriatis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 59.
Habitat in Europa.

bicolor. 236. Gr. griſeus apterus, femoribus poſterioribus ſubtus rufis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 60. b.
Habitat in Europa.

diſtinctus. 237. Gr. apterus viridis, femina dorſo, mare femoribus poſterioribus virideſcente. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 61. c.
Habitat in Europa.

222. FULGORA.

Caput fronte producta, inani.

Antennae breves infra oculos: articulis duobus; exteriore globoſo majore.

Roſtrum inflexum, elongatum: vagina quinquearticulata.

Pedes greſſorii.

Laternaria. 1. F. fronte roſtrata recta, alis lividis: poſterioribus ocellatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 152.* *Gron. zooph.* 668. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 1.
Grew. muſ. 158. *t.* 13. Cucujus peruvianus.
Merian. ſurin. t. 49. Laternaria.
Reaumur inſ. 5. *t.* 20. *f.* 6. 7.
Roeſel inſ. 2. *gryll. t.* 28. 29.
Seb. muſ. 4. *t.* 77. *f.* 3. 4.
Degeer inſ. 3. *p.* 195. *n.* 1.
Stoll. cicad. t. 1. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, prominente fronte noctu lucem vividiſſimam ſpargens.*

ſerrata. 10. F. fronte roſtrata adſcendente quadrifariam ſerrata. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 2.
Seb. muſ. 4. *t.* 77. *f.* 5. 6.
Lindenb. Naturſ. 13. *p.* 19. *t.* 3. *f.* 1. 2.
Habitat in Surinamo.

Diadema. 2. F. fronte roſtrata muricata: apice trifido, alis nigris rubro maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 3.
Drury inſ. 3. *t.* 50. *f.* 4. Fulgora armata.
Seb. muſ. 4. *t.* 77. *f.* 7. 8.
Lindenb. Naturſ. 13. *p.* 20. *t.* 3. *f.* 3.
Stoll. cicad. 1. *t.* 5. *f.* 22.
Habitat in India, *candelaria major.*

Candelaria. 3. F. fronte roſtrata adſcendente, elytris viridibus luteo maculatis, alis flavis apice nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 153.* *Act. Stockh.* 1746. *p.* 63. *t.* 1. *f.* 5. 6. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 4.
Degeer inſ. 3. *p.* 197. *n.* 2.

Roeſ.

Roeſ. inſ. 2. gryll. p. 189. *t.* 30.
Edw. av. t. 120.
Sulz. inſ. t. 10. *f.* 62.
Habitat in Sina.

phoſphorea. 4. F. fronte roſtrata ſubulata adſcendente, corpore griſeo glauco. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 314. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 5.
Degeer inſ. 3. *p.* 201. *n.* 4. *t.* 32. *f.* 6. Cicada filiroſtris.
Habitat in America *meridionali.*

noctivida. 5. F. fronte roſtrata acuminata adſcendente, corpore viridi, alis hyalinis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 314. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 6.
Degeer inſ. 3. *p.* 202. *n.* 5. *t.* 32. *f.* 4. Cicada coniroſtris.
Habitat in America *meridionali.*

lucernaria. 6. F. fronte roſtrata prominente, corpore ſupra virideſcente, ſubtus flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 314. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 7.
Degeer inſ. 3. *p.* 202. *n.* 6. *t.* 32. *f.* 6. Cicada breviroſtris.
Habitat in America *meridionali.*

flammea. 7. F. fronte roſtrata adſcendente tereti truncata. *Amoen. ac.* 6. *p.* 399. *n.* 39. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 314. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 8.
Stoll. cicad. t. 2. *f.* 7.
Habitat in America *meridionali.*

tenebroſa. 11. F. fronte roſtrata recta truncata, elytris griſeis ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 314. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 9.
Degeer inſ. 3. *p.* 200. *n.* 3. *t.* 32. *f.* 1. Cicada laternaria fuſca.
Habitat in Guinea.

obſcurata. 12. F. fronte roſtrata recta truncata, elytris cinereis nigro maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 10.
Stoll. cicad. 1. *t.* 6. *f.* 28.
Habitat in nova Hollandia.

adſcendens. 13. F. fronte roſtrata ſubulata adſcendente, elytris ferrugineo-fuſcis albo punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 11.
Habitat in Cayenna, *parva.*

faſciata. 14. F. fronte roſtrata adſcendente, elytris ferrugineo-fuſcis: faſciis duabus punctoque poſteriore viridibus. *Fabr. manſ. inſ.* 2. *p.* 261. *n.* 12.
Habitat in Cayenna, *adſcendentis ſtatura, an varietas?*

truncata. 8. F. fronte obtuſiuſcula, alis truncatis viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 261. *n.* 13.
Amoen. acad. 6. *p.* 399. *n.* 40. Cicada viridi-albicans, alis deflexis compreſſis poſtice truncatis.
Habitat in India.

plana. 15. F. flaveſcens, fronte porrecta plana, thorace elytrisque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 261. *n.* 14.
Habitat in Cayenna, *parva.*

pallipes. 16. F. fronte porrecta plana, elytris viridibus apice hyalinis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 261. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *ſtatura planae.*

hyalina. 17. F. fronte conica inaequali, elytris hyalinis: ſtriga atra. *Fabr. ſp inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 261. *n.* 16.
Habitat in Bengala, *obſcurata major.*

feſtiva. 18. F. fronte conica, elytris fuſcis: margine exteriori vireſcente, punctis nigris fulvisque, alis baſi rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 261. *n.* 17.
Habitat in Coromandel.

feneſtrata. 19. F. fronte conica biſulcata, elytris hyalinis: macula marginali fuſca. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 261. *n.* 18.
Habitat in Africa *aequinoctiali; europaea minor.*

europaea. 9. F. fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis reticulatis, plantis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 261. *n.* 19.
Sulz. hiſt. inſ. t. 9. *f.* 5.
Schulz. Naturf. 9. *t.* 2.
Stoll cicad. 1. *t.* 11. *f.* 51.
Habitat in Europa *auſtrali, cicadae ſpumantis magnitudine.*

minuta. 20. F. fronte conica, capite thoraceque flaveſcentibus: linea dorſali, elytris albidis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 262. *n.* 20.
Habitat Halae Saxonum, *parva cicadae ſtatura.*

Folium. 21. F. flavo-viridis, fronte roſtrata brevi recta, alis ampliſſimis verticalibus compreſſis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 204. *n.* 7. *t.* 32. *f.* 7.
Habitat in America.

223. CICADA. *Roſtrum* inflexum.
Antennae ſetaceae.
Alae quatuor membranaceae deflexae.
Pedes (plerisque) ſaltatorii.

* *antennis ſubulatis fronti inſertis*, Membracides Fabricii.

† *thorace compreſſo-membranaceo, corpore majore*, Foliaceae.

inflata. 52. C. thoracis folio inflato teſtaceo reticulato. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 262. *n.* 1.
Habitat in Cayenna, *magnitudine et ſtatura foliatae.*

rhombea. 1. C. folio thoracis rhombeo poſterius latiore. *Baker act. angl.* 1765. *p.* 55. *t.* 6. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 262. *n.* 2.
Habitat in America.

foliata. 2. C. thorace rotundato atro: arcubus albis. *Gron. zooph.* 677. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 3.
Fabr. mant. inſ. 2 *p.* 262. *n.* 5. Membracis (lunata) thorace foliaceo rotundato atro: lunulis tribus albis.
Degeer inſ. 3. *p.* 205. *n.* 8. *t.* 32. *f.* 9. 10. Cicada foliata faſciata.
Merian. ſurin. t. 5. *f. ult.*
Habitat in America *meridionali.*

flaveola. 53. C. thorace rotundato flavo: faſcia maculaque atris.
Fabr. mant. inſ. 2. *p.* 262. *n.* 4. Membracis foliacea.
Stoll. cicad. t. 1. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, ſtatura foliatae, at paulo major.*

54. C.

Cicadae *ſuccis plantarum vivunt; larva aptera, puppa ſolis alarum rudimentis inſtructa, ceterum utraque hexapus, currens imagini ſimillima, cercopidum agillima; imago gryllorum inſtar ſtridula;* manniferarum *larvae, veterum* Tettigometrae, *per annum fodiunt, et ſub terra latent, declaratae maſculae lamellis duabus abdomen ſubtus obtegentibus ſonorae in arbuſtis ſtrident mutasque in venerem feminas provocant.*

faſciata. 54. C. thorace rotundato atro: faſciis duabus; anteriore fulva, poſteriore alba. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 262. *n.* 6.
Habitat in Cayenna, *ſtatura foliatae.*

bracteata. 55. C. thorace viridi immaculato. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 263. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *parva.*

fronditia. 3. C. thoracis dorſo repando ſinuato: apice porrecto obtuſiſſimo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 262. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 705. *n.* 3. *Gronov. zooph.* 676.* Cicada foliacea, dorſo repando, roſtro obtuſiſſimo.
Degeer inſ. 3. *p.* 208. *n.* 11. *t.* 32. *f.* 15. 16. Cicada foliata ſinuata.
Stoll cicad. 1. *t.* 6. *f.* 3. A. B. C.
Habitat in Surinamo.

ſquamigera. 4. C anterius poſteriusque roſtrata acuta.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 316. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 263. *n.* 8. Membracis thorace foliaceo antice poſticeque acuto griſeo.
Degeer inſ. 3. *p.* 209. *n.* 12. *t.* 32. *f.* 17. 18. Cicada haſtata.
Habitat in America *meridionali.*

geniſtae. 56. C. thorace fuſco poſterius producto, abdomine dimidio breviore. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 27.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 424. *n.* 19. Cicada thorace inermi pone producto.
Habitat in Angliae *geniſta tinctoria.*

inermis. 57. C. thorace vireſcente poſterius ſubulato longitudine abdominis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 26.
Habitat in Americae *plantis.*

mutica. 58. C. thorace ferrugineo poſterius producto carinato longitudine abdominis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 378. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 25.
Habitat in America *boreali.*

convoluta. 59. C. thorace laevi vireſcente: margine flavo poſterius producto abdomine longiore. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 24.
Habitat in Braſilia, *mediae magnitudinis, flavo capite, thorace flaveſcente, apice atro.*

arcuata. 60. C. nigro fuſca, thorace compreſſo verticali: arcu flaveſcente. *Degeer inſ.* 3. *p.* 206. *n.* 9. *t.* 32. *f.* 10.
Habitat in Surinamo.

fuſca. 61. C. tota fuſca, thorace compreſſo verticali. *Degeer inſ.* 3. *p.* 208. *n.* 10. *t.* 32. *f.* 14.
Habitat in Surinamo.

gibboſa. 62. C. nigra, thorace carinato gibbo, anterius obtuſo, poſterius acuto, elytris flavo-lividis, pedibus fulvis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 311. *n.* 13. *t.* 32. *f.* 20. 21.
Forſt. nov. inſ. ſpec. 1. *p.* 67. *n.* 67. Cicada carinata.
Habitat in America.

binotata. 63. C. thorace ſubinermi poſterius producto, abdomine breviore teſtaceo, elytris macula baſeos nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 22.
Habitat in nova Hollandia.

†† *thorace utrinque cornuto:* Cruciatae.

Crux. 5. C. thorace cruciformi corpus totum tegente. *Muſ. Lud. Ulr.* 154.*
Habitat in America *auſtrali et* India.

haſtata. 64. C. thoracis cornu ſupra caput porrecto compreſſo carinato, corpore griſeo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 263. *n.* 9.
Habitat in America *meridionali, parva.*

lanceolata. 65. C. thoracis cornu ſupra caput porrecto incurvo, corpore atro: maculis duabus dorſalibus albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 263. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *parva.*

ſpinoſa. 66. C. thorace tricorni poſterius producto longitudine alarum. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 263. *n.* 11.
Sulz. hiſt. inſ. t. 9. *f.* 6.
Habitat in America *auſtrali et* India.

acuminata. 67. C. thorace tricorni: cornu intermedio longiori compreſſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 263. *n.* 12.
Habitat in Penſylvania.

cornuta. 6. C. thorace bicorni nigro poſterius ſubulato longitudine abdominis, alis fuſcis. *Fn. ſuec.* 879.* *Scop. ent. carn.* 435.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 317. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 264. *n.* 19.
Geoffr.

Geoffr. inſ. par. 2. *p.* 423. *n.* 18. Cicata thorace acute bicorni, pone producto.
Schreb. inſ. 7. *f.* 3. 4. Cicada cornuta.
Degeer inſ. 3. *p.* 181. *n.* 3. *t.* 11. *f.* 22. Cicada fuſca.
Petiv. gazoph. t. 47. *f.* 2. 3. Ranatra cornuta.
Sulz. inſ. t. 10. *f.* 63.
Schaeff. ic. t. 96. *f.* 2.
Habitat in carduis, ſalicibus.

Taurus. 68. C. thorace bicorni fuſco poſterius producto filiformi longitudine abdominis: cornubus arcuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 10 *mant. inſ.* 2. *p.* 264. *n.* 20.
Habitat in Coromandel.

Vitulus. 69. C. thorace bicorni viridi poſterius ſubulato longitudine abdominis, alis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 21.
Habitat in America.

Bonaſia. 70. C. thorace bicorni poſterius producto: margine albo, alis puncto baſeos albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 23.
Habitat in America.

aurita. 7. C. thorace biaurito, capitis clypeo antrorſum dilatato rotundato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 263. *n.* 13.
Geoffr. inſ. par. 2. *p.* 422. *n.* 17. Cicada thorace obtuſe bicorni.
Schreb. inſ. 8. *f.* 1. 2. Cicada criſtata, thorace bicorni, corniculis ſubrotundis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 9. *f.* 7.
Schaeff. icon. t. 96. *f.* 3.
Habitat in quercu, corylo, *tabani magnitudine, tota cinerea.*

ſinenſis. 71. C. thorace bicorni poſterius producto abdomine longiori atro: margine flaveſcente. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 263. *n.* 14.
Stoll cicad. 1. *t.* 11. *f.* 53. B.
Habitat in Sina, *magna.*

horrida. 72. C. thorace bicorni poſterius producto biclavato apice triſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 264. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

trifida. 73. C. piloſa, thorace quadricorni poſterius producto trifido: laciniis ſubulatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 264. *n.* 16.
Habitat in Cayenna, *magnitudine c. tauri.*

clavata. 74. C. thorace quadricorni poſterius producto trifido: laciniis lateralibus ante apicem clavatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 264. *n.* 17.
Habitat in Cayenna, *parva.*

braſilienſis. 75. C. thorace bicorni albo punctato poſterius producto abdomine longiori. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 264. *n.* 18.
Habitat in Braſilia.

** *non ſaltantes*, Manniferae, Tettigoniae Fabricii.

ciliaris. 8. C. alis poſterioribus ferrugineo-fuſcis: vittis longitudinalibus luteis, abdominis ſegmentis ciliatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 155.*
Rumpf amb. 3. *p.* 210. *t.* 135? Folium ambulans.
Habitat in America *auſtrali et* India.

fornicata. 11. C. thorace vireſcente, abdomine fornicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 156.*
Habitat in America *auſtrali et* India.

ſtridula. 12. C. elytris margine dilatato: punctis ſeptem albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 157.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 320. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 13. Cicada villoſa, elytris griſeis, alis flavis: omnibus margine hyalino.
Drury inſ. 2. *t.* 37. *f.* 2. Cicada catenata.
Habitat ad caput bonae ſpei.

cingulata. 76. C. thorace maculato, elytris hyalinis: coſta maculaque fuſcis, abdomine atro: faſciis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 14.
Habitat in nova Seelandia.

villoſa. 77. C. thorace fuſco viridique variegato, pectore albo villoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei, *minor, fronte viridi, utrinque atro-ſtriata.*

cruentata. 78. C. thorace variegato, elytris hyalinis: coſta flaveſcente, abdomine atro: faſciis ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 16.
Habitat in nova Hollandia.

79. C.

conſpurcata. 79. C. atra, elytris baſi flavo maculatis, ano flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.*320. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 17.
Habitat in India.

capenſis. 13. C. alis inferioribus limbo poſteriore fuſceſcente palmato picto. *Muſ. Lud. Ulr.* 158.
Petiv. gaz. 7. *t.* 4. *f.* 1. Cicada capenſis variegata, marginibus tranſparentibus.
Habitat ad caput bonae ſpei.

haematodes. 14. C. nigra immaculata, abdominis inciſuris ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 18. *Scop. ent. carn.* 347.
Petiv. gazoph. t. 15. *f.* 7.
Gron. zooph. 675.
Fueſſli inſ. helv. p. 24. *n.* 452.
Stoll cicad. t. 2. *f.* 11.
Habitat in Europa *magis auſtrali, mediae magnitudinis, gibboſa.*

plebeja. 15. C. ſcutelli apice bidentato, elytris anaſtomoſibus quatuor lineisque ſex ferrugineis. *Scop. entom. carn.* 345.
Mouff. inſ. 127.
Aldrov. inſ. 307.
Matthiol. Dioſc. 264.
Habitat in Italia, Africa, *maxima.*
Et cantu querulae rumpent arbuſta cicadae. Virgil.

orni. 16. C. elytris intra marginem tenuiorem punctis ſex concatenatis anaſtomoſibusque interioribus fuſcis. *Scop. ent. carn.* 346.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 320. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 19. Cicada nigra flavo maculata, alis albis baſi flavis: maculis duabus nigris.
Reaum. inſ. 5. *t.* 5. *f.* 16-19.
Seb. muſ. 4. *t.* 85. *f.* 4. 5.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 25.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 65.
Schaeff. icon. t. 4. *f.* 14.
Habitat in Europa *auſtrali; larva eduli.*
Sole ſub ardenti reſonant arbuſta cicadis. Virgil.

repanda. 17. C. elytris linea flexuoſa, alis margine hyalino. *Muſ. Lud. Ulr.* 159.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 321. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 20.

Degeer inſ. 3. *p.* 219. *n.* 15. *t.* 33. *f.* 1. Cicada nigra.
Habitat in India.

reticulata. 18. C. griſea, thoracis linea alba, elytris albo reticulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 321. *n.* 17. *mant inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 21.
Degeer inſ. 3. *p.* 227. *n.* 24. *t.* 23. *f.* 15. 16. Cicada fuſco-teſtacea.
Habitat in America *meridionali.*

atrata. 80. C. atra alis albis baſi nigris: venis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 321. *n.* 18. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 22.
Habitat in Sina.

ſanguinea. 81. C. nigra, ore, thoracis maculis duabus abdomineque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 321. *n.* 19. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 24.
Degeer inſ. 3. *p.* 221. *n.* 18. *t.* 33. *f.* 17. Cicada ſanguinea.
Habitat in Sina.

teſtacea. 82. C. nigra, abdomine ſanguineo, elytris alisque teſtaceis: venis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 23.
Stoll cicad. 1. *t.* 8. *f.* 41. C.
Habitat Tranquebariae; *mediae magnitudinis.*

ſplendidula. 83. C. elytris fuſco-aureis, tibiis anterioribus incraſſato-dentatis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 321. *n.* 20. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 25.
Habitat in Sina.

muta. 84. C. elytris hyalinis: coſta ſanguinea, abdomine linea dorſali ſanguinea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 21. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 26.
Habitat in nova Seelandia.

groſſa. 85. C. thorace viridi nigro ſublineato, alis albis poſterioribus macula baſeos flava. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 1.
Habitat in Braſilia.

javana. 86. C. capite thoraceque nigris rufo maculatis, elytris nigris: faſcia abbreviata alba. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 2.
Stoll cicad. 1. *t.* 4. *f.* 17.
Habitat in Java, *magna.*

griſea. 87. C. griſea, elytris aqueis: margine poſteriori nigro punctato, coſta anterius alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 3.
Habitat in inſulis Americae *oppoſitis.*

limbata. 88. C. thoracis margine dilatato acuto, alis atris: margine albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 4.
Stoll cicad. 1. *t.* 12. *f.* 57.
Habitat in America.

dilatata. 89. C. atra, thoracis margine dilatato, alis albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 5.
Habitat in Jamaica.

biſpinoſa. 90. C. fuſca, thorace utrinque uniſpinoſo, elytris obſcuris: ſtriga maculari nigra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 6.
Habitat in Sumatra, *magna.*

vaginata. 91. C. teſtacea, elytris albidis: coſta nigra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 7.
Habitat in Sumatra, *magna.*

Tibicen. 19. C. elytris anaſtomoſibus ferrugineis, ſcutelli apice emarginato. *Muſ. Lud. Ulr.* 160.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 319. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 8. Tettigonia ſcutello emarginato, alarum coſta vireſcente.
Degeer inſ. 3. *p.* 212. *n.* 14. *t.* 22. *f.* 23. Cicada Lyricea.
Brown jam. 436. *t.* 43. *f.* 15. Panorpa.
Marcgr. braſil. 256. Gueruca Eremenbi.
Merian. inſ. ſurin. t. 49. Tibicen.
Seb. muſ. 4. *t.* 85. *f.* 9. 10.
Habitat in America, *thorace nunc nigro, nunc nigro brunneoque vario.*

ſeptendecim. 20. C. nigro vireſcens, elytris margine flaveſcente, capite utrinque octoſtriato.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 319. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 9. Tettigonia nigra, elytris albis, coſta flava.
Kalm act. Stockh. 1756. *p.* 101. Cicada maxilla utraque lineis octo transverſis concavis, alarum margine inferiore luteſcente.
Collinſ. act. angl. 1765. *p.* 65. *t.* 8.
Habitat in America.

catena. 92. C. thorace variegato, elytris hyalinis anterius nervis punctatis, poſterius ſtrigis duabus undatis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 10.
Habitat ad caput bonae ſpei.

puſtulata. 93. C. atra, capite thoraceque rubro maculatis, elytris fuſcis baſi obſcurioribus: venis teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 11.
Habitat in America *meridionali, magna.*

maculata. 94. C. atra, thorace elytris alisque flavo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 12.
Drury inſ. 2. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in Siria.

violacea. 21. C. violacea, alis apice fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 162.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 322. *n.* 22. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 27.
Fueſſli inſ. helv p. 24. *n.* 455.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

querula. 95. C. capite thoraceque griſeis: characteribus maculisque nigris. *Pallas it.* 2. *app. n.* 83.
Habitat in auſtralibus circa fluvium Ural, *haematodi affinis.*

praſina. 96. C. dilute viridis, thoracis maculis fuſcis inauratis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 84.
Habitat in deſertis magis auſtralibus circa fluvios Ural *et* Irtis, *Junio frequens, querula minor.*

marginella. 97. C. pallida, thoracem inter et alas nigra: macula alba acuminata, thorace marginato. *Scop. entom. carn. p.* 116. *n.* 342.
Habitat in Carnioliae *ſalicetis.*

graminis. 98. C. elytris albidis: lineis tribus ocellisque duodecim. *Scop. ent. carn. p.* 116. *n.* 343.
Habitat in Carnioliae *gramine.*

notata. 99. C. pallide flavicans, elytris albidis nigro punctatis. *Scop. ent. carn. p.* 117. *n.* 344.
Habitat in Carnioliae *plantis variis.*

montana. 100. C. abdominis ſegmentis margine rubellis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 109. *n.* 108.
Habitat in Carnioliae *montanis circa* Idriam, *c. orni duplo minor.*

Schaefferi. 101. C. ex fuſco lutea, elytris alisque flavo-feneſtratis.
Schaeff. icon. 2. *t.* 121. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

*** *antennis filiformibus, ſub oculis inſertis.*
† *roſtri vagina porrecta, obtuſa, ſuperne canaliculata.*
Cercopides Fabricii.

afra. 102. C. elytris fuſco-griſeis: macula marginali fulva cinereaque. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 1. Cercopis groſſa.
Habitat in Africa *aequinoctiali, in hac tribu magna.*

atra. 103. C. atra, elytris utrinque vitta marginali ſanguinea. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 2.
Habitat in America *meridionali, magna.*

maculoſa. 104. C. thorace atro: faſcia fulva, elytris fulvis: maculis apiceque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 329. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 3.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura afrae.*

quadrifaſciata. 10. C. flava: faſciis quatuor fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 329. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 9.
Degeer inſ. 3. *p.* 225. *n.* 21. *t.* 33. *f.* 11. Cicada flava, faſciis quatuor transverſis nigris.
Habitat in America *meridionali.*

bifaſciata. 11. C. flaveſcens elytris fuſcis: faſciis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 330. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 20.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 706. *n.* 11. *Fn. ſuec.* 898.* *Fn. ſuec.* 1. *n.* 633. Cicada fuſca, faſciis alarum binis albis.
Degeer inſ. 3. *p.* 186. *n.* 6. *t.* 11. *f.* 25. Cicada trifaſciata.
Habitat in Europae *borealis plantis.*

ſanguinolenta. 22. C. atra, elytris maculis duabus faſciaque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 329. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 4. *Scop. ent. carn.* 330.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 418. *t.* 8. *f.* 5. Cicada nigra, elytris maculis ſex rubris.
Goeze Naturf. 6. *t.* 2.
Fueſſli inſ. Helv. p. 24. *n.* 456.
Habitat in Europae *ſalicibus et gramine.*

Schach. 105. C. nigra, elytris fuſcis: faſcia interrupta ſanguinea. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 5.
Habitat in America *ſeptentrionali, ſtatura ſanguinolentae.*

23. C.

An huic etiam inſerendae tanquam propriae ſpecies cicadae a Seba *muſei vol.* 4. *delineatae, fuſca t.* 85. *f.* 1. 2. *albo-guttata t.* 85. *f.* 3. 4. *ſcutata t.* 85. *f.* 7. 8. *et fuſco-maculata t.* 85. *f.* 11. 12?

coleoptrata. 23. C. elytris totis coriaceis alas obtegentibus griſeis fuſco irroratis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 330. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 14.
Habitat in Germaniae *plantis, mediae magnitudinis, capite thoraceque flaveſcentibus, abdomine fuſco.*

ruſtica. 106. C. griſea immaculata, alis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 330. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 15.
Habitat in Europae *plantis.*

gibba. 107. C. nigra, elytris albo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 334. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 16.
Habitat in Daniae *nemoribus.*

biguttata. 108. C. nigra flavo-maculata, elytris fuſcis: puncto marginali albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 325. *n.* 22. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 17.
Habitat in Germania, *ſtatura leucophthalmae.*

kilonienſis. 109. C. flaveſcens, elytris obſcuris: faſcia maculisque duabus oppoſitis albidis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 18.
Habitat Kilonii, *ſtatura et magnitudine biguttatae.*

unifaſciata. 110. C. cinerea, elytris faſcia obliqua fuſca. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 330. *n.* 12. *mant inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 19.
Habitat in agro Pedemontano, *gibba major.*

ſpumaria. 24. C. fuſca, elytris maculis binis albis lateralibus: faſcia duplici interrupta albida. *Fn. ſuec.* 881.* *Scop. ent. carn.* 331. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 329. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 10. *Fueſſli inſ. helv. n.* 450.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 415. *n.* 2. Cicada faſcia duplici albida interrupta transverſa.
Degeer inſ. 3. *p.* 163. *n.* 1. *t.* 11. *f.* 1-21. Cicada ſpumaria graminis.
Degeer act. Stockh. 1741. *p.* 221. *t.* 7.
Reaumur act. pariſ. 1705. *p.* 162.
Raj. inſ. 67.
Swammerd. quart. p. 83.
bibl. 1. *p.* 215.
Merian. inſ. 77. *t.* 51.
Petiv. gazoph. t. 61. *f.* 9.
Blanck. inſ. 97. *t.* 11. *f.* N. O. P.
Friſch inſ. 8. *p.* 26. *t.* 12.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. p.* 139. *t.* 23.

Sulz.

Sulz. inſ. t. 10. *f.* 64.
Schaeff. elem. t. 42.
Habitat in Europae *plantis variis, frequens in* roſis, graminibus, ſalice *viminali, more plurium hujus et ſequentis tribus ramis inſidendo ano evacuans numeroſas veſiculas, quaſi ſpumam, intra quam latitat.*

aurea. 111. C. cinereo-aurea nitida immaculata. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 11.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

hafnienſis. 112. C. nigra, capite, thorace elytrorumque margine albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 12.
Habitat Hafniae, *ſtatura ſpumariae.*

albifrons. 27. C. nigra, fronte alba. *Fn. ſuec.* 884.*
Habitat in Europa, *an hujus tribus?*

ſtriata. 30. C. elytris albido nigroque ad angulum acutum ſuturae dorſalis ſtriatis. *Fn. ſuec.* 887.*
Raj. inſ. 68. *n.* 1.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 424. *n.* 20.
Habitat in Europa, *an ex hac tribu.*

lineata. 31. C. flaveſcens, coleoptris ſtriis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 330. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 709. *n.* 31? *Fn. ſuec.* 888? Cicada exalbida; linea utrinque longitudinali nigra.
Habitat in Europa, *mediae magnitudinis.*

populi. 32. C. ſubtus flaveſcens, fronte punctis duobus nigris, alis hyalinis. *Fn. ſuec.* 890.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 331. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 21. Cercopis nebuloſa, vertice punctis duobus, abdomineque baſi atris.
Habitat in Europae *borealis plantis.*

rubra. 45. C. alis deflexis fuſcis: faſciis duabus flavis.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 329. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 6. Cercopis (cruentata) rufa, elytris nigris: faſciis duabus flavis.
Degeer inſ. 3. *p.* 224. *n.* 20. *t.* 33. *f.* 8.
Stoll cicad. t. 2. *f.* 10. C.
Habitat in America *meridionali, alis inferioribus hyalinis immaculatis.*

113. C.

Carnifex. 113. C. ſanguinea, thorace macula, elytris faſciis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 329. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 7.
Habitat in nova Hollandia.

varia. 114. C. capite thoraceque vireſcentibus, elytris fuſcis: maculis duabus baſeos ſtrigaque poſteriore flavis. *Fabr. mant.* 2. *p.* 274. *n.* 8.
Habitat in Cayenna, *atra, abdomine rufo.*

lineolata. 208. C. elytris griſeis fuſco lineolatis: diſci litura transverſa. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 46.
Habitat in Europa.

guttata. 209. C. fuſca, elytris maculis lacteis. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 47.
Habitat in Europa.

unicolor. 210. C. pallida immaculata. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 48.
Habitat in Europa.

bicolor. 211. C. griſea, thorace ſupra ſanguineo. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 49.
Habitat in Europa.

punctulata. 212. C. fuſca, thorace anterius punctis impreſſis, elytris maculis duabus albis lateralibus. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 50.
Habitat in Europa.

leucoptera. 213. C. elytris albis: ſtriis fuſcis interruptis. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 51.
Habitat in Europa.

venoſa. 214. C. alis hyalinis albo venoſis: poſterius faſciis duabus fuſcis irregularibus. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 52.
Habitat in Europa.

nebuloſa. 215. C. alis albis luteo-nebuloſis. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 53.
Habitat in Europa.

†† *roſtri vagina breviſſima, membranacea, cylindrica, obtuſa*, Cicadae Fabricii.

† *ſaltatoriae*, Ranatrae.

perſpicillata. 115. C. atra, alis macula ocellari albo-hyalina, abdomine apice flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 1.
Stoll cicad. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in India, *in hac tribu magna.*

elongata. 116. C. thorace rubro flavo lineato, elytris longiſſimis nigro punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 22.
Habitat in nova Hollandia, *parva, gibba.*

cayennenſis. 117. C. capite thoraceque fuſco-aureis nigro variis, elytris hyalinis apice obſcurioribus: macula aurea. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 269. *n.* 20.
Habitat in Cayenna, *fuſca, femoribus poſterioribus flavis, ſtatura ferrugineae.*

aurulenta. 118. C. capite thoraceque rufis, elytris fuſcis apice cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 269. *n.* 19.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine obtuſae.*

obtuſa. 119. C. nigra, elytris apice cinereo-hyalinis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 269. *n.* 18.
Habitat in Cayenna, *ſtatura ferrugineae.*

ferruginea. 120. C. capite, thorace ſcutelloque nigro punctatis, elytris rufis, alis atris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 269. *n.* 17.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.*

nervoſa. 25. C. fuſca, alis hyalinis fuſco maculatis: nervis punctatis. *Fn. ſuec.* 882.* *Scop. ent. carn.* 341. *Fueſſli inſ. Helv. p.* 24. *n.* 459.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 327. *n.* 35. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 48. Cicada alis fuſcis, nervis albo nigroque punctatis.
Degeer inſ. 3. *p.* 182. *n.* 4. *t.* 12. *f.* 1. 2. Cicada nervoſopunctata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 415. *n.* 1.
Habitat in Europae *plantis.*

variegata. 121. C. atra viridi variegata, alis hyalinis: punctis tribus coſtalibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 327. *n.* 36. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 49.
Habitat in Germania.

lyncea. 122. C. fronte thoraceque glaucis: punctis quatuor ocellaribus nigris, elytris hyalinis: margine flaveſcente. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 327. *n.* 37. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 50.
Habitat in India.

fulgida. 123. C. flava, elytris fuſco-auratis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 327. *n.* 38. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 51.
Habitat in Angliae *plantis.*

punctata. 124. C. elytris flaveſcentibus fuſco punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 327. *n.* 39. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 52.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 417. *n.* 4. Cicada fuſco-pallida &c.
Habitat in Europae *nemoribus.*

leucophthalma. 26. C. nigra, oculis albis. *Fn. ſuec.* 883.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 325. *n.* 21. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 28.
Habitat in Europae *borealis plantis.*

leucocephala. 28. C. nigra, capite albo. *Fn. ſuec.* 885.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 325. *n.* 23. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 29.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 421. *n.* 13.
β) *Schaeff. ic. t.* 237. *f.* 6.
Habitat in Europae *plantis.*

lateralis. 29. C. nigra, elytris latere albis. *Fn. ſuec.* 886.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 18. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 24. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 460.
Raj. inſ. 68. 2. Locuſta pulex fuſca, utrinque in lateribus alarum arcu albicante.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 416. *n.* 3.
Habitat in Europae *pratis.*

bimaculata. 125. C. ſupra nigra, ſcutello elytrorum maculis duabus dorſalibus margineque exteriori flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 325. *n.* 19. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 25.
Habitat in Braſilia.

feneſtrata. 126. C. ſupra nigra, capite ſcutelloque flavis, elytrorum margine hyalino. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 325. *n.* 20. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 26.
Habitat in inſula Tahiti *oceani auſtralis.*

flavipes. 127. C. nigra, capite pedibusque flavis, elytris apice hyalinis nigro ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 27.
Habitat in inſula Rotterdam *oceani auſtralis, feneſtratae proxime affinis.*

flavicollis. 33. C. fuſca, capite thoraceque flavis. *Fn. ſuec.* 891.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 325. *n.* 25. *mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 33.
Cicada nigra, capitis margine poſteriori thoraceque flavis.
Habitat in Europae *graminibus.*

flava. 34. C. flava unicolor. *Gron. zooph.* 681.
Habitat in Europa.

interrupta. 35. C. elytris flavis: linea nigra duplici interrupta longitudinali. *Fn. ſuec.* 889.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 325. *n.* 24. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 30.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 419. *n.* 9.
Petiv. gazoph. t. 61. *f.* 10.
Degeer inſ. 3. *p.* 186. *n.* 7. *t.* 12. *f.* 6.
Fueſſli inſ helv. p. 24. *n.* 462.
Habitat frequens in Europae *plantis.*

Hybneri. 128. C. pallida, capite thoraceque nigro punctatis, elytris lineatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 31.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura interruptae.*

abbreviata. 129. C. flaveſcens, elytris cinereis: vitta abbreviata atra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 32.
Habitat Hafniae, *ſtatura interruptae.*

vittata. 36. C. flava: vitta ferruginea longitudinali duplici repando-dentata. *Fn. ſuec.* 889.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 463. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 23.
Habitat in Europae *hortis.*

Lanio. 37. C. viridis, capite thoraceque carneis. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 464. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 27. *mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 38.
Habitat in Europae *plantis.*

ochromelas. 130. C. nigra, capite faſciis duabus flavis, elytris albo ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 39.
Habitat in Kilonii *plantis*, *ſtatura viridis.*

ignita. 131. C. vireſcenti-nitidula, capite ſcutello abdomineque fulvis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 40.
Habitat in Cayenna, *parva.*

turca. 132. C. atra, abdomine flavo, alis apice fuſcis: lunula hyalina. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 28. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 41.
Habitat in Europae *plantis.*

maura. 133. C. nigra, pectore abdomineque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 29. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 42.
Habitat in nova Hollandia.

nebuloſa. 134. C. nigra, elytris hyalinis baſi fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 30. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 43.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *mediae magnitudinis.*

hyalina. 135. C. fuſca, elytris faſcia abbreviata margineque poſteriori hyalinis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 31. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 44.
Fabr. ſyſt. entom. p. 688. *n.* 1. Cercopis feneſtrata.
Habitat in India.

pellucida. 136. C. griſea, elytris faſcia media hyalina. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 32. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 45.
Habitat in nova Hollandia.

cynosbatos. 137. C. fuſca, alis albo-hyalinis: margine fuſco punctato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 327. *n.* 33. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 46.
Habitat in Daniae *roſis.*

ſerratulae. 138. C. flava, elytris albis: puncto faſciisque duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 327. *n.* 34. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 47.
Habitat in Angliae *carduis.*

aptera. 38. C. aptera atra, elytris abbreviatis, tibiis antennisque pallidis. *Fn. ſuec.* 894.*
Habitat in Sudermania *ad* Akeroum, *pulicis magnitudine.*

tricolor. 139. C. elytris lacteis: punctis nigris, capite thoraceque virentibus. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 21. *n.* 36.
Habitat Upſaliae *frequens et* Lutatiis, *pediculo vix duplo major.*

reticulata. 140. C. elytris hyalinis fuſco reticulatis, capite thoraceque albis nigro maculatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 21. *n.* 37.
Habitat Upſaliae, *interrupta paulo major.*

variabilis. 141. C. elytris fuſco-flaveſcentibus: margine maculis duabus pallidis, capite thoraceque flaveſcentibus. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 22. *n.* 38.
Habitat frequens Upſaliae, *interrupta vix major, elytris nunc flaveſcentibus, nunc fuſco flavoque variis, nunc fuſcis.*

cincta. 142. C. elytris fuſcis: margine maculis duabus albis, capite thoraceque fuſcis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 23. *n.* 39.
Habitat Upſaliae, *magnitudine nervoſae, variabili ſextuplo major.*

exclamationis. 143. C. elytris nigris: linea punctoque albis, capite thoraceque nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4 *p.* 24. *n.* 40.
Habitat Upſaliae, *bifaſciatae magnitudine, ſupra nigra, ſubtus flaveſcens.*

guttata. 144. C. fuſco varia, capite thorace elytrisque ferrugineis: punctis flavis albisque, tergo coccineo. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 68. *n.* 68.
Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine ſpumariae, an ejusdem tribus?*

cruenta. 145. C. capite thorace alisque ſubfuſcis, abdomine nigro, elytris ruberrimis apice flavis.
Drury inſ. 2. *p.* 73. *t.* 38. *f.* 5. 6. Cicada ſanguinea.
Habitat in Jamaica.

ſalicina. 146. C. griſea, pedibus rufo-teſtaceis.
Degeer inſ. 3. *p.* 180. *n.* 2. Cicada ſpumaria ſalicis.
Habitat in ſalice, *an ad cercopides releganda?*

muſcaeformis. 147. C. fronte quadrata, thorace breviſſimo, ſcutello albido: punctis duobus impreſſis, alis fuſceſcentibus: baſi faſciaque abrupta albis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 253. *n.* 482.
Habitat in Auſtria *ſuperiore, infra* 3 *lineas longa.*

bicincta. 148. C. pallide fuſca, capite thoraceque faſcia albida. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 75. §. 26. *inſ. auſtr. p.* 254. *n.* 483.
Habitat in Auſtria *ſuperiori, infra* 3 *lineas longa.*

decimaquarta. 149. C. pallida, elytris numero 14 nigro notatis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 76. §. 28. *inſ. auſtr. p.* 254. *n.* 485.
Habitat in Auſtria, *infra* 3 *lineas longa.*

quadrimaculata. 150. C. ferruginea, elytris ad marginem exteriorem maculis duabus albis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 77. §. 30. *inſ. auſtr. p.* 254. *n.* 486.
Habitat Viennae auſtriae, $2\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

Schrankii. 151. C. fuſca ſubtus flava, alis hyalinis: apice nervis nigris feneſtratis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 74. §. 24. *inſ. auſtr. p.* 255. *n.* 487.
Habitat in Auſtria *ſuperiore,* $2\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

auſtriaca. 152. C. nigra, pedibus pallidis, oculorum baſi alba, alis hyalinis: faſciis ſubtribus nigris. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 73. §. 23. *inſ. auſtr. p.* 255. *n.* 488.
Habitat in Auſtria, $2\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

haemorrhouſa. 153. C. nigra, thorace maculis duabus ſanguineis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 256. *n.* 490.
Habitat in Auſtriae *arbuſtis, vix ultra* 2 *lineas longa.*

trilineata. 154. C. ferruginea, lineis tribus longitudinalibus nigris. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 75. §. 27. *inſ. auſtr. p.* 258. *n.* 496.
Habitat in Auſtria *ſuperiore.*

erythrophthalma. 155. C. flaveſcens, oculis rubris, tibiis anterioribus nigro marginatis, alis hyalinis: lineolis obſcuriuſculis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 77. §. 31. *inſ. auſtr. p.* 258. *n.* 498.
Habitat in Auſtria.

melanoſticta. 156. C. ſulphurea, capite punctis duobus, elytris maculis aliquot nigris: apice fuſco. *Schranck inſ. auſtr. p.* 259. *n.* 499.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 426.
Habitat in Auſtria *ſuperiore et* Gallia, *ſeſquilineam longa.*

arunci. 157. C. tota ferruginea, oculis fuſcis. *Scop. ent. carn. p.* 113. *n.* 332.
Habitat in Spiraea Arunco.

marginalis. 158. C. fuſca, elytri margine externo pedibusque flaveſcentibus, corpore luteo. *Scop. ent. carn. p.* 113. *n.* 333.
Habitat in Carnioſia.

bicordata. 159. C. elytris nigris: latere utroque et linea media, pedibusque flavis. *Scop. ent. carn. p.* 114. *n.* 334.
Habitat in Carnioliae *corylo, frontis macula media nigra, cujus apici utrique inſidet macula obcordata nigra.*

oenotherae. 160. C. flaveſcens, oculis nigris, elytris rivulis fuſcis. *Scop. ent. carn. p.* 114. *n.* 336.
Habitat in Carnioliae *oenothera bienni, ſpumans, ſpumaria major; an ex cercopidum tribu?*

carniolica. 161. C. nigricans, elytris margine omni lineolisque tribus longitudinalibus luteis. *Scop. ent. carn. p.* 114. *n.* 337.
Habitat in Carnioliae *fruticibus.*

pallida. 207. C. pallida thorace punctis ſex impreſſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 419 *n.* 8.
Habitat in Gallia *et* Calabria.

biguttata. 216. C. nigra, thorace utrinque gutta ſanguinea. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 20.
Habitat in Europa.

rivuloſa. 217. C. teſtacea, elytris ferrugineo variis: rivulis transverſis albis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 25.
Habitat in Europa.

ſtrigoſa. 218. C. ſcutello thoraceque transverſim ſtrigoſo rufeſcentibus, elytris fuſco, rufo cinereoque variis, ano ſetoſo, pedibus poſterioribus longis: tibiis ſpinis ciliatis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 26.
Habitat in Europa.

caſta. 219. C. fuſco-pallida immaculata. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 28.
Habitat in Europa.

quadri-ſtriata. 220. C. elytris nervoſis elevato-punctatis rugoſis tibiarumque apice griſeis, thorace depreſſo: ſtriis quatuor longitudinalibus, pedibus anterioribus latis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 27.
Habitat in Europa.

lutea. 221. C. lutea, elytris ad ſcutelli margines albis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 29.
Habitat in Europa.

bipunctata. 222. C. flava, fronte punctis duobus fuſcis, elytris albis luteo venoſis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 30.
Habitat in Europa.

flavi-frons. 223. C. lutea fronte flava: punctis duobus minimis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 31.
Habitat in Europa.

reticulata. 224. C. flava, elytris albis luteo venoſis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 32. 35.
Habitat in Europa.

lineolata. 225. C. fuſca, elytris albidis fuſco venoſis: lineolis interruptis albis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 33.
Habitat in Europa.

vireſcens. 226. C. ex flavo vireſcens. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 34.
Habitat in Europa.

lugubris. 227. C. elytris albis: margine interno poſteriorique nigro, dorſo interrupto. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 36.
Habitat in Europa.

hyalina. 228. C. elytris hyalinis albo venoſis. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 37.
Habitat in Europa.

laƈtea. 229. C. pallida, alis laƈteis. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 38.
Habitat in Europa.

denigrata. 230. C. flava, alis albis, abdomine ſupra nigro. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 39.
Habitat in Europa.

maculoſa. 231. C. fuſca, elytris albidis fuſco maculatis. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 40.
Habitat in Europa.

pallens. 232. C. aptera pallida. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 42.
Habitat in Europa.

†† *alis deflexis, latera obvolventibus*, Deflexae.

ocellata. 162. C. elytris compreſſis adſcendentibus viridibus: punƈtis ocellaribus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 2.
Degeer inſ. 3. *t.* 33. *f.* 2.
Habitat Tranquebariae.

aequinoƈtialis. 163. C. elytris deflexis viridibus: margine rubro; interiori baſi nigro punƈtato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 3.
Habitat in Africa *aequinoƈtiali, magna.*

marginata. 39. C. flava, elytris deflexis nigris: linea laterali alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 4.
Habitat in America, *lateralis magnitudine, alis pallidis.*

phalaenoides. 40. C. exalbida, alis patulis, elytris anterius nigro punƈtatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 5.
Degeer inſ. 3. *p.* 222. *n.* 19. *t.* 33. *f.* 6. Cicada flava, alis ampliſſimis deflexis albidis nigro punƈtatis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 9. *f.* 10.
Stoll cicad. t. 2. *f.* 9.
Habitat in America *meridionali, hemerobio perlae ſimilis.*

bipunƈtata. 41. C. exalbida, elytris deflexis griſeis, thoracis margine anteriori punƈtis duobus impreſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali, cornutae magnitudine.*

retuſa. 164. C. exalbida immaculata, capite anterius retuſo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine marginatae.*

165. C.

grisea. 165. C. grisea, elytris deflexis, capite apice puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 8.
Habitat in inſulis Americae *meridionali oppoſitis.*

tripuncta-ta. 166. C. elytris deflexis viridibus: punctis tribus albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n* 9.
Habitat in America *meridionali, viridis, vivida major.*

vivida. 167. C. viridis, elytris deflexis, alis albis, fronte conica. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 10.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis, in* nova *quoque* Hollandia.

minuta. 168. C. elytris deflexis viridibus: dorſo ſcabro, capitis margine poſteriori thoraceque linea dorſali ſanguinea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 11.
Habitat in nova Hollandia.

lanata. 42. C. alis nigris: punctis caeruleis, fronte lateribusque rubris, ano lanato. *Muſ. Lud. Ulr.* 163.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 13.
Sulz. hiſt. inſ. t. 9. *f.* 11.
Drury inſ. 2. *t.* 37. *f.* 11.
Stoll cicad. 1. *t.* 10. *f.* D. 49.
Habitat in America *auſtrali et* India, *nigricans, oculis ſpinoſis.*

tomen-toſa. 169. C. elytris deflexis viridibus fulvo ſubfaſciatis, alis albis: faſciis duabus atris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 269. *n.* 14.
Habitat in India.

barbata. 170. C. fuſca, abdomine vireſcente, ano lanato niveo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 269. *n.* 15.
Habitat in India.

atrata. 171. C. atra, thorace maculis quatuor griſeis, abdominis margine flavo: punctis niveis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 269. *n.* 16.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine lanatae, antennis teſtaceis, genubus flavis.*

villoſa. 172. C. viridis, elytris deflexis exalbidis, ano lanato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 21.
Habitat in America *meridionali.*

leporina. 43. C. alis exalbidis: anterius anaſtomoſibus pallidis ſupra lineolam nigricantem, ano lanato. *Fn. ſuec.* 895.*
Habitat in Europa.

cunicularia. 44. C. alis hyalinis: ſtriga faſcia punctisque fuſcis, ano lanato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 12.
Habitat in India, *fronte ovata ferruginea.*

viridis. 46. C. elytris viridibus, capite flavo: punctis nigris. *Fn. ſuec.* 896. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 417. *n.* 5. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 465. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 26. *mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 34.
Raj. inſ. p. 68. *n.* 3. Locuſta pulex paulo minor.
Petiv. gaz. 73. *t.* 76. *f.* 6. Ranatraærideſcens.
Habitat in Europa, *elytris rarius caeruleſcentibus.*

lacta. 173. C. ſupra nigra nitida: punctis caeruleſcentibus. *Fabr. mant.* 2. *p.* 271. *n.* 34.
Habitat in Cayenna, *viridi minor, ſubtus flaveſcens, ano coccineo.*

quadriguttata. 174. C. elytris rufeſcentibus: maculis duabus viridibus apice hyalinis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis, ſubtus flaveſcens.*

marginella. 175. C. nigra, capitis thoracis elytrorumque margine coccineis. *Fabr. mant. inſ* 2. *p.* 271. *n.* 37.
Habitat in Cayenna, *parva.*

compreſſa. 47. C. flava compreſſa. *Fn. ſuec.* 897.*
Habitat in Europa.

aurata. 48. C. flava, elytris fulvo pictis: maculis quatuor nigris poſteriusque auratis. *Fn. ſuec.* 899.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 41. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 55. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 466.
Habitat in Europae *magis borealis plantis.*

ulmi. 49. C. alis viridi luteis: apicibus nigricantibus inauratis. *Fn. ſuec.* 900.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 42. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 56. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 427. *n.* 27.
Degeer inſ. 3. *p.* 189. *n.* 8. Cicada muſciformis ulmi.
Habitat in Europae *ulmis.*

nitidula. 176. C. elytris pallide auratis albo nigroque punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 57.
Habitat Halae Saxonum, *parva, flava.*

177. C.

cuſpidata. 177. C. griſea, capite depreſſo plano apice fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 43. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 58.
Habitat in Angliae *plantis.*

quercus. 178. C. flaveſcens, elytris ſanguineo apice fuſco maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 44. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 59.
Habitat in quercu.

roſae. 50. C. flava, alis albis apice fuſco ſtriatis. *Fn. ſuec.* 902.*
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 428. *n.* 28. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 327. *n.* 40. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 53.
Fueſſli inſ. helv. p. 24. *n.* 467.
Degeer inſ. 3. *p.* 103. *n.* 9. Cicada muſciformis roſae.
Reaum. inſ. 5. *t.* 20. *f.* 10-14.
Friſch inſ. 11. *p.* 13. *t.* 20.
Habitat in roſae *foliis.*

fuſcata. 179. C. griſea, elytris punctis apiceque fuſcis, alis albis apice fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 54.
Habitat in Europa, *ſtatura et magnitudine C. roſae.*

coryli. 51. C. alis fuſcis convolutis: faſcia albida pone maculam cordatam caeruleſcentem. *Fn. ſuec.* 901.*
Habitat in corylo.

coccinea. 180. C. flava, capite thorace ſcutello tergo elytrisque coccineis, elytris lineis duabus longitudinalibus obliquis virentibus. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 69. *n.* 69.
Habitat in America *ſeptentrionali, compreſſae circiter magnitudine.*

americana. 181. C. elytris maculatis, ano lanato.
Habitat in America, *an vere diſtincta a* 42, 169-172 *ſpecies?*

albida. 182. C. albida, elytris nigro punctatis.
Habitat in America; *an diſtincta a* 42, 169-172 *ſpecies?*

globulifera. 183. C. atra, capite conico in ſpinam longiſſimam deſinente: pedunculis quatuor globuliferis. *Pall. miſcell. zool. p.* 187. *ſpicil. zool.* IX. *p.* 22. *t.* 1. *f.* 12. D. E. F.
Habitat - - - - *pediculo duplo vel triplo major.*

erythroptera. 184. C. fuſca, capite flavicante, elytris rubris: ſtrigis quatuor nigris. *Lepechin it.* 2. *p.* 209. *t.* 11. *f.* 24.
Habitat in Sibiria.

nitens. 185. C. griſeo-viridis, alis hyalinis nitidiſſimis, femoribus anterioribus tridentatis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 220. *n.* 17. *t.* 33. *f.* 4.
Habitat in Surinamo, 11 *lineas longa.*

collaris. 186. C. flavo-fulva, thorace faſcia rubra pallida, antennis longioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 226. *n.* 22. *t.* 33. *f.* 12.
Habitat in Surinamo, *muſcae minoris magnitudine.*

melanoptera. 187. C. fuſca: utrinque linea laterali flava, alis nigris. *Degeer inſ.* 3. *p.* 226. *n.* 23. *t.* 23. *f.* 14.
Habitat in Surinamo, *ſtatura et magnitudine collaris.*

gibberula. 188. C. fuſco-viridis reticulata, alarum baſi dilatata. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 418. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

ſexpunctata. 189. C. flaveſcens, thorace punctis ſex impreſſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 429. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

crocata. 190. C. nigra, thorace elytriſque faſcia crocea. *Geoffr. inſ. par.* 3. *p.* 422. *n.* 16.
Habitat in Gallia.

caſtaneae. 191. C. tota nigra. *Geoffr. inſ. par.* 3. *p.* 422. *n.* 15.
Habitat in Galliae *caſtanea.*

triſtriata. 192. C. fuſca, elytris albidis: faſciis tribus tranſverſis fuſcis. *Geoffr. inſ. par.* 3. *p.* 425. *n.* 21.
Habitat in Gallia.

biſtriata. 193. C. flava, elytrorum faſciis duabus transverſis fuſcis. *Geoffr. inſ. par.* 3. *p.* 425. *n.* 22.
Habitat in Gallia.

tripunctata. 194. C. viridi-flava, elytris punctis tribus nigris apice fuſcis. *Geoffr. inſ. par.* 3. *p.* 426. *n.* 25.
Habitat in Gallia.

geographica. 195. C. viridis, elytris maculis plurimis fuſcis ovatis. *Geoffr. inſ. par.* 3. *p.* 427. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

ſqualida. 196. C. fuſca elytris nebuloſis: nervis albidis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1152. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 422. *n.* 14.
Habitat in Europa.

197. C.

quadrinotata. 197. C. nigricans, thorace bipunctato, elytris totis coriaceis: faſcia duplici interrupta alba. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1149.
Habitat in Dania.

palleſcens. 198. C. elytris abbreviatis ſtriatis fuſco maculatis, alis albis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1150.
Habitat in Dania.

fuſca. 199. C. flaveſcens, elytris fuſcis nervoſis, oculis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1151.
Habitat in Dania.

puſilla. 200. C. pallida, alis membranaceis albis: punctis raris nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1163.
Habitat in Dania, *adeo exilis, ut ſaliens tantum oculis percipiatur.*

diaphana. 201. C. luteo-alba, oculis cinereis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1169.
Habitat in Dania.

arvenſis. 202. C. lutea, fronte, abdomine ſubtus, lateribusque nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103, *n.* 1170.
Habitat in Daniae *arvis.*

neuroptera. 203. C. flaveſcens, alis hyalinis nervoſis: maculis ſubfulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1171.
Habitat in Dania.

cancellata. 204. C. lutea, ſcutello tripunctato apice fuſco, alis albis reticulatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1172.
Habitat in Dania.

glabra. 205. C. fuſca, thorace nigro, elytris politis fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1173.
Habitat in Dania.

amphibia. 206. C. antennis craſſis elevatis, alis nullis, pedibus poſterioribus natatoriis. *Pontopp. Naturg. Daennem. p.* 214. *n.* 13. *t.* 16. a. b. *atl. dan.* 1. *t.* 29.
Müll. zool. dan. prodr. p. 103.
Habitat in Dania, *magnitudine pulicis, feminae abdomine enſifero; an hujus generis?*

224. NO-

224. NOTONECTA. *Roſtrum* inflexum.

Antennae thorace breviores.

Alae quatuor cruciato-complicatae, anterius coriaceae.

Pedes poſteriores piloſi, natatorii.

* *labio elongato.*

glauca. 1. N. elytris griſeis margine fuſco punctatis apice bifidis. *Fn. ſuec.* 903.* *Scop ent. carn.* 348. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 468. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 331. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 1.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 476. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 6. Notonecta capite luteo &c.

Degeer inſ. 3. *p.* 382. *n.* 5. *t.* 18. *f.* 16. 17. Nepa notonecta.

Petiv. gazoph. t. 72. *f.* 6. Notonecta vulgaris nigro pallidoque mixta.

Raj. inſ. 58. Cicada aquatica Mouffeti.

Bradl. nat. t. 26. *f.* 2. E.

Hufn. inſ. t. 12. *f.* 19.

Friſch inſ. 6. *p.* 28. *t.* 13.

Roeſ. inſ. 3. *app.* 1. *p.* 165. *t.* 27.

Pod. inſ. t. 1. *f.* 5.

Sulz. inſ. t. 10. *f.* 67.

Schaeff. elem. t. 90.

icon. t. 33. *f.* 5. 6.

Stoll cimic. 2. *t.* 12. *f.* IX. X.

Habitat in Europae *aquis, piſcibus moleſta.*

americana. 4. N. griſea, poſterius nigra, ſcutello atro, utrinque puncto baſeos flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 331. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 2.

Habitat in Americae *aquis.*

Notonectae et Nepae *ſub aquis degunt, animalculis aquaticis victitantes; larva et puppa hexapus, agilis, natans imagini ſimillima, haec cum alarum rudimentis, illa aptera.*

nivea. 5. N. elytris albis immaculatis apice rotundatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 332. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 3.
Habitat in India.

minutiſſima. 3. N. griſea, capite fuſco elytris truncatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 332. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 4.
Syſt nat. XII. 2. *p.* 713. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 905. Notonecta elytris cinereis maculis fuſcis longitudinalibus.
Fn. ſuec. 1. *n.* 690. Notonecta arenulae magnitudinis.
Geoffr. inſ. par. 1. p. 477. *n.* 2. Notonecta cinerea anelytra.
Fueſſli inſ. helv. p. 24. *n.* 470.
Habitat in Europae *aquis.*

minuta. 6. N. capite flavo, thorace elytrisque viridibus: lineis tranſverſis fuſcis. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 91. *t.* 10. *f.* 1.
Habitat in Europae *aquis.*

noveboracenſis. 7. N. flaveſcens, elytris concoloribus: maculis tribus nebuloſis fuſcis longitudinalibus. *Forſt. nov. inſ. ſpec.* 1. *p.* 70. *n.* 70.
Habitat in Noveboraco.

octopunctata. 8. N. capite flavo, thorace ſubfuſco, ſcutello nigro: punctis quinque albis, elytris fuſcis: margine albo; punctis quatuor atris.
Schaeff. ic. t. 97. *f.* 1.
Habitat in Germania, *magnitudine ſtriatae.*

indica. 9. N. glauca, elytris apice nigris. *Mant.* 2. *p.* 534.
Habitat in India.

atomaria. 10. N. alba, ſupra elytrisque pallide griſeis, alis lacteolis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 55.
Habitat in fluento Ruſſiae Volchova *ad* Novogrodium, *pediculi magnitudine.*

lutea. 11. N. elytris albidis: ſtriga marginali nigra. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1175.
Habitat in Daniae *aquis.*

marginata. 12. N. elytris nigris: margine ſuturaque luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 104. *n.* 1176.
Habitat in Dania. *De his* 6-12 *dubium, utrum huic, an ſequenti tribui accenſendae.*

** *la-*

** *labio nullo*, Sigarae Fabricii.

lineata. 13. N. elytris fuſcis: lineis duabus abbreviatis flavis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 276. *n.* 1.
Habitat in Cayenna, *ſtatura ſtriatae, at paulo major.*

ſtriata. 2. N. elytris fuſcis: lineolis transverſis undulatis numeroſiſſimis fuſcis. *Fn. ſuec.* 904.* *Scop. ent. carn.* 349. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 332. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 276. *n.* 2.
Petiv. gazoph. t. 72. *f.* 7. Notonecta vulgaris compreſſa fuſca.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 478. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 7. Corixa.
Degeer inſ. 3. *p.* 389. *n.* 6. *t.* 20. *f.* 1, 2. Nepa ſtriata.
Joblot microſc. 1. *p.* 1. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Roeſ. inſ. 3. *app.* 1. *p.* 177. *t.* 29.
Schaeff. elem. t. 50.
icon. t. 97. *f.* 2.
Stoll cimic. 2. *t.* 15. *f.* XIII. B.
Habitat in Europae *aquis frequens, magnitudine varians.*

coleoptrata. 14. N. elytris totis coriaceis fuſcis: margine exteriori flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 332. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 276. *n.* 3.
Habitat in Kilonii *aquis.*

225. NEPA.

Roſtrum inflexum.

Antennae breves.

Alae quatuor cruciato-complicatae: anterius coriaceae.

Pedes anteriores cheliformes; reliqui quatuor ambulatorii.

* *antennis palmato-diviſis, labio nullo.*

grandis. 1. N. ecaudata teſtacea flavo maculata. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 332. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 276. *n.* 1.
Syſt. nat XII. 2. *p.* 713. *n.* 1. *Muſ. Lud. Ulr.* 164* *Gron. zooph.* 685. Nepa teſtacea ſcutello laevi, alis albis maculis venisque flavis.
Degeer inſ. 3. *p.* 379. *n.* 4. Nepa ſurinamenſis.
Marcgr. braſ. 250. *f.* 259. Inſectum magnitudine bruſci.
Merian. inſ. ſurin. t. 56.
Roeſ. inſ. 3. *app.* 1. *t.* 26.
Habitat in Americae *aquis.*

2. N.

rubra. 2. N. fuſca, abdomine ſupra alarumque nervis rubris. *Muſ. Lud. Ulr.* 165.*
Fabr. mant. inſ. 2. *p.* 277. *n.* 6. Nepa cauda biſeta corpore ovato, cauda corpore longiore.
Stoll cimic. 2. *t.* 7. *f.* V. Scorpio aquaticus.
Habitat Tranquebariae.

annulata. 8. N. ecaudata ſubrotunda, pallide fuſca, tibiis anterioribus pallidis fuſco annulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 333. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 276. *n.* 2.
Habitat in Coromandel, *congeneribus latior, magis rotundata.*

ruſtica. 9. N. ecaudata fuſca, thoracis elytrorumque margine anteriore albido. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 333. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 276. *n.* 3.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 2. Nepa plana.
Stoll cimic. 2. *t.* 7. *f.* VI.

fuſca. 3. N. fuſca, cauda biſeta, ſcutello rugoſo, alis niveis. *Muſ. Lud. Ulr.* 166.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 333. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 277. *n.* 4.
Stoll cimic. 2. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Indiae *aquis, cauda corporis longitudine.*

groſſa. 10. N. cauda biſeta, corporis ovati longitudine. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 277. *n.* 5.
Habitat in Sina, *rubra major, cinerea, abdomine ſupra rubro, medio nigro, ano cinereo.*

atra. 4. N. atra thorace inaequali, corpore oblongo.
Habitat in Africa, *cinereae ſimillima, at duplo major et duplo longior.*

cinerea. 5. N. cinerea, thorace inaequali, corpore oblongo ovato. *Fn. ſuec.* 906. *Scop. ent. carn.* 350. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 471.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 333. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 277. *n.* 6. Nepa cauda biſeta, corpore ovato.
Fn. ſuec. 1. *n.* 691. Nepa abdominis margine integro.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 481. *n.* 2. Nepa corpore ovato.
Degeer inſ. 3. *p.* 361. *n.* 1. *t.* 18. *f.* 1. Nepa Scorpio aquaticus.
Mouff. inſ. 321. Scorpio paluſtris.
Raj. inſ. 58. Scorpio paluſtris ad cimices referenda.
Jonſt. inſ. t. 25. *f.* 1. 2. Scorpiones aquatici.

Pet.

Pet. gazoph. t. 74. *f.* 4. Scorpio vulgaris aquaticus.
Baub. ballon. 212. *f.* 2. Araneus aquaticus.
Swammerd. bibl. 1. *t.* 3. *f.* 4.
Bradl. natur. t. 26. *f.* 2. C.
Friſch inſ. 7. *t.* 15.
Hufn. inſ. t. 11. *f.* 2.
Roeſ. inſ. 3. *app.* 1. *p.* 136. *t.* 22. *f.* 6-8.
Sulz. inſ. t. 10. *f.* 68.
Schaeff. elem. t. 69.
icon. t. 33. *f.* 7. 9.
Stoll cimic. t. 1. *f.* 11. a.
Habitat in Europae *aquis, abdomine ſupra rubro, antennis palmato-bifidis.*

maculata. 11. N. nigra, thorace ſcutelloque ferrugineo maculatis, alis nigris, cauda biſeta. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 334. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 227. *n.* 8.
Habitat in Indiae *aquis.*

linearis. 7. N. linearis, manibus ſpina laterali pollicatis. *Fn. ſuec.* 908. *Gron. zooph.* 683.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 334. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 277. *n.* 9. Nepa cauda biſeta corpore lineari.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 480. *t.* 10. *f.* 1. Nepa corpore lineari.
Degeer inſ. 3. *p.* 369. *n.* 2. *t.* 19. *f.* 1. 2. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 473. Nepa linearis.
Raj. inſ. 59. Locuſta aquatica Mouffeti.
Swammerd. bibl. nat. 1. *p.* 233. *t.* 3. *f.* 9.
Friſch inſ. 7. *p.* 24. *t.* 16.
Roeſ. inſ. 3. *app.* 1. *p.* 141. *t.* 23.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 5. *f.* 5. 6.
Habitat in Europae *et* Indiae *aquis.*

** *labio porrecto rotundato,* Naucorides Fabricii.

cimicoides. 6. N. abdominis margine ſerrato. *Fn. ſuec.* 907. *Gron. zooph.* 686. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 474. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 334. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *g.* 277. *n.* 1. *Fueſſli inſ helv. p.* 24. *n.* 472.
Degeer inſ. 3. *p.* 375. *n.* 3. *t.* 19. *f.* 8. 9. Nepa Naucoris.
Friſch inſ. 6. *p.* 31. *t.* 14. Cimex aquaticus latior.
Roeſ. inſ. 3. *app.* 1. *p.* 176. *t.* 28.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 3.
Schaeff. elem. t. 87.

Schaeff.

Schaeff. icon. t. 33. *f.* 3. 4.
Stoll cimic. 2. *t.* 12. *f.* VIII. C. B.
β) Naucoris ſutura integra. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 62.
Habitat in Europae *aquis.*

antiguenſis. 12. N. abdominis margine integro.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 335. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 277. *n.* 2.
Naucoris nepaeformis.
Habitat in inſula Antigua.

226. CIMEX. *Roſtrum* inflexum.

Antennae thorace longiores.
Alae quatuor cruciato-complicatae: ſuperioribus anterius coriaceis.
Dorſum planum: thorace marginato.
Pedes curſorii.

* *antennis ante oculos inſertis.*
† *labio nullo*, Acanthiae Fabricii.
T *apteri.*

lectularius. 1. C. apterus. *Fn. ſuec.* 909. *Scop. ent. carn.* 354. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 434. *n.* 1. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 474. *Degeer inſ.* 3. *t.* 17. *f.* 9. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 335. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 1.
Mouff. inſ. 269. *f. ſuperiores.* Cimex domeſticus.
Bonann. microſc. t. 65.
Aldr. inſ. 534.
Jonſt. inſ. 89.
Raj. inſ. 7.
Ledermüll. microsc. t. 52. 63.
Southall tr. of Buggs. Lond. 1730. *oct.*
Sulz. inſ. t. 10. *f.* 69.
Stoll cimic. 2. *t.* 19. *f.* 131.
Habitat in Europae *domibus*, *exoticus*, *ante epocham ſalutarem jam in* Europa, *vix ante* 1670. *in* Anglia, *nocturnus*, *foetens*, *ſanguiſugus*, *rarius*, *aliquando tamen*, *teſtibus* Scopolio *et* Hermanno, *alatus*, *vivus facile occidendus*, *nidore carbonum*, *terebinthinae oleo accenſo*, *mentha arvenſi*, *lepidio ruderali*, *myrica*, *geranio robertiano*,

 aga-

agarico muſcario, cimicifuga, cannabis ſeminibus herbaque, opuli baccis, ledo paluſtri, tabaci oleo, capſici fumo, plumbaginis europaeae infuſo, acoro paluſtri, melolontheo oleo infuſo, meduſa, cimice perſonato, formicis rubris pellendus.

†† *elytris fere totis coriaceis*, coleoptrati.

Zoſterae. 122. C. niger, elytris abdomine longioribus apice hyalino ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 335. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 2.
Fabr. it. norw. Acanthia pellucens.
Habitat ad littora maris, *velociſſime ſupra fucos zoſteramque decurrens*, Kilonii *frequens.*

ater. 123. C. ater nitidus, elytris apice palleſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 3.
Habitat Kilonii, *c. zoſterae duplo minor.*

gryllo-ides. 13. C. apterus niger, elytris ovatis margine luteis abdomine brevioribus. *Fn. ſuec.* 910.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 335. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 4.
Acanthia (coriacea) aptera, elytris coriaceis nigro-griſeis.
Habitat in Europa, *thorace gryllum referens.*

clavipes. 124. C. apterus niger, pedibus piceis: femoribus anterioribus incraſſatis dentatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 5.
Habitat Tranquebariae, *magnitudine c. zoſterae.*

pedemontanus. 125. C. apterus, elytris connatis abbreviatis cinereis, ano ſetoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 6.
Habitat in agro Pedemontano, *parvus, totus cinereus.*

littoralis. 14. C. elytris ſordidis albo punctatis, alis abbreviatis, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 914. 915.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 7. *mant. inſ.* 2 *p* 279. *n.* 12.
Degeer inſ. 3. *p.* 278. *n.* 21. *t.* 14. *f.* 17. 18. Cimex ovatus nigricans.
Habitat in Europae *littoribus.*

15. C.

Cimices *plurimi foetent, omnes, reduviis exceptis, plantarum, omnes animalium, praeſertim inſectorum molliorum ſucco victitant, quem, volatilium more, roſtro ſugunt; larva et puppa hexapus, agilis, obambulat, imagini ſimillima, illa aptera, haec alarum rudimentis inſtructa.*

rugoſus. 15. C. elytris pallidis, corpore oblongo, femoribus anterioribus craſſiſſimis. *Fn. ſuec.* 916. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 8 *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 13.
Habitat in Europa *boreali.*

lunatus. 126. C. thorace lunato: margine prominente, abdomine ſerrato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 14
Stoll cimic. 2. *t.* 13. *f.* 84.
Habitat in America *auſtrali et* India.

clavicornis. 16. C. elytris nervoſo-carinatis reticulato-punctatis, antennis clavatis. *Fn. ſuec.* 911.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 7. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 480.
Reaum. inſ. 3. *t.* 34. *f.* 1-4.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 461. *n.* 56.
Habitat in Europae *hortis.*

ſerratulae. 127. C. niger, elytris palleſcentibus, alis apice fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 9.
Habitat in Angliae ſerratulis.

lavaterae. 128. C. niger, elytris abdomineque baſi rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p* 278. *n.* 8.
Habitat in Barbariae *lavateris, parvus in hac tribu.*

faſciatus. 129. C. ater, elytris palleſcentibus: faſciis duabus abbreviatis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 10.
Habitat Kilonii, *parvus, nitidus.*

Mülleri. 130. C. niger, pedibus fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 105. *n.* 1188.
Habitat in Dania.

maculatus. 131. C. fuſcus, thorace albo trimaculato, abdomine ſubtus albo: margine nigro-punctato. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 11.
Habitat Tranquebariae, *parvus.*

††† *membranacei et valde depreſſi.*

corticalis. 17. C. abdominis margine imbricatim ſecto, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 917. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 15.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 6. 7.
Habitat in Europae *arboribus ſilvaticis.*

paradoxus. 132. C. thorace abdomineque lobatis ciliato-ſpinoſis. *Sparrm. act. Stockh.* 1777. *p.* 234. *t.* 6. *f.* A. B. C. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 510. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 16.

Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura corticalis*, *folia decidua emortua aemulans.*

laevis. 133. C. niger, abdomine laevi brunneo, alis pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 17.

Habitat in Anglia.

betulae. 18. C. thorace denticulato, capite muricato, elytris anterius dilatatis. *Fn. ſuec.* 918. *Fabr. ſp. inſ* 2. *p.* 337. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 18.

Degeer inſ. 3. *p.* 305. *n.* 36. *t.* 15. *f.* 16. 17. Cimex depreſſus betulae.

Habitat in Europae *borealis betula alba.*

craſſipes. 134. C. abdomine incraſſato fuſco: apice flaveſcente, tibiis anterioribus incraſſatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 19.

Habitat Dresdae.

croſus. 19. C. abdomine flavo: faſcia nigra, thoracis margine ſinuato, tibiis anterioribus incraſſatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 20.

Degeer inſ. 3. *p.* 350. *n.* 25. *t.* 35. *f.* 13. 14. Cimex Scorpio.

Habitat in America *meridionali.*

niger. 585. C. niger, thorace ferrugineo marginato conico: apice truncato, elytris abdomine dimidio brevioribus margine externo ferrugineis, abdomine ſupra albo maculato: lobis utrinque ſex ferrugineis, totidemque ſubtus paribus guttarum albarum. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 66. b.

Habitat extra Europam.

umbraculatus. 135. C. ferrugineus, thorace marginato: margine anterius ſcutelloque apice albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 21.

Habitat Hafniae.

leucopterus. 136. C. thoracis margine ſerrato, corpore griſeo, alis albis fuſco maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 338. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 22.

Habitat - - - - -

filicis. 20. C. elytrorum apicibus capite pedibusque lividis, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 919.*
Habitat in filicibus.

cardui. 21. C. ſcutello lineis tribus elevatis, antennis apice nigris. *Fn. ſuec.* 920.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 338. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 24
Degeer inſ. 3. *p.* 309. *n.* 38. *t.* 6. *f.* 1. Cimex depreſſus ovatus griſeus nigro-maculatus.
Habitat in Europae *borealis cardui capitulis.*

pyri. 137. C thorace trialato: ſcutello foliato, elytris reticulatis baſi gibbis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 338. *n.* 18. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 25.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 461. *n.* 57.
Habitat in pyri *communis foliorum pagina inferiori, quam maculat.*

rhombeus. 22. C. thorace acutangulo, abdomine dilatato rhombeo poſterius ſexdentato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 338. *n.* 19. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 26.
Habitat in Africae *arboribus.*

ſylveſtris. 111. C. ater, elytris albis: arcu apicis nigro. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 23.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 731. *n.* 111. *Fn. ſuec.* 965. Cimex oblongus niger, alis elytrisque albo fuſcoque caeruleis, pedibus rufis.
Habitat in Europae *ſilvis, parvus.*

corticatus. 138. C. thoracis denticulati corporis pedumque cortice nigricante viridi, antennis clavatis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 7.
Drury inſ. 2. *p.* 76. *t.* 40. *f.* 2.
Habitat in Braſilia.

†† *labio elongato, ſubulato, annulato.*

† *ſcutello longitudine abdominis*, Scutellati.

Stockerus. 2. C. corpore viridi: maculis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 167.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 338. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 1. Cimex ſcutellaris ovatus, corpore viridi, maculis nigris abdomine ferrugineo.
Pet. gazoph. 34. *t.* 21. *f.* 12. Stockerus benghalenſis viridis nigro-maculatus.

Stoll cimic. 2. *t.* 3. *f.* C.
Habitat in Sina, *nobili affinis, ſubtus ferrugineus: lateribus cyaneis.*

nobilis. 3. C. viridi-auratus nigro maculatus. *Amoen. acad.* 6. *p.* 409. *n.* 46.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 338. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 2. Cimex ſcutellaris oblongus caeruleo-auratus nigro maculatus.
Sulz. biſt. inſ. t. 11. *f.* C.
Schroet. Abh. 1. *t.* 1. *f.* 9.
Stoll cimic. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Aſia, *ſubtus rufus, faſciis lateralibus caeruleo atroque nitentibus.*

regalis. 139. C. thorace ſcutelloque aureis, thorace punctis duobus, ſcutello maculis duabus caeruleſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 3.
Habitat in nova Hollandia.

imperialis. 140. C. thorace ſcutelloque rufis, abdomine cyaneo: margine ſanguineo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

nigellae. 141. C. niger obſcurus, thorace anterius, abdominis margine pedibusque albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 5.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 339. *n.* 5. Cimex (ruſticus) ſcutellaris niger obſcurus, abdominis margine ferrugineo, pedibus pallidis.
Habitat in Barbariae *nigella, elytris intus ſanguineis.*

cerinthes. 142. C. niger obſcurus immaculatus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 6.
Habitat in Africae *nigella ſativa, ſtatura et magnitudine c. nigellae.*

annulus. 143. C. vireſcens, maculis annularibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 7.
Drury inſ 3. *t.* 46. *f.* 9. Cimex Argus.
Habitat ad fluvium Senegal, *alis apice nigris, interdum obſcure pallidus.*

ſexguttatus. 144. C. ſupra teſtaceus, thorace punctis duobus, ſcutello quatuor cyaneo-nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 8.

Habitat

Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis, antennis nigris.*

Druraei. 145. C. ſanguineus, punctis maculisque nigris, ſubtus atro-caeruleſcens. *Mant. p.* 534.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 339. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 9. Cimex ſcutellaris ſupra rufus, maculis difformibus nigris.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 5.
Drury inſ. 1. *t.* 42. *f.* 1. 5.
Habitat in America *meridionali.*

Fabricii. 146. C. purpureus: punctis ſanguineis, ſubtus atro-caeruleſcens. *Mant. p.* 534.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 340. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 10. Cimex ſcutellaris ſubpurpuraſcens fulvo-punctatus.
Habitat in Cayenna, *altero ſexu ſupra rufeſcente, altero obſcure caeruleſcente.*

Argus. 147. C. niger: punctis ocellaribus fulvis numeroſis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 11.
Stoll cimic. 2. *t.* 7. *f.* 50.
Habitat in Surinamo, *ſtatura et magnitudine c. Fabricii, ſubtus flavus nigro varius.*

Schulzii. 148. C. atro-aeneus, ſcutello utrinque macula baſeos coccinea.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 340. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 12.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine ſcarabaeoidis, praecedentibus minor.*

paganus. 149. C. cyaneus, ſcutello abdomineque rufis cyaneo maculatis.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 340. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 13.
Habitat in nova Hollandia, *thorace interdum macula rufa, abdomine medio punctis* 4 *cyaneis inſignito.*

illuſtris. 150. C. glaucus, thorace ſcutelloque punctis duobus fuſcis.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 340. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 14.
Stoll. cimic. 2. *t.* 24. *f.* 166.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus.*

lineola. 151. C. ſupra cyaneus, capite thoraceque linea dorſali, ſcutello punctis duobus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 340. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis, antennis nigris.*

trilineatus. 152. C. niger, lineis tribus flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 340. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 16.
Habitat in America *meridionali, lineato minor, ſubtus niger, viridi irroratus, abdomine utrinque linea punctorum rubrorum inſignito.*

ſcarabaeoides. 4. C. corpore atro-aeneo. *Fn. ſuec.* 912.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 25. *mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 29. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 475.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 435. *n.* 2. Cimex hemiſphaericus nigro-aeneus &c.
Sulz. inſ. p. 26. *t.* 11. *f.* 70.
Habitat in Europa, *frequentius in ranunculi floribus.*

pallipes. 153. C. nigro-aeneus, ſcutelli abdominisque margine pedibusque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 343. *n.* 26. *mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 30.
Thunb. nov. inſ. ſp. 2. *p.* 29. Cimex (acaroides) ſcutellatus ater, thorace ſcutello abdomineque albo marginatis.
Habitat in Africa *aequinoctiali, flavipedi affinis, at paulo major.*

flavipes. 154. C. nigro-aeneus, margine omni pedibusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 343. *n.* 27. *mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 31.
Habitat in nova Hollandia.

Vahlii. 155. C. ater nitidus, capite lituris duabus, thorace ſcutellique margine pedibusque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 32.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

maurus. 5. C. corpore griſeo. *Fn. ſuec.* 913.* *Scop. ent. carn.* 352. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 476.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 342. *n.* 20. *mant. inſ.* 2 *p.* 282. *n.* 23. Cimex ſcutellaris cinereus, ſcutello baſi punctis duobus albis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* d.
Schaeff. ic. t. 43. *f.* 3. 4. 15. 16.
Habitat in Oriente, Calabria, *in* Europa *quadruplo minor.*

coſtatus. 156. C. griſeus, alarum coſta baſi pedibusque rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 22.
Habitat in inſula Rotterdam *oceani auſtralis, mauro proxime affinis.*

157. C.

hottentotta. 157. C. ferrugineus immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 21. *mant. inſ.* 2 *p.* 282. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 435. *n.* 3? Cimex fuſcus &c.
Habitat in Arabia.

leucogrammes. 158. C. griſeus albo ſtriatus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 22. *mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 25.
Habitat in Italia, *minor.*

ruſticus. 159. C. fuſcus, capite thoracisque anteriore ferrugineis, ſubtus albo fuſcoque varius. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 26.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis, antennis ferrugineis apice fuſcis.*

irroratus. 160. C. vireſcens fuſco irroratus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 23. *mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 27.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

lanatus. 161. C. aeneo niger griſeo-hirtus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 24. *mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 28.
Pall. it. 2. *app. p.* 729. *n.* 82.
Stoll cimic. 2. *t.* 9. *f.* 61.
Habitat in Sibiria, *oblongus, chryſomelae majoris magnitudine, frequens ad ſpicas elymi canini.*

lineatus. 6. C. niger, thorace lineis quinque, ſcutello tribus aurantiis, abdomine flavo punctis nigris. *Scop. ent. carn.* 351. *Gron. zooph.* 689. *Fueſſli inſ. helv. t.* 20. *f.* 6.
Mouff. inſ. 174 *f.* 5.
Poda inſ. 55. *n.* 2.
Buchholz de hepatomphal. Arg. 1768. *t.* 2. *f.* 3.

nigrolineatus. β) C. ruber, thorace lineis quinque, ſcutello tribus nigris, abdomine flavo: punctis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 341. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 17.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 6.
Schaeff. elem. t. 44. *f.* 1.
icon. t. 2. *f.* 3.
Stoll cimic. 2. *t.* 11. *f.* 9.
Habitat in Europae *magis auſtralis potiſſimum montoſis, in floribus mali et ſambuci.*

ſemipunctatus. 162. C. ſupra rufus, thorace punctis decem, ſcutello lineis quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 341. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 18.

Stoll cimic. 2. *t.* 11. *f.* 8.
Habitat in America, Europa *auſtrali.*

anchorago. 163. C. cyaneus, ſcutello baſi apiceque flaveſcente, abdominis margine flavo nigro punctato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 341. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 19.
Habitat in America *boreali, ubi mas rufus, ibi femina flava.*

grammicus. 7. C. corpore flaveſcente: ſupra lituris longitudinalibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 341. *n.* 18. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 20.
Habitat in Africa, *mediae magnitudinis.*

Allioni. 164. C. fuſcus, atomis numeroſiſſimis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 19. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 21.
Habitat in agro Pedemontano, *grammico paulo minor.*

fuliginoſus. 8. C. ſcutello fuliginoſo: lituris quinque nigris; poſteriore alba bifida. *Fn. ſuec.* 914.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 478. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 343. *n.* 28. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 33.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 10-12.
Habitat in Europa *et* Oriente.

litura. 165. C. niger, ſcutello lituris tribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 343. *n.* 29. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 34.
Habitat in Arabia.

tuberculatus. 166. C. obſcurus, ſcutello ſcabro ante apicem tuberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 343. *n.* 30. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 35.
Habitat in Italia, *litura paulo minor.*

inunctus. 167. C. ater, ſcutello baſi pedibusque griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 343. *n.* 31. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 36.
Habitat in Angliae *nemoribus.*

arabs. 9. C. thorace ſpinoſo, corpore ovato livido, ano bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 168.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 344. *n.* 32. *mant. inſ.* 2. *p.* 383. *n.* 37.
Sloane jam. 2. *t.* 237. *f.* 15. 16. Cimex ſylveſtris foetens viridis triangularis.
Habitat in America *meridionali.*

ſerratus. 10. C. thorace ſpinoſo, corpore livido, abdominis marginibus ſerratis. *Muſ. Lud. Ulr.* 169.*
Habitat in Arabia.

ſtolidus. 11. C. thorace ſubangulato, corpore ſupra viridi ſubtus flavo, ano bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 170.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 344. *n.* 33. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 38.
Degeer inſ. 3. *t.* 34. *f.* 3.
Habitat in America *auſtrali et* India.

Hiſtrio. 12. C. thorace ſcabro depreſſo griſeo pallidoque vario.
Habitat in America *auſtrali*, India, Sibiria.

ſilphoides. 168. C. niger, thorace poſterius, ſcutello anterius margine linea media maculisque duabus albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 29.
Stoll cimic. p. 19. *t.* 4. *f.* 21.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaber*, *ovatus*, *magnitudine c. baccarum*, *facie ſilphae.*

diophthalmus. 169. C. ruber, thorace punctis duobus nigris, pedibus cyaneis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 30. *f.* 45.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ovatus*, *glaber*, *magnitudine fere ſcarabaei ſtercorarii.*

multipunctatus. 170. C. ruber, thorace ſcutelloque punctis minutiſſimis plurimis nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 30.
Stoll cimic. p. 40. *t.* 9. *f.* 60.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ovatus*, *glaber*, *ſubtus griſeus*, *magnitudine griſei.*

grandis. 171. C. rufus, maculis thoracis tribus ſcutellique quinque nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 31. *f.* 46.
Habitat in India, *oblongus*, *convexus*, *glaber*, *ſubtus violaceus*, *magnitudine fere ſcarabaei ſtercorarii.*

liligerus. 172. C. ferrugineus, ſcutello punctis nigris duobus faſciaque undulata albida. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 32.
Stoll cimic. p. 40. *t.* 9. *f.* 59.
Habitat in interioribus regionibus ad caput bonae ſpei, *ovatus*, *convexus*, *glaber*, *magnitudine ſtockeri.*

guttigerus. 173. C. cinereus, ſcutello baſi punctis duobus albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 32. *f.* 47.
Habitat in Japonia, *ſcarabaeoide vix major.*

ocellatus. 174. C. ſupra purpureus, thorace ſpinoſo, ſcutello ocellis ſenis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 60. *f.* 72.

Habitat

An huc quoque referendi a Seba *muſ. vol.* 4. *delineati cimices, nigro-punctulatus t.* 95. *f.* 26. *et nigro denſe punctatus t.* 95. *f.* 27?

Habitat in Japonia *et* Sina, *oblongus*, *convexus*, *rufipedis magnitudine.*

ſurinamenſis. 175. C. niger, ſcutelli appendice rubra, elytris rubellis poſterius nigricantibus. *Schroet. Abh. zur Naturg. p.* 338. *t.* 2 *f.* 4.
Habitat in Surinamo.

exanthematicus. 176. C. nigricans: ſupra punctis confertis albis. *Scop. ent. carn. p.* 121. *n.* 353.
Habitat prope Tergeſtum.

torridus. 177 C. fuſcus: punctis miniatis. *Scop. ann. hiſtor. nat.* 5. *p.* 110. *n.* 109.
Habitat in America *torrida.*

Friſchii. 178. C. nigricans excavato-punctatus, elytris coriaceis connatis, alis nigris.
Friſch inſ. 13. *p.* 26. *n.* 28. *t.* 24.
Habitat in Germania, *roſtro rufeſcente*, *antennarum articulis* 4.

Schranckii. 179. C obſcure ferrugineus ſubtus flavus, ſcutello carinato: carina et ad baſin utrinque macula flavis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 78. §. 32.
Habitat in Auſtria.

variegatus. 180. C. fuſcus, abdominis limbo pedibusque luteo fuſcoque variis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 467. *n.* 65.
Habitat in Gallia.

fuſcus. 181. C. nigro-ferrugineus, ſcutello ad anum usque producto. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 467. *n*, 66.
Habitat in Gallia.

cucullatus. 182. C. ater punctatus, ſcutello ad anum usque producto. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 468. *n.* 67.
Habitat in Gallia.

ſagittifer. 183. C. ſupra ater, infra exalbidus nigro punctulatus, ſcutello atro albo-punctato poſterius ſagittato.
Schaeff. ic. t. 41. *f.* 1-3.
Habitat in Germania.

carneus. 184. C. thorace croceo, elytris incarnatis.
Schaeff. ic. t. 57. *f.* 3.
Habitat in Germania.

flavo-viridis. 185. C. flavo-vireſcens, ſcutelli apice nitide albo.
Schaeff. ic. t. 109. *f.* 8. 9.
Habitat in Germania.

carunculatus. 186. C. flavo viridique varius, abdomine atro: margine flavo, ano tuberculis ſex ſanguineis.
Schaeff. ic. t. 244. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

†† *thorace utrinque ſpina armato*, ſpinoſi.

Taurus. 187. C. griſeus, thoracis ſpinis porrectis compreſſis truncatis.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 344. *n.* 34. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 39.
Habitat in Coromandel, *magnus.*

Cervus. 188. C. viridis, elytris fuſcis: margine albo, thoracis ſpinis obtuſis ſubbifidis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 40.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

bidens. 23. C. ovatus griſeus, thorace acute ſpinoſo, antennis rufis. *Fn. ſuec.* 921.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 482. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 344. *n.* 35. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 41.
Degeer inſ. 3. *p.* 259. *n.* 6. *t.* 13. *f.* 9. Cimex ovatus fuſcus &c.
Sulz. inſ. t. 11. *f.* 72.
Habitat in Europa.

ſanguinipes. 189. C. fuſcus, thoracis ſpinis obtuſis, ſcutello apice albido, abdominis margine maculato, pedibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 344. *n.* 36. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 42.
Habitat in Italia, *ſtatura griſei.*

rufipes. 24. C. ovatus griſeus, thorace obtuſe ſpinoſo, pedibus rubris. *Fn. ſuec.* 922.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 483. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 344. *n.* 37. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 43.
Degeer inſ. 3. *p.* 253. *n.* 2.
Raj. inſ. p. 54. *n.* 2.
Schaeff. icon. t. 57. *f.* 6. 7.
Habitat in Europa *frequens.*

lentiginoſus. 586. C. ovatus griſeus, thorace obtuſe ſpinoſo, elytrorum punctis antennisque fuſcis; articulis 2. 3. 4. lividis, membrana maculis lentiginoſis adſperſa. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 78. b.
Habitat in Europa.

multicolor. 587. C. ovatus fuſcus, thorace elytrisque ruſo-griſeis, antennis albo-annulatis, femoribus nigris baſi albis, tibiis albis: apice plantisque nigris. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 78. c.
Habitat in Europa.

luridus. 190. C. thorace obtuſe ſpinoſo ſubvireſcente, elytris griſeis: macula fuſca, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 345. *n.* 38. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 44.
Habitat in Angliae *nemoribus.*

nigricornis. 191. C. ſubferrugineus, thorace obtuſe ſpinoſo, ſpinis antennisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 345. *n.* 39. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 45.
Habitat in Saxonia.

nigriſpinus. 192. C. ſupra griſeus, thorace obtuſe ſpinoſo, capite ſpinisque nigris, antennis annulo albo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 46.
Habitat in Sina, *ſtatura et magnitudine nigricornis.*

ictericus. 25. C. ovatus incarnatus ſubtus flavus, thorace acute ſpinoſo. *Amoen. acad.* 6. *p.* 399. *n.* 41.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 345. *n.* 40. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 47.
Cimex thorace ſpinoſo, oblongus ſupra ruſeſcens ſubtus flavus.
Habitat in America *et* Calabria.

floridanus. 26. C. ovatus niger rubro varius, ſcutello maculis tribus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 346. *n.* 49. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 52.
Habitat in America, *mediae magnitudinis.*

armatus. 193. C. thorace acute ſpinoſo, ſcutello nigro: punctis duobus apiceque teſtaceis, antennis pedibusque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 346. *n.* 45. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 53.
Habitat in nova Hollandia.

haemorrhous. 27. C. oblongus niger, abdomine ruſo, elytris punctis linearibus quinque nigris. *Amoen. acad.* 6. *p.* 400. *n.* 45.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 346. *n.* 46. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 54.
Habitat in America.

28. C.

An huc etiam referendae ſpecies a Seba *vol. muſ.* 4. *delineatae, flavo-teſſulatus t.* 95. *f.* 25. *ſpinoſus t.* 95. *f.* 31, 32. *quadriſpinoſus t.* 95. *f.* 33. 34. *hiſpidus t.* 97. *f.* 35.

marginatus. 28. C. thorace obtuſe ſpinoſo, abdomine marginato acuto, antennis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 349. *n.* 70. *mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 82.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 719. *n.* 28. *Fn. ſuec.* 923.* *Scop. ent. carn.* 363. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 484. Cimex oblongo-ovatus griſeus, thorace obtuſe ſpinoſo, antennis medio rubris.

Fn. ſuec. 1. *n.* 662. Cimex oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque angulato.

Degeer inſ. 3. *p.* 272. *n.* 17. Cimex auriculatus.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 446. *n.* 20.

Schaeff. ic. t. 41. *f.* 415.

Stoll cimic. 2. *t.* 5. *f.* 37.

Habitat in Europae *plantis.*

ſpiniger. 194. C. thorace obtuſe ſpinoſo dentatoque, capite quadriſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 350. *n.* 71. *mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 83.

Habitat in Italia, *ſtatura marginati, at duplo minor.*

pugnator. 195. C. oblongus ſupra fuſcus ſubtus flaveſcens, thorace acute ſpinoſo, antennis rufis apice nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 84.

Habitat Tranquebariae, *ſtatura et magnitudine ſpinigeri.*

faſciculatus. 196. C. cinereus, thorace ſubſpinoſo, alis fuſcis, pedibus faſciculato-tuberculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 350. *n.* 72. *mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 85.

Habitat ad caput bonae ſpei, *marginato duplo minor.*

inſidiator. 197. C. ſupra rufus ſubtus flaveſcens, thorace acute ſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 86.

Habitat in Barbaria, *quadrato minor, alis albidis.*

quadratus. 198. C. ſupra fuſcus ſubtus flaveſcens, thorace obtuſe ſpinoſo, abdomine quadrato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 350. *n.* 73. *mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 87.

Stoll cimic. 2. *t.* 5. *f.* 36.

Habitat in Germania.

haſtatus. 199. C. thorace acute ſpinoſo dentatoque, elytris obſcuris: ſtriga poſteriore alba. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 88.

Habitat Tranquebariae, *ſtatura quadrati, at minor.*

velox. 200. C. thorace acute ſpinoſo bipunctato, elytris puncto baſeos ſtrigaque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 350. *n.* 74. *mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 88.
Habitat in America.

Merianae. 201. C. thorace ſubſpinoſo, elytris fuſcis albo reticulatis, abdominis baſi ſpinoſa. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 350. *n.* 75. *mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 89.
Merian. inſ. ſurin. t. 51.
Habitat in Surinamo.

bipuſtulatus. 29. C. oblongiuſculus niger, punctis verticis duobus coccineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 346. *n.* 47. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 55.
Cimex thorace ſpinoſo niger, elytris lividis, capite punctis duobus coccineis.
Degeer inſ. 3. *p.* 334. *n.* 8. *t.* 34. *f.* 10. Cimex balteatus.
Habitat in America *meridionali.*

ſcaber. 30. C. oblongiuſculus teſtaceus, thorace angulato-ſpinoſo, alis nigris, femoribus denticulatis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 400. *n.* 43.*
Habitat in Java.

punicus. 31. C. ovatus niger, ſcutello lunula apiceque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 346. *n.* 48. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 56.
Habitat in Africa, *magnitudine c. baccarum.*

Ypſilon. 32. C. ovatus lividus, ſcutello ypſilo flavo inſcripto. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 346. *n.* 49. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 57.
Degeer inſ. 3. *p.* 332. *n.* 6. *t.* 34. *f.* 7. 8. Cimex ypſilon aeneus.
Habitat in America *meridionali.*

clypeatus. 33. C. ovatus viridis, faſcia flavicante, capite clypeato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 346. *n.* 50. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 58.
Gron. zooph. 691. Cimex ovatus, thorace utrinque aculeato faſcia transverſali flavicante, ſcutello gibboſo, capite clypeato, ano ſerrato.
Habitat in Sina.

albicollis. 202. C. ſupra viridis, thorace dentato, capite thoracisque anteriore ſcutellique baſi flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 347. *n.* 51. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 59.
Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 4. Cimex flavicollis.
Habitat in Jamaica, *ſubtus flaveſcens.*

punctatus. 34. C. ovatus punctatus, tibiis annulo albo. *Fn. ſuec.* 924.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 345. *n.* 41. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 48.
Cimex thorace ſubſpinoſo fuſcus, abdominis margine variegato, tibiis annulo albo.
Degeer inſ. 3. *p.* 269. *n.* 14.
Habitat in America *boreali*, *ſubtus griſeus*, *antennis nigris.*

varius. 203. C. ſupra rufus ſubtus flaveſcens, thorace obtuſe ſpinoſo, ſcutello nigro baſi apiceque albo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 49.
Habitat in Hiſpania, *ſtatura et magnitudine albipedis*, *capite antennisque nigris*, *pedibus rufis.*

albipes. 204. C. ſupra nigricans, thoracis ſubſpinoſi margine ſcutellique apice albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 345. *n.* 42. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 50.
Habitat in Italia, *ſubtus pallidus*, *ſtatura punctati.*

dentatus. 205. C. thorace acute ſpinoſo ſerrulato, corpore cinereo nigroque vario. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 346. *n.* 43. *mant. inſ.* 2. *p.* 284. *n.* 51.
Habitat in India.

haemorrhoidalis. 35. C. ovato-oblongus griſeus, thorace acute ſpinoſo, antennis nigris, ſterno porrecto. *Fn. ſuec.* 925.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 485.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 347. *n.* 52. *mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 60.
Cimex thorace obtuſe ſpinoſo ſubvireſcens, antennis nigris, ſterno porrecto.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 465. *n.* 63.
Degeer inſ. 3. *p.* 254. *n.* 3. *t.* 35. *f.* 7.
Sulz. hiſt. inſ. t. 11. *f.* 72.
Schaeff. ic. t. 57. *f.* 8?
Habitat in Europae *graminoſis.*

ſpinidens. 206. C. fuſcus, thorace acute ſpinoſo, ſcutello apice elytris margine albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 61.
Habitat Tranquebariae, *magnus*, *ſpinis unidentatis.*

oculatus. 207. C. griſeus, ſcutello punctis duobus flavis, tarſis anterioribus apice compreſſo membranaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 347. *n.* 53. *mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 62.
Habitat in Sina.

annulatus. 208. C. griſeus, tibiis albo annulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 347. *n.* 54. *mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 63.
Habitat in Virginia.

quadri-pustulatus. 209. C. thorace crenato obtuſe ſpinoſo ſcutelloque punctis duobus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 347. *n.* 55. *mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 64.
Habitat in America.

maculatus. 210. C. vireſcens, thorace obtuſe ſpinoſo: maculis quatuor, ſcutello elytrisque apice fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 347. *n.* 56. *mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 65.
Habitat in America, *elytrorum apice rarius concolore.*

pugnax. 211. C. oblongus vireſcens, thorace acute ſpinoſo, antennis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 348. *n.* 57. *mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 66.
Habitat in America.

emeritus. 212. C. vireſcens, thorace acute ſpinoſo, abdomine lineis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 348. *n.* 58. *mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 67.
Habitat in nova Hollandia.

gladiator. 213. C. thorace acute ſpinoſo ſcutelloque flaveſcentibus nigro punctatis elytris punctis albis ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 348. *n.* 59. *mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 68.
Stoll cimic. 2. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat in America *et ad* caput bonae ſpei.

furcatus. 214. C. fuſcus, thorace acute ſpinoſo ſerrato, clypeo acuminato bifido. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 348. *n.* 60. *mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 69.
Habitat in Patagonia, *nonnunquam totus griſeus.*

pugillator. 215. C. fuſcus, ſubtus fulvus nigro punctatus: margine flavo thorace acute ſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 348. *n.* 61. *mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 70.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magnus.*

victor. 216. C. fuſcus, thorace acute ſpinoſo, ſcutello apice rufo, pedibus pallidis nigro punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 348. *n.* 62. *mant. inſ.* 2. *p.* 285. *n.* 71.
Habitat in Braſilia, *et inſulis* Americae *oppoſitis.*

ciliatus. 217. C. thorace ciliato obtuſe ſpinoſo nigro: margine faſciaque poſteriore flavis, femoribus poſterioribus ſerratis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 348. *n.* 63. *mant. inſ.* 2. *p.* 286. *n.* 72.
Habitat in America.

bellator. 218. C. ſupra fuſcus ſubtus flaveſcens, antennis atris albo annulatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 286. *n.* 73.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

armiger. 219. C. griſeus, thorace acute ſpinoſo, ſcutello punctis duobus, antennis pedibusque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 348. *n.* 64. *mant. inſ.* 2. *p.* 286. *n.* 74.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

ſcorbuticus. 220. C. fuſcus, thorace obtuſe ſpinoſo, pedibus pallidis nigro punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 349. *n.* 65. *mant. inſ.* 2. *p.* 286. *n.* 75.
Habitat in America.

delirator. 221. C. flaveſcens nigro punctatus, thorace acute ſpinoſo poſterius elytrisque fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 286. *n.* 76.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

melacanthus. 222. C. obſcure ferrugineus, thoracis ſpinis acutis atris, abdomine atro: vittis flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 349. *n.* 66. *mant. inſ.* 2. *p.* 286. *n.* 77.
Habitat in Africa *aequinoctiali, parvus.*

aggreſſor. 223. C. corpore flaveſcente, thoracis ſpinis acutis ſubconcoloribus, ano quadridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 349. *n.* 67. *mant. inſ.* 2. *p.* 286. *n.* 78.
Habitat in nova Hollandia.

vittatus. 224. C. vireſcens, thorace ſubſpinoſo, elytris vitta ſubmarginali flava. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 349. *n.* 68. *mant. inſ.* 2. *p.* 286. *n.* 79.
Habitat ad caput bonae ſpei, *antennis ferrugineis, alis albidis.*

hamatus. 225. C. viridis, thorace acute ſpinoſo, abdomine ſerrato: denticulis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 286. *n.* 80.
Habitat in India, *magnus, antennis nigris.*

defenſor. 226. C. corpore viridi, thoracis ſpinis acutis nigris, ano quadridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 349. *n.* 69. *mant. inſ.* 2. *p.* 287. *n.* 81.
Habitat in nova Hollandia.

valgus. 36. C. oblongus niger, thorace ſerrato, femoribus poſterioribus incurvis tibiisque poſterioribus unidentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 171.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 351. *n.* 76. *mant. inſ.* 2. *p.* 288. *n.* 91.

Habitat ad caput bonae ſpei, *baſi abdominis nunc inermis nunc quadridentata.*

tragus. 227. C. thoracis ſpinis compreſſo-lunatis ſerratis, tibiis poſterioribus membranaceo-ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 288. *n.* 92.
Habitat in Sina, *ſtatura et magnitudine valgi.*

tenebroſus. 228. C. thorace ſerrulato, femoribus poſterioribus incurvis clavatis, abdomine baſi triſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 288. *n.* 93.
Habitat in India, *ſtatura et magnitudine valgi.*

fulvicornis. 229. C. fuſcus, thorace ſerrato, femoribus bidentatis: poſterioribus multidentatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 288. *n.* 94.
Habitat in India, *magnus, antennis ferrugineis.*

femoratus. 230. C. thorace ſerrulato, femoribus poſterioribus incurvis dentatis, tibiisque poſterioribus compreſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 351. *n.* 77. *mant. inſ.* 2. *p.* 288. *n.* 95.
Habitat in India.

curvipes. 231. C. thorace acute ſpinoſo, femoribus omnibus apice bidentatis, poſterioribus incurvis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 351. *n.* 78. *mant. inſ.* 2. *p.* 288. *n.* 96.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura femorati.*

magnipes. 232. C. obſcurus, thorace ſerrato, femoribus multiſpinoſis: poſterioribus incraſſatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 288. *n.* 97.
Habitat in Sina, *femorato triplo minor.*

membranaceus. 233. C. thorace acute ſpinoſo nigro: faſcia flava, tibiis poſterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 351. *n.* 79. *mant. inſ.* 2. *p.* 288. *n.* 98.
Habitat in inſula S. Jago *promontorii viridis.*

quadriſpinoſus. 37. C. elongatus ruber, thorace quadriſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 353. *n.* 91. *mant. inſ.* 2. *p.* 290. *n.* 115.
Degeer inſ. 3. *p.* 347. *n.* 22. *t.* 35. *f.* 7.
Habitat in America *meridionali, antennis longiſſimis capillaribus.*

phyllopus. 113. C. nigricans, thorace immaculato, elytris faſcia albicante, tibiis poſterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 351. *n.* 80. *mant. inſ.* 2. *p.* 289. *n.* 99.
Stoll cimic. 2. *t.* 8. *f.* 54.
Habitat in America *auſtrali, mediae magnitudinis.*

auctus. 235. C. thorace ſubſpinoſo nigro: maculis duabus fulvis, elytris faſcia flava, tibiis poſterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 351. *n.* 81. *mant. inſ.* 2. *p.* 289. *n.* 100.
Habitat in Cayenna, *phyllopodi proxime affinis.*

Gonagra. 236. C. thorace ſubſpinoſo: faſcia alba, elytris fuſcis: puncto cinereo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 351. *n.* 82. *mant. inſ.* 2. *p.* 289. *n.* 101.
Habitat in inſula S. Thomae *in* oceano americano.

kermeſinus. 116. C. oblongus rufus: faſcia albida nigro punctata, femoribus poſterioribus multidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 352. *n.* 83. *mant. inſ.* 2. *p.* 289. *n.* 102.
Degeer inſ. 3. *p.* 337. *n.* 11. *t.* 34. *f.* 15. Cimex rubro balteatus.
Habitat in Surinamo, *antennis fuſcis.*

auſtralis. 237. C. oblongus niger, thorace ſubſpinoſo: faſcia anteriore rubra, tibiis poſterioribus baſi membranaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 352. *n.* 84. *mant. inſ.* 2. *p.* 289. *n.* 103.
Habitat in inſula Tahiti *maris auſtralis.*

cruciger. 238. C. oblongus ſupra niger, thorace acute ſpinoſo lineis, elytris cruce ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 352. *n.* 85. *mant. inſ.* 2. *p.* 289. *n.* 104.
Habitat in Braſilia.

ſanctus. 239. C. oblongus rufus, thorace acute ſpinoſo elytris nigris: cruce ferruginea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 352. *n.* 86. *mant. inſ.* 2. *p.* 289. *n.* 105.
Habitat in Braſilia.

laetus. 240. C. viridis capite faſcia elytrorum abdominisque femoribusque flavis, elytris atris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 289. *n.* 106.
Habitat in Cayenna, *magnus, oblongus.*

lunatus. 241. C. niger, thorace arcu anteriore, elytris faſcia, corpore maculis albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 289. *n.* 107.
Habitat in Cayenna, *ſtatura laeti.*

elatus. 242. C. thorace acute ſpinoſo viridi: margine ferrugineo, elytris ſtriatis ferrugineis, corpore ferrugineo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 290. *n.* 108.
Habitat in Cayenna, *lunato minor.*

balteatus. 243. C. oblongus ferrugineus, elytris linea transverſa flava, femoribus poſterioribus multidentatis. *Mant. p.* 534. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 352. *n.* 87. *mant. inſ.* 2. *p.* 290. *n.* 109. *Drury inſ.* 1. *t.* 43. *f.* 3.
Habitat in America *meridionali.*

ſinuatus. 244. C. lividus, thorace acute ſpinoſo, tibiis poſterioribus compreſſis ſinuatis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 290. *n.* 110.
Habitat in Cayenna, *ſtatura ſerripedis, at major.*

ſerripes. 245. C. oblongus rufus, thorace acute ſpinoſo, femoribus poſterioribus dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 353. *n.* 88. *mant. inſ.* 2. *p.* 290. *n.* 111.
Habitat in nova Hollandia.

dentipes. 246. C. elongatus, femoribus poſterioribus elongatis ſerratis, corpore fuſco ſubtus lateribus albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 290. *n.* 112.
Habitat in Sierra Leon Africae, *lineari proxime affinis.*

linearis. 247. C. elongatus fuſcus, thorace acute ſpinoſo, femoribus poſterioribus elongatis denticulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 353. *n.* 89. *mant. inſ.* 2. *p.* 290. *n.* 113.
Habitat in Sina.

crenulatus. 248. C. thorace dentato rufo: macula nigra, femoribus poſterioribus dentatis, corpore atro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 353. *n.* 90. *mant. inſ.* 2. *p.* 290. *n.* 114. *Drury inſ.* 1. *t.* 45. *f.* 1.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis, capite nigro, rubro-lineato.*

ſpinifex. 249. C. linearis cinereus, ſcutello biſpinoſo. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 33. *f.* 48.
Habitat - - - *facie et magnitudine tipularii.*

ſetoſus. 250. C. oblongus griſeus, thorace capite pedibusque hiſpidis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 33.
Habitat in America *auſtrali et* India, *annulati magnitudine, at duplo anguſtior.*

acutus. 251. C. linearis cinereus, thoracis margine albido, abdomine punctis ſex nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 34.
Habitat - - - *magnitudine et facie clavati.*

clavatus. 252. C. lineari-oblongus ferrugineus, femoribus poſterioribus incraſſatis, ſcutello immaculato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 34. *f.* 49.
Habitat in Japonia, *annulati magnitudine, ſed paulo anguſtior.*

Jaculus. 253. C. linearis fuſcus, femoribus poſterioribus incraſſatis ſpinoſis, ſcutello linea alba. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 34. *f.* 50.
Habitat - - - magnitudine et facie piloſi.

piloſus. 254. C. linearis ferrugineus, linea capitis pectoriſque laterali albida. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2 *p.* 35.
Habitat - - - clavato paulo minor, ſubtus pallidus.

villoſus. 255. C. ſpinoſo-tuberculatus totus piceus villoſus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 35.
Stoll cimic. t. 13. *f.* 90.
Habitat - - - annulato major.

Crux. 256. C. niger, thorace flavo: cruce nigra. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 35.
Stoll cimic. t. 9. *f.* 65.
Habitat ad caput bonae ſpei, *perſonati magnitudine.*

pungens. 257. C. oblongus ſupra fuſcus ſubtus albidus, pectore abdominiſque lateribus nigro punctatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 36.
Habitat ad caput bonae ſpei, *annulati magnitudine, glaber.*

notatus. 258. C. oblongus ſupra ferrugineus ſubtus cinereus, abdomine ſextuplici ſerie punctorum nigrorum. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 37.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaber, vix annulati magnitudine.*

trigonus. 259. C. teſtaceus, elytris ſcutelloque puncto albo. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 37.
Stoll cimic. t. 11. *f.* 78. 79.
Habitat in Japonia *et* Surinamo, *glaber, c. abietis magnitudine.*

muricatus. 260. C. oblongus cinereus muricatus, tibiis poſterioribus baſi dilatatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 38. *f.* 51.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine c. hyoſcyami, femorato ſimilis.*

unipunctatus. 261. C. oblongus teſtaceus, elytris puncto nigro. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 38. *f.* 52.
Habitat in Japonia, *glaber, trigono plus quam duplo major.*

thoracicus. 262. C. oblongus viridi-aureus, thoracis margine luteo. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 39.
Stoll cimic. t. 8. *f.* 55. A.
Habitat in India *et* Surinamo, *annulati magnitudine, ſed longior.*

analis. 263. C. oblongus viridis, abdomine rubro, ano nigro. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 39.
Stoll cimic. t. 10. *f.* 72. B.
Habitat in India *et* Surinamo, *thoracici magnitudine, ſed paulo latior.*

transverſus. 264. C. rotundatus viridis, capite thoraceque anterius flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 40. *f.* 53.
Habitat in Africa, *juniperini magnitudine, glaber.*

humeralis. 265. C. ovatus viridis, elytris baſi luteis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 40. *f.* 54.
Habitat - - - juniperino quadruplo major, punctis impreſſis.

ſubulatus. 266. C. ovatus vireſcens, ſcutelli linea elevata ſubulata. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 41. *f.* 55.
Habitat - - - humeralis magnitudine et facie, ſubtus albidus.

Comma. 267. C. rotundatus cinereus, ſcutello linea flava. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 41. *f.* 56.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine c. baccarum.*

reticulatus. 268. C. cinereus nigro varius, thorace ſerrato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 42.
Stoll cimic. t. 16. *f.* 111.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaber, magnitudine c. baccarum.*

Fullo. 269. C. ovatus niger, albo irroratus, capite thoraceque linea alba. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 42. *f.* 57.
Habitat in Japoniae *inſula* Dezima, *rufipede major, ſcarabaeo fulloni ſimilis.*

tibialis. 270. C. ovatus brunneus albo fuſcoque lineatus, ſcutello maculis tribus albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 43. *f.* 58.
Habitat - - - magnitudine c. baccarum, glaber.

ſulcatus. 271. C. ovatus cinereus fuſco-nebuloſus, abdomine ſulcato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 43.
Stoll cimic. t. 6. *f.* 47.
Habitat in India, *c. baccarum paulo major.*

fuſcus. 272. C. oblongus ferrugineo-fuſcus, antennis pedibusque hirſutis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 44.
Habitat - - - - valgi fere magnitudine.

ſordidus. 273. C. cinereus, thorace denticulato, antennis pedibusque piloſo-hiſpidis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 44.
Habitat in Japonia, *marginati magnitudine.*

ſenegalenſis. 274. C. thorace acute ſpinoſo flavo: maculis nigricantibus, ſcutello viridi-ſtriato poſterius flavo, elytris dimidiato nigricantibus: ſtriis obliquis viridibus, poſterius fuſcis: ſtriis longitudinalibus nigris, corpore rubro: margine nigro maculato.
Drury inſ. 2. *p.* 70. *t.* 38. *f.* 4. Cimex variegatus.
Habitat ad fluvium Senegal, *ano denticulato, alis cineraſcentibus nigro-reticulatis.*

bidentatus. 275. C. longus fuſcus, roſtro arcuato, thorace ſubtus anterius bidentato. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 438. *n.* 6.
Habitat in Gallia.

Leviathan. 276. C. planus fuſcus, thorace elytrisque alatis, capite anterius cornuto, antennis brevibus craſſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 439. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

roſtratus. 277. C. oblongus fuſcus immaculatus, thorace utrinque obtuſe angulato, capite inter antennas bidentato. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 446. *n.* 21.
Habitat in Gallia.

acutangulus. 278. C. oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque acute angulato: margine laevi. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 447. *n.* 22.
Habitat in Gallia.

immaculatus. 279. C. oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque acute angulato: margine ſpinoſo. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 447. *n.* 23.
Habitat in Gallia.

porphyropterus. 280. C. ovatus flavo-viridis, thorace angulato, elytris pallide purpureis, antennis nigris, pedibus roſeis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 258. *n.* 5. *t.* 13. *f.* 152.

Habitat in Europae *arboribus herbisque, mediae magnitudinis, an hujus tribus?*

puſtulatus. 281. C. ovatus rufus: maculis flaveſcentibus ſparſis, thorace angulato, ſcutello elongato. *Degeer inſ.* 3. *p.* 329. *n.* 2. *t.* 34. *f.* 2.
Habitat in India, *varioloſo paulo minor, an hujus tribus?*

leucoſtictos. 282. C. ovatus flavo-griſeus, thorace acute ſpinoſo ſcutelloque punctis excavatis nigris, elytris punctis elevatis albis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 331. *n.* 5. *t.* 34. *f.* 6.
Habitat in Surinamo, *ſatis magnus.*

penſylvanicus. 283. C. ſubrotundus totus viridis, thorace angulato. *Degeer inſ.* 3. *p.* 330. *n.* 4. *t.* 34. *f.* 5.
Habitat in Penſylvania; *an hujus tribus?*

litteratus. 284. C. oblongo-ovatus griſeus, ſcutello ypſilo flavo inſcripto, antennis pedibusque teſtaceis.
Degeer inſ. 3. *p.* 333. *n.* 7. *t.* 34. *f.* 9. Cimex Ypſilon griſeus.
Habitat in Surinamo, *ypſilo affinis.*

tigripes. 285. C. oblongus ſupra fuſcus ſubtus griſeus, femoribus dentatis nigro maculatis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 335. *n.* 10. *t.* 34. *f.* 12.
Habitat in Surinamo, *muſcae domeſticae magnitudine.*

auſtriacus. 286. C. ovatus ferrugineus, ſcutello interſtincto: faſcia nigra. *Schranck Beytr. z. Naturg.* §. 33. *p.* 78. *t.* 3. *f.* 16.
Habitat prope Mauer Auſtriae *inferioris.*

chalybeus. 588. C. nigro-aeneus immaculatus. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 78. d.
Habitat in Europa.

beryllinus. 589. C. thorace obtuſe ſpinoſo utrinque dentato, ſpinarum apicibus clypeoque bifido ex caeruleo vireſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 79.
Habitat in Europa, *antennarum articulo quarto poſterius dimidio albo.*

aduſtus. 590. C. thorace acute ſpinoſo, capite, ſpinarum apice, ſcutelli medio, elytris utrinque ad baſin ſcutelli membranarumque marginibus externis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 80.
Habitat in Europa.

bidens. 591. C. thorace obtuſe ſpinoſo, elytrorum margine interno et poſteriore anoque bidentato ſanguineis, elytris pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 81.
Habitat in Europa.

bilobus. 592. C. thorace obtuſe dentato, elytris griſeis punctatis aut rufeſcentibus, ano bilobo. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 82.
Habitat in Europa.

diſtinctus. 593. C. oblongus, thorace obtuſe ſpinoſo ſubtus luteo, ſupra antennisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 83.
Habitat in Europa.

rubricornis. 594. C. thorace hiſpido obtuſe ſpinoſo, antennis hiſpidis coccineis: articulo ultimo nigro. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 84.
Habitat in Europa.

aculeatus. 595. C. griſeus, thorace ſpinoſo: ſpinis anterius antennarumque articulis ſecundo tertioque nigris. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 85.
Habitat in Europa.

conſperſus. 596. C. thorace obtuſe ſpinoſo: anterius punctis duobus impreſſis, abdomine ſubtus utrinque nigro punctato, gutta ad anum nigra. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 86.
Habitat in Europa.

††† *thorace mutico.*

† *rotundati ſ. ovati.*

aurantius. 287. C. aurantius, capite, thoracis margine anteriori, abdominis maculis marginalibus pedibusque atris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 290. *n.* 116. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 10. *f.* 10.
Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 5. Cimex incarnatus.
Thunb. nov. inſ. ſp. 2. *p.* 46.
Stoll cimic. 2. *t* 6. *f.* 39. *et. t.* 2. *f.* 10. A.
Habitat in Java, Zeilona, India, *magnus.*

Punctum. 288. C. ſupra nigricans, thorace poſterius aurantio, elytris albis: puncto nigro. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 291. *n.* 117.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 9. Cimex nigripes.
Stoll cimic. 2. *t.* 6. *f.* 40.
Habitat in Java, *magnus.*

melanopus. 289. C. ſupra ſanguineus, ſcutello maculis duabus, elytris unica nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 353. *n.* 92. *mant. inſ.* 2. *p.* 291. *n.* 118.

Drury

Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 5. Cimex incarnatus.
Stoll cimic. 2. *t.* 2. *f.* 10.
Habitat in India, *ſcutelli maculis interdum nullis.*

torquatus. 290. C. viridis, capite thoraceque anterius flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 353. *n.* 93. *mant. inſ.* 2. *p.* 291. *n.* 119.
Habitat in India, Italia.

rutilans. 291. C. viridi-aeneus, thorace faſcia anteriore ſanguinea, ſcutello elytrisque anterius flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 353. *n.* 94. *mant. inſ.* 2. *p.* 291. *n.* 120.
Stoll cimic. 2. *t.* 18. *f.* 122. A.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *magnus*, *antennis nigris.*

guttatus. 292. C. viridi-aeneus albido punctatus, tibiis anterioribus membranaceis dilatatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 291. *n.* 121.
Habitat in Siam, *magnus.*

viridulus. 39. C. ſupra flavus: punctis viridibus, ſubtus viridis. *Muſ. Lud. Ulr.* 172.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 354. *n.* 95. *mant. inſ.* 2. *p.* 291. *n.* 122.
Habitat in America *auſtrali et* India.

peregrinator. 40. C. ſuborbiculatus depreſſus griſeo pallidoque varius, thorace ſcabro. *Muſ. Lud. Ulr.* 173.*
Habitat in America *auſtrali et* India.

bipunctatus. 41. C. pallide griſeus: puncto albo utrinque ad baſin ſcutelli. *Muſ. Lud. Ulr.* 174.
Habitat in Syria.

ſexpunctatus. 42. C. rotundatus luteo nigroque varius, thorace luteo: punctis ſex nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 175.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 355. *n.* 105. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 136.
Habitat in America *auſtrali*, India, Sibiria.

ſignatus. 293. C. griſeus, ſcutello vitta nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 355. *n.* 106. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 137.
Habitat in Sierra Leon Africae.

gravis. 294. C. fuſcus, ſcutello punctis duobus flavis, elytris puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 355. *n.* 107. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 138.
Habitat in nova Seelandia, *mediae magnitudinis.*

Forskählii. 295. C. viridis, thoracis abdominisque margine ſanguineo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 356. *n.* 108. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 139.
Habitat in Oriente.

296. C.

Hybneri. 296. C. vireſcens, thorace faſcia ſanguinea. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 140.
Habitat Tranquebariae, *ſtatura et magnitudine cincti, ſubtus flaveſcens.*

cruentus. 297. C. viridis, thoracis abdominisque marginibus, antennis pedibusque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 356. *n.* 109. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 141.
Habitat in Surinamo.

geniculatus. 298. C. obſcurus, thoracis abdominisque margine flaveſcente, ano pedumque geniculis ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 142.
Habitat in Cayenna, *magnus, capite nigro.*

mixtus. 299. C. punctatus griſeus nigro maculatus, abdominis margine nigro: punctis flavis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 143.
Habitat in Cayenna, *magnus, antennis fuſcis.*

tripterus. 300. C. flavo rufoque varius, antennis nigris: ultimo articulo apice albo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 144.
Habitat in Cayenna, *ſtatura mixti, at paulo minor.*

griſeus. 43. C. griſeus, abdominis lateribus albo nigroque variis, alis nebuloſis, ſterno porrecto. *Fn. ſuec.* 926.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 356. *n.* 110. *mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 145. Cimex ovatus griſeus, abdominis lateribus albo nigroque variis, ventre antice ſpinoſo.
Degeer inſ. 3. *p.* 261. *n.* 8. *t.* 14. *f.* 9. Cimex betulae.
Habitat in Europa, *antennis nigris flavo annulatis.*

interſtinctus. 44. C. griſeus, abdominis lateribus rubro nigroque variis, alis albis, ſterno porrecto. *Fn. ſuec.* 927.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 356. *n.* 111. *mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 146. Cimex ovatus griſeus, abdominis margine nigro maculato.
Habitat in Europae *cultis.*

papilloſus. 301. C. fuſcus, antennis nigris, ſterno gibbo compreſſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 356. *n.* 112. *mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 147.
Stoll cimic. 2. *t.* 1. *f.* 2.
Drury inſ. 1. *t.* 43. *f.* 2.
Habitat in Sierra Leon Africae.

funebris. 302. C. ater, antennis, pedibus aliſque concoloribus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 356. *n.* 113. *mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 148.
Habitat in Sierra Leon Africae.

ruficornis. 303. C. ater, antennis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 356. *n.* 114. *mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 149.
Habitat in India.

baccarum. 45. C. ſubfulvus, abdominis margine fuſco maculato. *Fn. ſuec.* 928. *Scop. ent. carn.* 360. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 356. *n.* 115. *mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 150. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 486.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 466. *n.* 64. Cimex fuſcus, antennis abdominisque margine nigro croceoque variegatis.
Degeer inſ. 3. *p.* 257. *n.* 4. *t.* 14. *f.* 5. Cimex verbaſci.
Raj. inſ. p. 54. *n.* 2. Cimex ſcapulis magnis exſtantibus, macula e flavo rubente in centro crucis dorſalis.
Liſt. loq. 396. *mut. t.* 31. *f.* 19. Cimex ex luteo vireſcenti infuſcatus ad alvi margines nigris maculis.
Jonſt. inſ. t. 17. *f.* 9.
Schaeff. icon. t. 57. *f.* 1. 2.
Habitat in Europae *baccis frequens.*

Cribrum. 304. C. fuſcus, thorace ſcutelloque punctatis, abdominis punctis genubusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 357. *n.* 116. *mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 151.
Habitat in America, *magnus, antennis nigris.*

brevicornis. 305. C. obſcure cupreus, antennis brevibus compreſſis, femoribus anterioribus dentatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 152.
Habitat in Sina, *ſtatura c. baccarum.*

glaucus. 306. C. glaucus, elytris apice puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 357. *n.* 117. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 153.
Habitat in nova Hollandia.

Janus. 307. C. rotundatus ſupra ſanguineus, capite ſcutelli baſi alisque atris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 357. *n.* 118. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 154.
Drury inſ. 3. *t.* 46. *f.* 7. Cimex afer.
Stoll cimic. 2. *t.* 6. *f.* 41.
Schroet. Abh. 1. *t.* 2. *f.* 4.
Habitat in America.

dumoſus. 46. C. ſubrotundus griſeus, margine undique ſanguineo. *Fn. ſuec.* 929.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 355. *n.* 101. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 131.
Habitat in Europa.

tripun-ctatus. 308. C. rotundatus flaveſcens, capite lineis, ſcutello punctis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ. 2. p.* 355. *n.* 102. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 132.
Habitat in America.

atomarius. 309. C. griſeo fuſcoque varius, alis albis fuſco punctatis. *Fabr. ſp. inſ. 2. p.* 355. *n.* 103. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 133.
Habitat in inſula terrae novae.

nubilus. 310. C. griſeo nigroque varius, alis albis nigro ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ. 2. p.* 355. *n.* 104. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 134.
Habitat ad caput bonae ſpei.

triſtriatus. 311. C. flaveſcens, elytris apice puncto ocellari atro, abdomine lineis tribus albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 135.
Habitat in agro Pedemontano, *ſtatura parva nubili.*

varioloſus. 47. C. flavus, thorace ſubſpinoſo punctis fuſcis excavatis varioloſo, ſcutello baſi gibbo.
Habitat in America *majuſculus, annon ad praecedentem tribum relegandus?*

juniperinus. 48. C. ſubrotundus viridis, margine undique ſcutelloque apice flavo. *Fn. ſuec.* 930.* *Scop. ent. carn.* 359. *Fabr. ſp. inſ. 2. p.* 354. *n.* 98. *mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 125. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 487.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 464. *n.* 61. Cimex ſubrotundus viridis.
Raj. inſ. p. 53 *n.* 1. Cimex ſylveſtris viridis.
Degeer inſ. 3. *p.* 231. *t.* 13. *f.* 1. 2.
Habitat in Europae *juniperetis.*

ſmaragdulus. 312. C. viridis, ſcutello punctis tribus baſeos flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 354. *n.* 99. *mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 126.
Habitat in inſula Madera.

Beryllus. 313. C. pallidus, thoracis margine aurantio, elytris macula ferruginea lineolisque marginalibus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 127.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

calidus. 314. C. ſupra fuſcus, ſubtus teſtaceus, antennis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 128.
Habitat in Sierra Leon Africae, *mediae magnitudinis.*

caelebs. 315. C. fuſco griſeus, ſcutello punctis tribus apiceque flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 355. *n.* 100. *mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 129.
Habitat in nova Hollandia.

iratus. 316. C. viridi-fuſcus, thorace faſcia flava. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 130.
Habitat in Cayenna, *parvus, antennis nigris.*

praſinus. 49. C. ſubrotundus totus viridis, ſcutello concolore. *Fn. ſuec.* 931. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 488.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 354. *n.* 96. *mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 123. Cimex ovatus viridis immaculatus, antennis apice albo fuſcoque annulatis.
Degeer inſ. 3. *p.* 266. *n.* 9. Cimex viridis totus.
Stoll cimic. 2. *t.* 19. *f.* 127.
Habitat in ſilvis Europae *et ad* caput bonae ſpei.

diſſimilis. 317. C. ſupra viridis ſubtus ferrugineus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 354. *n.* 97. *mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 124.
Habitat in Germania, *praſino proxime affinis.*

caeruleus. 50. C. caeruleus immaculatus. *Fn. ſuec.* 933.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 489. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 129. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 169.
Degeer inſ. 3. *p.* 268. *n.* 11.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 472. *n.* 75.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 4.
Stoll cimic. t. 31. *f.* 221.
Habitat in Europae *theſio.*

Morio. 51. C. ater, plantis rufis. *Fn. ſuec.* 932.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 491. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 130. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 170.
Sulz. inſ. t. 11. *f.* 77.
Schaeff. icon. t. 57. *f.* 11. *et t.* 82. *f.* 6.
Stoll cimic. t. 32. *f.* 223.
Habitat in Europae *oleraceis.*

triſtis. 318. C. ater, clypeo orbiculato, thorace retuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 360. *n.* 131. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 171.
Degeer inſ. 3. *p.* 269. *n.* 13. Cimex niger ſpinipes.
Geoffr. inſ par. 1. *p.* 470. *n.* 70.
Habitat in Europae *plantis.*

ſpinipes. 319. C. ater, pedibus piceis, tibiis ſpinoſiſſimis. *Fabr. ſp. inſ. 2. p. 360. n.* 132. *mant. inſ. 2. p. 296. n.* 172.
Habitat in Africa *aequinoctiali, nitidus, magnitudine et ſtatura morionis.*

Aethiops. 320. C. ater, thorace ſtriga media impreſſa, tibiis ſpinoſiſſimis nigris. *Fabr. mant. inſ. 2. p. 296. n.* 173.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine oleracei.*

lugens. 321. C. fuſcus, thoracis lineola, ſcutello abdominisque margine albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 360. *n.* 133. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 174.
Habitat in America.

melanocephalus. 322. C. ſubrotundus griſeus, capite ſcutellique baſi nigro-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 360. *n.* 134. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 175.
Habitat in Anglia *et* Italia.

Lineola. 52. C. thorace laevi anterius atro, poſterius livido diſtincto punctis excavatis.
Habitat in America, *magnitudine fere tabani, capite atro, abdomine flavo, elytris incarnatis pallidisque.*

oleraceus. 53. C. caeruleo-aeneus, thorace lineola, ſcutello apice elytrisque puncto albo rubrove. *Fn. ſuec.* 934.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 492. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 126. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 165.
Raj. inſ. p. 54. *n.* 6. Cimex ſylveſtris caeruleſcens.
Geoffr inſ. par. 1. *p.* 471. *n.* 74.
Degeer inſ. 3. *p.* 266. *n.* 10. *t.* 15. *f.* 22.
Schaeff. icon. t. 46. *f.* 4. 5.
Stoll cimic. 2. *t.* 5. *f.* 32. 33.
Habitat in Europae *tetradynamis, quas* 1760 *in* Suecia *devaſtavit.*

pictus. 323. C. ſubrotundus ſupra ater, thorace lineis tribus, ſcutello linea punctisque quatuor, elytris margine ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 127. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 166.
Habitat in India.

verſicolor. 324. C. varius, capite abdomineque atris albo lineatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 167.
Habitat Tranquebariae, *ſtatura et magnitudine picti.*

biguttatus. 54. C. niger, margine undique albo, elytris puncto albo. *Fn. ſuec.* 935.* *Scop. ent. carn.* 356. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 128. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 168. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 493.

Habitat in Europae *plantis.*

bicolor. 55. C. elytris nigro alboque variis, alis albis. *Fn. ſuec.* 936.* *Scop. ent. carn.* 357. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 125. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 164. *Fueſſli inſ. helv. p.* 126. *n.* 494.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 470. *n.* 73. Cimex ovatus niger, thoracis lateribus elytrorumque maculis quatuor albis.

Degeer inſ. 3. *p.* 268. *n.* 12. Cimex ovatus niger nitidus, thorace elytris tibiisque ſpinoſis albo maculatis.

Raj. inſ. p. 54. *n.* 5. Cimex colore nigro ſplendente, maculis albis picto.

Liſt. ſcar. p. 396. *n.* 38. Cimex niger, maculis candidis notatus.

Petiv. gazoph. t. 14. *f.* 7. Cimex niger albo maculatus.

Schaeff. icon. t. 41. *f.* 8. 9.

Stoll cimic. t. 32. *f.* 224.

Habitat in Europae *hortis.*

ornatus. 56. C. nigro rubroque varius, capite alisque nigris. *Fn. ſuec.* 937.* *Scop. ent. carn.* 361. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 495. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 357. *n.* 119. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 155.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 469. *n.* 69.

Sulz. inſ. t. 11. *f.* 73.

Schaeff. icon. t. 60. *f.* 10.

Stoll cimic. 2. *t.* 2. *f.* 11.

Habitat in Europa *et* Oriente.

feſtivus. 57. C. nigro rubroque varius, thorace punctis ſex nigris, alis fuſcis: margine albido. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 490. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 120. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 156.

Scop. ent. carn. 362. Cimex dominulus.

Habitat in America *boreali*, Carniolia, Calabria, *ſtatura bicoloris, ſed magis oblongus.*

rutilus. 325. C. thorace abdomineque rufis, thorace maculis quatuor, abdomine faſciis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 121. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 157.

Habitat in nova Hollandia.

cruciatus. 326. C. nigro pallidoque varius, ſcutello nigro: cruce alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 122. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 158.
Habitat in India.

diſcoideus. 327. C. flaveſcens, capite diſco communi pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 159.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine ornati.*

bioculatus. 328. C. rotundatus ſupra niger, thorace rufo: punctis duobus nigris, ſcutello margine rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 123. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 160.
Habitat in America.

gramineus. 329. C. rotundatus viridis immaculatus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 161.
Habitat Tranquebariae, *parvus.*

fimbriatus. 330. C. rotundatus viridis, elytris griſeis: macula fuſca margineque viridi. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 162.
Habitat in Sina, *parvus.*

italicus. 331. C. obſcure rufus, ſcutello punctis duobus apiceque albis, abdominis margine nigro punctato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 124. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 162.
Habitat in Italia, *magnitudine oleracei.*

ruber. 58. C. ruber, alis fuſcis, elytris lineola tranſverſa alba. *Fn. ſuec.* 938.*
Habitat in Europae *urticis aliisque plantis.*

acuminatus. 59. C. ovalis anterius attenuatus cinereo-exalbidus, antennis incarnatis. *Fn. ſuec.* 939.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 498.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 360. *n.* 135. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 176. Cimex ovalis antice attenuatus exalbidus fuſco ſtriatus, antennis apice rufis.
Degeer inſ. 3. *p.* 271. *n.* 16. *t.* 14. *f.* 12. 13. Cimex roſtratus.
Raj. inſ. p. 56. *n.* 6. Muſca cimiciformis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 472. *n.* 77.
Liſt. mut. t. 31. *f.* 20.
Schaeff. icon. t. 42. *f.* 11.
Habitat in Europae *plantis.*

minutus. 61. C. elytris lividis apice fuſcis. *Fn. ſuec.* 941.*
Habitat in Europa.

collaris. 63. C. roſtro arcuato, corpore nigro, thorace poſterius elytrisque anterius ferrugineis, elytris poſterius alisque nigris.
Habitat in Guinea, *oblongus, magnitudine et ſtatura perſonati, an forte ejusdem cum eo tribus?*

javanicus. 332. C. luteus ano obtuſo, antennis pedibusque ferrugineis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 45.
Stoll cimic. t. 1. f. 2.
Habitat in Java, *glaber, inter maximos hujus generis.*

ſinenſis. 333. C. flaveſcens, ano quadridentato, ſterno porrecto. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 45. f. 59.*
Habitat in Japonia *et* Sina, *glaber, inter maximos hujus generis.*

brunneus. 334. C. ſupra brunneus ſubtus fuſcus, antennis piloſis. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 45.*
Habitat in India, *rufipede paulo major, glaber.*

Anchora. 335. C. rotundatus thorace elytrisque maculis ſex nigris, ſcutello anchora alba. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 47. f. 60.*
Habitat in Japonia *et* Sina, *griſei magnitudine, cruciato affinis.*

capenſis. 336. C. rotundatus niger, thoracis elytrorumque marginibus rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 47. f. 61.*
Habitat ad caput bonae ſpei, *oleraceo paulo major, glaberrimus.*

Thunbergii. 337. C. rotundatus nigro cinereoque varius ſcutello punctis duobus flavis, capite thoraceque albo lineatis. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 48. f. 62.*
Habitat - - - - griſei magnitudine, punctatiſſimus.

venoſus. 338. C. rotundatus ruber fuſco pictus, abdomine ſerie ſextuplici punctorum nigrorum. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 49.*
Habitat ad caput bonae ſpei, *oleracei magnitudine.*

coſtatus. 339. C. cinereus, linea elytrorum nigra. *Thunb. nov. inſ. ſp. p. 50. f. 63.*
Habitat in regionibus interioribus capitis bonae ſpei, *oleraceo paulo major, glaber.*

cornutus. 340. C. depreſſus cinereus, thorace lineis tribus elevatis, antennis fuſiformibus. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 50.*
Habitat in Japonia, *facie et magnitudine c. cardui, an hujus tribus?*

341. C.

melaleucos. 341. C. ater, elytris albis: maculis duabus nigris. *Thunb nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 50.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine ſcarabaeoidis, nitidus.*

hirtus. 342. C. ater, totus hirtus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 51.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine oleracei, opacus.*

niger. 343. C. ater, thorace tibiisque ciliatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 51.
Habitat ad caput bonae ſpei, *in* America *auſtrali,* India, *oleracei magnitudine, aterrimus.*

aterrimus. 344. C. ater, elytris dimidiato hyalinis. *Forſter nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 71. *n.* 71.
Habitat in Hiſpania, *circa* fretum Gaditanum, *magnitudine ornati.*

flavatus. 345. C. niger, ſcutello elytrisque apice lateribusque flavis, thoracis margine lineaque media flavis. *Schranck Beytr.* z. *Naturg. p.* 79. §. 34.
Habitat Vindobonae.

viennenſis. 346. C. caeruleo-aeneus, elytris margine albo. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 80. §. 35.
Habitat Vindobonae.

venuſtiſſimus. 347. C. argenteus, capite thoracis ſcutellique baſi violaceo-aeneis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 80. §. 36.
Habitat in Auſtria *ſuperiore.*

dubius. 348. C. atro-caeruleus punctatus nitens, thoracis elytrorumque margine exteriore albo. *Scop. ent. carn. p.* 121. *n.* 355.
Habitat in Carniolia.

aeneus. 349. C. pallide aeneus: punctis impreſſis nigris, ſcutello abdomen ſubaequante: baſi punctis duobus albis. *Scop. ent. carn. p.* 122. *n.* 358.
Habitat prope Idriam Carnioliae.

danicus. 350. C. niger, elytris faſciis duabus luteis. *Müll. Fn. Fridrichsd. p.* 29. *n.* 274. *zool. dan. prodr. p.* 106. *n.* 1202.
Habitat in Dania.

roſeus. 351. C. fuſcus, abdomine incarnato, pedibus pallidis: femoribus puncto nigro. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 105. *n.* 1197.
Habitat in Dania.

alatus. 352. C. rufus elytris alas mentientibus, antennis clavatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 106. *n.* 1204.
Habitat in Dania.

rufeſcens. 353. C. thorace obtuſe angulato, corpore e viridi rubroque nebuloſo. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 465. *n.* 62.
Habitat in Gallia.

pullus. 354. C. ex fuſco niger, alis pallidis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 470. *n.* 71.
Habitat in Gallia.

leucomelas. 355. C. niger, elytrorum limbo exteriore albo. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 470. *n.* 72.
Habitat in Gallia.

arboreus. 356. C. ſupra fuſco-viridis, ſubtus flaveſcens, thorace linea tranſverſa flava, elytris rubro marginatis, ano bidentato rubro. *Degeer inſ.* 3. *p.* 260. *n.* 7.
Habitat in Europae *arboribus*, 5 *lineas longus.*

puſillus. 357. C. griſeus albo marginatus nigro punctatus, abdomine aeneo nigro. *Degeer inſ.* 3. *p.* 270. *n.* 15.
Habitat in Europa.

parnaſſiae. 584. C. thorace rubro, alis fuſcis, corpore nigro. *Mayer Abh. boehm. Geſ.* 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiae *floribus parnaſſiae paluſtris, minimus, lente incedens, volatu agilis.*

fulvus. 597. C. fulvus, alis poſterius ex fuſco violaceis, abdomine ſubtus pallido: apice quadridentato. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 88.
Habitat extra Europam.

varius. 598. C. rotundatus ater, ſcutelli abdominisque marginibus, elytris thoraceque rubris: hoc anterius linea atra, membranis fuſcis, alis luteis apice fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 89.
Habitat extra Europam.

tricolor. 599. C. ſubrotundus vireſcens, margine undique flavo, antennis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 91.
Habitat in Europa.

600. C.

albidus. 600. C. ſubrotundus albidus, antennis nigris: geniculis albis, elytris livido rufoque variis, ſcutelli apice albo. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 93.
Habitat in Europa.

undatus. 601. C. ovalis pallidus, capite acuminato: lineis quatuor, ſcutelli thoracisque punctis, antennis elytrorumque rugis transverſis undatis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 97.
Habitat extra Europam.

palleſcens. 602. C. pallidus nigro punctatus thoracis ſcutellique apice elytrorumque marginibus externis albidis. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 98.
Habitat in Europa.

nigerrimus. 603. C. niger immaculatus. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 103.
Habitat in Europa.

melanoleucos. 604. C. ovatus niger, thorace elytrorumque margine exteriore albo. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 104.
Habitat in Europa.

ciliatus. 605. C. niger, capite, thorace elytrisque ciliatis et pedibus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 105.
Habitat in Europa.

exciſus. 606. C. griſeus, elytrorum membrana extus exciſa, abdomine nigro. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 106.
Habitat in Europa.

† †. *Oblongi.*

⊥ *antennis apice capillaribus.*

trifaſciatus. 67. C. corpore nigro rubroque vario.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 372. *n.* 202. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 267.
Cimex oblongus niger, antennis apice capillaribus, elytris faſciis tribus rufis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 8.
Habitat in Europa.

olivaceus. 358. C. elytris fuſco-ferrugineis baſi coccineis: puncto atro.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 372. *n.* 203. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 268.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 2.
Habitat in Germania.

ſeticornis. 359. C. ater, elytris fuſcis baſi pallidis apiceque puncto coccineo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 204. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 269.
Habitat Lipſiae, *capite rarius rufo.*

capillaris. 360. C. flaveſcens, elytris apice coccineis, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 205. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 270.
Habitat in Lipſiae *hortis.*

ſemiflavus. 68. C. corpore nigro, thorace pedibusque teſtaceis.
Habitat in Suecia, *ſtatura atri, capite antennarumque baſi pilis albis hirta teſtaceis.*

erythropus. 69. C. roſtro arcuato, thorace poſterius emarginato, pedibus rubris.
Habitat in Barbaria, *nigro rubroque varius, antennis fuſcis, elytris rufis, abdomine nigro: margine albo nigroque vario; an forte ad ultimam cimicum tribum relegandus?*

ater. 72. C. corpore atro. *Fn. ſuec.* 944. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 197. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 261.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 460. *n.* 54. Cimex oblongus ater, antennis ſeta terminatis.
Habitat in Europa *boreali, etiam* Calabria.

tyrannus. 361. C. ater, roſtro femoribusque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 198. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 262.
Habitat in Italia, *atro proxime affinis.*

Schach. 362. C. ater, capite ſcutello maculisque duabus elytrorum coccineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 199. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 263.
Habitat in Italia, *ſtatura tyranni.*

gothicus. 73. C. niger, ſcutello elytrorumque apicibus coccineis. *Fn. ſuec.* 966.* *Scop. ent. carn.* 381. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 501. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 206. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 271.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 445. *n.* 19. Cimex oblongus niger, thoracis lateribus ſcutelloque flavis, elytris antennis pedibusque flavo variegatis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 5.
Habitat in Europa, *frequens.*

tricolor. 363. C. ater, elytris apice macula coccinea. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 272.

Habitat

Habitat in Hiſpaniae *urtica*, *gothico proxime affinis*, *alis nigris*, *macula marginali transverſa pallida.*

umbratilis. 90. C. niger, elytris albo maculatis. *Fn. ſuec.* 951.*
Fabr. mant. inſ. 2. *p.* 305. *n.* 265. Cimex oblongus niger, elytris flavo lineatis apice faſcia alba, antennis apice capillaribus.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis*, *pedibus piceis.*

flavicollis. 364. C. niger, capite thorace pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 201. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 266.
Habitat in Anglia.

inclavatus. 97. C. niger, elytris fuſcis: faſciis duabus nigris.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 371. *n.* 200? *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 264? Cimex (bifaſciatus) oblongus fuſcus, elytris faſciis duabus albis, antennis apice capillaribus.
Habitat Lipſiae.

cimbricus. 365. C. thorace elytrisque rubellis: apice macula coccinea, nigra dupliciquealba. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 106. *n.* 1212.
Habitat in Dania; *an varietas gothici?*

trilineatus. 366. C. niger, thorace pedibusque cinereis, elytris fuſcis: lineolis transverſis tribus candidis. *Müll zool. dan. prodr. p.* 106. *n.* 1213.
Habitat in Dania.

ſpiſſicornis. 367. C. niger, pedibus flavis, antennis incraſſatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 207. *mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 273.
Habitat Hamburgi.

planicornis. 368. C. niger, alis lacteſcentibus, pedibus ex griſeo luteſcentibus, antennarum articulo medio compreſſo maximo. *Pall. ſpic. zool.* 9. *p.* 23. *t.* 1. *f.* 13.
Habitat in Belgio, *parvus.*

haſticornis. 369. C. rufus, pectore abdomineque faſciis albis nigrisque, antennarum articulo penultimo compreſſo rotundato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 53. *f.* 64.
Habitat in Aittonia *capenſi*, *ad* caput bonae ſpei, *Decembri frequens*, *glaber*, *perſonati magnitudine.*

punctipes. 607. C. flaveſcens, femoribus fuſco punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 137.
Habitat in Europa.

quadrimaculatus. 608. C. flaveſcens, thorace maculis quatuor fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 138.
Habitat in Europa.

fuliginoſus. 609. C. niger, capite thorace elytrisque rufeſcentibus, thorace poſterius fuſco, ſcutello flaveſcente, elytrorum apice inflexo coccineo. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 139.
Habitat in Europa.

erythrochlorus. 610. C. oblongus rufeſcens, thorace ſcutelloque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 140.
Habitat in Europa.

chryſocephalus. 611. C. niger, capite flavo: linea longitudinali nigra, elytris ex fuſco rufis: apice inflexo coccineo. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 141.
Habitat in Europa.

ſtramineus. 612. C. niger, elytris pallidis: apice inflexo coccineo. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 142.
Habitat in Europa.

concolor. 613. C. fuſcus, capite thoraceque rufis, antennis ſcutelloque flavis, pedibus pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 143.
Habitat in Europa.

tomentoſus. 614. C. capite thoraceque fuſcis fulvo tomentoſis, abdomine rufo, elytris fuſco pallidis: apice inflexo flavo, puncto extremo nigro. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 144.
Habitat in Europa.

melanochryſos. 615. C. niger, ſcutello poſterius, elytris apice inflexo flavis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 145.
Habitat in Europa.

bivenis. 616. C. niger, elytris e flavo fuſcis: apice inflexo flavo venisque duabus rubris. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 146.
Habitat in Europa.

leucozonias. 617. C. anguſtus niger, antennis baſi rubris, thorace poſterius ſcutelloque flavis, elytris rufis: faſcia obliqua apiceque inflexo albis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 147.
Habitat in Europa.

tricolor. 618. C. niger, elytris flavis: faſcia transverſa apiceque fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 148.
Habitat in Europa.

ochromelas. 619. C. niger, antennarum elytrorumque baſi, horum apice inflexo pedibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 149.
Habitat in Europa.

exoletus. 620. C. niger, thorace poſterius tibiis elytrisque pallidis, horum apice inflexo rufo marginato. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 150.
Habitat in Europa.

phoenicopterus. 621. C. fuſcus, capite thorace elytrisque rufeſcentibus, antennis pedibusque pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 151.
Habitat in Europa.

fuſcoculus. 622. C. flavus, oculis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 152.
Habitat in Europa.

leucogrammus. 623. C. ſupra rufeſcens, capite dorſali, abdomine ſubtus utrinque linea alba, thoracis tribus, elytris medio et margine externo albis: apice inflexo flavo. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 153.
Habitat in Europa.

expalleſcens. 624. C. fuſcus, capite ventre elytrisque pallidis, his fuſco ſubnebuloſis, thorace ſubconico: lineolis tribus fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 154.
Habitat in Europa.

flaveſcens. 625. C. pallide flavus. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 155.
β) Cimex flaveſcens, capite utrinque, ſcutello baſi elytrisque apice inflexo fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 156.
Habitat in Europa.

palleſcens. 626. C. pallidus rufo adſperſus. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 158.
β) Cimex pallidus rufeſcens, ſcutello flavo. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 159.
Habitat in Europa.

leucodermis. 627. C. ovatus pallidus: membrana elytrorum alba. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 162.
Habitat in Europa.

diſcolor. 628. C. niger, elytris griſeis: apice membranarumque apice albis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 160.
Habitat in Europa.

imperialis. 629. C. niger, elytrorum margine externo, baſi et apice inflexo flavis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 161.
Habitat in Europa.

630. C.

melanorhous. 630. C. antennis, thoracis margine, ſcutelli apice, pedibus et abdomine flavis, hujus apice nigro. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 163.
Habitat in Europa.

vittatus. 631. C. niger, thorace anterius poſteriusque ſcutelloque flavis, antennarum baſi elytrisque rufis: vitta apiceque inflexo albis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 164.
Habitat in Europa.

melanogaſter. 632. C. ovatus rufeſcens abdomine medio ſubtus atro. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 166.
Habitat in Europa.

ſordens. 633. C. ovatus niger, thorace pedibusque rufis, his fuſco variis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 167.
Habitat in Europa.

vitellinus. 634. C. ovatus flavus, elytris apicem verſus rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 168.
Habitat in Europa.

haematocephalus. 635. C. ovatus niger, elytris rufo-fuſcis: apice capiteque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 169.
Habitat in Europa.

leoninus. 636. C. ovatus flavo-rufus, thorace anterius maculis duabus nigris, elytris pallidis: apice inflexo fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 170.
Habitat in Europa.

carbonarius. 637. C. ovatus totus niger. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 171.
Habitat in Europa.

notatus. 638. C. ovatus pallidus, elytrorum apice inflexo: ſingulis angulo puncto fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 172.
Habitat in Europa.

diſcors. 639. C. ovatus ſupra pallidus ſubtus flavus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 173.
Habitat in Europa.

fuſceſcens. 640. C. ovatus niger, capite elytrisque pallidis: margine externo apiceque inflexo fuſceſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 174.
Habitat in Europa.

melanopterus. 641. C. ovatus fuſcus, elytris nigris: baſi, medio marginis antici apiceque inflexo, capite et thorace anterius flavis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 175.
Habitat in Europa.

leucoceras. 642. C. fuſcus, antennis, elytris pedibusque albidis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 176.
Habitat in Europa.

ochropterus. 643. C. ater, thorace, elytris pedibusque flaveſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 177.
Habitat in Europa.

melanoleucos. 644. C. ovatus niger, capite, thoracis dorſo, elytrorumque faſcia media et apice inflexo albis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 178.
Habitat in Europa.

erythrogaſter. 645. C. ovatus, thorace anterius nigro capite elytrisque pallidis: punctis apiceque inflexo fuſcis, abdomine rufeſcente. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 179.
Habitat in Europa.

ſticticus. 646. C. ovatus niger, capite elytrisque pallidis, femoribus nigro punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 180.
Habitat in Europa.

nubilus. 647. C. ovatus niger, elytris albis fuſco nebuloſis, pedibus rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 181.
Habitat in Europa.

leucopus. 648. C. fuſcus, antennis, thorace, elytris pedibusque albidis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 182.
Habitat in Europa.

conſperſus. 649. C. ovatus rufeſcens, elytris albis rufo adſperſis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 183.
Habitat in Europa.

chloropterus. 650. C. pallidus, thorace, elytris abdomineque vireſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 184.
Habitat in Europa.

albicans. 651. C. ovatus pallidus, alis albis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 185.
Habitat in Europa.

albidus. 652. C. ovatus rufeſcens, elytris antennis pedibusque albidis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 186.
Habitat in Europa.

653. C.

brunneus. 653. C. ovatus brunneus, alis albis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 187.
Habitat in Europa.

chryſopus. 654. C. ovatus niger, capite elytrorum margine externo pedibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 188.
Habitat in Europa.

II *antennis clavatis.*

Branderi. 66. C. roſtro arcuato, thorace ſubſexſpinoſo, elytris punctis tribus albis.
Habitat in Barbaria, *mediae magnitudinis, griſeus, ſubtus teſtaceus, antennis rufis, ſtatura perſonati.*

craſſicornis. 92. C. ſubgriſeus rubro punctatus. *Fn. ſuec.* 952.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 188. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 139.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 10.
Habitat in Europa.

Colon. 370. C. rubro nigroque varius, membranis elytrorum albis: puncto nigro. *Thunb. nov. inſ. ſpec.* 3. *p.* 57.
Habitat in Japonia, *campeſtris magnitudine.*

deuſtus. 371. C. rufo-fuſcus, ſcutelli apice, thoracis abdominisque marginibus rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 58.
β) Stoll cimic. t. 13. *f.* 87.
Habitat - - - magnitudine c. hyoſcyami.

tuberculoſus. 372. C. abdomine ſupra rufo, antennarum nodis binis: extremo longiore. *Scop. ent. carn. p.* 128. *n.* 372.
Habitat prope Idriam Carnioliae.

Oculus cancri. 373. C. ex livido flavus: maculis ſanguineis, oculis capitulo cylindrico inſidentibus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 343. *n.* 18. *t.* 34. *f.* 24.
Habitat in Surinamo.

moeſtus. 374. C. fuſcus, ſubtus rufo-lividus, thoracis margine livido. *Degeer inſ.* 3. *p.* 340. *n.* 14. *t.* 34. *f.* 20.
Habitat in Penſylvania.

ſubrufus. 677. C. pallide rufus, elytrorum feneſtratorum apice, clava, ſcutelloque rufis, hujus apice pallido. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 119.
Habitat in Europa.

ſtictopterus. 678. C. niger, elytris griſeis punctatis: apice maculis tribus fuſcis, membrana alba truncata, antennis pallidis: clava nigra. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 120. b.
Habitat in Europa.

ictericus. 679. C. fuſcus, capite thoraceque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 130.
Habitat in Europa.

111 *antennis filiformibus.*
+ *pedibus muticis.*

leucocephalus. 60. C. niger, capite pedibusque fulvis. *Fn. ſuec.* 940.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 192. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 255.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 472. *n.* 76.
Degeer inſ. 3. *p.* 290. *n.* 28.
Habitat in Europa.

transverſalis. 375. C. viridis, thorace lineola interrupta, elytris macula fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 256.
Habitat Kilonii, *ſtatura leucocephali, at duplo minor.*

haematodes. 376. C. ſanguineus, capite elytrorumque apicibus albidis, alis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 193. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 257.
Habitat in Germania.

tripuſtulatus. 377. C. niger, ſcutello maculisque elytrorum tribus coccineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 194. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 258.
Habitat in urticae dioicae *racemis,* Hafniae *frequens, parvus.*

Indus. 74. C. abdomine rubro bidentato, elytris fuſcis pallide ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 176.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 140. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 183.
Habitat in America *auſtrali et* India.

militaris. 378. C. rufus nigro maculatus, alis exalbidis: ſtriga baſeos atra. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 141. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 184.
Habitat in Oriente.

laniarius. 75. C. rufus, elytris apice ſanguineis, thorace nigricante, abdomine flavo.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis.*

hyoſcyami. 76. C. rubro nigroque varius, alis fuſcis immaculatis. *Fn. ſuec.* 945.* *It. oel.* 155.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 144. *mant.*

mant. inſ. 2. *p.* 298. *n.* 189. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 502.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 441. *n.* 12. Cimex oblongus rubro nigroque variegatus, ſcutelli nigri apice rubro.

Degeer inſ. 3. *p.* 274. *n.* 18. *t.* 14. *f.* 14. 15. Cimex oblongus ruber nigro maculatus &c.

Liſt. ſcar. angl. p. 397. *n.* 39. Cimex miniatus nigris maculis notatus.

Raj. inſ. p. 55. Cimex ſylveſtris minor, corpore oblongo anguſto.

Petiv. gazoph. t. 62. *f.* 2.

Merian. inſ. eur. t. 51. *f.* 1.

Sulz. inſ. t. 11. *f.* 75.

Schaeff. icon. t. 13. *f.* 1.

familiaris. 379. C. rubro nigroque varius, alis fuſcis: puncto baſeos albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 363. *n.* 145. *mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 190.
Habitat in Europae *et* Indiae *plantis, ſtatura et magnitudine c. hyoſcyami.*

roſtratus. 380. C. rufus, ſcutello vitta marginali flava. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 363. *n.* 146. *mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 191.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

malabaricus. 381. C. fuſceſcens, thorace ſcutelloque punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 363. *n.* 147. *mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 192.
Habitat ad littora malabarica.

aulicus. 382. C. rubro nigroque varius, elytris faſcia atra, alis atris: lineola baſis alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 363. *n.* 148. *mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 193.
β) Cimex irroratus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 55. *f.* 65.
Habitat in inſulis Americae *meridionali oppoſitis,* β) *ad* caput bonae ſpei.

383. C.

Huc inter oblongos ſcilicet cimices referas plures a Seba *muſ. vol.* 4. *delineatas ſpecies, productiorem t.* 95. *f.* 28. *pallide vireſcente flavum t.* 95. *f.* 29. *ſphaerico-collarem t.* 95. *f.* 30. *ſetaceum t.* 95. *f.* 35-37. *luteo-fuſcum t.* 97. *f.* 3. *nigro-rufum t.* 97. *f.* 5. *apterum ſerratum t.* 97. *f.* 12. *informem t.* 97. *f.* 21. 22. *nigricantem t.* 97. *f.* 23. *brunneo-atrum t.* 97. *f.* 24. 25. *ſetipedem t.* 97. *f.* 28, 29. *ſordidum t.* 97. *f.* 30. 31. *fuſco diſcolorem t.* 97 *f.* 32. *nigro-cineraſcentem t.* 97. *f.* 33. 34. *ovatis contra accenſeas foliaceum t.* 96. *f.* 28. *peltoidem t.* 96. *f.* 29. *rubripedem t.* 97. *f.* 2. *et plures a* Schaeffero *in iconibus depictos t.* 46. *f.* 6. *t.* 46. *f.* 7. 8. *t.* 57. *f.* 4. *t.* 57. *f.* 5. *t.* 57. *f.* 10. *t.* 57. *f.* 11. *t.* 79. *f.* 4. *t.* 170. *f.* 4. 5. *t.* 210. *f.* 3. a. b. *t.* 219. *f.* 3. a. b. *t.* 250. *f.* 5. 6. *t.* 272. *f.* 3. 4. *t.* 272. *f.* 5. 6. *quorum deſcriptio ab* Hanero *exſpectanda.*

varicornis. 383. C. variegatus, capite pedibuſque rufis, thoracis marginibus pallidis. *Fabr. mant. inſ. 2. p.* 298. *n.* 194.
Habitat in India, *magnus.*

pallens. 384. C. palleſcens, thorace elytrisque fuſcis: margine pallido. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 363. *n.* 149. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 195.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

cingulatus. 385. C. thorace teſtaceo anterius nigro: margine albo, elytris puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 150. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 196.
Habitat in nova Hollandia.

ſuperſtitiolus. 386. C. rufus, antennis, thoracis baſi, faſcia elytrorum alisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 151. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 197.
Thunb. nov. inſ. ſp. 3. *p.* 55. *f.* 66. Cimex oblongus rufus, thorace faſcia nigra albo adjecta, elytris puncto nigro.
Habitat in America *et ad* caput bonae ſpei, *equeſtris magnitudine.*

erythromelas. 387. C. rufus, elytris nigris: faſcia alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 152. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 198.
Degeer inſ. 3. *p* 335. *n.* 9. *t.* 34. *f.* 11. Cimex albo faſciatus.
Habitat in Surinamo, *thoracis elytrorumque margine albido.*

ruficollis. 388. C. glaucus, capite atro, thorace anterius rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 153. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 199.
Habitat in Braſilia.

ſcabroſus. 389. C. niger, thoracis margine elytrorumque faſciis duabus rufeſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 154. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 200.
Habitat in America.

leproſus. 390. C. thorace nigro, baſi margine punctisque duobus rubris, elytris atris immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 155. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 201.
Habitat in America.

leucurus. 391. C. niger, capite elytrisque rubris, alis atris baſi apiceque albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 299. n. 202.
Habitat in inſula oceani auſtralis Amſterdam, *magnitudine c. Koenigii.*

Koenigii. 392. C. teſtaceus, elytris puncto nigro, alis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 156 *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 203.
Stoll cimic. 2. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat Tranquebariae.

Slanbuſchii. 393. C. ſanguineus, thorace faſcia abbreviata, ſcutello, elytris puncto aliſque atris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 204.
Habitat in Sina, *ſtatura et magnitudine c. Koenigii.*

equeſtris. 77. C. rubro nigroque maculatus, thorace anterius poſteriusque atro, alis atris albo maculatis. *Fabr. mant.* 2. *p.* 298. *n.* 185.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 726. *n.* 777. *Fn. ſuec.* 946.* *It. oel.* 155. *Muſ. Lud. Ulr.* 177. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 142. Cimex oblongus rubro nigroque varius, alis fuſcis albo maculatis.
Scop. ent. carn. 369. Cimex ſpecioſus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 442. *n.* 14.
Degeer inſ. 3. *p.* 276. *n.* 19.
Schaeff. elem. t. 44. *f.* 2.
icon. t. 48. *f.* 8.
Habitat in Europae *potiſſimum vincetoxico, c. hyoſcyami duplo major.*

civilis. 394. C. rubro nigroque varius, thorace lunulis duabus nigris, alis fuſcis albo maculatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 186.
Habitat Tranquebariae, *equeſtri affinis.*

crudelis. 395. C. rubro nigroque varius, alis exalbidis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 143. *mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 187.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura equeſtris.*

apterus. 78. C. rubro nigroque varius, elytris rubris: punctis duobus nigris, alis nullis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 366. *n.* 169. *mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 222. *Scop. ent. carn.* 370. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 504.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 440. *n.* 11. *t.* 9. *f.* 4.
Degeer inſ. 3. *p.* 276. *n.* 20.
Raj. inſ. p. 55. *n.* 3.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 14.
Stoll cimic. 2. *t.* 15. *f.* 103.
Habitat gregarius in Europa, *rarius in malva ſilveſtri, interdum alatus.*

ſtriatulus. 396. C. flaveſcens, ſcutello elytris alisque fuſcis, elytris apice cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 366. *n.* 170. *mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 224.
Habitat in Braſilia.

nuſſax. 397. C. fuſcus, abdominis margine maculato, tibiis anterioribus femoribusque poſterioribus baſi pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 366. *n.* 171. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 223.
Habitat in Italia, *mediae magnitudinis.*

aegyptius. 79. C. rubro nigroque varius, elytris rubris: puncto nigro. *Muſ. Lud. Ulr.* 178.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 157. *mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 205.
Habitat in Aegypto.

mendicus. 398. C. rubro fuſcoque varius, alis atris: apice lineolaque baſeos albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 158. *mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 200.
Habitat in Malabaria.

ſervus. 399. C. rubro nigroque varius, elytris apice albis, alis nigris apice albidis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 207.
Habitat in Sina, *parvus, ſtatura mendici.*

famelicus. 400. C. ſupra ater thorace elytrisque punctis duobus flaveſcentibus, alis lineola baſeos alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 159. *mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 208.
Stoll cimic. 2. *t.* 8. *f.* 56?
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.*

quadriguttatus. 401. C. elytris rufis: faſcia nigra, alis punctis duobus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 160. *mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 299.
Habitat in nova Hollandia.

diſcolor. 402. C. niger, elytris rufis: puncto medio atro, alis atris: punctis duobus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 161. *mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 210.
Habitat in Italia, *parvus.*

auſtralis. 403. C. elytris rufis: ſtriga undata nigra, alis nigris: puncto medio albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 162. *mant. inſ* 2. *p.* 300. *n.* 211.
Habitat in nova Hollandia.

ſanguinolentus. 404. C. ſanguineus, antennis elytris pedibusque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 163. *mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 212.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

hiſpanicus. 405. C. thorace elytrisque rufis: maculis duabus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 300. *n.* 213.
Habitat in Hiſpania, *magnitudine et ſtatura ſanguinolenti.*

cruentatus. 406. C. rufus, thoracis maculis duabus, antennis, alis pedibusque fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 214.
Habitat in India, *ſanguinolento proxime affinis.*

ſuturalis. 407. C. rufus, antennis alisque nigris: ſuturis omnibus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 164. *mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 215.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

rubiginoſus. 408. C. ſupra rufus, alis albidis: macula magna fuſca. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 216.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſuturali major.*

excavatus. 409. C. rufus, antennis, pectore, ano pedibusque atris, ſcutello canaliculato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 365. *n.* 165. *mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 217.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *magnus.*

fuscatus. 410. C. ſanguineus, thoracis lineis, ſcutello, alis, ano pedibusque atris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 218.
Habitat in Guinea, *magnus.*

Carnifex. 411. C. rufus, antennis tibiisque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 366. *n.* 166. *mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 219. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 51.
Habitat ad caput bonae ſpei, *potiſſimum in tanaceto crithmifolio, magnitudine c. Rolandri.*

Augur. 412. C. rufus, antennis alis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 366. *n.* 167. *mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 220. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 57.
Stoll cimic. 2. *t.* 18. *f.* 124.
β) *Stoll cimic.* 2. *t.* 13. *f.* 89.
Habitat ad caput bonae ſpei, India, Sina, *carnifici affinis, equeſtri major.*

mactans. 413. C. ſupra rufus, thorace ſcutelloque punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 366. *n.* 168. *mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 221.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

80. C.

Andreae. 80. C. ſanguineus, antennis tibiis roſtro alisque nigris. *Muſ Lud. Ulr.* 179.*
Sloane jam. 2. *p.* 237. *f.* 29. 30. Cimex ſylveſtris oblongus e cinereo et nigro variegatus, ſupina parte cruce S. Andreae notatus.
β) Cimex ruficollis. *Muſ. Lud. Ulr.* 180.
γ) Cimex thorace nigro. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 56.
Habitat in America. γ) *in* Japonia.

ſaxatilis. 81. C. niger, thoracis margine laterali lineaque rubris, elytris maculis tribus rubris. *Scop. ent. carn.* 371. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 188.
Habitat in Europa *magis auſtrali, ſubtus rubro nigroque varius, capitis macula rubra anterius bifida.*

ſuccinctus. 82. C. thoracis elytrorumque margine exteriore femorumque baſi rufis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 400. *n.* 44. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 185. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 241.
Degeer inſ. 3. *p.* 339. *n.* 13. *t.* 34. *f.* 19. Cimex rubrocinctus.
Habitat in Americae *borealis plantis.*

tunicatus. 414. C. ſupra ferrugineo-fuſcus, corpore elytrorumque margine flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 186. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 242.
Habitat in Germania, *antennis rufis: articulorum apice nigro.*

pubicornis. 415. C. rufus, antennis, pectore elytris tibiisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 187. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 243.
Habitat in America.

Kalmii. 83. C. viridis, ſcutello macula cordata flava, elytris maculis duabus nigris. *Fn. ſuec.* 948.*
Habitat in Europa.

ſuperciliosus. 84. C. niger, palpebra elytrorumque margine albis.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis.* Modeer.

pratenſis. 86. C. flaveſcens, elytris viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 190. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 247.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 728. *n.* 86. *Fn. ſuec.* 949.* *Scop. ent. carn.* 386. Cimex oblongus griſeus, ſcutello macula cordata flava, elytris apice puncto fuſco.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 451. *n.* 33.
Habitat in Europae *pratis frequens.*

floralis. 416. C. ſupra obſcure griſeus, elytris apice puncto rubro, femoribus poſterioribus elongatis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 248.

 Habitat

Habitat in Hafniae *floribus*, *ſtatura pratenſis*, *antennis pallidis.*

norwegicus. 417. C. viridis, thorace bipunctato, elytris pallidioribus: puncto apicis flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 191. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 249.
Habitat in Norwegiae *plantis.*

inquinatus. 418. C. flaveſcens, elytris nigris albo variis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 250.
Habitat Kilonii, *mediae magnitudinis.*

naſſatus. 419. C. viridis, antennis pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 251.
Habitat Hafniae *in tilia*, *parvus*, *immaculatus.*

tiliae. 420. C. vireſcens, faſciis tribus fuſcis; media angulata. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 218. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 252.
Habitat Kilonii.

campeſtris. 87. C. flaveſcens, elytris macula ferruginea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 189. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 246.
Syſt. nat. XII. 2. *p* 728. *n.* 87. *Fn. ſuec.* 950.* Cimex oblongus viridis, ſcutello macula cordata viridi, elytris macula ferruginea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 452. *n.* 34.
Habitat iu Europae *campis.*

nemoralis. 421. C. niger, thorace elytrisque flaveſcentibus, ſcutello macula diſci nigra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 245.
Habitat in Barbaria, *ſtatura et magnitudine campeſtris.*

melanocephalus. 88. C. niger, thorace, elytris antennis pedibusque pallidis.
Habitat in Suecia, *parvus.* Solander.

hiſtrionicus. 89. C. niger, ſcutello flavo, elytris pedibusque teſtaceis.
Habitat in Europa, *magnitudine culicis.*

nemorum. 91. C. niger, elytris alisque fuſco alboque variis, pedibus teſtaceis. *Fn. ſuec.* 953.*
Habitat in Europa.

ſaltatorius. 93. C. niger, elytris ſtriatis, alis poſterius flavo maculatis. *Fn. ſuec.* 954.* *It. oel.* 121. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 196. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 260.
Raj. inſ. p. 57. *n.* 2. Cimex brevis et fere rotundus nigricans.
Habitat in Europa *ad littora.*

trigutta-tus. 94. C. niger, elytris aliſque apice puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 195. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 259.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 729. *n.* 94. Cimex oblongus niger, elytris teſtaceis: punctis tribus niveis; interiore minore.
Habitat in Europa, *pediculi magnitudine.*

arenarius. 95. C. niger, elytris cinereis, alis albis. *Fn. ſuec.* 955.* *It. oel.* 121. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 184. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 240.
Habitat in Europa *boreali frequens.*

pini. 96. C. ater, elytris fuſcis: macula rhombea atra. *Fn. ſuec.* 956. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 367. *n.* 173. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 227.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 449. *n.* 28.
Degeer inſ. 3. *p.* 279. *n.* 22. *t.* 14. *f.* 22.
Schaeff. icon. t. 42. *f.* 12.
Habitat frequens in Europae *borealis pinetis.*

ſylvaticus. 422. C. ater, elytris fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 367. *n.* 174. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 228.
Habitat in Europae *borealis nemoribus.*

Rolandri. 97. C. ater, alis macula rhombea flava. *Fn. ſuec.* 957. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 367. *n.* 175. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 229. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 511.
Degeer inſ. 3. *p.* 294. *n.* 33. Cimex fulvo maculatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 459. *n.* 51.
Sulz. inſ. t. 11. *f.* 76.
Schaeff. icon. t. 87. *f.* 7.
β) Cimex bimaculatus. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 449. *n.* 76.
Habitat in Europae *pinetis.*

Forſteri. 423. C. ater, ſcutelli apice, thoracis elytrorumque margine ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 368. *n.* 176. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 230.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine c. Rolandri.*

ſqualidus. 424. C. niger, thorace poſterius, elytris pedibusque griſeis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 231.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis.*

ſexpuſtulatus. 425. C. niger, thorace elytrisque maculis duabus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 368. *n.* 177. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 232.
Habitat in Jamaica.

lynceus. 426. C. niger, elytris griſeis: apice macula nigra; puncto albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 368. *n.* 178. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 233.
Habitat in Angliae *et* Calabriae *plantis.*

urticae. 427. C. niger, elytris griſeis, alis albis: puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 368. *n.* 179. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 234.
Habitat in Angliae *urtica.*

Lundii. 428. C. niger, elytris fuſcis apice nigro punctatis, alis nigris puncto baſeos apicisque albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 368. *n.* 180. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 235.
Habitat Hafniae, *parvus ſtatura lyncei.*

lunaris. 429. C. niger, thorace maculato, elytris lunula marginali flava. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 237.
Habitat in Cayenna, *ſtatura lyncei.*

ferrugineus. 99. C. ferrugineus, capite thorace ſcutelloque nigris.
Habitat in Suecia, *c. Rolandri ſimilis.*

populi. 109. C. albo fuſcoque nebuloſus. *Fn. ſuec.* 963. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 219. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 253.
Habitat in Europae *populo tremula.*

coryli. 121. C. niger, pedibus antennisque flavis. *Fn. ſuec.* 974.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 188. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 244.
Habitat in Europae *borealis corylo.*

S. Crucis. 430. C. ſupra obſcure griſeus, ſcutello linea dorſali albida. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 226.
Habitat in inſula S. Crucis oceani americani, *parvus.*

agilis. 431. C. thorace atro: margine poſteriore flavo, elytris fuſcis, baſi apiceque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 220. *mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 274.
Degeer inſ. 3. *p.* 295. *n.* 34. Cimex flavo quadrimaculatus.
Habitat in Germania, *ſtatura et magnitudine c. populi.*

Daldorfii. 432. C. flaveſcens, capite ſcutellique margine atris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 275.
Habitat Kilonii, *parvus.*

multicolor. 433. C. ſupra ſanguineus, thorace elytris ſcutelloque albo marginatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 52.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine pratenſis, ſubtus cinereus vel lividus, glaber, capite rufeſcente.*

adſperſus. 434. C. ſupra ferrugineus: margine fuſco, ſubtus cinereus nigro punctatus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 53.
Habitat - - - magnitudine equeſtris, glaber.

hexophthalmus. 435. C. ſupra cinereus, ſubtus albus pectore faſciis tribus ſanguineis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 54.
Habitat ad caput bonae ſpei, *annulati magnitudine, capite rubro medio nigro, antennis pedibusque nigris.*

albidus. 436. C. rubro nigroque varius, membrana elytrorum nivea. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 56.
Stoll cimic. t. 2. *f.* 80.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* Surinamo, *punctis lineisque rubris nigrisque varius, equeſtris magnitudine, antennis, roſtro, ſcutello pedibusque nigris.*

purpureus. 437. C. ſanguineus, capite, membrana elytrorum pedibusque nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 57. *f.* 67.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaberrimus, ſtatura annulati, at multo anguſtior, immaculatus, capite antennisque nigris.*

nebuloſus. 438. C. flaveſcens, thorace lineis quatuor, elytris faſciis tribus fuſcis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 59.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine campeſtris, glaber.*

cafer. 439. C. niger, thorace faſcia alba, elytris ferrugineis: maculis quatuor albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 59. *f.* 70.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaber, ſtatura et magnitudine arenarii.*

Candelabrum. 440. C. niger, rubro viridique notatus, thoracis baſi rubra candelabrum referente: candela ſupra caput porrecta.
Drury inſ. 1. *p.* 107. *t.* 45. *f.* 1.
Habitat in inſula Antigua.

claviger. 441. C. niger, elytris maculatis, abdominis inciſuris rubris, thorace incarnata: ſtriis obliquis nigris, maculaque clavaeformi cinerea.
Drury inſ. 1. *p.* 109. *t.* 45. *f.* 5.
Habitat in Antigua *inſula.*

triops. 442. C. griſeus, elytris punctis tribus nigris in longitudinem diſpoſitis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 107. *n.* 1216.
Habitat in Dania.

inauratus. 443. C. flaveſcens, thorace linea interrupta nigra, elytris duabus obliquis luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p,* 107. *n.* 1221.
Habitat in Dania.

hirtus. 444. C. niger, elytris litura longitudinali pallida. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1234.
Habitat in Dania.

cantharinus. 445. C. niger, thorace unidentato: circulo albo, elytris cinereis: maculis quatuor ſcutelloque luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1235.
Habitat in Dania.

ſexmaculatus. 446. C. ater, elytris maculis ſex pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1238.
Habitat in Dania.

deſes. 447. C. niger, thorace lineis tribus ſcutello margineque elytrorum flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1239.
Habitat in Dania.

rubellus. 448. C. ſanguineus, elytris membranaceis albis, antennis pedibusque pallidis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1241.
Habitat in Dania.

ochromelas. 449. C. luteus, thorace punctis quatuor elytrisque ſtriis ſex nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1242.
Habitat in Dania.

leucoſtictos. 450. C. ſanguineus, thorace linea transverſa nigra, elytris apicem verſus puncto albo. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1243.
Habitat in Dania.

gallorum. 451. C. niger, antennis brevioribus, elytris fuſcis: macula flaveſcente alboque. *Degeer inſ.* 3. *p.* 279. *n.* 23.
Habitat in plantarum *partibus ab aphidibus devaſtatis et relictis, pediculi magnitudine.*

fulvus. 452. C. flavo-fulvus, elytris fuſcis: vaſis fulvis, pedibus nigro maculatis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 341. *n.* 16. *t.* 34. *f.* 22.
Habitat in Surinamo.

erythrochlorus. 453. C. fuſcus, thorace anterius flavo, elytrorum baſi rubra: macula media flava. *Degeer inſ.* 3. *p.* 342. *n.* 17. *t.* 34. *f.* 23.
Habitat in Surinamo, *muſcae domeſticae magnitudine.*

454. C.

nanus. 454. C. flavo-teſtaceus, oculis nigris prominentibus, thorace maculis quatuor, elytriſque faſciis nigris. *Degeer inſ.* 3. *p.* 343. *n.* 19. *t.* 34. *f.* 25.
Habitat in Surinamo.

arcuatus. 455. C. niger, roſtro arcuato, elytris albidis: macula alba arcuque nigro, femoribus quatuor clavatis rubris. *Degeer inſ.* 3. *p.* 346. *n.* 21. *t.* 35. *f.* 4.
Habitat in Surinamo, *muſcae domeſticae magnitudine; an hujus tribus?*

erythrozonias. 456. C. nigro-fuſcus, roſtro arcuato, thoracis abdominisque margine faſciiſque transverſis rubris. *Degeer inſ.* 3. *p.* 349. *n.* 24. *t.* 35. *f.* 12.
Habitat in India, *magnus.*

bifurcatus. 457. C. nigricans, abdomine luteo bifurcato.
Schaeff. icon. t. 11. *f.* 15. 16.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

triangularis. 458. C. luteo-nigricans, thorace nigro triangulari: macula media lutea, elytrorum apice maculis binis coccineis.
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 2.
Habitat in Germania, *antennarum articulis tribus.*

haematoſtictos. 459. C. luteus, elytris maculis duabus ſanguineis.
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 3.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

digrammus. 460. C. flavicans: maculis rubentibus, elytrorum apice lineolis duabus albidis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 9.
Habitat in Germania.

quinquepunctatus. 461. C. fuſco-nigricans: dorſo punctis quinque albis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 12.
Habitat in Germania.

Rubecula. 462. C. collo thoraceque rubicundo, pedibus rubris.
Schaeff. ic. t. 112. *f.* 7.
Habitat in Germania.

ſtolatus. 463. C. laete ſanguineus, elytris ſtriis duabus nigris longitudinalibus.
Schaeff. icon. t. 119. *f.* 3.
Habitat in Germania.

ſexſtriatus. 464. C. fulvo-nigricans, elytrorum margine ſtriis tribus nigris. *Schaeff. icon. t.* 185. *f.* 4. 5. a. b.
Habitat in Germania.

M flavum. 465. C. nigricans, thorace elytrorumque marginibus M flavum referentibus.
Schaeff. ic. t. 199. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

V. flavum. 466. C. flavo luteoque varius, thoracis margine V flavum referente.
Schaeff. ic. t. 199. *f.* 6. 7.
Habitat in Germania.

Circulus. 467. C. nigricans, elytris maculis quatuor albis, thorace ſphaerico: margine albo punctato.
Schaeff. ic. t. 248. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

inſignitus. 468. C. aterrimus, elytris litura rubra.
Schaeff. icon. t. 266. *f.* 4. a. b.
Habitat in Germania.

celer. 469. C. aeneo-fuſcus, impreſſo punctatus, abdomine ſupra rubro apice emarginato. *Scop. ent. carn. p.* 126. *n.* 366.
Habitat in littoribus auſtriacis maris adriatici.

rugoſus. 470. C. capite utrinque dentato abdomine rubello, dorſo plicis quatuor longitudinalibus. *Scop. ent. carn. p.* 126. *n.* 367.
Habitat in Carniolia *ſuperiore.*

Pandurus. 471. C. rubro nigroque varius, thorace rubro nigro lineato, elytris rubris: macula media nigra, apiceque punctis tribus albis. *Scop. ent. carn. p.* 126. *n.* 368.
Habitat in Carniolia.

trinervis. 472. C. elytris membranaceis: nervis fuſco punctatis punctoque ferrugineo trigono marginali. *Scop. ent. carn. p.* 129. *n.* 373.
Habitat Idriae *circa foſſorum et ruſticorum aedes.*

maritimus. 473. C. nigricans, elytris teſtaceis fuſco punctatis: macula cordata nigra, antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. p.* 129. *n.* 374.
Habitat circa littora maris Adriatici.

alpinus. 474. C. nigricans, elytrorum corio ferrugineo-punctato, membrana fuſco lineata, pedibus ferrugineis. *Scop. ent. carn. p.* 129. *n.* 375.
Habitat in alpibus Vachinenſibus.

idriacus. 475. C. nigricans, elytris pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. p.* 130. *n.* 377.
Habitat Idriae.

hybridus. 476. C. niger, roſtro arcuato, abdomine elytrique corio rubro: maculis duabus atris, membrana fuſceſcente: macula ad baſin nigra. *Scop. ent. carn. p.* 131. *n.* 380.
Habitat in Carnioliae *collibus.*

meriopterus. 477. C. roſtro pedibusque citrinis, antennarum articulo ſecundo compreſſo villoſo articulis binis ſetaceis pallidis terminato. *Scop. ent. carn. p.* 131. *n.* 382.
Habitat in Carniolia, *in origani vulgaris et eupatorii cannabini floribus; an hujus tribus?*

aequinoctialis. 478. C. elytris totis coriaceis villoſis albidis: nervis fuſco punctatis, femoribus anterioribus craſſioribus. *Scop. ent. carn. p.* 132. *n.* 383.
Habitat in Carnioliae *floribus, praeſertim cynogloſſo omphalode, circa aequinoctium vernum frequens.*

umbellatarum. 479. C. ferrugineus, abdomine apicisque femorum faſciis fuſcis. *Scop. ent. carn. p.* 133. *n.* 385.
Habitat in Carnioliae *umbellatis.*

euonymi. 480. C. niger, thoracis macula media oblonga, ſcutelli lineis duabus, elytrorum ſtriis elevatis flavis: unica ramoſa. *Scop. ent. carn. p.* 133. *n.* 387.
Habitat in euonymo.

avellanae. 481. C. niger, elytrorum corio fuſco: baſi apiceque albis, pedibus fulvis. *Scop. ent. carn. p.* 134. *n.* 388.
Habitat in corylo avellana.

geniſtae. 482. C. fuſcus ſubvilloſus, alis hyalinis. *Scop. ent. carn. p.* 134. *n.* 390.
Habitat in geniſta tinctoria.

hortenſis. 483. C. niger, antennis trinodiis, roſtro pedibusque flavis. *Scop. ent. carn. p.* 134. *n.* 390.
Habitat in Carnioliae *hortis.*

484. C.

pellucidus. 484. C. fuſco-niger, pedibus pallidis, elytris pellucidis: apice fuſco. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 438. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

marmoratus. 485. C. luteo nigroque varius, oculis craſſiſſimis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 438. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

trigonus. 486. C. niger, thorace elytrisque rubris, elytris apice macula triangulari nigra. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 439. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

leucopterus. 487. C. rubro nigroque varius, alis baſi albis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 442. *n.* 13. *Raj. inſ. p.* 55. *n.* 2.
Habitat in Gallia.

maculoſus. 488. C. rubro nigroque varius, elytris puncto nigro, alis fuſcis: maculis albis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 443. *n.* 15.
Habitat in Gallia.

teſſellatus. 489. C. thorace nigro: lineis tribus rubris, elytris rubro nigroque teſſellatis: limbis nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 443. *n.* 16.
Habitat in Gallia.

croceus. 490. C. croceus, elytrorum apice rubro, alis nigris, antennarum articulo ſecundo clavato. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 444. *n.* 17.
β) Cimex niger, pedibus rufis.
γ) Cimex niger, capite, thorace pedibusque rufis.
Habitat in Gallia, *an hujus tribus?*

ſubfuſcus. 491. C. viridi-fuſcus, elytrorum nervis punctatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 448. *n.* 25.
Habitat in Gallia.

melanochros. 492. C. fuſcus, antennis, pedibus abdominisque margine nigro luteoque variis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 449. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

naevius. 493. C. cinereo nigroque varius, alis glaucis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 449. *n.* 27.
Habitat in Gallia.

cinereus. 494. C. niger, thorace poſterius cinereo, elytris fuſcis: apice albo. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 450. *n.* 29.
Habitat in Gallia.

virideſcens. 495. C. pallide virideſcens, femoribus nigro punctatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 450. *n.* 30.
Habitat in Gallia.

erythropterus. 496. C. niger, elytris anterius rufis, alis albo maculatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 451. *n.* 31.
Habitat in Gallia.

punctulatus. 497. C. atro fuſcus punctatus, alis venoſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 451. *n.* 32.
Habitat in Gallia.

cordiger. 498. C. ſpadiceus, ſcutello macula cordata lutea, elytris apice luteis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 453. *n.* 35.
Habitat in Gallia.

recticornis. 499. C. flaveſcens, thorace faſciis duabus nigris, ſcutello maculis flavis, antennis apice porrectis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 453. *n.* 36.
Habitat in Gallia.

termaculatus. 500. C. niger, thorace faſciis tribus flavis, ſcutello elytrorumque apice maculis luteis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 454. *n.* 37.
Habitat in Gallia.

Chloris. 501. C. viridi-flavus, capite thoraceque nigro maculatis, elytris viridibus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 455. *n.* 39.
Habitat in Gallia.

obfuſcatus. 502. C. viridis, elytris macula fuſca. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 455. *n.* 40.
Habitat in Gallia.

lineolatus. 503. C. viridis, elytrorum apice albido, ſcutello lineola fuſca. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 455. *n.* 41.
Habitat in Gallia.

viridiuſculus. 504. C. viridis, thorace ſcutelloque lineis quatuor nigris, elytris interius fuſcis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 456. *n.* 42.
Habitat in Gallia.

conicus. 505. C. fuſco-cinereus, oculis prominulis, elytris nervoſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 458. *n.* 49.
Habitat in Gallia.

aduſtus. 506. C. niger, capite, elytrorum apice genubusque ferrugineorubris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 459. *n.* 50.
Habitat in Gallia.

chloromelas. 507. C. niger, pedibus viridi nigroque variis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 459. *n.* 52.
Habitat in Gallia.

508. C.

atratus. 508. C. totus ater, alis atris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 460. *n.* 53.
Habitat in Gallia.

brachypterus. 655. C. pallidus, corpore lineari, elytris abdomine tertia parte brevioribus. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 189.
Habitat in Europa.

luteſcens. 656. C. flaveſcens, abdomine luteſcente. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 190.
Habitat in Europa.

gramineus. 657. C. pallidus, thorace utrinque linea fuſca, elytris vireſcentibus, abdomine luteſcente. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 191.
Habitat in Europa.

herbaceus. 658. C. vireſcens, capite antennisque ruſeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 194.
Habitat in Europa.

pictus. 659. C. pallidus, thorace lineis tribus fuſcis, abdomine nigro: margine dilatato rubro flavove ſubtus fuſco medio pallido. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 195.
Habitat in Europa.

rubellus. 660. C. ruſeſcens. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 196.
Habitat in Europa.

albipes. 661. C. niger, thoracis lateribus elytris pedibusque albidis. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 197.
Habitat in Europa.

ſquamatus. 662. C. niger, pedibus pallidis, elytrorum loco ſquamis albis. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 198.
Habitat in Europa.

purus. 663. C. ater immaculatus. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 113.
Habitat in Europa.

annulatus. 664. C. niger, elytris anterius, thorace poſterius griſeis, pedibus fuſco annulatis. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 114.
Habitat in Europa.

macropus. 665. C. niger, elytris griſeis ad membranam nigro maculatis, femoribus anticis craſſiſſimis, tibiis ruſeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 115.
Habitat in Europa.

666. C.

feneſtratus. 666. C. pallidus, coleoptris feneſtratis: nervis pallide rufis. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 118.
Habitat in Europa.

melanopus. 667. C. fuſcus, elytris griſeis apice fuſcis, femoribus nigris baſi griſeis. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 121.
Habitat in Europa.

denigratus. 668. C. niger, elytris griſeo-fuſcis: membrana baſi maculaque apicis alba. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 122.
Habitat in Europa.

biguttatus. 669. C. fuſcus, elytris maculis albis diſco fuſcis: membrana alba: venis maculisque duabus fuſcis, pedibus pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 123.
Habitat in Europa.

leucophlebs. 670. C. niger, elytris brunneis: membrana venis albis. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 124.
Habitat in Europa.

unipunctatus. 671. C. niger, elytris fuſco-luteis: puncto albo, membrana utrinque gutta alba, pedibus luteis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 125.
Habitat in Europa.

erythrurus. 672. C. rufeſcens, pedibus elytrisque pallidis, his apice rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 126.
Habitat in Europa.

ochrorhous. 673. C. fuſcus, ano luteo, elytris luteo-pellucidis: diſco puncto gemino apiceque ſolitario fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 128.
Habitat in Europa.

platycerus. 674. C. rufeſcens, antennis compreſſis latis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 129.
Habitat in Europa.

quadriſtriatus. 675. C. griſeus, thorace lineis quatuor longitudinalibus elevatis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 131.
Habitat in Europa.

fuſcicaudis. 676. C. capite, thorace elytrorumque griſeorum apice fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 132.
Habitat in Europa.

†† *pedibus dentatis aut ſpinoſis.*

Phaſianus. 509. C. fuſcus, femoribus arcuato-clavatis unidentatis, abdominis baſi ſubtus gibba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 136. *n.* 226. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 177.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magnus.*

bellicoſus. 510. C. fuſcus, femoribus poſterioribus arcuatis dentatis, abdomine quadriſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 361. *n.* 137. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 178.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura valgi, at duplo minor.*

Meleagris. 511. C. fuſcus, antennarum articulo ultimo tibiisque anterioribus flavis, femoribus poſterioribus ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 179.
Habitat in Sina, *magnus.*

Gallus. 512. C. elytris fuſcis flavo ſtriatis, abdominis diſco rubro, femoribus poſterioribus ſerratis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 361. *n.* 138. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 180.
Habitat in Surinamo, *ſtatura et magnitudine indi.*

Faber. 513. C. niger, abdomine fuſco: margine flavo, femoribus anterioribus apice bidentatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 181.
Habitat in Pulicandor, *magnus.*

Harpator. 514. C. niger, ſubtus rubro punctatus, femoribus dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 361. *n.* 139. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 180.
Habitat in America.

calcaratus. 114. C. fuſcus, abdomine ſupra ſanguineo, femoribus poſterioribus ſexdentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 367. *n.* 172. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 225.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 732. *n.* 114. *Fn. ſuec.* 968.* Cimex oblongus niger, capite linea rubra, femoribus poſticis ſubtus ſexdentatis.
Degeer inſ. 3. *p.* 280. *n.* 24. *t.* 14. *f.* 23. 24.
Schaeff. icon. t. 123. *f.* 2. 3.
Habitat in Europa.

denticulatus. 515. C. thoracis margine laterali denticulato, abdomine bidentato, femoribus poſterioribus ſpinoſis. *Scop. ent. carn. p.* 125. *n.* 365.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 16.
Habitat Tergeſti.

collium. 516. C. niger, elytris nucis colore: puncto nigro, femoribus anterioribus denticulo notatis. *Scop. ent. carn. p.* 130. *n.* 376.
Habitat in Carnioliae *collibus.*

armatus. 680. C. niger, elytris fuſcis: margine externo ſtriis, poſteriore punctis griſeis, femoribus anticis craſſiſſimis dente armatis. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 116.
Habitat in Europa.

lacteolus. 681. C. niger, femoribus anterioribus craſſis dente armatis, elytris baſi griſeis, membrana baſi gutta lactea. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 117.
Habitat in Europa.

ſetoſus. 682. C. fuſcus, femoribus et elytris rufeſcentibus, his apice fractis, tibiis albis ſetoſo ſpinoſis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 126.
Habitat in Europa.

⊥⊥⊥⊥ *antennis ſetaceis.*

⊣ *pedibus dentatis.*

abietis. 115. C. maculato-fulvus, pedibus rufis: femoribus craſſis. *Fn. ſuec.* 969.* *Scop. ent. carn.* 364. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 375. *n.* 222. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 290.
Degeer inſ. 3. *p.* 308. *n.* 37. *t.* 15. *f.* 20. 21. Cimex groſſipes.
Habitat in Europae *borealis abiete.*

⊣ ⊣ *pedibus inermibus.*

pabulinus. 83. C. viridis immaculatus, alis hyalinis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 373. *n.* 210. *mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 279.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 727. *n.* 83. *Fn. ſuec.* 947.* *Scop. ent. carn.* 132. Cimex oblongiuſculus flaveſcenti-viridis totus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 456. *n.* 53.
Degeer inſ. 3. *p.* 293. *n.* 31.
Habitat in Europae *pratis.*

laevigatus. 101. C. exalbidus, lateribus albis. *Fn. ſuec.* 958.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 512. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 208. *mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 276.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 452. *n.* 26.
Degeer inſ. 3. *p.* 292. *n.* 30.
Habitat in Europae *pratis, frequens.*

lateralis. 517. C. niger, lateribus albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 209. *mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 277.
Habitat Kilonii.

holſatus. 518. C. exalbidus, thorace lineis duabus, elytris interius fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 278.
Habitat Kilonii, *ſtatura laevigati.*

virens. 102. C. viridis, plantis antennarumque apicibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 373. *n.* 211. *mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 280.
Habitat in Europa, *pabulino duplo major.*

pallidus. 519. C. pallidus, capite corporeque atris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 281.
Habitat in Suecia, *parvus.*

dolabratus. 103. C. elytris ferrugineis latere albidis, antennis nigris, linea thoracis alba. *Fn. ſuec.* 959. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 373. *n.* 212. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 282.
Habitat in Europae *feſtuca nutante.*

calens. 104. C. capite, thorace elytrisque nigris, ſcutello fulvo. *Gron. zooph.* 712. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 373. *n.* 213. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 283.
Habitat in India.

ſtriatus. 105. C. niger, elytris flavo fuſcoque ſtriatis, apice pedibusque rufis. *Fn. ſuec.* 960.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 217. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 289.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 454. *n.* 38.
Degeer inſ. 3. *p.* 290. *n.* 29. *t.* 15. *f.* 14. 15.
Petiv. gazoph. t. 26. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 4.
Habitat in ulmi campeſtris *foliis.*

Gronovii. 106. C. thorace elytrisque atris, linea flava faſciam elytrorum formante. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 373. *n.* 214. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 284. *Gronov. zooph.* 711.*
Habitat in India.

erraticus. 107. C. nigricans, elytris albis, antennis lividis: infimo articulo nigro. *Fn. ſuec.* 961.*
Habitat in Europa.

108. C.

ferus. 108. C. griſeus immaculatus. *Fn. ſuec.* 962.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 215. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 285.
Habitat in Europae *ſilvis.*

vagans. 519. C. griſeus, capite thoraceque linea nigra, pedibus teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 286.
Habitat in Suecia, *ſtatura feri.*

orientalis. 520. C. fuſcus, capite thoraceque lineis tribus, elytris margine omni albo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 287.
Habitat in India, *marginello proxime affinis.*

marginellus. 521. C. niger, thoracis lineis tribus, elytris margine omni albis punctoque apicis coccineo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 216. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 288.
Habitat in Italia, *ſtatura feri.*

ulmi. 110. C. ſupra rubiginoſus, elytris ſtriis ſanguineis, alis albo fuſcoque variis. *Fn. ſuec* 964.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 375. *n.* 223. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 291.
Habitat in ulmo campeſtri.

mutabilis. 112. C. niger, alis caeruleis, antennis pedibusque flavis. *Fn. ſuec.* 967.*
Habitat in Suecia.

ſauciatus. 522. C. viridis, elytris maculis ſex roſeis, pedibus rubro tinctis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 293. *n.* 32.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 457. *n.* 4.
Habitat in Europa.

ſubapterus. 523. C. griſeus, alis breviſſimis, abdomine nigro punctato. *Degeer inſ.* 3. *p.* 287. *n.* 27. *t.* 15. *f.* 10.
Habitat in Europa.

††† *lineares, corpore anguſto elongato.*
⊥ *antennis ſetaceis.*

pedes. 524. C. fuſco flavoque varius, femoribus poſterioribus elongatis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 375. *n.* 224. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 292.
Habitat in India.

filiformis. 525. C. pallide vireſcens, antennis ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 375. *n.* 225. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 293.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

11 *antennis filiformibus.*

anguſtatus. 526. C. niger, capite thoraceque elongato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 59. *f.* 71.
Habitat - - - - tipularii magnitudine, glaber.

ſqualidus. 683. C. fuſcus, elytris griſeo fuſcoque variegatis, pedibus linearibus antennisque griſeo fuſcoque alternatim annulatis. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 201.
Habitat in Europa.

foſſarum. 527. C. ſupra fuſcus, thoracis ſcutellique marginibus lineaque dorſali flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 375. *n.* 226. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 294.
Habitat in India.

lacuſtris. 117. C. ſupra niger depreſſus, pedibus anterioribus breviſſimis. *Fn. ſuec.* 970. *it. wgoth.* 182. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 463. *n.* 59. *Scop. ent. car.* 394. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 375. *n.* 227. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 295.
Degeer inſ. 3. *p.* 311. *n.* 39. *t.* 16. *f.* 7. Cimex Najas.
Raj. inſ. p. 57. *n.* 1. Cimex aquaticus figurae longioris.
Bauh. Ballon. 213. *f.* 1. Inſectum Tipula dictum.
Liſt. mut. t. 5. *f.* 4.
Bradl. nat. t. 26. *f.* 2. d.
Friſch inſ. 7. *t.* 20.
Sulz. inſ. t. 11. *f.* 78.
Stoll cimic. 2. *t.* 9. *f.* 63.
Habitat in Europae *aquis pacatis.*

ſtagnorum. 118. C. teretiuſculus niger, thorace medio punctis duobus globoſis. *Fn. ſuec.* 9715. *Scop. ent. carn.* 395. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 376. *n.* 228. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 296.
Degeer inſ. 3. *p.* 322. *n.* 40. *t.* 15. *f.* 24. Cimex Acus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 463. *n.* 60.
Petiv. gazoph. t. 9. *f.* 12.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 17.
Habitat in Angliae *lacubus frequens.*

rivulorum. 528. C. niger, albo punctatus, abdomine fulvo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 376. *n.* 229. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 297.
Habitat in Alſatiae *rivulis montoſis, lacuſtri quadruplo minor.*

pallipes. 529. C. niger, pedibus pallidis, pectore biſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 376. *n.* 230. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 298.
Habitat in Italia, *ſtatura lacuſtris.*

culiciformis. 530. C. griſeus, thorace multiſpinoſo, elytris lituris nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 376. *n.* 231. *mant inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 299.
Habitat in Americae *aquis.*

anguſtus. 531. C. ſupra griſeus ſubtus flaveſcens, antennis pedibusque ſubteſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 300.
Habitat in Sina, *ſtatura culiciformis.*

Filum. 532. C. fuſcus, alis abbreviatis, pedibus longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 376. *n.* 232. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 301.
Degeer inſ. 3. *p.* 352. *n.* 26. *t.* 35. *f.* 16? Cimex longipes.
Habitat in India.

macropus. 533. C. ater, thoracis margine elytrorumque faſcia ſanguinea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 233. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 302.
Habitat in America.

curſitans. 534. C. ſupra fuſcus ſubtus cineraſcens, pedibus longiſſimis, ano bidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 234. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 303.
Habitat in nova Hollandia.

vagabundus. 119. C. griſeus, pedibus pallidis: anterioribus breviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 236. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 305.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 732. *n.* 119. *Fn. ſuec.* 972.* Cimex linearis variegatus, pedibus anticis breviſſimis craſſis inflexis.
Fn. ſuec. 1. *n.* 683. Cimex linearis, pedibus quatuor longioribus, antennis longiſſimis albo fuſcoque variis.
Degeer inſ. 3. *p.* 323. *n.* 41. *t.* 17. *f.* 1. 2. Cimex culiciformis.
Friſch inſ. 7. *p.* 11. *t.* 6. Cimex arborum oblongus, alarum ſignatura alba.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 462. *n* 58.
Habitat in Europae *muſcis.*

linearis. 535. C. viridis, antennis antrorſum porrectis. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 519.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 458. *n.* 47.
Habitat in Valeſia.

denigratus. 536. C. albidus, oculis fuſcis, ſcutello macula nigra. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 458. *n.* 48.
Habitat in Gallia.

hortorum. 537. C. viridis, oculis fuſcis, antennarum articulo ſecundo baſi albo, tibiis pallidis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 109. *n.* 1248.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 456. *n.* 43.
Degeer inſ. 3. *p.* 293. *n.* 31.
Habitat in Europae *hortis; an forſan ad praecedentem tribum relegandus ob antennas?*

tipuloides. 538. C. griſeus, antennis rubro maculatis, femoribus apice rubris, pedibus omnibus ſubaequalibus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 354. *n.* 27. *t.* 35. *f.* 18.
Habitat in Surinamo.

meridionalis. 539. C. nigro-fuſcus, pedibus teſtaceis, femoribus craſſis, elytris abdomine brevioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 355. *n.* 29. *t.* 35. *f.* 21.
Habitat in Surinamo.

tetragrammos. 540. C. nigricans, abdomine atro: lineis quatuor albis obliquis. *Schaeff. icon. t.* 43. *f.* 7. 8.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

araneoides. 541. C. luteus, pedibus longiſſimis.
Schaeff. icon. t. 169. *f.* 7.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

111 *antennis clavatis.*

triſpinoſus. 542. C. griſeo fuſcus, antennis longis, ſpinis dorſalibus tribus erectis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 354. *n.* 28. *t.* 35. *f.* 19.
Habitat in Surinamo.

1111 *antennis biclavatis.*

ſuecicus. 543. C. cinereus, femoribus clavatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 237. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 306.
Habitat in Suecia.

11111 *antennis bicaudatis.*

tipularius. 120. C. exalbidus, pedibus omnibus longiſſimis, femoribus clavatis. *Fn. ſuec.* 973.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 234. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 304.

Friſch

Friſch inſ. 7. *p.* 28. *f.* 20. Cimex arboreus culiciformis.
Habitat in Europae *borealis muſcis.*

** *antennis ſupra oculos inſertis, roſtro arcuato.* Reduvii.

Gigas. 544. C. niger, thoracis margine elytrorumque faſcia obſolete flexuoſa rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 309. *n.* 1.
Habitat in India.

Acantharis. 38. C. thorace ſpinoſo, abdomine ſpinis ciliato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 382. *n.* 29. *mant. inſ.* 2. *p.* 314. *n.* 45.
Brown jam. p. 434. *t.* 44. *f.* 11. Acantharis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 8.
Habitat in Jamaica.

Guttula. 545. C. ater nitidus, elytris pedibusque ſanguineis, alis puncto albo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 314. *n.* 46.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

elongatus. 546. C. elongatus rufus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 383. *n.* 30. *mant. inſ.* 2. *p.* 314. *n.* 47.
Habitat in Africa *aequinoctiali, reliquis hujus tribus anguſtior.*

criſtatus. 62. C. corpore fuſco-ferrugineo, ſcutello criſtato. *Amoen. acad.* 6. *p.* 399. *n.* 42.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 381. *n.* 23? *mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 36? Reduvius (ſerratus) niger, elytris ferrugineis, roſtro antennis tibiisque flavis, ſcutello criſtato ſerrato.
Forſter nov. inſ. ſp. 1. *p.* 72. *n.* 72? Cimex carinatus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 12.
Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 6.
Stoll cimic. 2. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in America *meridionali.*

leucopus. 547. C. fuſcus, antennarum annulis, tibiis abdominisque punctis lateralibus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 382. *n.* 24. *mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 37.
Habitat in Europa *media, ſtatura aegyptiaci, at paulo major.*

teſſulatus. 548. C. thorace elytrisque obſcure ferrugineis, abdomine atro: margine albo vario. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 38.
Habitat Monſpelii, *ſtatura albipedis.*

aegyptiacus. 549. C. corpore villoſo griſeo; abdominis margine nigro variegato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 382. *n.* 25. *mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 39.
Habitat in Aegypto.

Diadema. 550. C. niger, capite thoraceque ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 382. *n.* 26. *mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 40.
Habitat in America *boreali.*

quinqueſpinoſus. 551. C. thorace nigro, poſterius ſpinis quatuor flavis, ſcutello apice recurvo ſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 382. *n.* 27. *mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 41.
Habitat in India, *capite poſterius attenuato, antennis roſtroque pallidis.*

ſcutatus. 552. C. niger, elytris apice alisque medio puncto albo, ſcutello apice recurvo ſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 42.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

zonalis. 553. C. capite thoraceque nigris, elytris flaveſcentibus: faſcia, alis apice nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 43.
Habitat in Cayenna, *parvus, magis elongatus.*

mauritanicus. 554. C. ferrugineus, abdominis margine nigro maculato, thorace anterius ſubſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 382. *n.* 28. *mant. inſ.* 2. *p.* 314. *n.* 44.
Habitat in Mauritania.

perſonatus. 64. C. antennis apice capillaribus, corpore ſubvilloſo fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 309. *n.* 2. *Fueſſii inſ. helv. p.* 26. *n.* 499.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 724. *n.* 64. *Fn. ſuec.* 942. *Scop. ent. carn.* 379. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 397. *n.* 38. Cimex roſtro arcuato, antennis apice capillaceis, corpore oblongo ſubvilloſo fuſco.
Degeer inſ. 3. *p.* 281. *n.* 25. *t.* 15. *f.* 7. Cimex quisquilius.
Liſt. ſcar. angl. p. 397. *n.* 38. Cimex maximus pullus, alis nudis ex toto membranaceis.
Friſch inſ. 10. *t.* 10. Cimex ſtercorarius major oblongus.
Raj. inſ. 56. Muſca cimiciformis graviter volans.
Sulz. inſ. t. 11. *f.* 74?
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 6. 7. *et t.* 57. *f.* 9.
Habitat in Europae *quisquiliis.*
Larva *horrida conſumit lectularium.*

barbicornis. 555. C. niger, thorace abdominiſque baſi olivaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 378. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 309. *n.* 3.
Drury inſ. 3. *t.* 45. *f.* 1.
Habitat in Sierra Leon Africae, *thorace rarius nigro, antennis alterius ſexus barbatis.*

afer. 556. C. rufus, thorace maculis quatuor, elytris tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 378. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 309. *n.* 4.
Habitat in Africa *aequinoctiali, annulato minor.*

ſtridulus. 557. C. glaber niger, elytris fuſcis nigro maculatis: margine rufo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 309. *n.* 5.
Habitat Monſpelii, *parvus, primo vere agilis, antennas continuo motitans, thoracis attritu ſtridens.*

nitidulus. 558. C. ater, thorace olivaceo, femoribus anterioribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 378. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 309. *n.* 6.
Habitat in Africa *aequinoctiali, nitidus, barbicorni affinis.*

pilipes. 559. C. ater, thorace elytrorumque apice villoſis cinereis, pedibus hirtis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 309. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *capite poſterius attenuato, alis albis.*

longipes. 65. C. ruber, elytris nigris baſi faſciaque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 378. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 309. *n.* 8. *Gron. zooph.* 709.
Habitat in inſula S. Thomae oceani americani, *magnitudine perſonati.*

Bankſii. 560. C. ſupra rufus, alis nigris, abdomine atro: margine rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 379. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 309. *n.* 9.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

erythropus. 561. C. ater, elytris griſeis nigro venoſis, abdominis margine pedibusque poſterioribus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 309. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

binotatus. 562. C. ſupra niger, elytris puncto apicis rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 379. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 11.
Habitat in Surinamo, *ſtatura annulati.*

ſacer. 563. C. flaveſcens, thoracis cruce impreſſa, elytris abdominisque medio nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 12.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

guineenſis. 670. C. niger, thorace ſcutelloque acute ſpinoſis, elytris puncto albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 381. *n.* 22. *mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 35.
Stoll cimic. 2. *t.* 11. *f.* 64.
Habitat in Guinea, *magnitudine valgi.*

annulatus. 71. C. antennis apice capillaribus, corpore nigro ſubtus ſanguineo maculato. *Fn. ſuec.* 943.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 437. *n.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 379. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 13. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 500.
Degeer inſ. 3. *p.* 286. *n.* 26. Cimex niger rufipes.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 13.
Schaeff. icon. t. 5. *f.* 9-11.
Habitat in Europae *corylo.*

monſpelienſis. 564. C. rufus, capite, pectore abdominisque ſtriis maculari-bus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 14.
Schaeff. icon. 1. *t.* 5. *f.* 9. 10.
Habitat Monſpelii, *ſtatura et magnitudine annulati.*

praecinctus. 565. C. rufeſcens, antennis pedibusque flavo nigroque annulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 379. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 15.
Habitat in America *boreali.*

obſcurus. 566. C. ater, thorace poſterius, elytris abdominisque margine obſcure pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 379. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 16.
Habitat in Africa *aequinoctiali, parvus.*

cayennenſis. 567. C. obſcure fuſcus antennarum apice elytrorumque litura media albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 17.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

attelaboides. 568. C. teſtaceo nigroque varius, thorace anterius teſtaceo, dentibus duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 379. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 18.
Habitat in nova Hollandia.

pilicornis. 569. C. ater, thorace poſterius, ſcutello, elytrorum margine, abdomine femoribusque baſi rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 19.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis; antennis hirtis.*

quadridentatus. 570. C. fuſcus, capite, abdominis margine pedibusque olivaceis, thorace anterius quadridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 380. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 20.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

nigripes. 100. C. elytrorum baſi, antennis pedibusque rubris, tibiis anterioribus hirſutiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 380. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 21.
Degeer inſ. 3. *p.* 344. *n.* 20. *t.* 35. *f.* 1. Cimex hirtipes.
Habitat in America *meridionali.*

unicolor. 571. C. ater, immaculatus, thorace ſubſpinoſo, tibiis cylindricis hirſutiſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 22.
Habitat in Cayenna, *ſtatura nigripedis.*

barbaricus. 572. C. niger, thorace elytrisque obſcure ferrugineis, ſcutello lineola media alba. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 23.
Habitat in Barbaria, *ſtatura nigripedis.*

Rohrii. 573. C. ater, thorace ſubſpinoſo, elytris lineola, abdominis margine femorumque articulatione ſanguineis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 24.
Habitat in Cayenna, *ſtatura nigripedis.*

carbonarius. 574. C. ater, elytris poſterius albis, capite poſterius attenuato cylindrico. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 380. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 25.
Habitat in India, *ſtatura attelaboidis.*

pacificus. 575. C. rufo nigroque varius, abdominis margine dente medio erecto obtuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 380. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 26.
Habitat in nova Hollandia.

Edleri. 576. C. niger, thorace ſubſpinoſo, elytris maculis tribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 380. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 27.
Habitat in India.

octomaculatus. 577. C. thorace poſterius teſtaceo, elytris alisque atris: maculis quatuor laete flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 380. *n.* 18. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 28.
Habitat in India, *reliquis hujus tribus minor.*

ſtigma. 578. C. thorace teſtaceo, elytris alisque nigris: macula media flava. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 381. *n.* 19. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 29.
Habitat in India, *octomaculato proxime affinis.*

curtipes. 579. C. niger, elytris pallidis: puncto atro, abdomine rufo: ano atro. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 30.
Habitat in India, *parvus, pedibus anterioribus brevibus.*

uncinatus. 580. C. niger, elytris baſi pallidis, alis macula communi rufa, pectore ſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 381. *n.* 20. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 31.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

iracundus. 581. C. niger, thorace abdominisque marginibus rubro maculatis, elytris rufis. *Scop. ent. carn.* 378. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 381. *n.* 21. *mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 32.
Schranck Beytr. p. 81. *n.* 37. *t.* 3. *f.* 17. Cimex ſanguineus.
Poda muſ. p. 58. *n.* 17.
Habitat in Germania *ſuperiori.*

fuſcipes. 582. C. rufus, thoracis faſcia, elytrorum margine interiori pedibusque fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 33.
Habitat in India, *ſtatura iracundi, at paulo minor.*

bifidus. 583. C. ater, elytris faſcia rufa, ſcutello ſpina erecta apice bifida. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 312. *n.* 34.
Habitat in Sina, *magnus.*

membranaceus. 684. C. niger, abdominis apice membranisque duabus ovatis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 202.
Habitat extra Europam.

ſuperbus. 685. C. niger, abdomine rufo baſi nigro, elytris in medio ad marginem anticum puncto coccineo notatis, femoribus apice tibiisque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 203.
Habitat extra Europam.

naevius. 686. C. griſeus abdomine elytris dimidio longiore: dorſo nigro, margine elevato rufo fuſcoque vario. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 207.
Habitat in Europa.

quinquemaculatus. 687. C. niger, elytris abbreviatis, abdominis margine elevato: maculis quinque albis inverſe conicis, pedibus griſeis fuſco annulatis. *Muſ. Lesk. p.* 124. *n.* 208.
Habitat in Europa.

ſtaphylinus. 688. C. apterus niger, elytris abbreviatis pedibusque rubris: femoribus quatuor anticis compreſſis. *Muſ. Lesk. p.* 125. *n.* 209.
Habitat in Europa, *ſtaphylinis affinis.*

MA-

carinatus) [illegible]
fulcatus) in Apulia.
albospictus)
aeruginosus) in regione neapolitana } Cyrillo [illegible] Neapolitano.

MACROCEPHALUS. *Roſtrum* inflexum: vagina univalvi triarticulata ſetis tribus, maxillis palpis labioque nullis.

Antennae porrectae, breviſſimae, ſubmoniliformes, clavatae.

Caput oblongum, ſupra cylindricum.

Scutellum longitudine abdominis, depreſſum, membranaceum.

cimicoides. 1. M. griſeo-ferrugineus, ſcutello cineraſceute: macula coleoptrata flava, alis purpuraſcenti-violaceis, tibiis anterioribus incraſſatis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. *t.* 8. *f.* 1.
Habitat in Georgia Americae, *cimice eroſo paulo minor.*

227. APHIS. *Roſtrum* inflexum, vagina articulorum quinque: ſeta unica.

Antennae ſetaceae, thorace longiores.

Alae quatuor erectae aut nullae.

Pedes ambulatorii.

Abdomen ſaepius poſterius bicorne.

longiroſtris. 34. Aph. cinerea, roſtro corpore triplo longiore. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 314. *n.* 1.
Habitat Dresdae, *ſub arborum corticibus, formicarum larvis victitans, mediae magnitudinis.*

ribis. 1. Aph. Ribis rubri. *Fn. ſuec.* 975.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 7.
Leeuwenh. arc. epiſt. 90. *p.* 545. *t.* 548.
Blank. inſ. 164. *t.* 14. *f.* D. E.
Friſch inſ. 11. *p.* 9. *t.* 14.

Reaum. -

Reaum. inſ. 3. *t.* 22. *f.* 7-10.
Habitat ſub ribis *rubri foliis monſtroſis puſtulatis frequens.*

arundinis. 35. Aph. arundinis epigeios. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 8.
Habitat in arundinis epigeios *foliis.*

ulmi. 2. Aph. ulmi campeſtris. *Fn. ſuec.* 976.* *It. ſcan.* 203. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 387. *n.* 32. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 37.
Degeer inſ. 3. *p.* 81. *n.* 13. *t.* 5. *f.* 7-18. Aphis (foliorum ulmi) nigricans tuberculata foliorum convolutorum ulmi.
Reaum. inſ. 3. *t.* 25. *f.* 4-7.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 494. *n.* 1. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in ulmo *campeſtri.*

papaveris. 36. Aph. papaveris ſomniferi. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 388. *n.* 33. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 38.
Habitat in Holſatiae *papavere ſomnifero.*

paſtinacae. 3. Aph. paſtinacae ſativae. *Fn. ſuec.* 977.* *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 13.
Habitat in paſtinaca *ſativa.*

pruni. 37. Aph. pruni domeſticae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 14.
Degeer inſ. 3. *p.* 49. *n.* 5. *t.* 2. *f.* 1-8. Aphis dilute viridis albo farinoſa, corniculis brevibus, pruni.
Reaumur inſ. 3. *t.* 23. *f.* 9. 10.
Habitat in pruni *domeſticae foliis.*

ſambuci. 4. Aph. ſambuci nigrae. *Fn. ſuec.* 978. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 384. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 4.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 495. *n.* 3. Aphis ſambuci tota caerulea atra.
Liſt. angl. p. 397. *n.* 40. Cimex exiguus nunc niger nunc viridis, cui alae ex toto membranaceae, praegrandis.
Friſch inſ. 11. *p.* 14. *t.* 18.
Reaum. inſ. 3. *t.* 8. *f.* 5-15.
Habitat in Sambuci *nigrae ramis.*

ſolidaginis. 38. Aph. ſolidaginis virgaureae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 384. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 5.
Habitat in Norwegiae *ſolidaginis virgaureae caulibus, majuſcula, junior teſtacea, alias fuſca, anterius anguſtata, fronte emarginata, pedibus pallidis: geniculis nigris, corniculis elongatis ſetaceis, ſtilo duplo longioribus.*

39. C.

cerasi. 39. Aph. pruni cerasi. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 384. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 6.
Müll. zool. dan. prodr. p. 110. *n.* 1256.
Habitat in pruni *ceraſi foliis.*

rumicis. 5. Aph. rumicis lapathi. *Fn. ſuec.* 979.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 12.
Habitat in rumice *acuto.*

acetoſae. 6. Aph. rumicis acetoſae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 389. *n.* 43. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 48.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 496. *n.* 9. Aphis (acetoſae) atra, faſcia transverſa viridi.
Reaum. inſ. 3. *p.* 286.
Habitat in rumice acetoſa, acetoſella.

liguſtici. 40. Aph. liguſtici ſcotici. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 389. *n.* 44. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 49.
Habitat in Norwegiae *liguſtico ſcotico, nigra, antennis tibiarumque baſi pallida.*

lychnidis. 7. Aph. lychnidis divicae. *Fn. ſuec.* 980.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 384. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 2.
Fn. ſuec. 719. Aphis cucubali.
Habitat frequens in lychnidis divicae *caulibus.*

capreae. 41. Aph. ſalicis capreae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 384. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 3.
Habitat in Europae *ſalice.*

padi. 8. Aph. pruni padi. *Fn. ſuec.* 981. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 389. *n.* 45. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 50.
Reaum. inſ. 3. *t.* 23. *f.* 9. 10.
Habitat in pruno pado.

9. Aph.

Aphides *a vere in ſerum auctumnum vivos pariunt foetus, auctumno poſt copulam ova; poſt quartam demum metamorphoſin pariunt, aliisque inſtruuntur; a copula parentum naſcuntur filiae, neptes, proneptes, abneptes; aliae apterae, aliae alatae, absque ſexus diſcrimine in eadem ſpecie; plurimae cornubus duobus poſterioribus abdominis excernunt rorem mellenm, qui formicas allicit; ab ichneumonis ſpecie quadam infeſtatae. Species difficile diſtinguuntur, difficilius definiuntur, nec ſemper in diverſis plantis diverſae ſpecies, adeoque pauciores aphides, quam plantae aphidiferae.*

roſae. 9. Aph. roſae. *Fn. ſuec.* 982.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 387. *n.* 25. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 30.
Degeer inſ. 3. *p.* 65. *n.* 10. *t.* 3. *f.* 10. Aphis viridis, corniculis longiſſimis, roſae.
Reaum. inſ. 3. *t.* 21. *f.* 1-4.
Lederm. microgr. 53. *t.* 25.
Sulz. inſ. t. 12. *f.* 79.
Habitat in roſae *pedunculis.*

hortenſis. 42. Aph. atriplicis hortenſis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 387. *n.* 26. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 31.
Habitat in atriplicis hortenſis *ſummitatibus.*

picridis. 43. Aph. picridis hieracioidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 387. *n.* 27. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 32.
Habitat in picridis hieracioidis *caulibus.*

aegopodii. 44. Aph. aegopodii podagrariae. *Scop. ent. carn.* 399. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 387. *n.* 28. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 33.
Habitat in aegopodii podagrariae *foliis.*

dauci. 45. Aph. dauci carotae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 387. *n.* 29. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 34.
Habitat in dauci carotae *umbella.*

urticata. 46. Aph. urticae dioicae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 387. *n.* 30. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 35.
Habitat in urticae dioicae *caulibus, foliis.*

nymphaeae. 10. Aph. plantarum aquaticarum. *Fn. ſuec.* 983. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 17.
Habitat in nymphaeis, potamogetonibus.

corni. 47. Aph. corni ſanguineae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 18.
Habitat in corni ſanguineae *foliis.*

tiliae. 11. Aph. tiliae europaeae. *Fn. ſuec.* 984. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 388. *n.* 34. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 39.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 495. *n.* 6. Aphis alis antennis pedibusque nigro punctatis.
Degeer inſ. 3. *p.* 77. *n.* 12. *t.* 5. *f.* 1-5. Aphis (tiliae nigropunctata) flavo-viridis lineis punctisque nigris, alis nigro maculatis, corniculis brevioribus.
Friſch inſ. 11. *p.* 1. *n.* 3. *t.* 17. Pediculus arboreus tiliae.

Reaum.

Reaum. inſ. 3. *t.* 23. *f.* 1-8.
Habitat in Europae *tilia.*

juniperi. 48. Aph. juniperi communis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 388. *n.* 35. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 40.
Degeer inſ. 3. *p.* 56. *n.* 7. *t.* 4. *f.* 7. 8. Aphis obſcure fuſca cinereo maculata, corniculis brevioribus groſſis, juniperi.
Habitat in juniperi communis *foliis.*

braſſicae. 12. Aph. braſſicae oleraceae. *Fn. ſuec.* 985. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 388. *n.* 36. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 41.
Friſch inſ. 11. *p.* 10. *t.* 3. *f.* 15. Pediculus braſſicae.
Habitat in braſſicae oleraceae *foliorum pagina inverſa, unde tabeſcunt.*

craccae. 13. Aph. viciae craccae. *Fn. ſuec.* 986. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 46. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 51.
Degeer inſ. 3. *p.* 58. *n.* 8. *t.* 2. *f.* 14. 15. Aphis nigra caeruleſcens albo farinoſa, corniculis brevioribus, viciae craccae.
Habitat in viciae craccae *foliis.*

lactucae. 14. Aph. lactucae oleraceae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 47. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 52.
Reaum. inſ. 3. *t.* 22. *f.* 3-5.
Habitat in lactuca oleracea.

ſonchi. 15. Aph. ſonchi oleracei. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 48. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 53.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 497. *n.* 13.
Reaum. inſ. 3. *t.* 22. *f.* 3-5.
Habitat in ſoncho oleraceo.

cirſii. 16. Aph. ſerratulae arvenſis. *Fn. ſuec.* 987.* *It. wgoth.* 307.
Habitat in ſerratula arvenſi.

cardui. 17. Aph. cardui. *Fn. ſuec.* 988.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 15.
Habitat in carduorum *caulibus.*

achilleae. 49. Aph. flaveſcens, abdomine viridi, antennis pedibusque albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 16.
Habitat frequens Kilonii *in achillea millefolio.*

tanaceti. 18. Aph. tanaceti vulgaris. *Fn. ſuec.* 989.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 387. *n.* 31. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 36.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 496. *n.* 8. Aphis tanaceti fuſca, abdomine nigro caeruleo, antice viridi.
Habitat in tanaceti vulgaris *caulibus.*

abſinthii. 19. Aph. artemiſiae abſinthii. *Fn. ſuec.* 990.* *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 19.
Habitat in artemiſia abſinthio.

millefolii. 50. Aph. fuſca, abdomine vireſcente, antennis pedibus corniculisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 386. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 20.
Degeer inſ. 3. *p.* 60. *n.* 9. *t.* 4. *f.* 1-5. Aphis millefolii.
Habitat in achillea millefolio.

euonymi. 51. Aph. euonymi europaei. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 386. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 21.
Habitat in euonymi europaei *foliis.*

avenae. 52. Aph. avenae ſativae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 386. *n.* 18. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 22.
Habitat in Europae avena ſativa.

fraxini. 53. Aph. fraxini excelſioris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 386. *n.* 19. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 23.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 494. *n.* 2. Aphis fraxini nigro viridique variegata.
Habitat in fraxini excelſioris *ramis.*

jaceae. 20. Aph. centaureae jaceae. *Fn. ſuec.* 991.*
Habitat in centaurea jacea.

betulae. 21. Aph. betulae albae. *Fn. ſuec.* 992.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 386. *n.* 20. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 25.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 496. *n.* 7. Aphis marginibus inciſurarum abdominis punctis nigris.
Degeer inſ. 3. *p.* 45. *n.* 3. Aphis nigro punctata corniculata viridis, dorſo tuberculis nigris, betulae.
Reaum. inſ. 3. *t.* 22. *f.* 2.
Habitat in betulae *albae foliis.*

alni. 54. Aph. betulae alni. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 386. *n.* 21. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 26.
Degeer inſ. 3. *p.* 47. *n.* 4. *t.* 3. *f.* 15-17. Aphis flaveſcentialba tuberculata, alni.
Habitat in betulae alni *foliis.*

roboris. 22. Aph. nigra, corniculis obſoletis atris medii abdominis. *Fn. ſuec.* 993. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 388. *n.* 37. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 42.
Habitat in Quercu robore.

fagi. 23. Aph. fagi ſylvaticae lanata. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 497. *n.* 2.
Reaum. inſ. 3. *t.* 26. *f.* 1.
Habitat in ſago ſylvatica.

quercus. 24. Aph. quercus roboris proboſcide longiſſima. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 388. *n.* 38. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 43.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 498. *n.* 14. Aphis fuſca proboſcide corpore triplo longiore.
Reaum. inſ. 3. *t.* 28. *f.* 5-14.
Habitat in Galliae *potiſſimum* quercu, *atra, inter maximas, alis hyalinis: margine exterius atro, antennarum pedumque articulis baſi ferrugineis, abdomine mutico.*

pini. 25. Aph. pini ſylveſtris ramulorum. *Fn. ſuec.* 994. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 389. *n.* 39. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 44.
Degeer inſ. 3. *p.* 27. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 9-16. Aphis (nuda pini) fuſca tuberculata, pedibus nudis, pini.
Habitat in pini ſylveſtris *ramis junioribus.*

pineti. 55. Aph. pini ſylveſtris foliorum. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 389. *n.* 40. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 45.
Degeer inſ. 3. *p.* 39 *n.* 2. *t.* 6. *f.* 19. 33. Aphis (tomentoſa pini) nigra albo farinoſa tuberculata, pedibus villoſo tomentoſis.
Habitat in pini ſylveſtris *foliis, pedibus poſterioribus elongatis ciliatis.*

ſalicis. 26. Aph. ſalicis. *Fn. ſuec.* 995.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 389. *n.* 41. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 46.
Reaum. inſ. 3. *t.* 22. *f.* 2.
Habitat in ſalicibus *variis:*

vitis. 56. Aph. vitis viniferae. *Scop. ent. carn.* 398. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 49. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 54.
Habitat in Europae *magis auſtralis* vite vinifera.

populi. 27. Aph. populi tremulae foliorum. *Fn. ſuec.* 996.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 386. *n.* 22. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 27.
Habitat ſub populi tremulae *foliis convolutis fornicatis.*

tremulae. 28. Aph. populi tremulae ramulorum. *Fn. ſuec.* 997.*
Degeer inſ. 3. *p.* 94. *n.* 15. *t.* 7. *f.* 1-7. Aphis caerulea nigro-tomentoſa, corniculis nullis, populi tremulae ramulorum.
Habitat in populi tremulae *ramulis, ubi foliis approximatis conteguntur.*

viburni. 57. Aph. viburni opuli. *Scop. ent. carn.* 396. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 386. *n.* 23. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 28.
Sulz. hiſt. inſ. t. 11. *f.* 1. 2.
Habitat in viburni opuli *foliis et caulibus.*

mali. 58. Aph. pyri mali. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 387. *n.* 24. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 29.
Degeer inſ. 3. *p.* 53. *n.* 6. *t.* 3. *f.* 20. Aphis pomi flavo-viridis, corniculis longioribus pedibus antennisque nigreſcentibus.
Habitat ſub pyri mali *foliis.*

burſaria. 29. Aph. populi nigrae. *Fn. ſuec.* 998.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 9. *it. ſcan.* 311.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 497. *n.* 11. Aphis populi nigra lanata.
Hofm. altd. hort. 51.
Seb. muſ. 1. *t.* 38. *f.* 8.
Jung verm. 161. 162.
Rupp jenenſ. 3. *p.* 333.
Swammerd. bibl. 45. *f.* 22-25.
Reaum. inſ. 3. *t.* 26. *f.* 7-11.
Hort. amb. t. 96.
Merian. inſ. europ. 1. *p.* 15. *t.* 42.
Habitat in populi nigrae *foliis ſaccatis, petiolorumque utriculis coloratis.*

aparines. 59. Aph. galii aparines. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 10.
Habitat in galio aparine.

urticae. 30. Aph. urticae alba lanata poſterius truncata.
Friſch inſ. 8. *p.* 34. *t.* 17.
Habitat in Germaniae *urtica, inter maximas ſui generis, ſetis, ſubtus lana obtecta.*

aceris. 31. Aph. aceris platanoidis. *Fn. ſuec.* 999.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 385. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 11. Aphis aceris campeſtris.

Geoffr.

Geoffr. inſ. par. I. *p.* 495. *n.* 5. Aphis (aceris) viridis maculis nigris.
Reaum. inſ. 3. *t.* 22. *f.* 6-10.
Habitat in aceris campeſtris *et* platanoidis *foliis.*

atriplicis. 32. Aph. atriplicis. *Fn. ſuec.* 1000.
Habitat ſub atriplicis, *inprimis* littoralis, *foliis, intra cylindrum ex foliis revolutis confectum obambulans.*

piſtaciae. 33. Aph. nigra, alis albidis, tibiis longiſſimis, thorace verrucoſo.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 389. *n.* 42. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 47. Aphis piſtaciae lentiſci.
Siml. vit. geſ. 49.
Camer. epit. 51.
Lob. ic. 100.
Dodon. pempt. 780.
J. Bauh. hiſt. I. *p.* 279.
Theodor. hiſt. 1439.
Habitat in piſtacia vera, terebintho, lentiſco, *antennis moniliformibus, oculis nigricantibus, abdomine poſterius mutico, lanugine alba globulis miſta tecto, alis interdum erectis, in folliculo, e foliorum baſi enaſcente, ventricoſo, utrinque attenuato, ſpithameo, pollice craſſiore, primo viridi, poſt exitum aphidis incarnato.*

perſicae. 60. Aph. amygdali perſicae.
Sulz. hiſt. inſ. p. 105. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat in amygdalo perſica, *inter majores, viridis, capite thorace tibiisque nigris, alis longiſſimis, antennis corpore longioribus, roſtro brevi.*

polyanthis. 61. Aph. polyanthis tuberoſae.
Sulz. hiſt. inſ. p. 105. *t.* 11. *f.* 4. 5.
Habitat in polyanthe tuberoſa, *fuſca, globoſa, antennis corpori aequalibus; mare minore, dorſo griſeo, utplurimum alato.*

saligna. 62. Aph. griſeo-fuſca, roſtro longiſſimo, antennis brevioribus, corniculis nullis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 11. *f.* 6.
Habitat in ſalice.

plantaginis. 63. Aph. plantaginis. *Bonnet inſectol.* I. *p.* 56.
Habitat in plantaginum *caulibus.*

archangelicae. 64. Aph. angelicae archangelicae. *Scop. entom. carn. p.* 137. *n.* 400.
Habitat in angelica archangelica, *nigra, roſtro et abdomine virentibus.*

leucanthemi. 65. Aph. chryſanthemi leucanthemi. *Scop. ent. carn. p.* 138. *n.* 404.
Habitat in chryſanthemo leucanthemo, *nigra, abdomine roſtroque vireſcentibus, hoc apice fuſco.*

ſcabioſae. 66. Aph. ſcabioſae. *Scop. ent. carn. p.* 138. *n.* 405.
Habitat in ſcabioſis.

fabae. 67. Aph. viciae fabae. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 406.
Habitat in vicia faba, *quam ſterilem reddit.*

geniſtae. 68. Aph. geniſtae tinctoriae. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 409.
Habitat in geniſta tinctoria, *nigra, alis puncto fuſco.*

coryli. 69. Aph. coryli avellanae. *Goeze entom. Beytr.* 2. *p.* 311.
Habitat in coryli avellanae *foliorum pagina inferiori, albida, minor.*

juglandis. 70. Aph. juglandis regiae.
Friſch inſ. 11. *p.* 12. *n.* 10. *t.* 16.
Habitat in juglande regia, *flavo-viridis, antennis brevioribus, corpore ſegmentis quinque ſupra nigris conſtante.*

balſamitae. 71. Aph. tanaceti balſamitae. *Müll. zoòl. dan. prodr. p.* 109. *n.* 1252.
Habitat in tanaceto balſamita, *nigra, abdomine viridi, oculis rubris.*

gallarum. 72. Aph. gallarum ulmi. *Degeer inſ.* 3. *p.* 89. *n.* 14. *t.* 4. *f.* 15.
Reaum. inſ. 3. *p.* 299. *t.* 25. *f.* 4-7.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 494. *n.* 1. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in folliculis foliorum ulmi, *nigricans, corniculis nullis.*

farinoſa. 73. Aph. ſalicis farinoſa. *Degeer inſ.* 3. *p.* 76. *n.* 11.
Habitat in ſalice, *obſcure viridis, tuberculis lanuginoſis albis, corniculis longioribus.*

xyloſtei. 74. Aph. lonicerae xyloſtei. *Degeer inſ.* 3. *p.* 96. *n.* 16. *t.* 7. *f.* 8.
Habitat in lonicera xyloſteo, *tomentoſa, corniculis nullis.*

Mayeri. 75. Aph. rubra, antennis thorace brevioribus, abdomine extenuato, tibiis brevioribus. *Mayer Abh. boehm. Geſ.* 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiae *foliis* tanaceti vulgaris, *aptera.*

228. CHERMES. *Roſtrum* vagina pectorali: ſetis tribus inflexis.

Antennae cylindricae, thorace longiores.

Alae quatuor deflexae.

Thorax gibbus.

Pedes ſaltatorii.

graminis. 1. Ch. airae flexuoſae. *Fn. ſuec.* 1001.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 1.
Habitat in Europae *graminibus, inprimis* aira flexuoſa.

ulmi. 2. Ch. ulmi campeſtris. *Fn. ſuec.* 1002.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 2. *mant. inſ. p.* 317. *n.* 2.
Habitat intra ulmi campeſtris *folia revoluta.*

ceraſtii. 3. Ch. ceraſtii viſcoſi. *Fn. ſuec.* 1003. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 4.
Habitat in ceraſtii viſcoſi *foliis, in capitulum conniventibus.*

pyri. 4. Ch. pyri communis. *Fn. ſuec.* 1004.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 3.
Degeer inſ. 3. *p.* 141. *n.* 2. *t.* 9. *f.* 2. Chermes (pyri) viridi-fuſca maculis faſciisque obſcuris, alis fuſco maculatis.
Habitat in pyri communis *foliis.*

ſorbi. 5. Ch. ſorbi aucupariae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 7.
Habitat in ſorbo aucuparia, *ſupra lituris lineisque variis nigris varia, ſubtus virens, thorace flaveſcente, anterius punctis duobus, poſterius lineis quatuor nigris.*

Chermis *larvae pedatae, ſaepius villoſae; imagines ſaliunt, plantis inſident, ceterum aphidibus ſimiles.*

perſicae. 18. Ch. amygdali perſicae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 8.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 506. *n.* 4. Chermes perſicae oblongus.
Reaum. inſ. 4. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat in amygdali perſicae *ramis.*

calthae. 6. Ch. calthae paluſtris. *Fn. ſuec.* 1005.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 9.
Habitat in calthae paluſtris *floribus.*

buxi. 7. Ch. buxi ſempervirentis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 5.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 485. *n.* 2. Pſylla viridis, antennis ſetaceis, alis fuſco-flaveſcentibus.
Reaum. inſ. 3. *t.* 19. *f.* 1-14.
Habitat intra Europae *magis auſtralis* buxi *folia ſumma conniventia, Majo interdum* Argentorati *frequentiſſima, excrementa dulcia, cito tamen aceſcentia, et poſtea foetida excernens.*

urticae. 8. Ch. urticae dioicae. *Fn. ſuec.* 1006.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 10.
Degeer inſ. 3. *p.* 134. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 17-19. Chermes (urticae) fuſca ſ. vireſcens, abdominis lateribus albo maculatis.
Habitat in urticae dioicae *foliis.*

betulae. 9. Ch. betulae albae. *Fn. ſuec.* 1007.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 11.
Habitat in betulae albae *ramis.*

alni. 10. Ch. betulae alni. *Fn. ſuec.* 1008.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 12. *mant. inſ. p.* 318. *n.* 12.
Degeer inſ. 3. *p.* 148. *n.* 3. *t.* 10. *f.* 8. Chermes alni lanata viridis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 486. *n.* 3. Pſylla viridis, antennis ſetaceis, alis aqueis.
Friſch inſ. 8. *p.* 48. *t.* 13. Vermis ſuctorius alni.
Sulz. inſ. t. 12. *f.* 80.
Schaeff. elem. t. 39.
Habitant in betulae alni *ramulis larvae, caudis plumoſis tectae.*

quercus. 11. Ch. quercus roboris. *Fn. ſuec.* 1009.*
Habitat in quercus *foliis, ex flavo albicans ad marginem alarum interiorem litura, ad exteriorem quatuor fuſcis.*

12. Ch.

ſagi. 12. Ch. fagi ſylvaticae. *Fn. ſuec.* 1010. *it. ſcan.* 65. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 6.
Reaum. inſ. 3. *t.* 26. *f.* 1-6.
Habitat in fagi ſylvaticae *foliis.*

abietis. 13. Ch. pini abietis. *Fn. ſuec.* 1011.* *fl. lappon.* 218. *p.* 347. E. *it. gotl.* 180. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 13.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 487. *n.* 5. Pſylla pallide flaveſcens, oculis fuſcis, alis aqueis.
Degeer inſ. 3 *p.* 99. *n.* 17. *t.* 8. *f.* 1-3. Aphis (gallarum abietis) tomentoſa, corniculis nullis.
Friſch inſ. 12. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 3. Inſectum tuberculi muricati arboris taxi.
Cluſ. pannon. 20, 21. Picea pumila.
Habitat frequens in turionum abietis *gallis ſtrobiliformibus, ſquamatis, imbricatis.*

ſalicis. 14. Ch. ſalicis. *Fn. ſuec.* 1012. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 14.
Habitat in Europae *ſalicibus.*

fraxini. 15. Ch. fraxini excelſioris. *Fn. ſuec.* 1013. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 15.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 486. *n.* 4. Pſylla nigro luteoque variegata, alarum ore in apicibus fuſcis.
Habitat in fraxino.

aceris. 16. Ch. aceris platanoidis. *Fn. ſuec.* 1014. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 16.
Habitat in aceris platanoidis *racemis.*

ficus. 17. Ch. ficus caricae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 17.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 484. *n.* 1. Pſylla fuſca, antennis craſſis piloſis, alarum nervis fuſcis.
Reaum. inſ. 3. *t.* 29. *f.* 17-24.
Habitat in Europae *magis auſtralis* ficu carica.

pini. 19. Ch. pini lanata. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 699.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 488. *n.* 6.
Habitat in pinu; *an eadem cum ch. abietis?*

20. Ch.

lichenis. 20. Ch. fuſca nigro punctata, antennis corpore longioribus, alis nervoſis fuſco maculatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 88. *n.* 7.
Habitat in lichenibus.

caſtanea. 21. Ch. fuſca, antennis ſetaceis laevibus, alis nervoſis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 489. *n.* 8.
Habitat in variis plantis.

rubra. 22. Ch. rubra, alis nervoſis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 489. *n.* 9.
Habitat in variis plantis.

pruni. 23. Ch. pruni domeſticae. *Scop. ent. carn. p.* 140. *n.* 414.
Habitat in pruno domeſtica, *abdomine rubro: punctis faſciisque lateralibus fuſcis.*

crataegi. 24. Ch. crataegi oxyacanthae. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 412.
Habitat in crataego oxyacantha; *larva ex plumpeo virente: plica abdominis longitudinali media.*

euonymi. 25. Ch. euonymi europaei. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 411.
Habitat in euonymo europaeo, *nigra, pedibus pallidis.*

ſenecionis. 26. Ch. ſenecionis vulgaris. *Scop. ent. carn. p.* 140. *n.* 413.
Habitat in ſenecione vulgari, *ex flavo virens, antennarum articulo ultimo craſſiore, duobus pilis terminato.*

229. COCCUS. *Roſtrum* vagina ſetisque pectoralibus.

Antennae filiformes.

Abdomen poſterius ſetoſum.

Alae duae erectae maſculis; *feminae* apterae.

heſperidum. 1. C. hybernaculorum. *Fn. ſuec.* 1015.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 393. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 1. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 19. §. 8.
Fn. ſuec. 722. Coccus heſperidum.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 505. *n.* 2. Chermes heſperidum.
Act. Pariſ. 1692. *p.* 14. *t.* 14.
Reaum. inſ. 4. *t.* 1.
Friſch inſ. 12. *p.* 12.
Sulz. inſ. t. 12. *f.* 81.
Schaeff. elem. t. 48.
Habitat in hybernaculorum *arboribus ſempervirentibus, frequentiſſimus*, e. g. citro, lauro, quaſſia, *ſpadiceus, ovato-oblongus.*

Aonidum. 2. C. indarum arborum. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 393. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 2. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 30. §. 26.
Habitat in Aſiae *arboribus ſempervirentibus*, Camellia &c. *cocco heſperidum minor, apterus, flaveſcens, oblongus, vel ſuborbicularis, antennis longitudine fere thoracis, teſta orbiculata, planiuſcula, atro-purpuraſcente: centro ſ. vertice tuberculato, rotundo, rubro, in ſeneſcentibus aperto.*

capenſis. 3. C. ovalis ſubtomentoſus conico-gibbus: apice operculato. *Amoen. acad.* 6. *p.* 401. *n.* 47.* *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 3. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 31. §. 28.
Habitat ad caput bonae ſpei *in* gnaphalio muricato.

Adonidum. 4. C. rufus farinaceus piloſus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 393. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 4. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 48. §. 34.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 511. *n.* 1. Coccus adonidum, corpore roſeo farinaceo, alis ſetisque niveis.
Fn. ſuec. 1. *n.* 1169. Pediculus adonidum.

β) Lederm.

β) *Lederm. microſc.* 1762. *t.* 9. Pediculus coffeae.
Habitat in Americae, Africae, *nunc in* Europae *calidioris arboribus, corpore ovato oblongiuſculo albo, antennis pedibusque fuſcis; linea dorſali longitudinali elevata, cum puncto elevato in ſingulis ſegmentis, laterum marginibus acutis, cum inciſuris punctisque prominentibus* 14, *area inter lineam dorſalem et marginem totidem punctis ſecundum longitudinem diſpoſitis conſperſa, cauda bifida: Serior folliculum ſtruit, ſe ſexies majorem, in quo ſe ſuaque ova flava condit.*

quercus. 5. C. quercus roboris. *Fn. ſuec.* 1016. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 393. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 5.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 508. *n.* 13. Chermes quercus reniformis.
Reaum. inſ. 4. *t.* 6. *f.* 1-4.
Habitat in Quercu Robore.

ilicis. 6. C. quercus cocciferae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 393. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 6. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 24. §. 19.
Garid. aixenſ. 250. *t.* 53.
Reaum. inſ. 4. *t.* 5.
Geoffr. mat. med. 2. *p.* 782.
Lederm. microſ. 72. *t.* 36.
Habitat in Galloprovinciae quercu coccifera, *nitens fuſcus albo-villoſus, aceto immerſus et ſupra lintea exſiccatus tinctorius.*

betulae. 7. C. betulae albae. *Fn. ſuec.* 1017. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 394. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 10. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 23. §. 16.
Habitat in Europae betula alba, *teres, ſpadiceus.*

carpini. 8. C. carpini betuli. *Fn. ſuec.* 1018. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 394. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 11. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 29. §. 24.

Habitat

Cocci, *hybernaculorum peſtis, juniores in ramis foliisque arborum decurrunt, volandoque ſaliunt, aliquas ſubeunt metamorphoſes, ut tamen Adonidum, polonicus, ſpurius, cacti phalaridis, piloſellae, uvae urſi et alni faciem vix mutent; adultiores, feminae praeſertim maribus multoties majores, oculis nigris antennis pedibusque minimis inſtructae, fertiliſſimae, ut ſingulae per rimam caudalem foecundatae ad* 1000 *ova contineant, tardi, adhaerent plantis, ſaepe ramis, alii radicibus, fere immobiles.*

Habitat in carpinio betulo, *ſubſphaericus*, *pallide rubeſcens, ſtria ad latus elevata.*

ulmi. 9. C. ulmi campeſtris. *Fn. ſuec.* 1019. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 393. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 8. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 27. §. 21.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 507. *n.* 8. Chermes ulmi rotundus.
Degeer inſ. 6. *p.* 436. *n.* 1. *t.* 28. *f.* 7. Coccus ovatus albus fuſco transverſe ſtriatus, ulmi.
Habitat in ulmo campeſtri, *brunneus; faſciis transverſis fuſcis.*

coryli. 10. C. coryli avellanae. *Fn. ſuec.* 1020. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 394. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 9. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 29. §. 23.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 507. *n.* 10. Chermes coryli hemiſphaericus.
Reaum. inſ. 4. *t.* 3. *f.* 4-10.
Habitat in corylo avellana, *citreus, rubro maculatus.*

tiliae. 11. C. tiliae europaeae. *Fn. ſuec.* 1021. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 394. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 12. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 30. §. 25.
Geoffr. inſ. par. 1. *p. p.* 507. *n.* 9. Chermes tiliae hemiſphaericus.
Reaum. inſ. 4. *t.* 3. *f.* 1-3.
Habitat in tilia europaea.

ruſci. 12. C. ruſci, teſta octo clypeolis cincta. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 394. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 13. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 31. §. 29.
Columm. purp. 16. *t.* 17. Lepas nova ſ. myrti morbus.
Ginann. adr. 1. *p.* 60. *t.* 3. *f.* 27. Balanus terreſtris compoſitus e multis teſtis.
Klein oſtr. 116. Lepas teſſellata.
Bocc. muſ. t. 107. *f.* XXIII. h. h.
Habitat in Apuliae myrto, ruſco; *teſta truncata, octogona, perforata, clypeolis, praeter duos laterales oppoſitos, in medio granulo notatis.*

myricae. 13. C. myricae quercifoliae. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 14. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 31. §. 27.
Habitat ad caput bonae ſpei, *in* myrica quercifolia, *piſi minoris magnitudine, ſemiovatus, pallide incarnatus, vertice*

vertice obtuſe acuminato cum poro tenuiſſimo; poro alio poſterius ſupra marginem cartilagineum craſſiorem, album, utrinque ſeptem circiter torulis protuberantem.

capreae. 14. C. ſalicis cinereae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 394. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 15. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 22. §. 15.
Degeer inſ. 6. *p.* 440. *n.* 2. *t.* 28. *f.* 13. Coccus ſubrotundus fuſcus, linea dorſali nigra, ſalicis.
Habitat in Europae ſalicibus, *quibus folia hirſuta, piſi majoris magnitudine, ſemiamplexicaulis, ovatus, anterius obtuſus et biſidus, colore ſeminis ſtaphyleae, linea media nigra, nitens, glaber.*

ſalicis. 15. C. ſalicis hermaphroditae. *Fn. ſuec.* 1022.* *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 21. §. 12.
Habitat in ſalicis hermaphroditae *cortice, minimus, depreſſiuſculus, cinereus.*

vitis. 16. C. vitis viniferae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 18. *mant. inſ.* 2 *p.* 319. *n.* 25. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 20. §. 9.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 506. *n.* 6. Chermes vitis oblongus.
Act. bonon. 2. *p.* 279. *t.* 284.
Reaum. inſ. 4. *t.* 6. *f.* 5-7.
Habitat in vitis viniferae *ramis, cinnamomeus.*

ficus. 23. C. ficus religioſae et indicae. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 7.
Kerr act. angl. 1781. *p.* 374. *f.* a. b. Coccus Lacca.
Habitat in Indiae ficu religioſa *et* indica, gummilaccam *producens, ruber, antennis ramoſis, cauda biſeta.* Swagermann.

polonicus. 17. C. radicis ſcleranthi perennis. *Fn. ſuec.* 1023. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 20. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 23. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 34. §. 31.
Fn. ſuec. 720. Coccus radicum purpureus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 504. *n.* 1. Chermes radicum purpureus.
Breyn act. phyſ. med. 6. 3. *app.* 5. *t.* 1. Coccus tinctorius radicum.
Camer. epit. 691. Polygonum cocciferum.
Baub. pin. 281.
Rupp. jen. 86.
Raj. biſt. 186.
Baub. biſt. 3. *p.* 378.

Friſch

Friſch inſ. 5. p. 6. t. 2.
Act. upſ. 1742. t. 1.
Reaum. inſ. 4. p. 1.
Habitat in ſcleranthi perennis *radicibus, oblongo-ovatus, purpureus aut ſpadiceus olim,* Coiaccis *adhuc tinctorius.*

fragariae. 24. C. fragariae veſcae. *S. G. Gmelin it. 1. p. 205. 3. p. 312.*
Act. angl. 1765. p. 91. t. 10.
Mayer act. ſoc. priv. boh. 4. p. 152. 184. Coccus potentillae.
Habitat in Europa *et* Sibiria *ad* fragariae veſcae, potentillae vernae, reptantis, albae *radices, ruſticis Ruſſis ad tingenda colore kermeſino lintea uſitatus, roſtro nigro, thorace trirugi, ano pilis nigreſcentibus cincto.*

hypericonis. 25. C. hypericonis perforati. *Pallas it. 1. p. 21.*
Habitat in Ruſſiae hypericone perforato.

piloſellae. 18. C. radicis hieracii piloſellae. *Fn. ſuec. 1024. Fabr. ſp. inſ. 2. p. 394. n. 13. mant. inſ. 2. p. 319. n. 16. Modeer act. Gothenb. 1. p. 49. §. 36.*
Sim. Paul. quadr. 113.
Act. upſal. 1742. p. 54. t. 2.
Habitat in hieracii piloſellae *radicibus.*

uvae urſi. 19. C. radicis arbuti uvae urſi. *Fabr. ſp. inſ. 2. p. 394. n. 14. mant. inſ. 2. p. 319. n. 17. Modeer act. Gotheub. 1. p. 49. §. 37.*
Habitat ſub muſcis ad radices arbuti uvae urſi, *tinctorius, ſpadiceus.*

phalaridis. 20. C. radicum phalaridis. *Fn. ſuec. 1026. Fabr. ſp. inſ. 2. p. 395. n. 15. mant. inſ. 2. p. 319. n. 18. Modeer act. Gothenb. 1. p. 48. §. 35.*
Geoffr. inſ. par. 1. p. 512. n. 2. t. 10. f. 5. Coccus graminis, corpore roſeo.
Habitat ad graminum, *praeſertim* phalaridis canarienſis, *radices, oblongo-ovatus, albidus vel pallide rubeſcens.*

oxyacanthae. 21. C. crataegi oxyacanthae. *Fabr. ſp. inſ. 2. p. 395. n. 16. mant. inſ. 2. p. 319. n. 19. Modeer act. Gothenb. 1. p. 20. §. 10.*
Reaum. inſ. 4. t. 6. f. 11. 12.
Habitat in crataego oxyacantha, *oblongus, ſpadiceus.*

ſerratulae. 26. C. ſerratulae arvenſis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 20.

Habitat in Angliae ſerratula arvenſi.

zoſterae. 27. C. zoſterae marinae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 19. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 22.

Habitat in maris balthici zoſtera marina.

cacti. 22. C. cacti coccinelliferi. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 21. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 24. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 44. §. 33.

Brown jam. 435. Coccinella alis deſtituta, corpore rugoſo.

Degeer inſ. 6. *p.* 447. *n.* 1. *t.* 80. *f.* 12-14. Coccus cacti coccinelliferi.

Act. angl. 1762.

Hernand. mex. 78.

Sloan. jam. 2. *p.* 153. *praef. t.* 9.

Pet. gazoph. 3. *t.* 1. *f.* 5.

Reaum. inſ. 4. *t.* 7. *f.* 11. 12.

Rauſch hiſt. nat. de la cochinille. t. 1. *f.* 1-5.

Habitat in Americae cactis opuntiis, *depreſſus, tomentoſus, transverſe rugoſus, dorſi margine laterali utrinque duplici: ſuperiore breviore, abdomine purpuraſcente, pedibus brevibus nigris, antennis ſubulatis, corpore tertia parte brevioribus, eximie tinctorius.*

liriodendri. 28. C. liriodendri tulipiferae. *Hamburg. Magaz.* 12. *p.* 1-24.

Habitat in liriodendro tulipifera.

farinoſus. 29. C. ovatus tomentoſus pallide fuſcus albo-farinoſus. *Degeer inſ.* 6. *p.* 442. *n.* 3. *t.* 38. *f.* 16. 17. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 50. §. 38.

Habitat in betula alno, *depreſſiuſculus.*

clematidis. 30. C. clematidis oblongus.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 506. *n.* 1.

Habitat in clematidibus.

perſicae. 31. C. perſicae rotundus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 28. §. 22.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 506. *n.* 5.

Reaum. inſ. 4. *t.* 2. *f.* 4. 5.

Habitat in amygdala *perſica, nitens, rubicundus, ſpadiceus aut niger,*

32. C.

abietis. 32. C. abietis rotundus. *Modeer act. Gothenb.* I. *p.* 27. §. 20.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 507. *n.* 7.
Habitat in pinu abiete; *badius.*

fuſcus. 33. C. quercus fuſcus. *Modeer act. Gothenb.* I. *p.* 24. §. 18.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 507. *n.* II.
Reaum. inſ. 4. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat in quercu robore, *albo tomento obductus.*

variegatus. 34. C. quercus rotundus ex albo, flaveſcente nigroque varius.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 508. *n.* 12.
Reaum. inſ. 4. *t.* 5. *f.* 3. a.
Habitat in quercu robore.

lanatus. 35. C. quercus oblongus: ſerico albo.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 508. *n.* 14.
Habitat in quercu robore; *nonne mera varietas fuſci?*

meſpili. 36. C. meſpili: ſerico albo.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 508. *n.* 16.
Habitat in meſpilis.

conchiformis. 37. C. arborum linearis. *Modeer act. Gothenb.* I. *p.* 22. §. 14.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 509. *n.* 17.
Reaum. inſ. 4. *t.* 5-7.
Habitat in ulmo, *anguſtus, fuſcus.*

aceris. 38. C. aceris ovatus. *Modeer act. Gothenb.* I. *p.* 21. §. 13.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 509. *n.* 18.
Habitat in acere, *ovato-depreſſus, ſtriis ad latera longitudinalibus albis aut cinereis.*

laniger. 39. C. fuſcus: ſerico albo.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 512. *n.* 3.
Reaum. inſ. 4. *t.* 7. *f.* I. 2. 6. 9.
Habitat in ulmo campeſtri.

dioſmatis. 40. C. dioſmatis crenatae. *Modeer act. Gothenb.* I. *p.* 21. § II.
Habitat in capitis bonae ſpei dioſmate crenato *et* pulchello, *ovato-oblongus.*

alni. 41. C. betulae alni. *Modeer act. Gothenb.* I. *p.* 23. §. 17.
Habitat in betulae alni *dichotomia ramorum, oblongo-ovatus, rubeſcens.*

Ura. 42. C. teſta fuſca ſphaerico-gibba, ſubflaveſcente. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 32. §. 30.
Habitat in Suecia *ſub lapidibus.*

ſpurius. 43. C. ovatus hinc inde piloſus ſpadiceus ſubtus pallide flavus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 43. §. 32.
Habitat in ulmi *ramorum dichotomia.*

230. THRIPS. *Roſtrum* obſoletum, intra os abſconditum.

Antennae filiformes longitudine thoracis.

Corpus lineare; *abdomen* ſurſum reflexile.

Alae quatuor rectae, dorſo incumbentes, longitudinales, anguſtae, ſubcruciatae.

paradoxa. 1. Thr. fuſca, alis abbreviatis, antennis pectinatis fiſſilibus aliformibus. *Amoen. acad.* 6. *p.* 401. *n.* 48.*
Habitat in Sina, *an hujus generis?*

phyſapus. 2. Thr. elytris glaucis, corpore atro. *Fn. ſuec.* 1027.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 385. *n.* 2. *Scop. ent. carn.* 418. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 396. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 1.
Degeer inſ. 3. *p.* 6. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. Thrips atra, alis albis, antennis ſexnodiis.
Degeer act. Stockh. 1744. *p.* 3. *t.* 4. *f.* 4. Phyſapus ater, alis albis.
Schaeff. elem. t. 127.
Habitat frequens in Europae floribus compoſitis, *loti corniculatae flores clauſos tumidosque reddens*, *ſecalis ſpicas exinaniens.*

minutiſſima. 3. Thr. elytris corporeque glauco, oculis fuſcis. *Fn. ſuec.* 1028.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 396. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 4.
Habitat in Europae *floribus.*

juniperina. 4. Thr. elytris niveis, corpore fuſco. *Fn. ſuec.* 1029.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 396. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 2.
Degeer inſ. 3. *p.* 10. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 5. Thrips griſeo-fuſca, oculis nigris, alis albeſcentibus.
Degeer act. Stockh. 1744. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 2. Phyſapus fuſcus, alis albicantibus.
Habitat in juniperi *gallis.*

ulmi. 6. Thr. nigra, alis niveis ciliatis, ano acuminato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 396. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 384. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 6. Thrips elytris albidis, corpore nigra abdominali ſeta.
Degeer inſ. 3. *p.* 11. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 8-13. Thrips (corticis) nigra, alis hyalinis niveis, barbis longiſſimis, antennis octonodiis.
Habitat gregaria in ulmi *cortice.*

urticae. 7. Thr. flava, elytris albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 397. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 5.
Schranck Beytr. zur Naturg. 31. *t.* 1. *f.* 25. 26.
Habitat in urticae, vitis, coryli *aliorumque foliorum pagina inferiori, ſolitaria.*

faſciata. 5. Thr. elytris albo nigroque faſciatis, corpore fuſco. *Fn. ſuec.* 1030.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 385. *n.* 3. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 397. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 6.
Degeer inſ. 3. *p.* 18. *n.* 4. Thrips atra, alis faſciis tranſverſis tribus albis, antennis annulo albo.
Sulz. inſ. t. 7. *f.* 48. b.
Habitat in Europae *floribus compoſitis.*

fuſca. 8. Thr. nigricans, elytris glaucis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 96. *n.* 1083.
Habitat in Dania, *an forſan femina faſciatae?*

obſcura. 9. Thr. flaveſcens, elytris pallidis, oculis abdominisque annulis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 96. *n.* 1084.
Habitat in Dania.

Thripes *in floribus frequentes agiliſſimae fere ſubſiliunt, abdomine ſaepius ſurſum flexo, tarſi veſiculoſi; larvae aeque agiles currunt, ſaepius rubrae.*

rufa. 10. Thr. rufa. *v. Gleichen Neueſtes im Reich der Pflanz. t.* 16. *f.* 6. 7.
Habitat in tritici *ſpicis, an forſan larva minutiſſimae?*

variegata. 11. Thr. variegata. *v. Gleichen Neueſtes im Reich der Pflanz. p.* 22. *t.* 21. *f.* 6. 7.
Habitat in linaria.